PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - TOÁN 12

Hệ thống bài tập ôn tập tổng hợp kiến thức giữa học kỳ I lớp 12, tập trung vào khảo sát hàm số (đơn điệu, cực trị, giá trị lớn nhất/nhỏ nhất, tiệm cận, đồ thị), hình học không gian (vectơ, tọa độ Oxyz) và các bài toán vận dụng thực tế (tối ưu hóa, mô hình hóa).

Dạng 1. Nhận diện hàm số từ đồ thị

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$: Nhánh cuối đi lên $\Rightarrow a > 0$, nhánh cuối đi xuống $\Rightarrow a < 0$. Giao với Oy tại $(0; d)$.
- Hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất $y = \frac{ax+b}{cx+d}$: Tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu $x = -\frac{d}{c}$, tiệm cận ngang là $y = \frac{a}{c}$.
- Hàm phân thức bậc hai/bậc nhất $y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$: Có tiệm cận đứng $x = -\frac{e}{d}$ và tiệm cận xiên $y = mx + n$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhìn nhánh cuối cùng bên phải: Lên là dương, Xuống là âm!

- **Công thức cốt lõi:** Đối với hàm phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, đường tiệm cận ngang là $y = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$. Tìm tung độ giao điểm của đồ thị với trục tung Oy .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Nhận diện hàm bậc ba: Cho đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có nhánh cuối cùng bên phải đi lên và cắt trục tung tại điểm $(0; 1)$. Xác định dấu của a và d .

Ví dụ 2 - Nhận diện hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất: Cho đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 2$. Xác định giá trị của a, c nếu biết $c = 1$.

Ví dụ 3 - Nhận diện hàm phân thức bậc hai/bậc nhất: Cho đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{x-1}$ có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận xiên $y = x + 2$. Xác định a và b .

Ví dụ 4 - Nhận diện hàm số qua giao điểm: Cho đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ cắt trục hoành tại $x = 2$ và cắt trục tung tại $y = -3$. Biết $c = 1, d = 1$. Tìm a và b.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có nhánh cuối cùng bên phải đi xuống. Xác định dấu của a.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có nhánh cuối cùng bên phải đi lên. Xác định dấu của a.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng $x = 3$ và tiệm cận ngang $y = -1$. Tìm a nếu biết $c = 1$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho đồ thị hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{x-1}$ có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận xiên $y = 2x + 3$. Tìm a và b.

✍ Bài làm:

Dạng 2. Xét tính đơn điệu của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng K khi và chỉ khi $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$ và $f'(x) = 0$ chỉ tại hữu hạn điểm.
- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$ và $f'(x) = 0$ chỉ tại hữu hạn điểm.
- Dựa vào đồ thị $f'(x)$: Khoảng $f'(x) > 0$ (nằm trên trục hoành) là khoảng đồng biến; khoảng $f'(x) < 0$ (nằm dưới trục hoành) là khoảng nghịch biến.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhìn dấu $f'(x)$: Dấu $+$ là 'lên' (đồng biến), dấu $-$ là 'xuống' (nghịch biến).

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số đồng biến trên khoảng K khi $f'(x)\breve{2}265...$ và nghịch biến trên khoảng K khi $f'(x)\breve{2}264...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$. Tìm khoảng đồng biến của hàm số.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x$. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: x | $-\infty$ | -1 | 1 | $+\infty$ $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$

Ví dụ 2 - Dựa vào đồ thị đạo hàm $f'(x)$: Cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ (giả sử đồ thị cắt trục Ox tại các điểm $x = -2$ và $x = 2$). Tìm các khoảng đồng biến của hàm số $y = f(x)$.

Ví dụ 3 - Dựa vào công thức hàm số (Hàm đa thức): Xét tính đơn điệu của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

Ví dụ 4 - Dựa vào công thức hàm số (Hàm phân thức): Xét tính đơn điệu của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$.

Ví dụ 5 - Dựa vào đồ thị $f'(x)$ (Biến thể): Cho đồ thị $y = f'(x)$ đi qua các điểm $(-1;0), (0;2), (1;0)$. Tìm khoảng nghịch biến của $y = f(x)$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: x | $-\infty$ | 0 | 2 | $+\infty$ $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: x | $-\infty$ | -2 | 3 | $+\infty$ $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$

✍ Bài làm:

Bài 3. Xét tính đơn điệu của hàm số $y = x^3 - 3x$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại các điểm $x = -1$ và $x = 1$. Tìm khoảng đồng biến của hàm số $y = f(x)$.

✍ Bài làm:

Dạng 3. Tìm cực trị của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tìm số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$, ta tìm số lần đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu khi đi qua các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$.
- Điểm cực trị của đồ thị hàm số là tọa độ $(x_0; y_0)$ sao cho $f'(x_0) = 0$ và $f(x_0) = y_0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Cực trị xảy ra khi đồ thị đạo hàm $f'(x)$ 'cắt xuyên qua' trục hoành. Nếu đồ thị chỉ 'chạm' (tiếp xúc) trục hoành mà không đổi dấu, đó không phải là điểm cực trị.

- **Công thức cốt lõi:** Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ bằng số lần đạo hàm $f'(x)$ … qua các nghiệm của $f'(x) = 0$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị đạo hàm $f'(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt và tại các điểm đó đạo hàm đều đổi dấu. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm tọa độ điểm cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Đếm số điểm cực trị từ đồ thị đạo hàm $f'(x)$: Cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ (giả sử đồ thị cắt trục hoành tại $x = -1, x = 1, x = 2$ và đổi dấu tại đó). Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Ví dụ 2 - Đếm số điểm cực trị từ đồ thị hàm số $f(x)$: Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ (giả sử đồ thị có 2 điểm 'đỉnh' và 'đáy'). Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Ví dụ 3 - Tìm tọa độ điểm cực đại: Tìm tọa độ điểm cực đại của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$.

Ví dụ 4 - Tìm tọa độ điểm cực tiểu: Tìm tọa độ điểm cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt và đổi dấu tại đó. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt và đổi dấu tại đó. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm tọa độ điểm cực đại của hàm số $y = x^3 - 3x + 5$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm tọa độ điểm cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 12x + 1$.

✍ Bài làm:

Dạng 4. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên một đoạn

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tìm GTLN và GTNN của hàm số liên tục $y = f(x)$ trên đoạn $[a;b]$, ta thực hiện các bước: 1. Tính $f'(x)$, tìm các điểm $x_i \in (a;b)$ mà tại đó $f'(x) = 0$ hoặc không xác định. 2. Tính các giá trị $f(a), f(b)$ và $f(x_i)$. 3. So sánh các giá trị đã tính, giá trị lớn nhất là $M = \max\{f(a), f(b), f(x_i)\}$ và giá trị nhỏ nhất là $m = \min\{f(a), f(b), f(x_i)\}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm GTLN/GTNN trên đoạn, hãy nhớ: 'Tính đạo hàm - Tìm nghiệm trong đoạn - So sánh đầu mút và cực trị'.

- **Công thức cốt lõi:** Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$ được tìm bằng cách so sánh các giá trị tại $f(a), f(b)$ và các điểm $x_i \in (a;b)$ sao cho $f'(x_i) = 0$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^2 - 4x + 5$ trên đoạn $[0;3]$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x$ trên đoạn $[0;2]$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức cho hàm đa thức: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-2;2]$.

Ví dụ 2 - Áp dụng cho hàm phân thức: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$.

Ví dụ 3 - Đọc bảng biến thiên: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như sau: x chạy từ -1 đến 3 , $f'(x)$ đổi dấu từ $+$ sang $-$ tại $x = 1$ và từ $-$ sang $+$ tại $x = 0$. Các giá trị là $f(-1) = 2, f(0) = 5, f(1) = 0, f(3) = 4$. Tìm GTLN và GTNN của hàm số trên $[-1;3]$.

Ví dụ 4 - Biến thể tìm giá trị tại điểm cho trước: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^2 + 2x + 3$ trên đoạn $[0;2]$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[-2;0]$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = x^3 - 3x + 5$ trên đoạn $[-2;0]$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = x^4 - 2x^2$ trên đoạn $[-2;2]$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0;2]$.

✍ Bài làm:

Dạng 5. Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Đường tiệm cận đứng (TCĐ) là đường thẳng $x = x_0$ nếu $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty$ hoặc $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty$. Đối với hàm phân thức, x_0 thường là nghiệm của mẫu số.
- Đường tiệm cận ngang (TCN) là đường thẳng $y = y_0$ nếu $\lim_{x \to +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \to -\infty} f(x) = y_0$. Đối với hàm phân thức bậc tử bằng bậc mẫu, y_0 là tỉ số các hệ số của bậc cao nhất.
- Đường tiệm cận xiên (TCX) là đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) nếu $\lim_{x \to +\infty} f(x) - (ax+b) = 0$. Thường áp dụng cho hàm phân thức có bậc tử lớn hơn bậc mẫu đúng 1 đơn vị.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Bậc tử < Bậc mẫu $\Rightarrow$ TCN là $y = 0$. Bậc tử = Bậc mẫu $\Rightarrow$ TCN là tỉ số hệ số. Bậc tử = Bậc mẫu + 1 $\Rightarrow$ Có TCX.

- **Công thức cốt lõi:** Để tìm tiệm cận xiên $y = ax + b$ của hàm số $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$, ta thực hiện phép chia đa thức để đưa về dạng $y = ax + b + \frac{R(x)}{Q(x)}$ với $\lim_{x \to infty} \frac{R(x)}{Q(x)} = 0$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+3}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2x-1}{x+1}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất: Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$.

Ví dụ 2 - Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất (trường hợp đặc biệt): Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{2x-2}$.

Ví dụ 3 - Hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất (Tìm TCX): Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-x+1}{x-1}$.

Ví dụ 4 - Hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất (Tìm TCX): Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\frac{2x^2+2x+2}{x-1}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{3x+2}{x-1}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{4x-5}{x+2}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2+3x+1}{x+2}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-4}{x-2}$.

✍ Bài làm:

Dạng 6. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Đối với hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ ($c\neq 0$), tâm đối xứng là giao điểm của hai đường tiệm cận: $I\left(-\frac{d}{c};\frac{a}{c}\right)$
- Đối với hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất $y=\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ ($d\neq 0$), tâm đối xứng là giao điểm của đường tiệm cận đứng $x=-\frac{e}{d}$ và đường tiệm cận xiên.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Tâm đối xứng của hàm phân thức chính là 'điểm giao' của các đường tiệm cận.

- **Công thức cốt lõi:** Tâm đối xứng của đồ thị hàm số phân thức là giao điểm của $I(x_0;y_0)$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-x+1}{x-1}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Hàm bậc nhất/bậc nhất: Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{x-1}$.

Ví dụ 2 - Hàm bậc nhất/bậc nhất (biến thể số): Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-3}{x+2}$.

Ví dụ 3 - Hàm bậc hai/bậc nhất: Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-x+1}{x-1}$.

Ví dụ 4 - Hàm bậc hai/bậc nhất (biến thể số): Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2+2x+2}{x-1}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{x-1}{x+1}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{x+2}{x-2}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-x+1}{x-1}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2+2x+2}{x-1}$.

✍ Bài làm:

Dạng 7. Phân tích và biểu diễn vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ (với A là đỉnh và C' là đỉnh đối diện qua tâm hình hộp)
- Quy tắc cộng vectơ trong hình lăng trụ: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'}$
- Tính chất trọng tâm/tâm đáy: Trong hình chóp có đáy là hình bình hành tâm O, ta có $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm vectơ đường chéo của hình hộp, hãy cộng 3 vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh và cùng hướng với 3 cạnh của hình hộp đó.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, vectơ đường chéo $\overrightarrow{AC'} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\overrightarrow{AC'}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Tính tổng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 2 - Quy tắc cộng trong hình lăng trụ: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{B'C}$ theo $\vec{a} = \overrightarrow{AA'}, \vec{b} = \overrightarrow{AB}, \vec{c} = \overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 3 - Tính chất tâm đáy hình chóp: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Tính $\overrightarrow{SA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

Ví dụ 4 - Biểu diễn vectơ trong hình hộp chữ nhật: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm BC. Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 5 - Biến thể hình chóp: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Chứng minh $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{BD'}$ theo $\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BB'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tính $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{A'C}$ theo $\vec{a}=\overrightarrow{AA'},\vec{b}=\overrightarrow{AB},\vec{c}=\overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Dạng 8. Tọa độ vectơ và điểm trong không gian Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Nếu $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$ thì $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$
- Hình chiếu vuông góc của điểm $A(x_A;y_A;z_A)$ lên các trục tọa độ lần lượt là: $Ox(x_A;0;0)$, $Oy(0;y_A;0)$ và $Oz(0;0;z_A)$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm vectơ $\overrightarrow{AB}$, lấy 'Sau trừ Trước' (tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A). Muốn tìm hình chiếu lên trục nào thì giữ nguyên tọa độ trục đó, các trục còn lại cho bằng 0.

- **Công thức cốt lõi:** Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ được tính bằng công thức: $\overrightarrow{AB}=(...;...;...)$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho điểm $A(3;-2;5)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên trục Ox .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho $A(1;2;3)$ và $B(4;5;6)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm tọa độ vectơ từ hai điểm cho trước: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(4;5;6)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Ví dụ 2 - Tìm hình chiếu lên trục Ox : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(5;-1;2)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Ox .

Ví dụ 3 - Tìm hình chiếu lên trục Oy : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-3;4;7)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Oy .

Ví dụ 4 - Tìm hình chiếu lên trục Oz : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;0;-5)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Oz .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;3;4)$ và $B(5;6;7)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(2;3;4)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1;4;-2)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên trục Oy .

✍ Bài làm:

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3;-2;5)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên trục Oz .

✍ Bài làm:

Dạng 9. Tích vô hướng và góc giữa hai vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được tính bởi công thức: $\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}| \,.\, |\vec{b}| \cos(\theta)$, trong đó θ là góc giữa hai vectơ đó.
- Góc θ giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được xác định qua công thức: $\cos(\theta) = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}| \,.\, |\vec{b}|}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính tích vô hướng, hãy nhớ: 'Độ dài nhân độ dài, rồi nhân cos góc'. Muốn tìm góc, hãy lấy 'Tích chia cho tích độ dài'.

- **Công thức cốt lõi:** Công thức tính tích vô hướng là $\vec{a}.\vec{b} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 5$ và góc giữa chúng là 60° . Tính $\vec{a}.\vec{b}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $\vec{a}.\vec{b} = -6$, $|\vec{a}| = 3$ và $|\vec{b}| = 4$. Tính $\cos(\theta)$ (với θ là góc giữa hai vectơ).

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính tích vô hướng khi biết độ dài và góc: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ và góc giữa chúng là 60° . Tính $\vec{a}.\vec{b}$.

Ví dụ 2 - Tính góc giữa hai vectơ khi biết tích vô hướng và độ dài: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $\vec{a}.\vec{b} = -4$, $|\vec{a}| = 2$ và $|\vec{b}| = 4$. Tính góc θ giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Ví dụ 3 - Áp dụng vào hình học (Tứ diện đều): Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 4 - Áp dụng vào hình học (Tứ diện đều biến thể): Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh $a\frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{DA}.\overrightarrow{DC}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có $|\vec{a}| = 6$, $|\vec{b}| = 2$ và góc giữa chúng là 120° . Tính $\vec{a}.\vec{b}$.

✍️ Bài làm:

Bài 2. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 5$ và góc giữa chúng là 60° . Tính $\vec{a}.\vec{b}$.

✍️ Bài làm:

Bài 3. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $\vec{a}.\vec{b} = 10$, $|\vec{a}| = 5$ và $|\vec{b}| = 4$. Tính $\cos(\theta)$ (với θ là góc giữa hai vectơ).

✍️ Bài làm:

Bài 4. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}$.

✍️ Bài làm:

Dạng 10. Mô hình hóa thực tế: Bài toán tối ưu hóa (Doanh thu/Lợi nhuận)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tìm lợi nhuận lớn nhất, ta thiết lập hàm lợi nhuận $L(x) = R(x) - C(x)$, trong đó $R(x)$ là doanh thu và $C(x)$ là chi phí.
- Doanh thu được tính bằng công thức $R(x) = x \times p(x)$, với x là số lượng sản phẩm và $p(x)$ là giá bán mỗi sản phẩm.
- Để tìm giá trị lớn nhất của hàm số $L(x)$, ta tính đạo hàm $L'(x)$, tìm các điểm tới hạn và xét dấu hoặc lập bảng biến thiên.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí. Muốn tối ưu lợi nhuận, hãy tìm cực trị của hàm lợi nhuận!

- **Công thức cốt lõi:** Hàm lợi nhuận được xác định bởi công thức $L(x) = \ldots - C(x)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một cửa hàng bán trà sữa với giá 20.000 đồng/ly, mỗi ngày bán được 100 ly. Nếu giảm giá 1.000 đồng cho mỗi ly thì số lượng bán được tăng thêm 10 ly. Tính số ly trà sữa bán được mỗi ngày để lợi nhuận cao nhất (giả sử chi phí mỗi ly là 10.000 đồng).

Đáp số: .....

Câu 2. Một công ty sản xuất sản phẩm với chi phí $C(x) = x^2 + 250x + 40000$ (đơn vị: nghìn đồng). Tìm số lượng sản phẩm x để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là thấp nhất.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Bài toán giá bán và số lượng: Một cửa hàng bán bánh với giá 30.000 đồng/chiếc, mỗi ngày bán được 3000 chiếc. Nếu giảm giá 1.000 đồng cho mỗi chiếc thì mỗi ngày sẽ bán thêm được 100 chiếc. Biết chi phí sản xuất mỗi chiếc bánh là 18.000 đồng. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất?

Ví dụ 2 - Bài toán chi phí trung bình: Một xưởng sản xuất có tổng chi phí là $C(x) = x^2 + 250x + 40000$ (đơn vị: nghìn đồng), với x là số sản phẩm. Tìm số lượng sản phẩm x để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là thấp nhất.

Ví dụ 3 - Bài toán lợi nhuận hàm bậc ba: Lợi nhuận của một công ty được mô hình hóa bởi hàm số $L(x) = -x^3 + 150x^2 + 60000x$ (đơn vị: triệu đồng), với x là số sản phẩm. Tìm số lượng sản phẩm x để lợi nhuận đạt cực đại.

Ví dụ 4 - Bài toán tối ưu hóa doanh thu: Một cửa hàng bán vé xem phim với giá 100.000 đồng/vé, mỗi ngày bán được 500 vé. Nếu tăng giá thêm 10.000 đồng cho mỗi vé thì số lượng vé bán được giảm đi 20 vé. Tính giá bán để doanh thu đạt cao nhất.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một cửa hàng bán áo với giá 40.000 đồng/chiếc, mỗi ngày bán được 200 chiếc. Nếu giảm giá 1.000 đồng cho mỗi chiếc thì số lượng bán được tăng thêm 10 chiếc. Biết chi phí mỗi chiếc là 25.000 đồng. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu để đạt lợi nhuận cao nhất?

✍ Bài làm:

Bài 2. Một cửa hàng bán giày với giá 50.000 đồng/đôi, mỗi ngày bán được 400 đôi. Nếu giảm giá 2.000 đồng cho mỗi đôi thì số lượng bán được tăng thêm 40 đôi. Biết chi phí mỗi đôi là 30.000 đồng. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu để đạt lợi nhuận cao nhất?

✍ Bài làm:

Bài 3. Một công ty sản xuất sản phẩm với tổng chi phí là $C(x) = x^2 + 300x + 90000$ (đơn vị: nghìn đồng), với x là số sản phẩm. Tìm số lượng sản phẩm x để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là thấp nhất.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm ($0 \le x \le 200$) được mô hình hóa bởi hàm số $L(x) = -x^3 + 120x^2 + 40000x$ (đơn vị: triệu đồng). Tìm số lượng sản phẩm x để lợi nhuận đạt cực đại.

✍ Bài làm:

Dạng 11. Mô hình hóa thực tế: Bài toán hình học (Thể tích/Diện tích)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bước 1: Xác định biến số x (thường là kích thước thay đổi) và tìm điều kiện của x dựa trên thực tế hình học.
- Bước 2: Thiết lập hàm số $f(x)$ biểu diễn đại lượng cần tối ưu (thể tích, diện tích, chiều dài) thông qua các công thức hình học cơ bản.
- Bước 3: Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) hoặc giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số $f(x)$ trên khoảng/đoạn xác định bằng cách tính đạo hàm $f'(x)$, tìm nghiệm và lập bảng biến thiên.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Khi gấp hộp từ tấm vật liệu hình vuông cạnh a , thể tích đạt cực đại khi cạnh hình vuông cắt đi tại 4 góc là $x = \frac{a}{6}$.

- **Công thức cốt lõi:** Thể tích khối hộp không nắp được gấp từ tấm nhôm hình vuông cạnh a bằng cách cắt 4 góc hình vuông cạnh x là $V(x) = ... \times (a - 2x)^2$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một tấm nhôm hình vuông cạnh 18 cm được dùng để gấp thành một cái hộp không nắp bằng cách cắt bỏ 4 hình vuông cạnh x ở 4 góc. Tìm giá trị x để thể tích hộp lớn nhất.

Đáp số: .....

Câu 2. Một cái thang bắc qua một cột đỡ cao $2\ \mathrm{m}$ và cách tường $1\ \mathrm{m}$. Tính chiều dài ngắn nhất của cái thang (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Gấp hộp từ tấm nhôm (Tìm thể tích lớn nhất): Một tấm nhôm hình vuông cạnh $12\ \mathrm{cm}$. Người ta cắt bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\mathrm{cm})$ với $0 < x < 6$, rồi gập tấm nhôm lại để thành cái hộp không có nắp. Tìm x để thể tích hộp lớn nhất và tính thể tích đó.

Ví dụ 2 - Gấp hộp từ tấm nhôm (Biến thể diện tích đáy): Một tấm nhôm hình vuông cạnh a. Cắt 4 góc hình vuông cạnh x để gấp thành hộp không nắp. Chứng minh rằng thể tích hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x = \frac{a}{6}$.

Ví dụ 3 - Chiều dài ngắn nhất của thang (Phương pháp góc): Tìm chiều dài nhỏ nhất của cái thang để nó có thể tựa vào tường và mặt đất, bắc qua cột đỡ cao $4\ \mathrm{m}$ và cách tường $0,5\ \mathrm{m}$.

Ví dụ 4 - Chiều dài ngắn nhất của thang (Phương pháp tọa độ): Một cột đỡ cao h cách tường d. Tìm chiều dài ngắn nhất của thang bắc qua cột đỡ.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $24\ \mathrm{cm}$. Người ta cắt bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\mathrm{cm})$ rồi gập thành hộp không nắp. Tìm x để thể tích hộp lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $30\ \mathrm{cm}$. Cắt 4 góc hình vuông cạnh x để gấp thành hộp không nắp. Tính thể tích lớn nhất của hộp.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một cái thang bắc qua một cột đỡ cao $3\ \mathrm{m}$ và cách tường $1\ \mathrm{m}$. Tìm chiều dài ngắn nhất của cái thang.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $12\ \text{cm}$. Cắt 4 góc hình vuông cạnh x để gấp thành hộp không nắp. Nếu thể tích hộp là 128cm^3 , hãy tìm x .

✍ Bài làm:

Dạng 12. Vận dụng vật lý: Lực căng dây và Trọng lực

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để vật cân bằng, tổng các lực tác động lên vật phải bằng 0 . Theo phương thẳng đứng: $\sum F_z = 0$.
- Trường hợp 4 dây đối xứng (hình chóp tứ giác đều): $4T\cos(\alpha) = P$, với α là góc giữa dây và phương thẳng đứng.
- Trường hợp 3 dây đôi một vuông góc: $3F\cos(\alpha) = P$. Với 3 dây đôi một vuông góc và đối xứng, ta có $\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{3}}$, suy ra $F = \frac{P}{\sqrt{3}}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Vật treo bằng 3 dây đôi một vuông góc $\Rightarrow$ Lực căng mỗi dây $F = \frac{P}{\sqrt{3}}$. Vật treo bằng 4 dây đối xứng $\Rightarrow 4T\cos(\alpha) = P$.

- **Công thức cốt lõi:** Trong trường hợp 3 dây đôi một vuông góc, lực căng mỗi dây là $F = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một vật nặng có trọng lượng $P = 30$ N được treo bởi 3 sợi dây đôi một vuông góc. Tính lực căng mỗi sợi dây.

Đáp số: .....

Câu 2. Một vật nặng có trọng lượng $P = 40$ N được treo bởi 4 sợi dây đối xứng tạo với phương thẳng đứng một góc 60° . Tính lực căng mỗi sợi dây.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Trường hợp 3 dây đôi một vuông góc: Một chiếc đèn có trọng lượng $P = 60$ N được treo bởi 3 sợi dây không giãn đôi một vuông góc với nhau. Tính độ lớn lực căng của mỗi sợi dây.

Ví dụ 2 - Trường hợp 4 dây đối xứng (góc giữa các dây): Một vật nặng có khối lượng $m = 2$ kg được treo bởi 4 sợi dây đối xứng tạo thành một hình chóp tứ giác đều. Biết góc giữa hai dây đối diện là 60° . Tính lực căng mỗi sợi dây (lấy $g = 10$ m/s ^{2}).

Ví dụ 3 - Trường hợp 4 dây đối xứng (góc với phương đứng): Một vật nặng có trọng lượng $P = 100$ N được treo bởi 4 sợi dây đối xứng tạo thành một hình chóp tứ giác đều. Biết mỗi sợi dây tạo với phương thẳng đứng một góc 45° . Tính lực căng mỗi sợi dây.

Ví dụ 4 - Trường hợp 3 dây đôi một vuông góc (tính P): Một chiếc đèn được treo bởi 3 sợi dây đôi một vuông góc. Biết lực căng mỗi sợi dây là $F = 10$ N. Tính trọng lượng của chiếc đèn.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một vật nặng có trọng lượng $P = 30$ N được treo bởi 3 sợi dây đôi một vuông góc. Tính lực căng mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một vật nặng có trọng lượng $P = 45$ N được treo bởi 3 sợi dây đôi một vuông góc. Tính lực căng mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một vật nặng có trọng lượng $P = 20$ N được treo bởi 4 sợi dây đối xứng tạo với phương thẳng đứng một góc 30° . Tính lực căng mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một vật nặng có khối lượng $m = 5$ kg được treo bởi 4 sợi dây đối xứng tạo thành một hình chóp tứ giác đều. Biết mỗi sợi dây tạo với phương thẳng đứng một góc 45° . Tính lực căng mỗi sợi dây (lấy $g = 10$ m/s ^{2}).

✍ Bài làm:

Dạng 13. Bài toán thực tế về tăng trưởng/lạm phát

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Nếu một số tiền M chịu lạm phát với tỷ lệ $r_1, r_2, ..., r_n$ trong n giai đoạn liên tiếp, thì sức mua sau n giai đoạn là: $M_{mới} = M \cdot (1 - r_1) \cdot (1 - r_2)...(1 - r_n)$
- Trong đó r_i là tỷ lệ lạm phát của giai đoạn i (được viết dưới dạng số thập phân, ví dụ $5\% = 0,05$)

💡 **Mẹo giải nhanh:** Lạm phát làm tiền 'mất giá' → dùng dấu trừ $(1-r)$ để tính sức mua còn lại.

- **Công thức cốt lõi:** Sức mua sau n giai đoạn lạm phát liên tiếp là $M_{mới} = M \cdot ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một người có 100 triệu đồng. Sau một năm, tỷ lệ lạm phát là 5% . Hỏi sức mua của 100 triệu đồng đó sau một năm là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp số: .....

Câu 2. Một số tiền 50 triệu đồng chịu lạm phát 10% trong năm đầu và 20% trong năm thứ hai. Tính sức mua của số tiền này sau hai năm (đơn vị: triệu đồng).

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức cho 1 giai đoạn: Do giá cả hàng hóa tăng lên do lạm phát, sức mua của 1 tỷ đồng sau một năm với tỷ lệ lạm phát là 4% là bao nhiêu?

Ví dụ 2 - Áp dụng công thức cho 2 giai đoạn khác nhau: Một khoản tiết kiệm 200 triệu đồng chịu lạm phát 6% trong năm thứ nhất và 7% trong năm thứ hai. Tính sức mua của khoản tiền này sau hai năm (đơn vị: triệu đồng).

Ví dụ 3 - Áp dụng công thức cho nhiều giai đoạn với cùng tỷ lệ: Tính sức mua của 500 triệu đồng sau 3 năm liên tiếp với tỷ lệ lạm phát mỗi năm là 5% .

Ví dụ 4 - Bài toán tính ngược (Tìm tỷ lệ lạm phát): Một số tiền ban đầu là 100 triệu đồng, sau hai năm lạm phát liên tiếp, sức mua chỉ còn lại 81 triệu đồng. Tìm tỷ lệ lạm phát trung bình mỗi năm (giả sử tỷ lệ hai năm là như nhau).

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Sức mua của 500 triệu đồng sau hai năm liên tiếp với tỷ lệ lạm phát lần lượt là 4% và 5% là bao nhiêu triệu đồng?

✍️ Bài làm:

Bài 2. Sức mua của 800 triệu đồng sau hai năm liên tiếp với tỷ lệ lạm phát lần lượt là 3% và 6% là bao nhiêu triệu đồng?

✍ Bài làm:

Bài 3. print(“Sức mua của 1000 triệu đồng sau ba năm liên tiếp với tỷ lệ lạm phát mỗi năm là 2% . Tính sức mua sau ba năm (đơn vị: triệu đồng).”, “”)

✍ Bài làm:

Bài 4. Một khoản tiền 400 triệu đồng sau hai năm lạm phát liên tiếp là 5% và 8% . Hỏi sức mua của số tiền này sau hai năm là bao nhiêu triệu đồng?

✍ Bài làm:

Dạng 14. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Diện tích hình chữ nhật tạo bởi hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ là $S = |\, x_{TCĐ} \cdot y_{TCN}|$ (nếu có tiệm cận ngang) hoặc $S = |\, x_{TCĐ} \times \text{khoảng cách từ gốc tọa độ đến tiệm cận xiên}|$ (trong các trường hợp đặc biệt).
- Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành $y = 0$, trục tung $x = 0$ và đường thẳng $x = a$ được tính bởi công thức: $S = \int_0^a |\, f(x)|\, dx$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tính diện tích hình chữ nhật tạo bởi các đường tiệm cận, chỉ cần lấy tích giá trị tuyệt đối của hoành độ tiệm cận đứng và tung độ tiệm cận ngang.

- **Công thức cốt lõi:** Diện tích hình chữ nhật tạo bởi tiệm cận đứng $x = a$ và tiệm cận ngang $y = b$ với hai trục tọa độ là $S = |\, ...\, |$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$. Tính diện tích hình chữ nhật tạo bởi hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x-3}{x+2}$. Tính diện tích hình chữ nhật tạo bởi hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức diện tích hình chữ nhật từ tiệm cận: Cho hàm số $y=\frac{3x-1}{x+2}$. Tính diện tích hình chữ nhật giới hạn bởi hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ.

Ví dụ 2 - Áp dụng công thức diện tích hình chữ nhật từ tiệm cận: Cho hàm số $y=\frac{x+1}{2x-4}$. Tính diện tích hình chữ nhật giới hạn bởi hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ.

Ví dụ 3 - Tính diện tích giới hạn bởi đồ thị và trục tọa độ: Cho hàm số $y=x^2-4x+3$ trên đoạn $[0;3]$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số, trục hoành và trục tung.

Ví dụ 4 - Biến thể nâng cao với tiệm cận xiên: Cho hàm số $y=\frac{x^2+1}{x}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số, tiệm cận đứng, trục hoành và trục tung trong góc phần tư thứ nhất.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y=\frac{4x-2}{x+3}$. Tính diện tích hình chữ nhật tạo bởi hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y=\frac{x+5}{3x-6}$. Tính diện tích hình chữ nhật tạo bởi hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y=\frac{2x-4}{x+1}$. Tính diện tích hình chữ nhật tạo bởi hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=\frac{x^2+2x+2}{x+1}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x=1$.

✍ Bài làm:

Dạng 15. Nhận dạng đồ thị hàm số bậc ba

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Dựa vào hệ số a trong hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$): Nếu $a > 0$, đồ thị có hướng đi lên ở nhánh cuối bên phải ($\lim_{x \to +\infty} y = +\infty$); nếu $a < 0$, đồ thị có hướng đi xuống ở nhánh cuối bên phải ($\lim_{x \to +\infty} y = -\infty$).
- Giao điểm của đồ thị với trục tung Oy có tọa độ $(0; d)$, giúp xác định giá trị d .
- Số lượng điểm cực trị của hàm số bậc ba phụ thuộc vào số nghiệm của phương trình $y' = 3ax^2 + 2bx + c = 0$. Đồ thị có thể có 2 điểm cực trị hoặc không có cực trị nào (đồ thị luôn có 1 điểm uốn).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhìn 'đuôi' bên phải: 'Đuôi' đi lên $\rightarrow a > 0$; 'Đuôi' đi xuống $\rightarrow a < 0$.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có nhánh cuối bên phải đi lên khi ... > 0 .

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$. Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với trục tung Oy .

Đáp số: .....

Câu 2. Xác định dấu của hệ số a của hàm số bậc ba nếu đồ thị có nhánh cuối bên phải đi xuống.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Nhận dạng dựa vào hệ số a và giao điểm Oy : Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$. Đồ thị hàm số có đặc điểm nào sau đây?

Ví dụ 2 - Nhận dạng dựa vào hệ số a và số cực trị: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2$. Đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Ví dụ 3 - Nhận dạng đồ thị từ các phương án cho trước: Đồ thị hàm số có nhánh cuối bên phải đi lên và cắt trục tung tại $y = -2$. Trong các hàm số sau, đâu là hàm số phù hợp: $y = x^3 + x - 2$; $y = -x^3 + x - 2$; $y = x^3 - x + 2$; $y = -x^3 - x - 2$.

Ví dụ 4 - Nhận dạng dựa vào điểm cực trị: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Đồ thị hàm số có điểm cực đại và cực tiểu nằm ở đâu?

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Nhận dạng đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$. Trong các phương án sau, đâu là đồ thị có nhánh cuối bên phải đi xuống và cắt trục tung tại $y = -1$?

✍ Bài làm:

Bài 2. Nhận dạng đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 3$. Đồ thị có đặc điểm nào sau đây?

✍ Bài làm:

Bài 3. Nhận dạng đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x - 4$. Đồ thị có đặc điểm nào sau đây?

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho đồ thị hàm số bậc ba có nhánh cuối bên phải đi lên và cắt trục tung tại $y = 2$. Hàm số nào sau đây có thể là đồ thị đó?

✍ Bài làm:

Dạng 16. Tìm tiệm cận xiên của hàm số phân thức

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cho hàm số phân thức $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$ có bậc của tử lớn hơn bậc của mẫu đúng 1 đơn vị. Đường tiệm cận xiên có dạng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) được tìm bằng cách thực hiện phép chia đa thức tử cho mẫu.
- Sau khi chia, hàm số có dạng $y = ax + b + \frac{r(x)}{Q(x)}$ với bậc của $r(x)$ nhỏ hơn bậc của $Q(x)$. Khi đó $\lim_{x\to\infty} \frac{r(x)}{Q(x)} = 0$, suy ra đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm tiệm cận xiên, hãy 'chia tử cho mẫu' để tách phần đa thức bậc nhất ra!

- **Công thức cốt lõi:** Đường tiệm cận xiên của hàm số $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$ có dạng $y = ...$ sau khi thực hiện phép chia đa thức.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm phương trình đường tiệm cận xiên của hàm số $y = \frac{x^2+3x+2}{x+1}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm giá trị của b trong phương trình tiệm cận xiên $y = 2x + b$ của hàm số $y = \frac{2x^2-x+1}{x-1}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng phép chia đa thức cơ bản: Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+x+1}{x-1}$.

hệ 2 - Biến thể với hệ số $a \neq 1$: Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2-5x+3}{x+2}$.

Ví dụ 3 - Trường hợp tử số có hệ số âm: Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2+4x-1}{x-2}$.

Ví dụ 4 - Tìm tiệm cận xiên từ đồ thị (Dạng nâng cao): Cho hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{x+d}$ có tiệm cận xiên $y = 2x + 3$. Tìm a, b, c, d nếu biết đồ thị cắt trục tung tại $(0; 5)$ và có tiệm cận đứng $x = -1$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2x+3}{x+1}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-3x+5}{x-2}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{3x^2+4x-1}{x+1}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm phương trình đường tiệm cận xiên của hàm số $y = \frac{2x^2-x+4}{x-3}$.

✍ Bài làm:

Dạng 17. Tính khoảng cách từ một điểm đến đường tiệm cận

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tính khoảng cách từ điểm $M(x_0;y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: ax+by+c=0$, ta sử dụng công thức: $d(M,\Delta)=\frac{|\,ax_0+by_0+c\,|}{\sqrt{a^2+b^2}}$
- Đối với hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất $y=\frac{ax+b}{cx+d}$, đường tiệm cận đứng là $x=-\frac{d}{c}$ (dạng $1x+0y+\frac{d}{c}=0$) và tiệm cận ngang là $y=\frac{a}{c}$ (dạng $0x+1y-\frac{a}{c}=0$).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Luôn đưa phương trình đường thẳng về dạng $ax+by+c=0$ trước khi áp dụng công thức để tránh nhầm lẫn dấu.

- **Công thức cốt lõi:** Khoảng cách từ điểm $M(x_0;y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: ax+by+c=0$ là $d=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tính khoảng cách từ điểm $A(1;2)$ đến đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x+3}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tính khoảng cách từ điểm $B(0;0)$ đến đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{3x+1}{x-2}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng cho tiệm cận đứng: Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x-1}$. Tính khoảng cách từ điểm $M(2;3)$ đến tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Ví dụ 2 - Áp dụng cho tiệm cận ngang: Cho hàm số $y=\frac{2x-3}{x+1}$. Tính khoảng cách từ điểm $P(1;1)$ đến tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Ví dụ 3 - Áp dụng cho tiệm cận xiên: Cho hàm số $y=2x+1+\frac{3}{x+3}$. Tính khoảng cách từ điểm $M(2;-1)$ đến tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Ví dụ 4 - Tổng hợp các loại tiệm cận: Cho hàm số $y=\frac{x^2-x+1}{x-1}$. Tính khoảng cách từ điểm $O(0;0)$ đến tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y=\frac{x-1}{x+1}$. Tính khoảng cách từ điểm $A(2;1)$ đến tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y=\frac{x+2}{x-3}$. Tính khoảng cách từ điểm $B(4;5)$ đến tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y=x+3+\frac{1}{x-2}$. Tính khoảng cách từ điểm $C(1;1)$ đến tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=\frac{2x+5}{x-1}$. Tính khoảng cách từ điểm $D(0;0)$ đến tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

✍ Bài làm:

Dạng 18. Xác định số điểm cực trị dựa trên bảng biến thiên/xét dấu đạo hàm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ là các điểm mà tại đó đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu.
- Nếu $f'(x)$ đổi dấu từ dương $(+)$ sang âm $(-)$ khi đi qua x_0 thì x_0 là điểm cực đại.
- Nếu $f'(x)$ đổi dấu từ âm $(-)$ sang dương $(+)$ khi đi qua x_0 thì x_0 là điểm cực tiểu.
- Nếu $f'(x)$ không đổi dấu khi đi qua x_0 thì x_0 không phải là điểm cực trị.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Chỉ đếm các điểm mà tại đó $f'(x)$ 'nhảy' dấu (từ $+$ sang $-$ hoặc ngược lại). Nếu đi qua nghiệm mà dấu giữ nguyên thì 'bỏ qua' ngay!

- **Công thức cốt lõi:** Số điểm cực trị của hàm số là số lần đạo hàm $f'(x)$ … khi đi qua các nghiệm của nó.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: x chạy qua $-1,0,2$ và dấu $f'(x)$ lần lượt là $(+),(-),(+)$. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x-1)^2(x-2)$. Tìm số điểm cực tiểu của hàm số.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định số điểm cực trị qua bảng xét dấu: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: $x \mid -\infty \mid -1 \mid 1 \mid +\infty$ $f'(x) \mid + \mid 0 \mid - \mid 0 \mid +$

Ví dụ 2 - Trường hợp đạo hàm không đổi dấu: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-2)^2$. Tìm số điểm cực trị của hàm số.

Ví dụ 3 - Xác định số điểm cực đại và cực tiểu riêng biệt: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau: $x \mid -\infty \mid 0 \mid 2 \mid +\infty$ $f'(x) \mid + \mid 0 \mid - \mid 0 \mid +$ $f(x) \mid \inf \mid \uparrow \mid 3 \mid \downarrow \mid 1 \mid \uparrow \mid \sup$

Ví dụ 4 - Phân tích từ biểu thức đạo hàm: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=-x^2(x-1)(x+2)$. Tìm số điểm cực trị của hàm số.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: $x \mid -\infty \mid -2 \mid 0 \mid 3 \mid +\infty$ $f'(x) \mid + \mid 0 \mid - \mid 0 \mid + \mid 0 \mid +$

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: $x \mid -\infty \mid -3 \mid 1 \mid 4 \mid +\infty$ $f'(x) \mid + \mid 0 \mid - \mid 0 \mid + \mid 0 \mid +$

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x+1)^2(x-3)$. Tìm số điểm cực trị của hàm số.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: $x \mid -\infty \mid -1 \mid 0 \mid 2 \mid +\infty$ $f'(x) \mid - \mid 0 \mid + \mid 0 \mid - \mid 0 \mid +$

✍ Bài làm:

Dạng 19. Tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a,b]$, ta thực hiện các bước: Tính đạo hàm $f'(x)$, tìm các điểm $x_i \ddagger [a,b]$ mà tại đó $f'(x)=0$ hoặc $f'(x)$ không xác định.
- Tính giá trị của hàm số tại hai đầu mút $f(a), f(b)$ và tại các điểm x_i tìm được ở bước trên.
- Giá trị lớn nhất $M = \mathrm{A}\alpha\gamma(f(a), f(b), f(x_1), ..., f(x_n))$ và giá trị nhỏ nhất $m = \mathrm{A}\alpha\gamma(f(a), f(b), f(x_1), ..., f(x_n))$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc 3 bước: Đạo hàm → Nghiệm trong đoạn → So sánh giá trị. Đừng quên tính giá trị tại 2 đầu mút a và b!

- **Công thức cốt lõi:** Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[a,b]$ là $M = \mathrm{A}\alpha\gamma(..., f(b), f(x_i))$ với x_i là các điểm cực trị thuộc đoạn $[a,b]$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[0,2]$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^2 + 4x + 1$ trên đoạn $[0,3]$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Hàm đa thức bậc ba cơ bản: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-2,2]$.

Ví dụ 2 - Hàm đa thức bậc bốn: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ trên đoạn $[0,2]$.

Ví dụ 3 - Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ trên đoạn $[3,5]$.

Ví dụ 4 - Hàm đa thức bậc ba với hệ số khác: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ trên đoạn $[0,3]$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 5$ trên đoạn $[-2,2]$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x - 1$ trên đoạn $[-2, 2]$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -x^4 + 2x^2 + 3$ trên đoạn $[0, 2]$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x+2}{x-3}$ trên đoạn $[4, 6]$.

✍ Bài làm:

Dạng 20. Ứng dụng đạo hàm giải bài toán tối ưu (Kinh tế/Thực tế)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để giải bài toán tối ưu, bước đầu tiên là thiết lập hàm số $f(x)$ biểu diễn đại lượng cần tối ưu (lợi nhuận, chi phí, thể tích, diện tích…) theo một biến số x duy nhất.
- Tìm khoảng xác định của biến x dựa trên điều kiện thực tế của bài toán (ví dụ: $x > 0$, chiều dài không thể âm).
- Sử dụng đạo hàm để tìm các điểm cực trị của hàm số $f(x)$ trên khoảng xác định. Giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm số tại các điểm cực trị hoặc tại biên của khoảng xác định chính là giá trị tối ưu cần tìm.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy trình 3 bước: Thiết lập hàm → Tìm đạo hàm $f'(x) = 0$ → Đối chiếu điều kiện thực tế.

- **Công thức cốt lõi:** Lợi nhuận được tính bằng công thức: $L(x) = R(x) - C(x)$, trong đó $R(x)$ là … và $C(x)$ là chi phí.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm . Người ta cắt bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau cạnh x cm rồi gập lại thành hộp không nắp. Tìm x để thể tích hộp lớn nhất.

Đáp số: .....

Câu 2. Một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm với chi phí tổng cộng là $C(x) = 2x^2 + 40x + 100$ (nghìn đồng). Tìm số lượng sản phẩm x để chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm là thấp nhất.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh: Một quầy cà phê bán với giá $20,000$ đồng/ly thì mỗi ngày bán được 100 ly. Cứ giảm giá $1,000$ đồng thì số ly bán được tăng thêm 20 ly. Biết chi phí nhập mỗi ly là $10,000$ đồng. Hỏi phải bán giá bao nhiêu để lợi nhuận mỗi ngày là lớn nhất?

Ví dụ 2 - Tối ưu hóa thể tích hình học: Từ một tấm tôn hình vuông cạnh a , cắt bỏ 4 hình vuông cạnh x ở 4 góc rồi gấp thành một chiếc hộp không nắp. Tìm x theo a để thể tích hộp lớn nhất.

Ví dụ 3 - Tối ưu hóa chi phí trung bình: Chi phí để sản xuất x đơn vị sản phẩm là $C(x) = x^2 + 100x + 400$ (đơn vị tiền tệ). Tìm x để chi phí trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm là nhỏ nhất.

Ví dụ 4 - Bài toán thực tế về khoảng cách: Một điểm M di chuyển trên trục Ox , một điểm N di chuyển trên đường thẳng $y = 2$. Tìm vị trí M, N để khoảng cách MN ngắn nhất khi biết M cố định tại $(1, 0)$ và N có hoành độ x .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một quầy trà sữa bán giá $30,000$ đồng/ly thì mỗi ngày bán được 200 ly. Cứ giảm giá $1,000$ đồng thì số ly bán được tăng thêm 20 ly. Chi phí nhập mỗi ly là $15,000$ đồng. Tìm giá bán để lợi nhuận lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một cửa hàng bán giày giá $500,000$ đồng/đôi thì bán được 50 đôi/tuần. Cứ giảm giá $20,000$ đồng thì số đôi bán được tăng thêm 5 đôi. Chi phí nhập là $300,000$ đồng/đôi. Tìm giá bán để lợi nhuận lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 3. Chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 3x^2 + 120x + 300$. Tìm x để chi phí trung bình thấp nhất.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $18\ \text{cm}$. Cắt 4 góc hình vuông cạnh x rồi gấp thành hộp không nắp. Tìm thể tích lớn nhất của hộp.

✍ Bài làm:

Dạng 21. Xác định tiệm cận đứng và tiệm cận ngang từ bảng biến thiên

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tiệm cận đứng là đường thẳng $x = x_0$ nếu $\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$. Trong BBT, ta nhìn vào các giá trị x làm cho $f(x)$ tiến tới vô cực.
- Tiệm cận ngang là đường thẳng $y = y_0$ nếu $\lim_{x \to +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \to -\infty} f(x) = y_0$. Trong BBT, ta nhìn vào giá trị của $f(x)$ tại các đầu mút $\pm\infty$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** TCĐ: Nhìn cột x có 'vạch đứng' ∞ . TCN: Nhìn cột x có $\pm\infty$ và xem y bằng bao nhiêu.

- **Công thức cốt lõi:** Đường tiệm cận đứng có dạng $x = ...$ và đường tiệm cận ngang có dạng $y = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

$$f(x) \to$$

Câu 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: $x \to 1$ và $infty$. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: $x \to +\infty$ và $f(x) \to 3$. Tìm phương trình đường tiệm cận ngang.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm tiệm cận đứng: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: x chạy từ $-\infty$ đến $+\infty$, tại $x = 2$ hàm số không xác định và $f(x)$ tiến tới $+\infty$ khi $x \to 2^-$ và $-\infty$ khi $x \to 2^+$. Tìm tiệm cận đứng.

Ví dụ 2 - Tìm tiệm cận ngang: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: khi $x \to -\infty$ thì $f(x) \to 0$ và khi $x \to +\infty$ thì $f(x) \to 5$. Tìm tiệm cận ngang.

Ví dụ 3 - Tìm cả hai loại tiệm cận: Cho hàm số có bảng biến thiên: tại $x = 1$ hàm số tiến tới vô cực, và khi $x \to +\infty$ hàm số tiến tới 2 . Tìm số đường tiệm cận.

Ví dụ 4 - Kết hợp nhiều giá trị: Cho hàm số có BBT: $x \to -\infty, f(x) \to -3$; $x \to 1, f(x) \to infty$; $x \to +\infty, f(x) \to -3$. Tìm các đường tiệm cận.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số có bảng biến thiên: tại $x = 3$ hàm số tiến tới vô cực, và khi $x \to +\infty$ hàm số tiến tới 4 . Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số có bảng biến thiên: tại $x = -2$ hàm số tiến tới vô cực, và khi $x \to -\infty$ hàm số tiến tới 1 . Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số có bảng biến thiên: khi $x \to +\infty$ hàm số tiến tới 0 , và khi $x \to -\infty$ hàm số tiến tới 0 . Tìm số đường tiệm cận ngang.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số có BBT: tại $x = 0$ hàm số tiến tới vô cực, và khi $x \to +\infty$ hàm số tiến tới 2 , khi $x \to -\infty$ hàm số tiến tới 2 . Tìm tổng số tiệm cận.

✍ Bài làm:

Dạng 22. Tính toán vectơ trong không gian (Hình lăng trụ/Hình chóp)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, vectơ đường chéo $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.
- Quy tắc cộng/trừ vectơ: Sử dụng quy tắc ba điểm $\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{XZ}$ và quy tắc hiệu $\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{AY} - \overrightarrow{AX}$ để phân tích vectơ theo các vectơ cơ sở.

- Tính chất hình chóp đáy hình bình hành: Nếu O là tâm của hình bình hành $ABCD$, thì $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$, dẫn đến $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$ và $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn phân tích một vectơ 'lạ', hãy tìm đường đi từ điểm đầu đến điểm cuối thông qua các cạnh đã biết của hình khối.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+...+\overrightarrow{AA'}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AD}=\vec{b},\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Tính vectơ $\overrightarrow{A'C}$ theo $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Tính tổng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$ theo vectơ $\overrightarrow{SO}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AD}=\vec{b},\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

Ví dụ 2 - Phân tích vectơ trong hình lăng trụ: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'}=\vec{a},\overrightarrow{AB}=\vec{b},\overrightarrow{AC}=\vec{c}$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{B'C}$ theo $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

Ví dụ 3 - Tổng vectơ trong hình chóp: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$.

Ví dụ 4 - Biểu diễn vectơ qua các cạnh: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AD}=\vec{b},\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{D'B}$ theo $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AD}=\vec{b},\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a}, \overrightarrow{AD}=\vec{b}, \overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ theo $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$ theo $\overrightarrow{SO}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a}, \overrightarrow{AD}=\vec{b}, \overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{C'A}$ theo $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

✍ Bài làm:

Dạng 23. Tính toán tọa độ vectơ trong không gian Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Nếu điểm $A(x_A;y_A;z_A)$ có hình chiếu vuông góc lên các trục tọa độ Ox,Oy,Oz lần lượt là H,K,L thì $H(x_A;0;0), K(0;y_A;0), L(0;0;z_A)$.
- Cho hai điểm $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$, tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được tính bằng công thức: $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$.
- Độ dài của vectơ $\vec{u}=(x;y;z)$ là: $|\vec{u}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Hình chiếu lên trục nào thì giữ nguyên tọa độ của trục đó, các tọa độ còn lại bằng 0 .

- **Công thức cốt lõi:** Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ với $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$ là $\overrightarrow{AB}=(...;y_B-y_A;z_B-z_A)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho điểm $A(1;2;-3)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên trục Ox .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho $\vec{u}=(3;-4;12)$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm tọa độ hình chiếu lên trục tọa độ: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;-5;3)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên trục Oy .

Ví dụ 2 - Tính tọa độ vectơ giữa hai điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;2)$ và $B(4;-2;5)$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Ví dụ 3 - Tính độ dài vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(-2;6;3)$. Tính độ dài $|\vec{u}|$.

Ví dụ 4 - Tìm tọa độ điểm khi biết vectơ và điểm đầu: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và vectơ $\vec{u}=(5;-1;4)$. Tìm tọa độ điểm B sao cho $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-3;4;1)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên trục Oz .

✍ Bài làm:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $B(5;-2;7)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của B lên trục Ox .

✍ Bài làm:

Bài 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;3;-1)$ và $B(0;1;4)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(1;2;-2)$. Tính độ dài $|\vec{u}|$.

✍ Bài làm:

Dạng 24. Bài toán vật lý: Cân bằng lực trong không gian (Dây treo)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điều kiện cân bằng lực: $\sum \vec{F} = 0$. Trong trường hợp treo vật đứng yên, tổng các thành phần lực theo phương thẳng đứng phải bằng trọng lượng vật: $\sum F_z = P$.
- Đối với hệ n sợi dây đối xứng qua trục thẳng đứng, gọi α là góc hợp bởi mỗi sợi dây và phương thẳng đứng, lực căng mỗi sợi dây T được tính bằng: $T = \frac{P}{n \cdot \cos(\alpha)}$.
- Trường hợp đặc biệt: Nếu n sợi dây đôi một vuông góc với nhau, lực căng mỗi sợi dây là: $T = \frac{P}{\sqrt{n}}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ: 'Tổng lực hướng lên = Trọng lượng hướng xuống'. Nếu dây vuông góc, dùng $\sqrt{n}$ chia cho P . Nếu dây đối xứng, dùng $\cos(\alpha)$ chia cho P .

$$T =$$

- **Công thức cốt lõi:** Trong hệ n sợi dây đối xứng, lực căng mỗi sợi dây là $fracPn \cdot \cos(\alpha)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một vật nặng $10N$ được treo bởi 2 sợi dây đối xứng, mỗi sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 60° . Tính lực căng mỗi sợi dây.

Đáp số: .....

Câu 2. Một vật có trọng lượng $30N$ được treo bởi 3 sợi dây đôi một vuông góc với nhau. Tính lực căng mỗi sợi dây.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức dây đối xứng: Một chiếc đèn chùm có khối lượng $m = 3.2\ \text{kg}$ được treo bởi 4 sợi dây xích sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều và góc $\angle ASC = 60^\circ$. Lấy $g = 9.8\text{m/s}^2$. Tính lực căng mỗi sợi dây.

Ví dụ 2 - Trường hợp dây đôi một vuông góc: Một vật nặng có trọng lượng $60\ \text{N}$ được treo bởi 3 sợi dây giống hệt nhau, đôi một tạo với nhau một góc 90° . Tính độ lớn lực căng mỗi sợi dây.

Ví dụ 3 - Áp dụng công thức dây đối xứng (số lượng khác): Một vật có khối lượng $m = 5\ \text{kg}$ được treo bởi 3 sợi dây đối xứng qua trục thẳng đứng, mỗi sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 45° . Tính lực căng mỗi sợi dây.

Ví dụ 4 - Trường hợp dây treo không đối xứng (phân tích vectơ): Một vật nặng $P = 100\ \text{N}$ được treo bởi 2 sợi dây SA và SB . Sợi dây SA hợp với phương thẳng đứng một góc 30° , sợi dây SB hợp với phương thẳng đứng một góc 45° . Tính lực căng mỗi sợi dây nếu biết chúng có cùng độ lớn T .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một chiếc đèn chùm có khối lượng $m = 4\ \text{kg}$ được treo bởi 4 sợi dây xích sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều và góc $\angle ASC = 60^\circ$. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Tính lực căng mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một vật nặng có trọng lượng $P = 80\ \text{N}$ được treo bởi 3 sợi dây đôi một vuông góc với nhau. Tính lực căng mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một vật có khối lượng $m = 2\ \text{kg}$ được treo bởi 3 sợi dây đối xứng qua trục thẳng đứng, mỗi sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 45° . Tính lực căng mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một vật nặng $P = 120\ \text{N}$ được treo bởi 4 sợi dây đối xứng qua trục thẳng đứng. Biết mỗi sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc $\alpha = 30^\circ$. Tính lực căng mỗi sợi dây.

✍ Bài làm:

Dạng 25. Bài toán tối ưu hình học (Cắt góc tấm nhôm)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cho tấm nhôm hình vuông cạnh a , cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x ($0 < x < a/2$), ta được hình hộp không nắp có các kích thước: chiều cao $h = x$, cạnh đáy $L = a - 2x$.
- Hàm thể tích: $V(x) = x(a - 2x)^2$.
- Để thể tích lớn nhất, ta tìm cực trị của hàm $V(x)$ trên khoảng $(0; a/2)$, thường đạt tại $x = a/6$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm thể tích lớn nhất khi cắt góc, hãy nhớ ngay: $x = a/6$ (với a là cạnh tấm nhôm ban đầu).

- **Công thức cốt lõi:** Thể tích lớn nhất của hình hộp không nắp được tạo thành từ tấm nhôm vuông cạnh a là $V_{max} = \ldots$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 18 cm. Người ta cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x cm để gấp thành một cái hộp không nắp. Tìm thể tích lớn nhất của cái hộp đó.

Đáp số: .....

Câu 2. Một tấm nhôm hình chữ nhật có kích thước 20 cm $\times$ 30 cm. Cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x cm để gấp thành hộp không nắp. Tìm giá trị x để thể tích lớn nhất.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức cho tấm vuông: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x cm để gấp thành một cái hộp không nắp. Tìm thể tích lớn nhất của cái hộp.

Ví dụ 2 - Kiểm tra các thành phần hình hộp: Từ một tấm nhôm vuông cạnh a , người ta cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x để tạo thành hộp không nắp. Nếu chiều cao hộp là $x = 3$ cm và thể tích là 108 cm ^{3} , hãy tìm cạnh a của tấm nhôm.

Ví dụ 3 - Biến thể tấm hình chữ nhật: Một tấm nhôm hình chữ nhật có kích thước 10 cm $\times$ 16 cm. Cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x cm để gấp thành hộp không nắp. Tìm thể tích lớn nhất.

Ví dụ 4 - Tìm diện tích đáy: Cho một tấm nhôm vuông cạnh 24 cm. Cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x cm để thể tích hộp lớn nhất. Tính diện tích đáy của hình hộp đó.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 24 cm. Cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x cm để gấp thành một cái hộp không nắp. Tìm thể tích lớn nhất của cái hộp đó.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một tấm nhôm hình vuông cạnh 30 cm. Cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x cm để tạo thành hộp không nắp. Tìm thể tích lớn nhất của cái hộp.

✍ Bài làm:

Bài 3. Từ một tấm nhôm hình vuông cạnh a cm, người ta cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x cm để tạo thành hộp không nắp. Nếu thể tích lớn nhất đạt được là 250 cm ^{3} , hãy tìm a .

✍️ Bài làm:

Bài 4. Một tấm nhôm hình chữ nhật có kích thước 12 cm $\times$ 18 cm. Cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x cm để gấp thành hộp không nắp. Tìm giá trị x để thể tích hộp lớn nhất.

✍️ Bài làm:

Dạng 26. Bài toán vật lý: Chuyển động của vật thể (Vận tốc/Gia tốc)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Vận tốc tức thời $v(t)$ là đạo hàm bậc nhất của quãng đường $S(t)$ theo thời gian t : $v(t) = S'(t)$.
- Gia tốc tức thời $a(t)$ là đạo hàm bậc nhất của vận tốc $v(t)$ hoặc đạo hàm bậc hai của quãng đường $S(t)$ theo thời gian t : $a(t) = v'(t) = S''(t)$.
- Vật dừng lại hoặc đổi chiều chuyển động khi vận tốc tức thời triệt tiêu: $v(t) = 0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ chuỗi đạo hàm: Quãng đường $\overset{S'}{\to}$ Vận tốc $\overset{v'}{\to}$ Gia tốc .

- **Công thức cốt lõi:** Vận tốc tức thời được tính bởi công thức $v(t) = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một chất điểm chuyển động có phương trình quãng đường $S(t) = t^3 - 3t^2 - 9t + 2025$ (với $t > 0$, S tính bằng mét, t tính bằng giây). Tính gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc của nó triệt tiêu.

Đáp số: .....

Câu 2. Độ cao của một khinh khí cầu theo thời gian được cho bởi công thức $h(t) = 6t^3 - 81t^2 + 324t$ (với t tính bằng phút, h tính bằng mét). Gọi $(a; b)$ là khoảng thời gian lớn nhất mà khinh khí cầu giảm dần độ cao. Tính giá trị biểu thức $P = 2b - 3a$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính vận tốc từ quãng đường: Một vật chuyển động theo phương trình $S(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4$ (m), với t là thời gian tính bằng giây. Tính vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ s.

Ví dụ 2 - Tính gia tốc từ vận tốc: Vận tốc của một vật chuyển động được xác định bởi hàm số $v(t) = 4t^2 - 2t + 1$ (m/s), với t tính bằng giây. Tính gia tốc của vật tại thời điểm $t = 1$ s.

Ví dụ 3 - Tìm thời điểm vận tốc triệt tiêu: Một vật chuyển động có phương trình quãng đường $S(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m). Tìm các thời điểm t mà tại đó vật dừng lại (vận tốc triệt tiêu).

Ví dụ 4 - Tính gia tốc tại thời điểm cho trước: Một vật chuyển động có vận tốc $v(t) = t^2 - 4t + 5$ (m/s). Tính gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ s.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một vật chuyển động theo phương trình $S(t) = 3t^3 - 4t^2 + 5$ (m). Tính vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1$ s.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một vật chuyển động theo phương trình $S(t) = 2t^3 - 5t^2 + 10$ (m). Tính vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ s.

✍ Bài làm:

Bài 3. Vận tốc của một vật là $v(t) = 5t^2 - 6t + 2$ (m/s). Tính gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ s.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một vật chuyển động có phương trình quãng đường $S(t) = t^3 - 3t^2 + 2$ (m). Tìm thời điểm $t > 0$ mà tại đó vật dừng lại.

✍ Bài làm:

Bài 5. Một vật chuyển động có phương trình quãng đường $S(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ (m). Tính gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc của nó triệt tiêu lần đầu tiên ($t > 0$).

✍ Bài làm:

Dạng 27. Tính toán tọa độ điểm và vectơ trong không gian Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Nếu $A(x;y;z)$ là một điểm, thì hình chiếu vuông góc của A lên các trục tọa độ lần lượt là $A_x(x;0;0)$, $A_y(0;y;0)$, $A_z(0;0;z)$ và lên các mặt phẳng tọa độ là $A_{xy}(x;y;0)$, $A_{yz}(0;y;z)$, $A_{zx}(x;0;z)$
- Cho hai điểm $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$, ta có $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$ và độ dài đoạn thẳng $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$
- Trong không gian, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}=(x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{v}=(x_2;y_2;z_2)$ là $\vec{u}\cdot\vec{v}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm hình chiếu lên trục nào, hãy giữ nguyên tọa độ của trục đó và cho các tọa độ còn lại bằng 0 .

- **Công thức cốt lõi:** Nếu $\vec{u}=(x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{v}=(x_2;y_2;z_2)$ thì $\vec{u}\cdot\vec{v}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;5)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên trục Ox .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho $\vec{u}=(1;2;2)$ và $\vec{v}=(3;0;4)$. Tính $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Hình chiếu điểm lên trục tọa độ: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3;-4;2)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên trục Ox .

Ví dụ 2 - Tính tọa độ vectơ và độ dài đoạn thẳng: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(4;6;3)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Ví dụ 3 - Tính tích vô hướng của hai vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u}=(2;-1;3)$ và $\vec{v}=(-1;2;1)$. Tính $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

Ví dụ 4 - Phân tích vectơ trong hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, ext{và}\overrightarrow{AA'}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(5;-2;1)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên trục Ox .

✍ Bài làm:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $B(-3;4;7)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của B lên trục Oy .

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho $\vec{u}=(2;3;-1)$ và $\vec{v}=(4;-2;5)$. Tính $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;1)$ và $B(2;3;4)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

✍ Bài làm:

Dạng 28. Bài toán thực tế: Lạm phát và sức mua

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Sức mua sau năm thứ nhất với tỷ lệ lạm phát r_1 là: $M_1 = M_0 \times (1 - r_1)$
- Sức mua sau n năm với các tỷ lệ lạm phát lần lượt là $r_1, r_2, ..., r_n$ là: $M_n = M_0 \times (1 - r_1) \times (1 - r_2) \times ... \times (1 - r_n)$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Lạm phát làm giảm giá trị tiền, nên ta dùng dấu trừ $(-)$ trong ngoặc: $(1 - r)$

- **Công thức cốt lõi:** Sức mua sau n năm là $M_n = M_0 \times (1 - r_1) \times (1 - r_2) \times ... \times (1 - r_n)$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một người có 500 triệu đồng. Sau hai năm, tỷ lệ lạm phát lần lượt là 4% và 5%. Hỏi sức mua của số tiền đó sau hai năm là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp số: .....

Câu 2. Số tiền 100 triệu đồng sau hai năm lạm phát liên tiếp 10% mỗi năm sẽ còn lại bao nhiêu triệu đồng?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức cho 2 năm lạm phát khác nhau: Một số tiền 200 triệu đồng sau hai năm, tỷ lệ lạm phát lần lượt là 6% và 7%. Hỏi sức mua của số tiền đó sau hai năm là bao nhiêu triệu đồng?

Ví dụ 2 - Áp dụng công thức cho lạm phát cùng tỷ lệ: Một người gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng. Sau hai năm, tỷ lệ lạm phát mỗi năm là 5%. Hỏi sức mua của số tiền đó sau hai năm là bao nhiêu tỷ đồng?

Ví dụ 3 - Tính tỷ lệ giảm giá trị tổng quát: Một số tiền 100 triệu đồng sau hai năm lạm phát lần lượt là 10% và 20%. Tính tổng tỷ lệ giảm giá trị của số tiền này sau hai năm.

Ví dụ 4 - Biến thể: Tính số tiền ban đầu: Sau hai năm lạm phát lần lượt là 5% và 5%, sức mua của 180,5 triệu đồng là 162,855 triệu đồng. Hỏi số tiền ban đầu là bao nhiêu triệu đồng?

Ví dụ 5 - Tính sức mua sau 3 năm: Một số tiền 50 triệu đồng sau ba năm lạm phát lần lượt là 2%, 3% và 4%. Hỏi sức mua của số tiền đó sau ba năm là bao nhiêu triệu đồng?

Ví dụ 6 - Tính sức mua sau 1 năm: Một số tiền 100 triệu đồng sau một năm lạm phát 10%. Hỏi sức mua là bao nhiêu triệu đồng?

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một số tiền 300 triệu đồng sau hai năm, tỷ lệ lạm phát lần lượt là 5% và 6%. Hỏi sức mua của số tiền đó sau hai năm là bao nhiêu triệu đồng?

✍️ Bài làm:

Bài 2. Một số tiền 400 triệu đồng sau hai năm, tỷ lệ lạm phát lần lượt là 4% và 8%. Hỏi sức mua của số tiền đó sau hai năm là bao nhiêu triệu đồng?

✍️ Bài làm:

Bài 3. A số tiền 500 triệu đồng sau hai năm, tỷ lệ lạm phát mỗi năm là 10%. Hỏi sức mua của số tiền đó sau hai năm là bao nhiêu triệu đồng?

✍️ Bài làm:

Bài 4. Sau hai năm lạm phát lần lượt là 10% và 10%, sức mua của 200 triệu đồng là 162 triệu đồng. Hỏi số tiền ban đầu là bao nhiêu triệu đồng?

✍️ Bài làm: