
KẾT QUẢ GEMMA 4 VẼ HÌNH TOÁN KHÔNG GIAN TỪ FILE PDF THỰC TẾ

Tài liệu nguồn: "ÔN VEC TƠ KG 10T10.pdf" (Chương trình GDPT 2018)


Câu 1 (Phần C): Vectơ trong tứ diện

Cho tứ diện ABCD. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ 0 mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện ABCD?
A. 12.
B. 4.
C. 10.
D. 8.




Câu 2 (Phần C): Vectơ trong hình lập phương

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. vec(AB) + vec(AD) + vec(AA') = vec(AC').
B. vec(AC) = vec(AB) + vec(AD).
C. |vec(AB)| = |vec(CD)|.
D. vec(AB) = vec(CD).




Câu 3 (Phần C): Trọng tâm tứ diện

Cho hình tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. vec(GA) + vec(GB) + vec(GC) + vec(GD) = vec(0).
B. vec(OG) = frac(1)(4)(vec(OA) + vec(OB) + vec(OC) + vec(OD)).
C. vec(AG) = frac(2)(3)(vec(AB) + vec(AC) + vec(AD)).
D. vec(AG) = frac(1)(4)(vec(AB) + vec(AC) + vec(AD)).




Câu 4 (Phần C): Trung điểm trong tứ diện

Cho tứ diện ABCD, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD; Đẳng thức nào sai?
A. vec(IJ) = frac(1)(2)(vec(AC) + vec(BD)).
B. vec(IJ) = frac(1)(2)(vec(AD) + vec(BC)).
C. vec(IJ) = frac(1)(2)(vec(DC) + vec(AD) + vec(BD)).
D. vec(IJ) = frac(1)(2)(vec(AB) + vec(CD)).




Câu 6 (Phần C): Quy tắc hình hộp

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Chọn đẳng thức vectơ đúng:
A. vec(AC') = vec(AB) + vec(AB') + vec(AD).
B. vec(DB') = vec(DA) + vec(DD') + vec(DC').
C. vec(AC') = vec(AC) + vec(AB) + vec(AD).
D. vec(DB) = vec(DA) + vec(DD') + vec(DC).




Câu 8 (Phần C): Trung điểm trong tứ diện

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khẳng định nào sau đây sai?
A. vec(AB) + vec(CD) = vec(CB) + vec(AD).
B. 2vec(MN) = vec(AB) + vec(DC).
C. vec(AD) + 2vec(MN) = vec(AB) + vec(AC).
D. 2vec(MN) = vec(AB) + vec(AC) + vec(AD).




Câu 9 (Phần C): Vectơ trong hình chóp

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. vec(SA) + vec(SD) = vec(SB) + vec(SC).
B. vec(SA) + vec(SB) + vec(SC) + vec(SD) = vec(0).
C. vec(SA) + vec(SC) = vec(SB) + vec(SD).
D. vec(SA) + vec(SB) = vec(SC) + vec(SD).




Câu 10 (Phần C): Vectơ trong lăng trụ tam giác

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB?
A. vec(A'B').
B. vec(A'C).
C. vec(A'C').
D. vec(A'B).




Câu 13 (Phần C): Vectơ trong lăng trụ tam giác

Cho hình lăng trụ tam giác ABCA'B'C'. Đặt vec(AA') = vec(a), vec(AB) = vec(b), vec(AC) = vec(c), vec(BC) = vec(d). Trong các biểu thức véctơ sau đây, biểu thức nào đúng.
A. vec(a) + vec(b) + vec(c) = vec(d).
B. vec(a) = vec(b) + vec(c).
C. vec(a) + vec(b) + vec(c) + vec(d) = vec(0).
D. vec(b) - vec(c) + vec(d) = vec(0).




Câu 1 (Phần D): Vectơ trong hình hộp

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) vec(BD) - vec(D'D) - vec(B'D') = vec(BB')
b) vec(AC) - vec(BA') + vec(DB) + vec(C'D) = vec(0)
c) vec(AC) + vec(BA') + vec(DB) + vec(C'D) = vec(0)
d) vec(AB) + vec(B'C') + vec(DD') = vec(AC')



Câu 2 (Phần D): Vectơ trong hình hộp

Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) vec(AC_1) + vec(A_1C) = 2vec(AC)
b) vec(AC_1) + vec(CA_1) + 2vec(C_1C) = vec(0)
c) vec(CA_1) + vec(AC) = vec(CC_1)
d) vec(AC_1) + vec(CD) = vec(A_1D_1)



Câu 5 (Phần D): Tích vô hướng trong hình lập phương

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D', có cạnh a. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) vec(AD').vec(CC') = a^2
b) vec(AD').vec(AB') = a^2
c) vec(AB').vec(CD') = 0
d) |vec(AC')| = asqrt(3)

