Câu 1. Mỗi con **sán lá gan lớn** trưởng thành, hút bao nhiêu ml máu mỗi ngày:
A. 0,1 ml. **B.** 0,4m **C.** 0,2 ml. **D.** 0,3ml.
Câu 2. Loài ốc nào sau đây là vật chủ phụ thứ I của **sán lá phổi**:
A. Bythinia. **B.** Limnea. **C.** Bulimus. **D.** Planorbis.
Câu 3. Vật chủ phụ thứ I của **sán lá phổi**:
A. Ốc. **B.** Lươn **C.** Cá giếc. **D.** Tôm, cua
Câu 4. Thời gian từ khi ấu trùng lông của **sán lá ruột** xâm nhập vào ốc và hoàn tất sự phát triển trong cơ thể ốc là:
A. 2 tháng. **B.** 4 tháng **C.** 3 tháng. **D.** 1 tháng.
Câu 5. Loài ốc nào sau đây là vật chủ phụ thứ I của **sán lá ruột**:
A. Limnea. **B.** Bythinia. **C.** Bulimus. **D.** Planorbis.
Câu 6. Khi nhiễm với số lượng nhiều **sán lá ruột** bệnh nhân có triệu chứng:
A. Đau bụng vùng hạ sường phải, tiêu chảy, mệt mỏi, sụt cân, phù.
B. Đau bụng vùng thượngû vị, tiêu chảy, mệt mỏi, sụt cân, phù.
C. Đau bụng vùng hạ vị, tiêu chảy, mệt mỏi, sụt cân, phù.
D. Đau bụng vùng hạ vị, đi cầu phân nhầy máu, sốt.
Câu 7. Loài ốc nào sau đây là vật chủ phụ thứ I của **sán lá phổi**:
A. Planorbis. **B.** Bulimus. **C.** Bythinia. **D.** Limnea
Câu 8. Thuốc điều trị ***Enterobius vermicularis***:
A. Fansidar **B.** Mebendazole. **C.** Niclosamide. **D.** Praziquantel.
Câu 9. Người nhiễm **sán lá ruột** do ăn các loại thực phẩm nào sau đây chưa nấu chín:
A. Các loại rau thuỷ sinh: ngó sen, rau muống, củ ấu... **B.** Tôm sống.
C. Gỏi cá giếc. **D.** Cua nướng.
Câu 10. Thời gian từ khi nhiễm **nang ấu trùng sán lá ruột** đến khi phát triển con trưởng thành:
A. 3 tháng. **B.** 2 tháng. **C.** 1 tháng. **D.** 4 tháng.
Câu 11. Giun kim cái thường đẻ trứng ở:
A. Trực tràng. **B.** Hậu môn. **C.** Tá tràng. **D.** Ruột non.
Câu 12. Loài ốc nào sau đây là vật chủ phụ thứ I của **sán lá phổi**:
A. Bulimus. **B.** Bythinia. **C.** Limnea. **D.** Planorbis.
Câu 13. Vật chủ phụ thứ I của **sán lá gan lớn**:
A. Ốc. **B.** Tôm. **C.** Cá giếc. **D.** Cua.
Câu 14. Chu kỳ ngược dòng của ***Enterobius vermicularis***:
A. Ấu trùng giun kim nở ra ở hậu môn đi lên manh tràng.
B. Ấu trùng giun kim từ ruột già lên sống ở ruột non.
C. Giun kim từ ruột già lên sống ở ruột non.
D. Trứng giun kim theo gió bụi vào miệng.
Câu 15. Ngoài người, vật chủ chính của **sán lá phổi** có thể là:
A. Chó, mèo. **B.** Gà, vịt. **C.** Cừu, dê. **D.** Trâu, bò.
Câu 16. Trong bệnh sán lá ruột, bạch cầu toan tính có thể tăng đến:
A. 26-30%. **B.** 31-35%. **C.** 20-25%. **D.** 36-40%.
Câu 17. ***Enterobius vermicularis*** không gây tác hại này:
A. Rối loạn tiêu hoá. **B.** Giun kim lạc chỗ vào cơ quan sinh dụ
C. Ngứa hậu môn. **D.** Tắc ruột.
Câu 18. Về mặt hình thể, **sán lá gan lớn** trưởng thành có đặc điểm:
A. Dài 3 - 4cm, ống tiêu hoá phân hai nhánh lớn.
B. Dài 5 - 6cm, ống tiêu hoá phân hai nhánh chính, sau đó phân nhiều nhánh nhỏ.
C. Dài 3 – 4 cm, ống tiêu hoá phân 2 nhánh chính, sau đó phân nhiều nhánh nhỏ.
D. Dài 5 - 6 cm, ống tiêu hoá phân 2 nhánh lớn.

Câu 19. Kích thước của trứng **sán lá gan lớn**:

A. (40-60) µm x (10-12) µm. **B.** (70-90) µm x (30-40) µm.

C. (100-120) µm x (30-40) µm. **D.** (130-150) µm x (60-90) µm.

Câu 20. Người nhiễm **sán lá gan lớn** do ăn:

A. Rau sống. **D.** Cá gỏi.

B. Tôm cua nướng. **C.** Các loại thực vật thuỷ sinh có chứa nang ấu trùng chưa nấu chín

Câu 21. Hình ảnh X-Quang phổi trong bệnh **sán lá phổi** dễ nhầm với bệnh nào sau đây:

A. Giãn phế quản. **B.** Viêm phế quản.

C. Tràn dịch màng phổi. **D.** Lao hạch ở phổi.

Câu 22. Tuổi thọ của giun ***Enterobius vermicularis*:**

A. 3-4 tháng. **B.** 1 năm. **C.** 6 tháng. **D.** 1-2 tháng

Câu 23. Trong bệnh **sán lá gan lớn**, giai đoạn ấu trùng chu du, bạch cầu toan tính có thể tăng đến:

A. 60% **B.** 40% **C.** 80%. **D.** 50%

Câu 24. Vật chủ phụ thứ I của **sán lá ruột**:

A. Tôm. **B.** Cua. **C.** Ốc. **D.** Cá giếc.

Câu 25. Ngoài người, vật chủ chính của **sán lá gan lớn** có thể là:

A. Lợn. **B.** Gà, vịt. **C.** Trâu, bò. **D.** Chuột.

Câu 26. Chẩn đoán bệnh **sán lá gan lớn** giai đoạn trưởng thành dựa vào:

A. Triệu chứng lâm sàng **B.** Xét nghiệm máu bạch cầu toan tính tăng.

C. Tìm trứng trong phân hay dịch hút tá tràng. **D.** Siêu âm gan.

Câu 27. Phòng bệnh giun kim **không** cần làm điều này:

A. Ăn chín, uống sôi. **B.** Cắt móng tay.

C. Không ăn thịt bò tái. **D.** Không mặc quần không đáy cho trẻ em.

Câu 28. Để dự phòng **bệnh sán lá phổi** không nên ăn:

A. Gỏi tôm, cua sống **B.** Gỏi cá giếc **C.** Lươn nướng **D.** Ếch nướng

Câu 29. Trứng sán lá ruột sau khi bài xuất ra khỏi cơ thể người phát triển thành ấu trùng lông khi gặp môi trường thích hợp nào sau đây:

A. Nước ngọt (sông, ao, hồ...) **B.** Nước biển.

C. Đất cát, nhiều khí O_2. **D.** Đất xốp, nhiều khí O_2.

Câu 30. Trứng sán lá phổi sau khi bài xuất ra khỏi cơ thể phát triển thành ấu trùng lông khi trứng rơi vào môi trường thích hợp nào sau đây:

A. Nước mặn (biển). **B.** Nước lợ (đầm, phá).

C. Đất cát xốp có độ pH cao. **D.** Nước ngọt (sông, ao, hồ).

Câu 31. Kích thước **sán lá phổi**:

A. 8 - 16 mm **B.** 45-55 mm **C.** 20-25 mm **D.** 30-40 mm

Câu 32. Giun kim sống ở:

A. Tá tràng. **B.** Ruột già.

C. Ruột non. **D.** Vùng hồi manh tràng.

Câu 33. Để chẩn đoán bệnh ***Enterobius vermicularis***, người ta dùng kỹ thật giấy bóng kính dính vào:

A. Buổi sáng sau khi trẻ thức đậy. **B.** Bất kỳ thời điểm nào.

C. Buổi sáng sau khi trẻ đã làm vệ sinh thân thể. **D.** Buổi trưa.

Câu 34. Thời gian từ khi **sán lá phổi** xâm nhập vào vật chủ chính đến khi trưởng thành đẻ trứng khoảng:

A. 2 tháng. **B.** 4 tháng. **C.** 1 tháng. **D.** 3 tháng.

Câu 35. ***Enterobius vermicularis*** chủ yếu đẻ trứng:

A. Tuỳ theo lúc mà có thể đẻ ban đêm hoặc ban ngày

B. Vào ban đêm, ở rìa hậu môn nên thường gây ngứa hậu môn

C. Đẻ ban ngày, sau khi đẻ, giun cái chết.

D. Vào ban đêm ngay trong lòng ruột