

MỤC LỤC

Bài	Tên bài	Trang
1	Đại cương về sinh lý học – vấn đề chuyển hóa năng lượng	2
2	Sinh lý thân nhiệt	9
3	Sinh lý cấu trúc màng – vận chuyển các chất qua màng	14
4	Sinh lý điện thế màng tế bào	23
5	Sinh lý dịch cơ thể	26
6	Đại cương về hoạt chất sinh học	33
7	Sinh lý vùng hạ đồi – tuyến yên	40
8	Sinh lý tuyến giáp – tuyến cận giáp	48
9	Sinh lý tuyến tụy nội tiết	54
10	Sinh lý tuyến thượng thận	58
11	Hệ thống nội tiết và các hormon địa phương	61
12	Tổng kết về hoạt chất sinh học và các tuyến nội tiết	64
13	Sinh lý sinh dục nam	69
14	Sinh lý sinh dục nữ	74
15	Sinh lý sinh sản	82
16	Sinh lý hồng cầu và nhóm máu	87
17	Sinh lý bạch cầu và miễn dịch	99
18	Sinh lý tiểu cầu và neuron	105
19	Sinh lý thần kinh neuron và synapse	112
20	Sinh lý thần kinh cảm giác	120

21	Sinh lý thần kinh vận động	130
22	Sinh lý phản xạ không điều kiện	137
23	Sinh lý phản xạ có điều kiện	144
24	Sinh lý cơ – xương – khớp	151
25	Sinh lý tim	156
26	Sinh lý vận mạch	166
27	Trao đổi khí ngoài phổi	176
28	Trao đổi khí tại phổi và vận chuyển khí trong máu	187
29	Đại cương về hệ tiêu hóa	191
30	Tiêu hóa tại miệng – thực quản – dạ dày	196
31	Tiêu hóa tại ruột non và ruột già	206
32	Độ lọc cầu thận – sự bài tiết và hấp thu qua ống thận	216
33	Chức năng và điều hòa chức năng thận – hệ thống tiết niệu	227

TRẮC NGHIỆM SINH LÝ

CHUYÊN ĐỀ 1 – ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH LÝ HỌC

Bài số 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH LÝ HỌC – VẤN ĐỀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Nội dung 1 : Tính chất chung của cơ thể sống

Câu 1: Quá trình chuyển hóa trong cơ thể :

- a. Phân giải vật chất , tạo năng lượng thuộc quá trình đồng hóa
- b. Chuyển hóa là khả năng cơ thể đáp ứng với kích thích của môi trường sống
- c. Dị hóa là quá trình thu nhận vật chất từ bên ngoài
- d. Đồng hóa và dị hóa là 2 mặt thống nhất của chuyển hóa

Câu 2: Định luật bảo toàn năng lượng là :

- a. Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
- b. Hoá năng của thức ăn chuyển thành các dạng năng lượng khác cần thiết cho sự sống.
- c. Năng lượng không sinh ra thêm và cũng không mất đi.
- d. Năng lượng tiêu hao dù bất cứ dạng nào cuối cùng để thải ra ngoài dưới dạng nhiệt.

Nội dung 2 : Các dạng năng lượng trong cơ thể sống

Câu 3: Dạng năng lượng nằm trong các liên kết hóa học

- a. Nhiệt năng
- b. Động năng
- c. Hóa năng
- d. Thẩm thấu năng

Câu 4: Hình thái cơ thể được duy trì nhờ :

- a. hóa năng
- b. nhiệt năng
- c. động năng
- d. điện năng

Câu 5: Dạng năng lượng nào sau đây không sinh công cho cơ thể ?

- a. cơ năng
- b. thẩm thấu năng
- c. điện năng
- d. nhiệt năng

Câu 6: Các hình thái chuyển động trong cơ thể được thực hiện nhờ

- a. Hóa năng
- b. Động năng
- c. Thẩm thấu năng
- d. Điện năng

Câu 7: Dạng năng lượng có nguồn gốc từ sự chênh lệch ion giữa 2 bên màng

- a. Hóa năng
- b. Động năng

- c. Thẩm thấu năng
- d. Điện năng

Câu 8: Hai dạng năng lượng có nguồn gốc từ **thế năng** hai bên màng tế bào là :

- a. Hóa năng và cơ năng
- b. Điện năng và thẩm thấu năng
- c. Hóa năng và nhiệt năng
- d. cơ năng và nhiệt năng

Câu 9: Bản thân **cấu trúc** của **màng bào tương** tế bào đã tích trữ trong đó:

- a. Hóa năng
- b. Động năng
- c. Thẩm thấu năng
- d. Điện năng

Câu 10: Sự **di chuyển của dung môi** qua màng bán thấm được thực hiện nhờ

- a. Hóa năng
- b. Thẩm thấu năng
- c. Cơ năng
- d. Điện năng

Câu 11: Dạng năng lượng sau luôn được **đào thải** khỏi cơ thể :

- a. Nhiệt năng
- b. Cơ năng
- c. Điện năng
- d. Thẩm thấu năng

Câu 12: Dạng năng lượng nào sau đây có nguồn gốc **thế năng** ?

- a. Hóa năng
- b. Cơ năng
- c. Thẩm thấu năng
- d. Nhiệt năng

Câu 13: **Động năng** tồn tại trong :

- a. Liên kết hóa học
- b. Sự trượt lên nhau của sợi actin và myosin
- c. Chênh lệch nồng độ các chất ở hai bên màng
- d. Chênh lệch nồng độ ion hai bên màng

Câu 14: **Thẩm thấu năng** tồn tại trong :

- a. Liên kết hóa học
- b. Sự trượt lên nhau của sợi actin và myosin
- c. Chênh lệch nồng độ **các chất ở hai bên màng**
- d. Chênh lệch nồng độ ion hai bên màng

Câu 15: ATP thuộc dạng năng lượng :

- a. Hóa năng
- b. Cơ năng
- c. Thẩm thấu năng
- d. Điện năng

Nội dung 3: Quá trình tổng hợp năng lượng trong cơ thể sống

Câu 16: Nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể chủ yếu từ :

- a. Protein
- b. Carbohydrate
- c. Glycogen trong cơ

d. Các mô mỡ trong cơ thể

Câu 17: Quá trình tổng hợp năng lượng của cơ thể thực chất là quá trình chuyển hóa năng của chất sinh năng thành hóa năng của :

- a. thức ăn
- b. ADP
- c. **ATP**
- d. ADH

Câu 18: Quá trình tổng hợp năng lượng ATP diễn ra qua mấy giai đoạn ?

- a. 1
- b. **2**
- c. 3
- d. 4

Câu 19: Quá trình phosphoryl hóa là quá trình :

- a. Hấp thụ các hợp chất C-H-O vào tế bào
- b. Đốt cháy các hợp chất C-H-O vào trong tế bào bằng O₂
- c. Chuyển giao điện tử qua các cơ chất cho hydro
- d. **Gắn phosphat vào ADP và tích trữ trong đó năng lượng**

Câu 20: Oxy hóa khử là quá trình :

- a. **thoái hóa các chất sinh năng lượng tạo ra năng lượng tự do, CO₂ và nước**
- b. đào thải CO₂ và nước ra khỏi cơ thể
- c. tổng hợp ATP để dự trữ năng lượng cho cơ thể
- d. chuyển hóa ATP thành các dạng năng lượng của cơ thể

Câu 21: Quá trình oxy hóa khử trong tổng hợp năng lượng thực chất là :

- a. Gắn phosphat vào ADP để tạo thành ATP
- b. Chuyển hóa ATP thành 5 dạng năng lượng của cơ thể
- c. Cho và nhận điện tử một cách trực tiếp
- d. **Phá vỡ liên kết của các chất sinh năng**

Câu 22: Quá trình oxy hóa khử trong tổng hợp năng lượng diễn ra ở :

- a. ty thể
- b. **ty thể và bào tương**
- c. bào tương
- d. tiêu thể và bào tương

Câu 23: Quá trình oxy hóa khử tạo năng lượng là quá trình chuyển giao điện tử của

- a. Carbon
- b. **Hydro**
- c. Oxy
- d. Nito

Câu 24: Sự oxy hóa chất hóa học nào sau đây tạo ra nhiều năng lượng nhất ?

- a. Glucid.
- b. **Lipid.**
- c. Protid.
- d. Cả ba như nhau.

Câu 25: Chọn câu đúng

- a. **Toàn bộ** nhiệt sinh ra từ các phản ứng chuyển hóa được sử dụng cho duy trì cơ thể
- b. **Thức ăn là nguồn cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể**
- c. Ba chất sinh năng lượng chính cho cơ thể : protid, amin, lipid
- d. Quá trình phosphoryl hóa xảy ra ở **trung thể**

Câu 26: ATP cung cấp năng lượng cho quá trình sau, ngoại trừ :

- a. vận chuyển glucose qua màng tế bào
- b. bơm Na^+ - K^+ -ATPase
- c. phản ứng tổng hợp các chất tạo hình
- d. sự co rút của các sợi actin và myosin

Câu 27: Khi tế bào **không hoạt động**

- a. hàm lượng ADP trong tế bào thấp
- b. hàm lượng ADP trong tế bào cao
- c. các phản ứng sinh năng trong tế bào tăng lên
- d. hàm lượng ATP không được duy trì ổn định

Nội dung 4 : Tiêu hao năng lượng trong cơ thể sống

Câu 28: Duy trì cơ thể bao gồm các hoạt động sau :

- a. Thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu
- b. Tiêu hóa , vận cơ và điều nhiệt
- c. Sinh sản và phát triển
- d. a và b đúng

Câu 29: Năng lượng tiêu hao **nhiều nhất** để duy trì cơ thể :

- a. vận cơ
- b. điều nhiệt
- c. tiêu hóa
- d. chuyển hóa cơ sở

Câu 30: Chuyển hóa năng lượng của toàn cơ thể tăng khi kích thích cấu trúc của thần kinh nào sau đây

- a. Thần kinh giao cảm
- b. Phó giao cảm
- c. Đồi thị
- d. Phần trước vùng dưới đồi

Câu 31: Chuyển hóa cơ sở là các hoạt động

- a. Diễn ra liên tục để duy trì cơ thể
- b. Đảm bảo cho sự sinh sản và phát triển
- c. Sản sinh năng lượng từ vận cơ và tiêu hóa
- d. Tất cả điều đúng

Câu 32: Tiêu hao năng lượng cho **chuyển hóa cơ sở** là tiêu hao năng lượng để duy trì cơ thể trong điều kiện:

- a. Không vận cơ, không tiêu hóa, không điều nhiệt
- b. Không sinh sản, không phát triển cơ thể
- c. Không vận cơ, không sinh sản, không điều nhiệt
- d. Không vận cơ, không phát triển cơ thể

Câu 33: Hoạt động nào sau đây **không** phải là chuyển hóa cơ sở ?

- a. thần kinh
- b. hô hấp
- c. tim mạch
- d. tiêu hóa

Câu 34: Chọn câu **sai**, tiêu hao năng lượng cho chuyển hóa cơ sở là tiêu hao năng lượng cho:

- a. hấp thu chất dinh dưỡng
- b. tim đập
- c. thận bài tiết
- d. trao đổi vật chất qua màng tế bào

Câu 35: Đơn vị đo **chuyển hóa cơ sở**:

- a. Kcal/kg thể trọng/ phút
- b. Kcal/m³ da/ giờ
- c. Kcal/m² da/ ngày
- d. KJ/m² da/ giờ

Câu 36: Khi nói về các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa cơ sở :

- a. Sốt làm tăng chuyển hóa cơ sở
- b. Nửa sau chu kỳ kinh nguyệt, chuyển hóa cơ sở thấp hơn bình thường
- c. Chuyển hóa cơ sở cao nhất lúc 1-4h sáng và thấp nhất lúc 13-16h chiều
- d. Ưu năng tuyến giáp làm giảm chuyển hóa cơ sở

Câu 37: Trong các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa cơ sở, yếu tố nào sau đây sai :

- a. chuyển hóa cơ sở thay đổi theo nhịp ngày đêm, cao nhất lúc 13-16 h , thấp nhất lúc 1-4h
- b. Tuổi càng cao chuyển hóa cơ sở càng giảm
- c. ở cùng một lứa tuổi chuyển hóa cơ sở ở nam lớn hơn nữ
- d. Nửa sau chu kỳ kinh nguyệt chuyển hóa cơ sở giảm.

Câu 38: Chọn phát biểu SAI về yếu tố ảnh hưởng lên tiêu hao năng lượng cho CHCS :

- a. Người già thấp hơn người trẻ
- b. Ban ngày cao hơn ban đêm
- c. Nửa đầu chu kỳ kinh nguyệt cao hơn nửa sau
- d. Thay đổi khi xúc cảm

Câu 39: Điều kiện để đo chuyển hóa cơ sở chính xác :

- a. nhịn ăn, không vận động và không điều nhiệt
- b. không mang thai và không cho con bú
- c. không bị mắc bệnh cấp tính và mãn tính
- d. nhịn ăn, không mang thai và không mắc bệnh gì

Câu 40: Để đo chuyển hóa cơ sở cần dặn bệnh nhân

- a. Nhịn ăn và không vận động
- b. Đi vệ sinh
- c. Uống nhiều nước
- d. Hít thở sâu

Câu 41: Để giữ cho thân nhiệt được hằng định đảm bảo cho tốc độ phản ứng hóa học trong cơ thể diễn ra bình thường, cơ thể phải tiêu hao năng lượng cho hoạt động :

- a. bài tiết
- b. hô hấp
- c. điều nhiệt
- d. chuyển hóa

Câu 42: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiêu hao năng lượng trong vận cơ, ngoại trừ :

- a. Thời gian vận cơ
- b. Cường độ vận cơ
- c. Tư thế vận cơ
- d. Mức độ thông thạo

Câu 43: Khi vận cơ hóa năng tích lũy trong tế bào cơ chuyển thành công cơ học, bị tiêu hao dưới dạng nhiệt

- a. 35% , 65%
- b. 25% , 75%
- c. 55% , 45%
- d. 75% , 25%

Câu 44: Khi nói về năng lượng tiêu hao cho vận cơ:

- a. cường độ vận cơ càng lớn thì tiêu hao năng lượng càng thấp
- b. càng thông thạo công việc thì năng lượng tiêu hao càng ít

- c. dựa vào **mức độ thông thạo** để chế tạo ra công cụ, phương tiện lao động phù hợp cho từng người
- d. số cơ co **không liên quan** đến mức độ tiêu hao năng lượng

Câu 45: Năng lượng tiêu hao trong vận cơ :

- a. trong vận cơ hóa năng tích lũy trong cơ bị tiêu hao như sau: **35%** chuyển hóa thành công cơ học, **65%** tỏa ra dưới dạng nhiệt
- b. năng lượng tiêu hao trong vận cơ được tính theo **kcal/kg cơ thể/giờ**
- c. cường độ vận cơ càng lớn, mức tiêu hao năng lượng **càng giảm**
- d. **tư thế vận cơ càng thoải mái thì càng ít tiêu hao năng lượng**

Câu 46: Đơn vị đo tiêu hao năng lượng tiêu hao trong vận cơ:

- a. KJ/ Kg thể trọng/ giờ
- b. Kcal/ Kg thể trọng/ ngày
- c. **Kcal/ Kg thể trọng/ phút**
- d. KJ/ Kg thể trọng/giờ

Câu 47: Về mặt năng lượng, cơ sở để **xây dựng chế độ ăn** cho người lao động là:

- a. **Cường độ vận cơ**
- b. Tư thế vận cơ
- c. Mức độ tiêu hao năng lượng
- d. Tiêu hao năng lượng cho phát triển

Câu 48: Cơ sở sinh lý học của việc **chế tạo công cụ lao động** phù hợp với người lao động dựa trên sự tiêu hao năng lượng do :

- a. Chuyển hóa cơ sở
- b. Cường độ vận cơ
- c. **Tư thế vận cơ**
- d. Mức độ thông thạo công việc

Câu 49: Xét dưới góc độ chuyển hóa năng lượng thì **việc huấn luyện tay nghề** cho người lao động dựa trên cơ sở tiêu hao năng lượng do :

- a. Chuyển hóa cơ sở
- b. Cường độ vận cơ
- c. Tư thế vận cơ
- d. **Mức độ thông thạo khi vận cơ**

Câu 50: SDA của chế độ ăn sau đây có **giá trị nhỏ nhất** :

- a. **Glucid**
- b. Lipid
- c. Protid
- d. Hỗn hợp

Câu 51: SDA của chế độ ăn sau đây có **giá trị lớn nhất** :

- a. Glucid
- b. Lipid
- c. **Protid**
- d. Hỗn hợp

Câu 52: Chế độ ăn nào sau đây sinh **nhiều nhiệt nhất** ?

- a. Glucid
- b. **Protid**
- c. Lipid
- d. Hỗn hợp

Câu 53: SDA của chế độ ăn **sau sinh sản** là :

- a. Glucid

- b. Lipid
- c. Protid
- d. Hỗn hợp

Câu 54: Cơ sở để cho trẻ em tăng thêm một bữa ăn sau khi bị bệnh là tiêu hao năng lượng cho:

- a. Duy trì cơ thể
- b. Chuyển hóa cơ sở
- c. Phát triển cơ thể
- d. Sinh sản

Nội dung 5: Điều hòa chuyển hóa năng lượng và chuyển hóa chung trong cơ thể

Câu 55: Điều hòa chuyển hóa năng lượng mức cơ thể được thực hiện bằng:

- a. hô hấp, tuần hoàn
- b. thần kinh, miễn dịch
- c. thần kinh, thể dịch
- d. hô hấp, thể dịch

Câu 56: Hormone sau đây làm tăng chuyển hóa năng lượng bằng cơ chế thể dịch, ngoại trừ:

- a. T3, T4
- b. cortisol
- c. inulin
- d. GH

Câu 57: Các điều hòa sau là cơ chế feedback âm, ngoại trừ :

- a. CO₂ máu tăng, phổi tăng thông khí thải CO₂
- b. Huyết áp tăng, giảm nhịp tim và sức co bóp cơ tim
- c. Đường máu tăng, Insulin tăng tiết
- d. Chất tiết từ bạch cầu trong viêm nhiễm càng hoạt hóa các bạch cầu

Câu 58: Trong cơ thể khi đường máu tăng, tụy bài tiết Insulin để đưa vào trong tế bào làm ổn định đường huyết. Đây thuộc cơ chế:

- a. Feedback âm tính
- b. Feedback dương tính
- c. Điều hòa thần kinh
- d. Điều hòa thể dịch

CHUYÊN ĐỀ 1 – ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH LÝ HỌC

Bài số 2

SINH LÝ THÂN NHIỆT CƠ THỂ

Nội dung 1. Các loại thân nhiệt và các yếu tố ảnh hưởng lên thân nhiệt cơ thể

Câu 59: Hai nguồn gốc **sinh nhiệt** của cơ thể là:

- a. phản ứng chuyển hóa, vận cơ
- b. môi trường, chuyển hóa cơ sở
- c. **phản ứng chuyển hóa, môi trường**
- d. phản ứng chuyển hóa, năng lượng dự trữ

Câu 60: **Thân nhiệt trung tâm**

- a. **Là nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể**
- b. Thay đổi theo nhiệt độ môi trường
- c. Nhiệt độ ở trực tràng dao động hơn nhiệt độ ở miệng
- d. Nơi đo nhiệt độ trung tâm là gan , lách

Câu 61: **Thân nhiệt ngoại vi** có đặc điểm :

- a. Là nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể.
- b. Không thay đổi theo nhiệt độ môi trường.
- c. **Có thể dùng để đánh giá hiệu quả điều nhiệt.**
- d. Đo ở nách thấp hơn nhiệt độ trực tràng $0,5^{\circ}\text{C}$ - 1°C .

Câu 62: Đặc điểm của thân nhiệt trung tâm, **ngoại trừ**:

- a. Là nhiệt độ của các tạng
- b. Hằng định ở 37°
- c. Phản ánh mục tiêu điều nhiệt
- d. **Phải đo bằng cách đưa nhiệt kế vào bên trong cơ thể**

Câu 63: **Vùng thân nhiệt có trị số cao nhất là :**

- a. **Trực tràng**
- b. Gan
- c. Nách
- d. Miệng

Câu 64: Trên lâm sàng, khi đo nhiệt độ ở nách của bệnh nhân là $36,5^{\circ}\text{C}$ thì nhiệt độ cơ thể người bệnh là:

- a. 36°C
- b. $36,5^{\circ}\text{C}$
- c. **37°C**
- d. 38°C

Câu 65: **Thân nhiệt ngoại vi :**

- a. Là thân nhiệt chung cho toàn cơ thể
- b. Thường được đo ở 3 nơi : Nách , miệng , trực tràng
- c. **Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường**
- d. Được xem là mục đích điều nhiệt của cơ thể

Câu 66: **Thân nhiệt ngoại vi :**

- a. Là nhiệt độ các tạng và thường có trị số nhỏ hơn 37° .
- b. Hằng định
- c. **It có ảnh hưởng đến các phản ứng chuyển hóa trong cơ thể**
- d. Thường được đo ở ba nơi : Trực tràng , miệng , nách

Câu 67: **Thân nhiệt:**

- a. ảnh hưởng gián tiếp đến tốc độ phản ứng hóa học trong cơ thể
- b. **ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng hóa học trong cơ thể**
- c. thay đổi theo nhiệt độ môi trường

d. không thay đổi theo nhiệt ngày đêm

Câu 68: Các yếu tố góp phần tạo ra thân nhiệt trung tâm , **NGOẠI TRỪ** :

- a. Chuyển hóa cơ sở
- b. Vận cơ
- c. Tiêu hóa
- d. **Nhiệt độ môi trường**

Nội dung 2: Cơ chế quá trình sinh nhiệt trong cơ thể

Câu 69: Các nguồn **sinh nhiệt tự nhiên** , ngoại trừ :

- a. chuyển hóa cơ sở
- b. Tăng trương lực cơ
- c. run
- d. **SDA**

Câu 70: Các điều kiện sau làm tăng sinh nhiệt , ngoại trừ :

- a. Vận động
- b. Nửa sau chu kì kinh nguyệt
- c. **Bệnh dịch tả**
- d. Bệnh Basedow

Câu 71: Các yếu tố làm tăng thân nhiệt, ngoại trừ

- a. Vận cơ
- b. Nửa sau chu kỳ kinh nguyệt
- c. Thai nghén
- d. **Nhiễm khuẩn tả**

Câu 72: Yếu tố ảnh hưởng lên thân nhiệt theo chiều **hướng làm tăng**:

- a. Buổi tối trong chu kỳ ngày đêm
- b. Bệnh tả
- c. **Tháng cuối thai kỳ**
- d. Người già

Câu 73: Sự biến đổi của thân nhiệt trong chu kỳ kinh nguyệt như sau

- a. Thân nhiệt ngày trước rụng trứng tăng hơn ngày sau rụng trứng 0,3-0,5°C.
- b. Thân nhiệt ngày trước rụng trứng tăng hơn ngày sau rụng trứng 1,5°C.
- c. **Thân nhiệt ngày sau rụng trứng tăng hơn ngày trước rụng trứng 0,3-0,5°C.**
- d. Thân nhiệt ngày sau rụng trứng tăng hơn ngày trước rụng trứng 1,5°C.

Câu 74: Nói về các yếu tố ảnh hưởng lên thân nhiệt, **câu nào sau đây sai**

- a. thân nhiệt thấp nhất lúc 5-7h sáng và cao nhất lúc 14-16h chiều
- b. nửa sau chu kỳ kinh nguyệt và tháng cuối thai nghén thân nhiệt tăng
- c. vận cơ càng nhiều, thân nhiệt càng cao
- d. **bệnh dịch tả làm tăng thân nhiệt**

Nội dung 2. Cơ chế thải nhiệt của cơ thể

Câu 75: Thải nhiệt bằng **cơ chế truyền nhiệt** là hình thức , **Chọn câu sai** :

- a. Đối lưu
- b. **Bốc hơi nước**
- c. Trục tiếp
- d. Bức xạ

Câu 76: Hình thức thải nhiệt sau đây có liên quan đến **màu sắc**

- a. **truyền nhiệt bức xạ**
- b. truyền nhiệt trực tiếp
- c. truyền nhiệt đối lưu

d. bốc hơi nước

Câu 77: Trong **truyền nhiệt bức xạ**, khối lượng nhiệt phụ thuộc vào :

- a. **Màu sắc của vật nhận nhiệt**
- b. Diện tích truyền nhiệt
- c. Tốc độ chuyển động của vật lạnh
- d. Tất cả đều đúng

Câu 78: Khối lượng nhiệt truyền trong **truyền nhiệt bức xạ** phụ thuộc vào, **NGOẠI TRỪ**:

- a. Chênh lệch nhiệt độ
- b. Thời gian truyền nhiệt
- c. **Khoảng cách truyền nhiệt**
- d. Màu sắc của vật nhận nhiệt

Câu 79: Thái nhiệt bằng **truyền nhiệt bức xạ** **KHÔNG** phụ thuộc vào :

- a. Sự chênh lệch nhiệt độ
- b. Thời gian truyền nhiệt
- c. **Khoảng cách và nhiệt độ khoảng không ở giữa**
- d. Màu sắc của vật nhận nhiệt

Câu 80: Điều kiện để cơ thể thải nhiệt qua **đường truyền nhiệt** là:

- a. **nhiệt độ cơ thể lớn hơn nhiệt độ môi trường**
- b. nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt độ môi trường
- c. nhiệt độ cơ thể nhỏ hơn nhiệt độ môi trường
- d. trong mọi điều kiện

Câu 81: Điều kiện để cơ thể thải nhiệt bằng **bốc hơi nước**:

- a. Nhiệt độ cơ thể phải cao hơn nhiệt độ môi trường
- b. **Nhiệt độ môi trường phải cao hơn nhiệt độ cơ thể**
- c. Phải có nước trên bề mặt và bề mặt phải thoáng gió
- d. Phải vận động trong điều kiện ẩm độ môi trường thấp

Câu 82: Làm việc trong môi trường nóng, cơ thể thải nhiệt chủ yếu nhờ:

- a. Truyền nhiệt
- b. Bốc hơi nước qua đường hô hấp
- c. **Thấm nước qua da**
- d. Bài tiết mồ hôi

Câu 83: Phương thức thải nhiệt sau có thể thực hiện khi **nhiệt độ môi trường lớn hơn thân nhiệt** :

- a. **Bài tiết mồ hôi**
- b. Truyền nhiệt bức xạ
- c. Truyền nhiệt đối lưu
- d. Truyền nhiệt trực tiếp

Câu 84: Lượng nước mất hằng định mỗi ngày là :

- a. Nước bốc hơi đường hô hấp
- b. **Nước thấm qua da**
- c. mồ hôi
- d. nước tiểu

Câu 85: Trong điều kiện bình thường, lượng nước mất hằng ngày **không nhìn thấy** và không ý thức được là:

- a. 0,1 lít/ngày
- b. 0,5 lít/ngày
- c. **0,6 lít/ngày**
- d. 0,2 lít/ngày

Câu 86: Lượng mồ hôi bay hơi phụ thuộc vào không khí và tốc độ gió

- a. nhiệt độ
- b. áp suất
- c. độ ẩm
- d. vận tốc

Câu 87: Điều kiện để cơ thể **thải nhiệt bằng mồ hôi** tốt, **NGOẠI TRỪ**

- a. Bề mặt thoáng gió
- b. Ẩm độ môi trường thấp
- c. **Thân nhiệt cao hơn nhiệt độ môi trường**
- d. Co mạch dưới da

Câu 88: Trong thải nhiệt bằng hình thức **bốc hơi nước** :

- a. Lượng nước bốc qua đường hô hấp lúc nào cũng lớn nhất
- b. Lượng nước thấm qua da dày thay đổi theo nhiệt độ môi trường
- c. Nhiệt độ cơ thể luôn luôn lớn hơn nhiệt độ môi trường
- d. **Bề mặt da phải thoáng gió để đảm bảo sự thải nhiệt diễn ra hiệu quả**

Nội dung 3. Cơ chế điều hòa thân nhiệt – chống nóng và chống lạnh của cơ thể

Câu 89: Trung tâm điều hòa thân nhiệt :

- a. Da
- b. Phổi
- c. **Setpoint**
- d. Vỏ não

Câu 90: Khi điểm chuẩn vùng dưới đồi cao hơn thân nhiệt , người ta cảm thấy :

- a. Thở hỗn hển
- b. Gian mạch da
- c. **Rùng mình**
- d. Vã mồ hôi

Câu 91: Độc tố của vi khuẩn gây sốt là do tấn công trực tiếp vào:

- a. vỏ não
- b. **setpoint ở cùng dưới đồi**
- c. tim mạch và hô hấp
- d. mạch máu dưới da

Câu 92: **Cơ chế chống nóng** của cơ thể

- a. **giảm sinh nhiệt là quan trọng và gọi là điều kiện hóa học**
- b. giảm sinh nhiệt là quan trọng và gọi là điều kiện vật lý
- c. tăng sinh nhiệt là quan trọng và gọi là điều kiện vật lý
- d. tăng sinh nhiệt là quan trọng và gọi là điều kiện hóa học

Câu 93: **Cơ chế chống lạnh** của cơ thể:

- a. giảm sinh nhiệt, tăng thải nhiệt
- b. giảm sinh nhiệt, tăng thải nhiệt
- c. **tăng sinh nhiệt, giảm thải nhiệt**
- d. tăng sinh nhiệt, tăng thải nhiệt

Câu 94: Trong cơ chế chống nóng có hiện tượng:

- a. Co mạch dưới da
- b. **Giảm phản ứng chuyển hóa**
- c. Giảm nhiệt truyền và thoát hơi nước
- d. Tăng tiêu thụ năng lượng

Câu 95: Cảm giác mệt mỏi và dấu hiện da ửng đỏ gợi ý tình trạng :

- a. giãn mạch da, tăng chuyển hóa

- b. dẫn mạch da, giảm chuyển hóa
- c. co mạch da, tăng chuyển hóa
- d. co mạch da, giảm chuyển hóa

Câu 96: Trong cơ chế chống lạnh

- a. Thay đổi thân nhiệt diễn ra liên tục không có giới hạn
- b. Sinh nhiệt được thực hiện theo từng bước tăng : Chuyển hóa cơ sở, còng, run
- c. Bệnh nhân có biểu hiện da đỏ và cảm giác mệt mỏi
- d. Bệnh nhân có nguy cơ mất nhiều nước và muối

Câu 97: Cơ chế chống lạnh bao gồm các phản ứng sau đây, NGOẠI TRỪ :

- a. Co mạch da.
- b. Dựng lông (quan trọng ở các loài thú).
- c. Run.
- d. Huy động thần kinh phó giao cảm

Câu 98: Chọn phát biểu sai về điều hòa thân nhiệt

- a. Setpoint lưu giữ nhiệt độ 37°C và điều hòa thân nhiệt
- b. Bệnh nhân đang chống nóng có biểu hiện mệt mỏi và da ửng đỏ
- c. Giảm sinh nhiệt diễn ra không có giới hạn trong cơ chế chống nóng
- d. Bệnh nhân đang chống lạnh cần được bổ sung thêm năng lượng

Nội dung 4. Đặc điểm của sốt và cơ chế của một số biện pháp hạ sốt

Câu 99: Động tác chườm mát bằng khăn ướt đắp trán cho một người bị sốt là ví dụ về

- a. Truyền nhiệt trực tiếp.
- b. Truyền nhiệt bằng hình thức đối lưu.
- c. Truyền nhiệt bằng bức xạ nhiệt.
- d. tất cả đều sai

Câu 100: Hạ nhiệt bằng phương pháp đắp khăn lạnh trên trán có tác dụng:

- a. Giảm thân nhiệt ngoại vi bằng cơ chế bốc hơi nước.
- b. Giảm thân nhiệt trung tâm bằng cơ chế bốc hơi nước.
- c. Giảm thân nhiệt ngoại vi bằng cơ chế truyền nhiệt.
- d. Giảm thân nhiệt trung tâm bằng cơ chế truyền nhiệt.

Câu 101: Lao nước ấm để hạ sốt dựa trên cơ sở:

- a. làm tăng chuyển hóa cơ sở
- b. tạo lớp nước gây bốc hơi
- c. giãn mạch dưới da tăng thải nhiệt
- d. truyền nhiệt trực tiếp

Câu 102: Cơ chế chính gây ớn lạnh và rét run trong sốt là

- a. Thân nhiệt giảm đột ngột
- b. Co mạch ngoại vi
- c. Hưng phấn thần kinh dẫn mạch
- d. Tất cả đều đúng

Câu 103: Cấp cứu sốt cao co giật ở trẻ em cần nhanh chóng :

- a. ủ ấm cho trẻ
- b. cởi bớt quần áo của trẻ
- c. cho trẻ uống nhiều nước
- d. uống thuốc hạ sốt

CHUYÊN ĐỀ 1 – ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH LÝ HỌC

Bài số 3

SINH LÝ CẤU TRÚC MÀNG VÀ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

Nội dung 1. Cấu trúc và chức năng một số thành phần của màng tế bào

Câu 104: Mỗi tế bào có bao nhiêu thành phần cơ bản chính?

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 6

Câu 105: Cấu trúc màng tế bào gồm mấy thành phần chính?

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 6

Câu 106: Độ dày của màng tế bào :

- a. 7,5 – 10 nm
- b. 7,5 – 10 μ m
- c. 2,5 – 5 nm
- d. 2,5 – 5 μ m

Câu 107: Màng tế bào

- a. Lớp lipid kép có đầu kỵ nước hướng vào nhau
- b. có khả năng hòa màng
- c. cho các chất hòa tan thấm dễ dàng
- d. Tất cả đều đúng

Câu 108: Màng tế bào có đặc điểm sau:

- a. Dày 7,5 - 10 nm
- b. Thành phần protein chiếm tỷ trọng nhỏ nhất
- c. Không tạo khả năng hòa màng
- d. Tham gia tiêu hóa và bài tiết dịch mật

Câu 109: Thành phần chủ yếu nhất của lớp lipid kép:

- a. phospholipid
- b. glycolipid
- c. cholesterol
- d. glycoprotein

Câu 110: Trong thành phần lipid của màng, thứ tự về tỉ lệ các chất :

- a. Phospholipid > Cholesterol > Glycolipid
- b. Cholesterol > Phospholipid > Glycolipid
- c. Glycolipid > Phospholipid > Cholesterol
- d. Phospholipid > Glycolipid > Cholesterol

Câu 111: Protein màng được chia làm mấy loại:

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

Câu 112: Các protein màng tế bào **không** có vai trò:

- a. Tạo cấu trúc chống đỡ
- b. Tổng hợp DNA
- c. Là receptor
- d. Là kháng nguyên

Câu 113: Trong cấu trúc màng sinh chất loại **prôtêin chiếm số lượng nhiều nhất** có chức năng là

- a. Enzim
- b. Vận chuyển
- c. Hoocmôn
- d. Kháng thể

Câu 114: Chức năng của protein trung tâm trên màng tế bào

- a. Tạo kênh vận chuyển hoặc chất chuyên chở
- b. Là những thể tiếp nhận
- c. Tạo tính miễn dịch
- d. là những receptor của hormones

Câu 115: Chức năng màng sinh học của tế bào, **CHỌN CÂU SAI** :

- a. Protein trung tâm làm nhiệm vụ chuyên chở chất qua màng
- b. Protein ngoại vi tạo các bộ khung cho màng
- c. Protein ngoại vi đóng vai trò là các enzym
- d. Lớp lipid tạo khả năng hòa màng

Câu 116: Vai trò **KHÔNG PHẢI** của protein trên màng tế bào :

- a. Enzym
- b. Vận chuyển
- c. Tạo lớp áo
- d. Tất cả đều sai

Câu 117: Thành phần protein trung tâm trên màng tế bào có đặc điểm sau:

- a. Tạo thành các kênh
- b. Không tham gia vai trò khuếch tán chất hòa tan trong nước: các ion.
- c. Nằm ngoài các lớp phospholipid
- d. Tham gia điều khiển chức năng nội bào

Câu 118: Các chức năng sau đây của glucid màng , ngoại trừ :

- a. Làm các tế bào dính vào nhau
- b. Có hoạt tính men
- c. Là receptor
- d. Tham gia phản ứng miễn dịch

Câu 119: Câu nào **sai** khi nói về đặc điểm của các thành phần cấu trúc màng tế bào?

- a. thành phần chủ yếu của màng là protein và lipid
- b. hai đầu kỵ nước của lớp lipid kép nằm quay vào trong, ở giữa hai lớp lipid màng
- c. thành phần lipid màng tế bào gồm có phospholipid, cholesterol và glycolipid
- d. màng tế bào được cấu tạo bởi một lớp phân tử phospholipid

Câu 120: Câu nào sau đây **SAI** về thành phần cấu tạo của màng tế bào?

- a. Nước là thành phần của dịch tế bào, chiếm 70 – 85%
- b. Có các chất điện giải như Na^+ , K^+ , Ca^{++} ,...
- c. Carbohydrate đóng vai trò chính về dinh dưỡng tế bào và chức năng cấu trúc
- d. Protein chiếm 10 – 20% khối tế bào

Câu 121: Màng tế bào có tính thấm cao nhất đối với ion

- a. Na
- b. Ca
- c. Kali

d. Fe

Nội dung 2. Vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào

Câu 122: Vận chuyển chọn lọc qua màng tế bào gồm những hình thức nào sau đây?

- a. Khuếch tán đơn giản
- b. Thẩm thấu
- c. Siêu lọc
- d. **Cả ba đều đúng**

Câu 123: Vận chuyển thụ động qua màng tế bào :

- a. Do chênh lệch gradient từ thấp đến cao
- b. **Hầu hết không cần chuyên chở**
- c. Cần năng lượng dạng ATP
- d. Tạo chênh lệch bậc thang càng nhiều hơn

Câu 124: Hình thức vận chuyển thụ động có đặc điểm sau:

- a. Không theo hướng gradient
- b. Không theo thể thức bậc thang
- c. Cần năng lượng
- d. **Gồm 4 hình thức: khuếch tán, thẩm thấu, điện thẩm và siêu lọc**

Câu 125: Các con đường khuếch tán qua màng sinh chất là:

- a. Khuếch tán qua kênh prôtêin mang tính chọn lọc
- b. Khuếch tán qua lỗ màng kênh prôtêin không mang tính chọn lọc
- c. Khuếch tán qua lỗ màng mang tính chọn lọc
- d. **Khuếch tán qua lỗ màng không mang tính chọn lọc**

Câu 126: Trong khuếch tán đơn giản , tương quan giữa tốc độ khuếch tán và chênh lệch nồng độ chất khuếch tán có dạng :

- a. **Tuyến tính**
- b. Sigma
- c. Sin
- d. Đường cong tiệm cận ngang

Câu 127: **Tốc độ khuếch tán** chất qua màng tế bào

- a. Tỷ lệ nghịch với độ hòa tan trong Lipid
- b. Tỷ lệ thuận với trọng lượng phân tử
- c. **Tỷ lệ thuận với nhiệt độ**
- d. Tỷ lệ thuận với độ dày của màng

Câu 128: Tốc độ khuếch tán của một vật thể qua màng sẽ **gia tăng** nếu:

- a. Giảm diện tích bề mặt của màng
- b. Tăng độ dày của màng
- c. Tăng kích thước của vật thể
- d. **Tăng khả năng tan trong lipid của vật thể**

Câu 129: **Hệ số thẩm** của màng tế bào:

- a. **Tỷ lệ nghịch với độ dày của màng**
- b. Tỷ lệ thuận với trọng lượng phân tử chất thẩm
- c. Tỷ lệ nghịch với nhiệt độ
- d. Tỷ lệ nghịch với độ hòa tan của chất thẩm trong lipid

Câu 130: **Tốc độ khuếch tán** qua màng tế bào **không phụ thuộc vào:**

- a. Bản chất của chất khuếch tán.
- b. **Độ ẩm**
- c. Trạng thái của màng
- d. Nhiệt độ

Câu 131: Các yếu tố sau đây ảnh hưởng đến **mức độ khuếch tán**, ngoại trừ:

- a. Tác dụng về bậc thang điện tích
- b. **Tác dụng về bậc thang năng lượng**
- c. Tác dụng về bậc thang áp suất
- d. Tác dụng về bậc thang nồng độ

Câu 132: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng lên sự khuếch tán, **NGOẠI TRỪ**:

- a. Tốc độ khuếch tán tỷ lệ nghịch với độ dày của màng tế bào
- b. **Nhiệt độ tỷ lệ nghịch với tốc độ khuếch tán**
- c. Sự chênh lệch nồng độ hai bên màng tế bào càng cao làm cho sự khuếch tán càng nhanh
- d. Quá trình khuếch tán phụ thuộc khuynh hướng gradien nồng độ

Câu 133: Các chất sau đây khuếch tán được qua lớp lipid kép màng tế bào, **NGOẠI TRỪ** :

- a. Khí CO₂ và O₂
- b. Nước
- c. **Các ion**
- d. Vitamin A, D, E, K

Câu 134: Hiện tượng thẩm thấu

- a. Dung môi từ ngăn có ASTT cao qua màng bán thấm đến ngăn có ASTT thấp hơn
- b. Glucose thẩm thấu chậm hơn Na⁺
- c. **ASTT luôn tỉ lệ thuận với nồng độ thẩm thấu**
- d. Thẩm thấu ngừng khi đạt trạng thái cân bằng động 2 bên màng

Câu 135: Áp suất thẩm thấu có tác dụng nào sau đây?

- a. Chuyển dung môi qua màng bán thấm tới vùng có áp suất thủy tĩnh thấp
- b. Chuyển dung môi qua màng từ vùng có nồng độ chất hòa tan từ cao đến thấp
- c. **Chuyển dung môi qua màng từ vùng có nồng độ chất hòa tan từ thấp đến cao**
- d. Chuyển chất hòa tan qua màng bán thấm từ vùng có nồng độ cao đến thấp

Câu 136: Khuếch tán của nước trong màng tế bào

- a. Chỉ qua kênh protein, không qua lớp Lipid kép vì không tan trong Lipid
- b. Chỉ qua lớp Lipid kép, không qua kênh Protein vì kích thước quá nhỏ
- c. **Qua kênh protein và lớp lipid kép vì nước có kích thước nhỏ và động năng lớn**
- d. Được khuếch tán có gia tốc nhờ chất mang

Câu 137: Màng tế bào có tính thấm cao đối với nước vì lý do nào sau đây ?

- a. Nước hòa tan trong lớp lipid của màng
- b. Nước vận chuyển qua màng bằng cơ chế khuếch tán hỗ trợ
- c. **Nước là một phân tử nhỏ, nó được khuếch tán đơn thuần qua các kênh protein màng**
- d. Nước được vận chuyển tích cực qua màng

Câu 138: Điều nào dưới đây là **không đúng** khi mô tả dòng chảy của nước dưới tác dụng của gradient áp lực thẩm thấu:

- a. Có dòng chảy của nước từ nơi có áp lực thẩm thấu thấp tới nơi có áp lực thẩm thấu cao.
- b. Tốc độ dòng chảy của nước gia tăng khi tính thấm đối với nước của màng tăng.
- c. Có dòng chảy của nước từ nơi có nồng độ chất hòa tan thấp tới nơi có nồng độ chất hòa tan cao.
- d. **Đòi hỏi cung cấp năng lượng cho dòng chảy của nước qua màng.**

Câu 139: Khuếch tán được gia tốc

- a. Cần chất mang
- b. Không cần ATP
- c. **Tốc độ vận chuyển có giá trị cực đại**

d. Tất cả đúng

Câu 140: Khuếch tán đơn thuần và khuếch được hỗ trợ giống nhau ở

- a. Cần chất mang
- b. Đi ngược bậc thang nồng độ
- c. Mức khuếch tán tăng lên một cách cân xứng với nồng độ chất khuếch tán
- d. Hoạt động không cần dạng năng lượng ATP

Câu 141: Sự khuếch tán đơn thuần và vận chuyển trung gian (Facilitated) giống nhau ở điểm nào sau đây

- a. Cần chất chuyên chở
- b. Đi ngược chiều gradient nồng độ
- c. Có thể hoạt động không cần ATP
- d. Có thể bị ức chế bởi chất ức chế chuyên biệt.

Câu 142: Chất khuếch tán có gia tốc :

- a. Vitamin A, D, E, K
- b. Nước
- c. NH_3
- d. Glucose

Câu 143: Chất nào sau đây vận chuyển qua màng tế bào bằng hình thức khuếch tán có gia tốc ?

- a. CO_2
- b. NH_3
- c. nước
- d. Acid amin

Câu 144: Chất nào sau đây được vận chuyển qua màng tế bào bằng hình thức khuếch tán gia tốc?

- a. nước
- b. các đường đơn hay acid amin
- c. các ions
- d. các vitamin

Câu 145: Glucose vận chuyển qua màng tế bào theo hình thức:

- a. Vận chuyển chủ động thứ cấp
- b. Khuếch tán được gia tốc
- c. Vận chuyển tích cực qua khoảng kẽ tế bào
- d. Câu a và b đúng

Câu 146: Glucose qua bờ bàn chải của tế bào biểu mô niêm mạc ruột và ống thận theo hình thức

- a. vận chuyển tích cực thứ phát
- b. khuếch tán đơn thuần
- c. khuếch tán được tăng cường
- d. đồng vận chuyển cùng chất mang với ion Na

Câu 147: Chọn tổ hợp đúng : a. nếu 1, 2, 3 đúng b. nếu 1 và 3 đúng
c. nếu 1 và 3 đúng d. nếu 2 và 4 đúng

Khuếch tán qua màng tế bào:

- 1. Chất khuếch tán phải hòa tan trong lipid
- 2. Giảm khi độ dày của màng tăng
- 3. Giảm khi bị sốt
- 4. Khuếch tán glucose phải có chất chuyên chở

Câu 148: Yếu tố chính yếu tạo hiện tượng điện thẩm là:

- a. Bản chất của chất khuếch tán
- b. Sự chênh lệch về điện thế
- c. Đặc điểm màng tế bào

d. Nhiệt độ hai bên màng tế bào

Câu 149: Quá trình điện thẩm có các đặc điểm sau, **ngoại trừ:**

- a. Sự di chuyển của ion khi có sự chênh lệch điện thế hai bên màng
- b. Đạt trạng thái cân bằng động trước khi cân bằng điện thế
- c. Chênh lệch điện thế cân bằng với chênh lệch nồng độ ion
- d. Xác định điện thế màng tế bào bằng phương trình Nerst

Câu 150: Trạng thái **cân bằng động** là kết quả của sự khuếch tán do lúc đầu có sự chênh lệch căn bản về

- a. Nồng độ
- b. Áp suất thẩm thấu
- c. Áp suất thủy tĩnh
- d. Điện thế

Câu 151: Điện thế màng được tính bằng phương trình Nernst đạt được khi có sự cân bằng giữa 2 lực

- a. Khuếch tán và thẩm thấu
- b. Khuếch tán và điện thẩm
- c. Điện thẩm và thẩm thấu
- d. Điện thẩm và siêu lọc

Câu 152: Hiện tượng **trao đổi chất ở mao mạch** được thực hiện dựa vào nguyên lý của hiện tượng

- a. Điện thẩm
- b. Khuếch tán
- c. Thẩm thấu
- d. Siêu lọc

Câu 153: Khi nói về hiện tượng siêu lọc thì :

- a. Áp suất thủy tĩnh có tác dụng kéo các chất hòa tan
- b. Albumin máu giảm sẽ ảnh hưởng đến áp suất thủy tĩnh
- c. Áp suất keo có tác dụng kéo nước
- d. Nồng độ chất tan trực tiếp ảnh hưởng lên áp suất thủy tĩnh

Câu 154: Phù trong bệnh suy tim là do yếu tố nào sau đây?

- a. Giảm áp suất thủy tĩnh trong mô kẽ
- b. Giảm áp suất keo trong huyết tương
- c. Tăng áp suất thủy tĩnh
- d. Tăng áp suất keo trong huyết tương

Nội dung 3. Vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào

Câu 155: Vận chuyển **chủ động** qua màng tế bào :

- a. đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp
- b. không cần năng lượng dạng ATP
- c. làm thẳng bằng bậc thang nồng độ
- d. luôn cần chất chuyên chở

Câu 156: Hình thức **vận chuyển chủ động** qua màng tế bào có đặc điểm sau :

- a. Xảy ra theo hướng ngược gradient điện hóa học
- b. Hướng tới bậc thang càng hẹp hơn
- c. Không cần chất mang
- d. Không sử dụng năng lượng

Câu 157: Vận chuyển chủ động qua màng tế bào , **Chọn câu sai :**

- a. Luôn cần năng lượng và chất mang
- b. Ngược hướng Gradient
- c. Giúp chênh lệch bậc thang ngày càng rộng ra
- d. Tất cả đều sai

Câu 158: Quá trình vận chuyển thụ động khác quá trình vận chuyển chủ động ở các đặc điểm sau, **NGOẠI TRỪ:**

- a. Nguồn năng lượng từ ATP
- b. Chất mang
- c. **Kênh protein**
- d. Khuynh hướng gradien

Câu 159: Yếu tố giúp **phân loại vận chuyển chủ động** :

- a. Chất mang
- b. Hướng vận chuyển
- c. **Nguồn gốc ATP**
- d. Mức tiêu thụ ATP

Câu 160: Các cách vận chuyển Na^+ sau đây là **vận chuyển tích cực** , **ngoại trừ** :

- a. **Qua kênh Na^+**
- b. Qua bơm Na^+-K^+
- c. Đồng vận chuyển với glucose
- d. Đồng vận chuyển với acidamin

Câu 161: Hình thức vận chuyển nào dưới đây **không đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng**:

- a. **Đưa ion Natri ra khỏi các tế bào thần kinh**
- b. Chuyển các ion calci vào trong lòng lưới nội sinh chất
- c. Chuyển ion hydro vào trong lòng ống lượn xa của thận
- d. Đưa glucose vào trong các tế bào của mô mỡ

Câu 162: Vận chuyển tích cực thứ phát khác với vận chuyển tích cực nguyên phát ở:

- a. Có cơ chế hòa màng
- b. Cần protein mang
- c. Cần receptor đặc hiệu
- d. **Phụ thuộc vào thế năng của Na^+**

Câu 163: Quá trình vận chuyển **chủ động sơ cấp** giúp vận chuyển chất nào sau đây, **NGOẠI TRỪ**:

- a. Na^+
- b. Ca^{2+}
- c. **Nước**
- d. Glucose

Câu 164: **Cùng một chất mang** sẽ chuyên chở Na^+ từ ngoài vào trong tế bào theo gradient nồng độ và Ca^{++} từ trong ra ngoài tế bào ngược gradient nồng độ. Đây là

- a. Khuếch tán được gia tốc
- b. **Vận chuyển chủ động sơ cấp**
- c. Đồng vận chuyển thuận
- d. Đồng vận chuyển nghịch

Câu 165: Vận chuyển chủ động sơ cấp :

- a. Bài tiết H^+ ở dạ dày
- b. Hoán đổi với Na^+ tại ống thận
- c. Hoán đổi với Na^+ tại ống tiêu hóa
- d. **Cả a và c đúng**

Câu 166: Hoạt động nào sau đây thuộc vận chuyển **chủ động sơ cấp**?

- a. **Vận chuyển Ca^{++} qua bơm canxi.**
- b. Hoán đổi H^+ với Na^+ tại ống thận
- c. Bài tiết H^+ bởi tế bào ống thận khi cơ thể bị nhiễm toan
- d. Bài tiết H^+ tại ống tiêu hóa

Câu 167: Hoạt động nào sau đây **KHÔNG** thuộc vận chuyển **chủ động sơ cấp** ?

- a. Bơm Na^+ , K^+ , ATPase
- b. Vận chuyển H^+ vào dạ dày
- c. Vận chuyển Ca^{++} vào tế bào
- d. **Vận chuyển H^+ vào lòng ống thận khi cơ thể nhiễm toan**

Câu 168: Khác nhau giữa **khuếch tán được gia tốc** và vận chuyển **chủ động thứ cấp**?

- a. Cần chất mang
- b. Chất vận chuyển có thể là glucose hay acid amin
- c. **Tốc độ vận chuyển có giá trị cực đại**
- d. Vận chuyển chất tại màng tế bào về phía lòng ống

Câu 169: Vai trò của **bơm $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPase}$** :

- a. **là nguyên nhân chính tạo điện tích âm bên trong màng**
- b. làm cho các điện tích âm bên trong ít hơn bên ngoài màng
- c. góp phần tạo giai đoạn tái cực khi màng bị kích thích
- d. góp phần tạo giai đoạn khử cực khi màng bị kích thích

Câu 170: Bơm $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPase}$ có chức năng sau:

- a. **Bơm có vai trò duy trì nồng độ Na^+ và K^+ khác nhau hai bên màng**
- b. Không tham gia điều hòa thể tích tế bào
- c. Không tạo ra điện thế màng
- d. Tất cả đều đúng

Câu 171: Chức năng của **bơm $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPase}$** : **CHỌN CÂU SAI**

- a. Giữ vững thể tích của thể bào
- b. Là bơm điện thế.
- c. **Duy trì điện thế âm mặt ngoài và dương mặt trong màng tế bào.**
- d. Góp phần tạo tính phân cực màng

Câu 172: Bơm $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPase}$ hoạt động khi:

- a. 3 ion K^+ gắn ở mặt trong và 2 ion Na^+ gắn ở mặt ngoài protein mang
- b. 3 ion Na^+ gắn ở mặt trong và 2 ion K^+ gắn ở mặt ngoài protein mang
- c. enzyme ATPase được hoạt hóa
- d. **câu B, C đúng**

Câu 173: Bơm $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPase}$ hoạt động sẽ bơm :

- a. 2Na^+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào
- b. **3Na^+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào**
- c. 2Na^+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào
- d. 3Na^+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào

Câu 174: Bơm $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPase}$ có tác dụng nào sau đây, **NGOẠI TRỪ**:

- a. Giúp 2K^+ từ ngoài vào trong tế bào và 3 Na^+ từ trong ra ngoài
- b. **Giúp duy trì nồng độ Na^+ và K^+ khác nhau hai bên màng $[\text{Na}_o^+] < [\text{Na}_i^+]$, $[\text{K}_o^+] > [\text{K}_i^+]$**
- c. Giúp điều hòa thể tích tế bào
- d. Tạo ra điện thế điện thế màng tế bào

Câu 175: Bơm $\text{Ca}^{2+} \text{ATPase}$ hoạt động theo hình thức:

- a. **vận chuyển tích cực sơ cấp**
- b. vận chuyển tích cực thứ cấp
- c. khuếch tán đơn giản
- d. khuếch tán có gia tốc

Câu 176: Sử dụng Oresol (nước biển khô) trong tiêu chảy dựa trên cơ sở hoạt động sinh nào :

- a. Bơm $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPase}$
- b. **Đồng vận chuyển nghịch Na^+/H^+**

- c. Đồng vận chuyển thuận Na^+ /Glucose hoặc Amino acid
- d. Đồng vận chuyển nghịch Na^+ / HCO_3^-

Câu 177: Bù nước và điện giải qua đường uống trong tiêu chảy nhờ hoạt động nào sau đây tại ruột?

- a. Kích thích bởi Acetylcholin
- b. Kích thích bởi 1,25 – dihydroxy
- c. Đồng vận chuyển thuận Na^+ /Glucose hoặc Amino acid trên bờ vi nhung mao ruột
- d. Vận chuyển chủ động nguyên phát Na^+ , K^+ , ATPase

Câu 178: Bệnh nhân sốt xuất huyết, dịch thoát ra khỏi lòng mạch gây trụy mạch. Người ta dùng dung dịch cao phân tử để kéo nước trở lại vào mạch máu nhờ vào hiện tượng:

- a. thẩm thấu
- b. điện thẩm
- c. vận chuyển tích cực nguyên phát
- d. vận chuyển tích cực thứ phát

Nội dung 4. Vận chuyển các chất bằng cơ chế hòa màng

Câu 179: Nhờ cơ chế “ Hòa màng ” tế bào có thể thực hiện được các hoạt động sau, ngoại trừ :

- a. Tiêu hóa
- b. Tạo chuyển động dạng amib
- c. Bài tiết
- d. Vận chuyển chọn lọc các chất qua màng tế bào

Câu 180: Trong quá trình tiêu hóa của tế bào :

- a. Hiện tượng nhập bào tạo không bào
- b. Các enzym của ty thể thủy phân các chất nhập bào
- c. Các thể cận được bài tiết ra ngoài bằng hiện tượng xuất bào
- d. Không bào hòa màng với tiêu thể tạo túi thực bào

Câu 181: Hiện tượng thực bào:

- a. Xảy ra ở phần lớn các tế bào trong cơ thể
- b. Khởi đầu quá trình tiêu hóa của tế bào
- c. Nhập bào các chất hòa tan
- d. Không cần ATP

Câu 182: Sự ẩm bào là hiện tượng

- a. Màng tế bào hấp thụ các chất lỏng
- b. Các chất lỏng không lọt qua các lỗ màng, khi tiếp xúc với màng sinh chất, màng tạo nên bóng bao bọc lại
- c. Các chất lỏng bị tế bào hút vào ngược chiều gradien nồng độ
- d. Cả 3 câu đều đúng

Câu 183: Chất được tế bào nuốt theo hình thức ẩm bào:

- a. vi khuẩn
- b. xác hồng cầu
- c. tế bào lạ
- d. dịch ngoại bào

Câu 184: Sự tạo thành túi tiêu hóa là một giai đoạn của quá trình:

- a. thực bào
- b. ẩm bào
- c. nhập bào qua receptor
- d. xuất bào

Câu 185: Ví dụ điển hình về hiện tượng xuất bào:

- a. hoạt hóa các thành phần phospholipid của màng tế bào

- b. đưa glucose và các acid amin từ trong tế bào biểu mô niêm mạc ruột vào máu
- c. đưa các sản phẩm có tính kháng nguyên lên bề mặt tế bào bạch cầu mono
- d. giải phóng các bọc chứa hormone, protein

CHUYÊN ĐỀ 1 – ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH LÝ HỌC

Bài số 4

SINH LÝ VỀ ĐIỆN THẾ MÀNG TẾ BÀO

Nội dung 1. Điện thế nghỉ của màng tế bào

Câu 186: Màng tế bào ở trạng thái nghỉ chủ yếu cho ion nào thẩm ra?

- a. K^+
- b. Na^+
- c. Cl^-
- d. Ca^{++}

Câu 187: Ion dương có nồng độ bên ngoài cao hơn bên trong tế bào là:

- a. K^+
- b. H^+
- c. Fe^{++}
- d. Na^+

Câu 188: Phương trình Nerst hay được dùng để tính :

- a. Điện thế màng.
- b. Áp suất thẩm thấu của màng.
- c. Ngưỡng điện thế.
- d. Điện thế khuếch tán của Na^+ và K^+ .

Câu 189: Điện thế nghỉ của tế bào :

- a. Chủ yếu do ion K^+ tạo ra
- b. Lan truyền tạo dòng điện sinh học
- c. Có trị số -90 đến -100mV
- d. Chuyển sang điện thế hoạt động khi bơm $Na^+-K^+-ATPase$ hoạt động

Câu 190: Nguồn gốc của điện thế nghỉ tế bào có từ những quá trình nào sau đây, NGOẠI TRỪ:

- a. Sự khuếch tán K^+
- b. Sự khuếch tán Na^+
- c. Hoạt động của bơm $Na^+ K^+ ATPase$
- d. Hoạt động của bơm $H^+ K^+ ATPase$

Câu 191: Vì sao ở trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện dương?

- a. Do Na^+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng
- b. Do K^+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng tạo ra nồng độ của nó cao hơn ở phía mặt trong của màng
- c. Do K^+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng tạo cho ở phía mặt trong của màng mang điện tích âm
- d. Do K^+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng

Câu 192: Tế bào ở trạng thái nghỉ

- a. Mặt trong tế bào tích điện âm, mặt ngoài tế bào tích điện dương
- b. Dòng điện sinh học chuyển từ âm sang dương
- c. Na^+ vào tế bào
- d. Tất cả đúng

Nội dung 2. Điện thế hoạt động của màng tế bào

Câu 193: Điện thế hoạt động của tế bào

- a. Khuếch tán K^+
- b. Khi kênh mở, Na^+ di chuyển ồ ạt vào trong tế bào
- c. Khuếch tán Na^+
- d. Hoạt động $Na^+K^+-ATPase$

Câu 194: Điện thế hoạt động

- a. giai đoạn khử cực Na^+ di chuyển ồ ạt vào trong tế bào
- b. có hiện tượng cơ cơ ngay tại giai đoạn khử cực
- c. màng tế bào ở trạng thái phân cực
- d. điện thế lúc này thường $-70mV$

Câu 195: Nhận xét **không đúng** về điện thế hoạt động :

- a. chỉ một lượng nhỏ Na^+ và K^+ khuếch tán qua màng
- b. có cả hiện tượng feedback dương và feedback âm
- c. bơm Na^+/K^+ trực tiếp liên quan đến việc tạo ra điện thế hoạt động
- d. trong giai đoạn điện thế hoạt động, tổng nồng độ ion Na^+ và K^+ thay đổi không đáng kể

Câu 196: Các yếu tố tham gia tạo điện thế hoạt động, **ngoại trừ**:

- a. mở kênh Natri
- b. mở kênh Kali
- c. Mở kênh calci-natri
- d. hoạt động của bơm $Na-K-ATPase$

Câu 197: Trong quá trình hình thành điện thế hoạt động ở màng tế bào, Na^+ di chuyển ồ ạt trong tế bào bằng cơ chế

- a. Khuếch tán đơn thuần
- b. Khuếch tán có gia tốc
- c. Vận chuyển chủ động sơ cấp
- d. Vận chuyển chủ động thứ cấp

Câu 198: Sắp xếp các hiện tượng:

1. bắt đầu khử cực màng
2. cổng K^+ bắt đầu mở
3. cổng K^+ bắt đầu đóng
4. cổng Na^+ bắt đầu mở
5. cổng Na^+ bắt đầu đóng
6. tái cực màng

- a. 1, 2, 4, 3, 5, 6
- b. 2, 6, 3, 4, 1, 5
- c. 4, 6, 2, 1, 5, 3
- d. 1, 4, 2, 5, 6, 3

Câu 199: Trong quá trình hình thành điện thế hoạt động ở màng tế bào, Na^+ di chuyển ồ ạt vào trong tế bào gây hiện tượng :

- a. Phân cực
- b. Khử cực
- c. Tái cực
- d. Cả ba sai

Câu 200: Tính thấm của natri tăng trong giai đoạn:

- a. khử cực
- b. ưu phân cực
- c. tái cực
- d. trong giai đoạn tăng nhanh của điện thế hoạt động

Câu 201: Tính thấm của màng với ion kali lớn nhất khi:


- a. trong khi khử cực
- b. trong giai đoạn tăng nhanh của điện thế hoạt động
- c. trong khi ưu phân cực

d. trong khi tái cực

Câu 202: Giai đoạn khử cực của điện thế hoạt động, chọn câu sai :

- a. Na^+ ồ ạt vào trong màng
- b. Kênh K^+ chưa kịp mở
- c. Bên trong màng trở thành (+) so với mặt ngoài
- d. Tất cả đều sai

Cho hình minh họa điện thế hoạt động:



Câu 203: Giai đoạn khử cực là giai đoạn;

Thời gian (ms)

- a. E
- b. B
- c. D
- d. C

Câu 204: Giai đoạn phân cực là giai đoạn:

- a. A
- b. B
- c. C
- d. D

Câu 205: Giai đoạn tái hồi cực là giai đoạn:

- a. B
- b. C
- c. D
- d. E

Câu 206: Giai đoạn ưu phân cực là giai đoạn:

- a. A
- b. B
- c. D
- d. E

Câu 207: Cổng hoạt hóa của kênh Na^+

- a. Mở khi mặt trong màng mất điện tích (+)
- b. Mở khi mặt trong màng tích điện tích (-) mạnh
- c. Đóng khi mặt trong màng mất điện tích (-)
- d. Đóng khi mặt trong màng mất điện tích (+)

Câu 208: Đặc tính của kênh K^+

- a. Mở trong suốt quá trình điện thế hoạt động
- b. Chỉ có một cổng hoạt hóa đóng mở ở bên trong màng

- c. Góp phần trong giai đoạn khử cực
- d. Góp phần duy trì điện thế nghỉ

CHUYÊN ĐỀ 2 – SINH LÝ THỂ DỊCH – NỘI TIẾT

Bài số 5

SINH LÝ CÁC DỊCH CƠ THỂ

Nội dung 1. Cân bằng xuất nhập nước và hằng tính nội môi

Câu 209: Trung bình lượng nước nhập xuất hằng ngày :

- a. 1300 ml
- b. 2300 ml
- c. 3100 ml
- d. 3200 ml

Câu 210: Hệ thống tham gia tiếp nhận chất dinh dưỡng bao gồm:

- a. Hệ hô hấp, tiêu hóa
- b. Tim và mạch máu
- c. Dịch ngoại bào
- d. Hệ hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, da

Câu 211: Hệ thống vận chuyển tham gia điều hòa hằng tính nội môi

- a. Hô hấp, tiêu hóa, niệu, da
- b. Tim mạch
- c. Hô hấp, tiêu hóa – gan
- d. Tim mạch, dịch ngoại bào

Câu 212: Hệ thống bài tiết các sản phẩm chuyển hóa, tham gia điều hòa hằng tính nội môi . Gồm :

- a. Hệ hô hấp, hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa, dạ dày
- b. Hệ hô hấp, tim, hệ mạch, hệ tiêu hóa
- c. Hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ da, hệ niệu
- d. Hệ hô hấp, hệ tim mạch, hệ tiêu hóa , gan

Nội dung 2. Các thành phần dịch trong cơ thể

A. Thể tích dịch – nồng độ thẩm thấu và một số chất thành phần trong dịch nội bào

Câu 213: Dịch tạo nên môi trường bên trong cơ thể là

- a. Dịch nội bào
- b. Dịch ngoại bào
- c. Huyết tương
- d. Dịch kẽ

Câu 214: Dịch của cơ thể chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm tổng trọng lượng cơ thể ?

- a. 20%
- b. 40%
- c. 60%
- d. 80%

Câu 215: Một người trưởng thành nặng 60kg, thể tích ICF :

- a. 20 lít
- b. 24 lít
- c. 36 lít
- d. 12 lít

Câu 216: Một người trưởng thành nặng 60kg, thể tích ECF:

- a. 20 lít
- b. 24 lít
- c. 36 lít

d. 12 lít

Câu 217: Một người trưởng thành nặng 60kg, thể tích huyết tương

- a. 6 lít
- b. 12 lít
- c. 3 lít
- d. 8 lít

Câu 218: Một người nặng 60kg, thể tích dịch kẽ:

- a. 9 lít
- b. 12 lít
- c. 8 lít
- d. 3 lít

Câu 219: Nồng độ thẩm thấu của dịch cơ thể người bình thường nặng 60kg là:

- a. 255 mosmol/l
- b. 265 mosmol/l
- c. 275 mosmol/l
- d. 285 mosmol/l

Câu 220: Nồng độ thẩm thấu của ICF bình thường nặng 60kg là:

- a. 2850 mosmol/l
- b. 5700 mosmol/l
- c. 6840 mosmol/l
- d. 3420 mosmol/l

Câu 221: Nồng độ thẩm thấu của ECF bình thường nặng 60kg là:

- a. 2850 mosmol/l
- b. 5700 mosmol/l
- c. 6840 mosmol/l
- d. 3420 mosmol/l

Câu 222: Tính **thẩm thấu** của dịch cơ thể được **quyết định** bởi:

- a. Các khí trong dịch
- b. Protein huyết tương
- c. Nước
- d. Các chất điện giải

Câu 223: Dịch và thành phần dịch trong ngăn cơ thể :

- a. Về mặt khối lượng, chất điện giải chiếm ưu thế trong huyết tương
- b. Do chiếm ưu thế nên chất điện giải quyết định tính thẩm thấu của dịch cơ thể
- c. Protein trong huyết tương tạo một phần áp suất thẩm thấu của dịch cơ thể, nhưng quyết định sự phân phối nước trong cơ thể
- d. Tất cả đều sai

Câu 224: Dịch và thành phần trong ngăn dịch của cơ thể

- a. Về mặt khối lượng , chất điện giải chiếm ưu thế trong huyết tương
- b. Dịch nội bào chiếm 1/3 lượng dịch cơ thể
- c. Dịch nội bào chứa nhiều oxy, glucose, các amino acid , Mg^{++} , K^{+}
- d. Ion Na^{+} chiếm ưu thế ở ngăn ngoại bào

Câu 225: Chọn câu **SAI**

- a. Dịch chứa chất dinh dưỡng, chất khí là dịch ngoại bào
- b. Dịch ngoại bào chứa 1/3 lượng dịch của cơ thể
- c. Dịch nội bào chủ yếu chứa ion Na^{+}
- d. Hầu hết dịch của cơ thể ở bên trong tế bào

Câu 226: Tỷ lệ và thành phần ưu thế của dịch nội bào :

- a. Chiếm 56% tổng lượng dịch, nhiều K^+ , Mg^{++}
- b. Chiếm 1/3 lượng dịch, nhiều Na^+ , Cl^-
- c. Chiếm 2/3 lượng dịch, nhiều K^+ , Mg^{++}
- d. Chiếm 1/3 lượng dịch, nhiều Na^+ , Cl^-

Câu 227: Cân bằng áp suất thẩm thấu trong cơ thể:

- a. Kiểm soát cân bằng Na^+ là cơ chế chính
- b. Qua cơ chế ADH tham gia điều hòa
- c. ANP tham gia điều hòa
- d. Tất cả đều đúng

B. Đặc trưng của các khoang dịch trong cơ thể

Câu 228: Huyết tương có chức năng sau, ngoại trừ:

- a. Vận chuyển chất dinh dưỡng
- b. Bảo vệ cơ thể
- c. Thăng bằng toan kiềm
- d. Dự trữ glucid cho cơ thể

Câu 229: Thành phần protein huyết tương, ngoại trừ:

- a. Albumin
- b. Globulin
- c. Fibrinogen
- d. Phospholipid

Câu 230: Áp suất keo của huyết tương:

- a. 26 mmHg
- b. 28 mmHg
- c. 30 mmHg
- d. 32 mmHg

Câu 231: Dịch kẽ:

- a. Có chức năng cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng cho tế bào
- b. Nhận từ các tế bào CO_2 và các sản phẩm chuyển hóa để chuyển thải ra ngoài
- c. Chiếm khoảng 15% tổng trọng lượng cơ thể
- d. Tất cả đúng

Câu 232: Dịch trong lòng mao mạch vào khoảng kẽ tăng lên là do:

- a. Giảm áp suất máu động mạch
- b. Giảm áp suất máu tĩnh mạch
- c. Tăng áp suất keo dịch kẽ
- d. Tăng chênh lệch áp suất thủy tĩnh và áp suất keo trong mao mạch

Câu 233: Chức năng của hệ thống bạch huyết. Chọn câu sai

- a. Vận chuyển mỡ được hấp thụ vào tuần hoàn máu
- b. Là con đường bạch cầu lympho tái tuần hoàn máu
- c. Vận chuyển một lượng protein và dịch từ dịch kẽ trở lại hệ thống tuần hoàn
- d. Tham gia điều hòa thể tích và áp suất máu

Câu 234: Dịch bạch huyết: CHỌN CÂU SAI:

- a. Là đường chủ yếu để vận chuyển lipid được hấp thụ từ ống tiêu hóa vào cơ thể
- b. Là đường các bạch cầu lympho tái tuần hoàn
- c. Đóng vai trò quan trọng làm ổn định nồng độ protein trong cơ thể
- d. Vận chuyển một lượng protein và dịch từ dịch kẽ về hệ thống tuần hoàn

Câu 235: Dịch não tủy, CHỌN CÂU SAI:

- a. Hàng rào máu – não là nơi trực tiếp thực hiện chức năng dinh dưỡng các mạch não

- b. Hàng rào máu – dịch não tủy là nơi tiết ra dịch não tủy
- c. Mỗi ngày có khoảng 500ml dịch não tủy được tiết ra
- d. Các tế bào nội mô mao mạch não đứng cách nhau tạo thành các lỗ lọc

Câu 236: Đặc điểm các khoang dịch thuộc ngăn ngoại bào :

- a. Protein trong dịch kẽ thấp hơn trong huyết tương
- b. Protein trong huyết tương tạo ra được áp lực keo kéo dịch vào lòng mạch
- c. Hệ bạch huyết giúp kiểm soát nồng độ Protein trong dịch kẽ , thể tích và áp suất dịch kẽ
- d. Tất cả đều đúng

Nội dung 3: Các cơ chế điều hòa dịch cơ thể

A. Điều hòa thể tích dịch

Câu 237: Cân bằng thể tích dịch ngoại bào trong cơ thể :

- a. Vai trò của Renin
- b. Qua cơ chế khát
- c. ADH tham gia điều hòa
- d. Kiểm soát cân bằng Na^+ là cơ chế chính

Câu 238: Điều hòa thể tích ngăn ngoại bào. CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

- a. Kiểm soát sự cân bằng Na^+
- b. Chủ yếu qua ANP hệ thống renin – Angiotensin
- c. Chủ yếu qua cơ chế khát và ADH
- d. Tăng tái hấp thu Na^+ ở ống thận

Câu 239: Một người bình thường sau khi uống 1000ml NaCl 0,9% , kết quả :

- a. Thể tích nước tiểu tăng
- b. Áp suất thẩm thấu của nước tiểu tăng
- c. Áp suất thẩm thấu của huyết tương tăng
- d. Tăng bài tiết ADH

Câu 240: Vùng dưới đồi bài tiết ADH do các nguyên nhân sau đây kích thích , NGOẠI TRỪ :

- a. mất nước do nôn ói
- b. chảy máu nặng
- c. giảm áp suất thẩm thấu của máu
- d. tiêu chảy

Câu 241: Yếu tố gây tăng bài tiết Renin của tổ chức cận cầu thận

- a. Tăng áp suất thẩm thấu dịch ngoại bào
- b. Uống quá nhiều nước
- c. Dẫn động mạch vào cầu thận
- d. Giảm thể tích dịch ngoại bào

Câu 242: Hệ thống Renin – Angiotensin

- a. Khởi động khi tăng thể tích dịch ngoại bào
- b. Thông qua Angiotensin II gây giãn mạch mạnh
- c. Thông qua Angiotensin II làm tăng ADH và Aldosteron
- d. Thông qua Angiotensin II ức chế gây cơ chế khát

Câu 243: Hệ thống Renin – Angiotensin có tác dụng :

- a. giãn mạch
- b. giảm lượng nước nhập vào
- c. Tăng hấp thụ muối và nước
- d. Tất cả đều đúng

Câu 244: Angiotensin II có tác dụng, ngoại trừ :

- a. Gây co tiểu động mạch mạnh

- b. Kích thích lớp vỏ thượng thận bài tiết Aldosteron
c. Kích thích bài tiết Acetylcholin
d. Kích thích bài tiết ADH

Câu 245: Men chuyển có tác dụng :

- Tạo Angiotensin II từ Angiotensin I
- Ức chế tiết Aldosteron
- Ức chế tiết ADH
- Giãn mạch

Câu 246: Chọn tập hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng
c. Nếu 2 và 4 đúng d. Nếu chỉ 4 đúng

Thuốc ức chế men chuyển có tác dụng:

1. Giảm tiết Aldosteron
2. Giảm tiết ADH
3. Giãn mạch
4. Giảm lượng nước tiểu bài xuất

Câu 247: ANP có tác dụng

- a. co mạch
b. giãn mạch
c. Tăng hấp thụ muối nước
d. Tất cả đều sai

Câu 248: ANP (Atrial Natriuretic peptid):

- a. Được tăng tiết khi giảm thể tích dịch ngoại bào
b. Làm tăng mức lọc ở cầu thận
c. Làm tăng ức chế bài tiết ADH và Aldosteron
d. Tất cả đúng

Câu 249: ANP trong điều hòa thể tích dịch ngoại bào

- a. Được tăng tiết khi tăng thể tích dịch ngoại bào
b. Gây giãn mạch mạnh
c. ức chế bài tiết Aldosteron từ võ thượng thận
d. Làm giảm tái hấp thụ Na^+ và nước ở ống thận

Câu 250: ANP, CHỌN CÂU SAI :

- a. Tăng lên khi tăng thể tích dịch ngoại bào
b. Làm tăng GFR
c. Làm ức chế bài tiết ADH và Aldosteron
d. **Tất cả sai**

Câu 251: Đáp ứng với ANP khi tăng thể tích dịch ngoại bào :

- a. Thân sẽ tăng độ lọc cầu thận và bài tiết Na^+ , nước
b. Võ thượng thận giảm tiết Aldoseron
c. Hậu yên giảm tiết ADH
d. **Tất cả các ý trên**

Câu 252: Chọn tập hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng
c. Nếu 2 và 4 đúng d. Nếu chỉ 4 đúng

Đáp ứng của thận khi tăng ANP:

1. Thận tăng lọc và bài tiết muối nước
2. Kích thích tăng tiết Aldosteron
3. **Ức chế ADH**
4. Thận giảm bài tiết muối nước

- d. Thuốc ức chế tái hấp thu Na^+ ở đỉnh quai Henle

C. Điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể

Câu 262: Yếu tố tham gia điều hòa chất khí trong dịch cơ thể :

- các thụ cảm quan ngoại vi và trung ương
- tác động thông qua ion H^+
- làm thay đổi hoạt động thông khí ở phổi
- tất cả đều đúng**

Câu 263: Chọn tập hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng
c. Nếu 2 và 4 đúng d. Nếu chỉ 4 đúng

Khi bệnh nhân ăn nhạt liên tục trong nhiều tháng, kết quả là:

1. Ống lượn gần vẫn tái hấp thu lượng Na^+ được lọc
2. K^+ máu tăng
3. Ống lượn xa và ống góp tăng tái hấp thu Na^+
4. Bệnh nhân bị nhiễm toan

CHUYÊN ĐỀ 2 – SINH LÝ THỂ DỊCH – NỘI TIẾT

Bài số 6

ĐẠI CƯƠNG VỀ HOẠT CHẤT SINH HỌC

Nội dung 1. Các khái niệm cơ bản về hoạt chất sinh học – receptor – tuyến nội tiết – hệ thống nội tiết – các ligand, agonist, antagonist, ái lực và hiệu lực

Câu 264: Hormon bao gồm những khái niệm sau , **Ngoại trừ :**

- a. Là một chất trung gian hóa học do tuyến nội tiết bài tiết , được phân phối bởi dòng máu
- b. Là một chất trung gian hóa học do bất cứ một cơ quan nào tiết ra, được phân phối bởi dòng máu
- c. Là một chất trung gian hóa học do các tế bào tiết ra , được phân phối bởi dịch gian bào
- d. Là một chất trung gian hóa học do các cơ quan bài tiết ra , được phân phối bởi 1 đường ống

Câu 265: Điểm giống nhau giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết:

- a. Có cấu trúc nang
- b. Hormone sinh ra tiết thẳng vào máu
- c. Có ống dẫn hormone
- d. **Cấu tạo từ các tế bào tuyến**

Câu 266: Điểm khác biệt cơ bản trong quan điểm về *cũ* và *mới* về hoạt chất sinh học là:

- a. **Nguồn gốc**
- b. Bản chất
- c. Đích tác động
- d. Phương tiện di chuyển

Câu 267: Tính chất nào sau đây **không đúng** với quan niệm mới về hoạt chất sinh học?

- a. **Do tuyến nội tiết bài tiết**
- b. Phân phối bởi dòng máu
- c. Tác dụng sinh học trên mô dịch
- d. Là chất trung gian hóa học

Câu 268: Đặc điểm của hormone địa phương, **ngoại trừ:**

- a. **Sau khi tạo ra lưu thông trong máu**
- b. Tác dụng sinh học trên mô đích lân cận hoặc chính nó
- c. Bản chất là chất trung gian hóa học
- d. Do một nhóm tế bào tiết ra có thể thuộc tuyến nội tiết hoặc không

Câu 269: Hormone mà tất cả các tế bào trong cơ thể là mô đích:

- a. **T3-T4**
- b. GH
- c. Somastostatin
- d. ACTH

Câu 270: Các hormone sau có mô đích là tất cả hoặc hầu như tất cả tế bào trong cơ thể:

- a. **GH và T3-T4**
- b. TSH và ACTH
- c. ADH và oxytocin
- d. Calcitonin và PTH

Câu 271: Receptor, **chọn phát biểu sai:**

- a. Bản chất là protein
- b. Số lượng thay đổi theo thời điểm
- c. Có tính đặc hiệu chuyên biệt với từng hormone trừ T3-T4 và somatomedin
- d. **Không liên quan đến đáp ứng sinh lý**

Câu 272: Vị trí của receptor trên tế bào:

- a. Trong nhân
- b. Trong bào tương
- c. Trên màng tế bào
- d. Một trong ba vị trí trên

Câu 273: Câu nào sau đây **không đúng**

- a. Hormon thường gắn với thụ thể ở tế bào đích
- b. Mỗi thụ thể thường gắn với nhiều hormon
- c. Thụ thể có thể nằm ở trên , trong màng tế bào hoặc trong nhân
- d. Thụ thể đặc hiệu cho mỗi loại hormon

Nội dung 2. Phân loại và tính chất các loại hormone

Câu 274: Hormone tan trong nước có đặc điểm, ngoại trừ:

- a. Receptor trên màng
- b. Di chuyển tự do trong máu
- c. Tác động theo cơ chế chất truyền tin thứ hai
- d. Gây đáp ứng sinh lý chậm

Câu 275: Hormon tan trong lipid có đặc điểm

- a. Được tổng hợp sẵn
- b. Bài tiết nhanh
- c. Vận chuyển trong máu dưới dạng kết hợp
- d. Tác dụng nhanh và ngắn

Câu 276: Hormon trọng lượng phân tử lớn, không hòa tan trong lipid , hoạt động theo cơ chế :

- a. Hoạt hóa Adenylcyclase ở màng tế bào và làm tăng AMP vòng
- b. Hoạt hóa với hệ gene trong nhân tế bào đích
- c. Điều khiển ngược
- d. Gắn với Recepteur trong tế bào đích

Câu 277: Hormone nào sau đây có receptor nằm trong nhân tế bào?

- a. Catecholamin
- b. Hormone peptide
- c. Hormone Steroid
- d. T3, T4

Câu 278: Các hormone peptide :

- a. Các hormone được tạo thành dạng tiền chất dự trữ ở bộ máy golgi
- b. Các hormone được tạo thành dạng hoạt động dự trữ ở bộ máy golgi
- c. Các hormone được tạo thành dạng tiền chất dự trữ ở mạng lưới nội chất hạt
- d. Các hormone được tạo thành dạng tiền chất hoạt động ở mạng lưới nội chất hạt

Câu 279: Các hormone steroid:

- a. Các hormone được tạo thành chủ yếu ở dạng tiền chất dự trữ ở các tế bào chết tét
- b. Các hormone được tạo thành chủ yếu ở dạng hoạt động dự trữ ở các tế bào chế tiết
- c. Các hormone được tạo thành chủ yếu ở dạng tiền chất dự trữ ở mạng lưới nội chất hạt
- d. Các hormone được tạo thành chủ yếu ở dạng tiền chất hoạt động ở mạng lưới nội chất hạt

Câu 280: Hormone catecholamin :

- a. Tổng hợp sẵn, bài tiết nhanh
- b. Tổng hợp sẵn, bài tiết chậm
- c. Tổng hợp và dự trữ dạng tiết chất, bài tiết nhanh
- d. Tổng hợp và dự trữ dạng tiết chất, bài tiết chậm

Câu 281: Hormone T3-T4 :

- a. Tổng hợp sẵn, bài tiết chậm

- b. Tổng hợp sẵn, bài tiết nhanh
- c. Tổng hợp và dự trữ dạng tiết chất, bài tiết chậm
- d. Tổng hợp và dự trữ dạng tiết chất, bài tiết nhanh

Câu 282: Nhóm các *hormone steroid* có chung các đặc điểm sau , **Ngoại trừ :**

- a. Tan được trong dầu , tổng hợp từ cholesterol
- b. Vận chuyển trong máu dưới dạng kết hợp
- c. Có khả năng gây giữ muối và nước
- d. Tác dụng theo cơ chế thông qua chất truyền tin thứ hai

Câu 283: Các *hormone steroid* khi di chuyển trong máu được vận chuyển đặc hiệu bởi :

- a. Globulin
- b. Albumin
- c. Hemoglobin
- d. Cả a và b đúng

Nội dung 3. Cơ chế tác dụng của hormone

Câu 284: Cơ chế tác dụng của hormone gồm:

- a. Tăng tính thấm của màng tế bào, tăng tổng hợp protein
- b. Thông qua chất truyền tin thứ hai, gắn vào receptor đặc hiệu trên màng tế bào
- c. Thông qua chất truyền tin thứ hai, thông qua hoạt hóa gen tế bào
- d. Hoạt hóa hệ thống enzyme nội bào theo kiểu dây chuyền

Câu 285: Đặc điểm của hormon tác dụng theo cơ chế dẫn truyền tin thứ II là :

- a. Hormon tan được trong nước và có receptor nằm trong tế bào
- b. Hormon tan được trong lipid và có receptor nằm trong tế bào
- c. Hormon tan được trong nước và có receptor nằm trên màng tế bào
- d. Hormon tan được trong lipid và có receptor nằm trong tế bào

Câu 286: Đặc điểm của hormon tác dụng theo cơ chế hoạt hóa gen :

- a. Hormon tan được trong nước và có receptor nằm trong tế bào
- b. Hormon tan được trong lipid và có receptor nằm trong tế bào
- c. Hormon tan được trong nước và có receptor nằm trên màng tế bào
- d. Hormon tan được trong lipid và có receptor nằm trong tế bào

Câu 287: Chất truyền tin thứ 2 tạo thành khi receptor trên màng gắn với:

- a. Agonist
- b. Antagonist
- c. Ligand
- d. Cả ba đều đúng

Câu 288: Chất truyền tin thứ 2 đóng vai trò là :

- a. Hormon
- b. Cơ chất
- c. Enzym
- d. Vitamin

Câu 289: Chất nào sau đây **không phải** là chất truyền tin thứ II

- a. AMPc và GMPc
- b. Ca^{++} -calmodulin
- c. PIP_2
- d. Inositol triphosphat và diacylglycerol

Câu 290: Các chất sau đây đều là chất truyền tin thứ hai:

- a. AMP vòng , ion Mg^{++} , Phospholipid
- b. AMP vòng , ion Ca^{++} , mảnh phospholipid

- c. AMP vòng , ion Ca^{++} , mảnh inositol triphosphat
- d. AMP vòng , ion Ca^{++} , mảnh phospholipid , Diacylglycerol

Câu 291: AMPc gây hoạt hóa

- a. Adenylcyclase
- b. Phospholipid C
- c. Protein kinase A
- d. Protein kinase C

Câu 292: Vai trò của Adenyl cyclase trong cơ chế hình thành và tác dụng của AMPc:

- a. Hoạt hóa chuỗi enzyme theo kiểu dòng thác
- b. Cắt đứt liên kết phosphat của ATP tạo AMP vòng
- c. Cung cấp năng lượng cho phản ứng enzyme
- d. Góp phần dẫn đến sự đáp ứng sinh lý

Câu 293: Câu nào sau đây **không đúng** với cơ chế tác dụng của hormone :

- a. Hoạt hóa enzyme trong tế bào
- b. Hoạt hóa enzyme trong nhân
- c. AMP vòng là chất truyền tin thứ hai của hormone tuyến giáp
- d. Làm thay đổi tính thấm của màng tế bào

Câu 294: Cơ chế tác dụng thông qua chất truyền tin thứ hai, **chọn sai:**

- a. Để đạt đáp ứng sinh lý cần lượng lớn hormone ban đầu (hormone ngoại bào)
- b. Chất truyền tin thứ hai hoạt hóa hệ enzyme nội bào theo cơ chế dòng thác
- c. Receptor đặc hiệu nằm trên màng tế bào
- d. Các hoạt chất sinh học tác động theo cơ chế này có đặc tính tan trong nước

Câu 295: Sau khi chất truyền tin thứ hai Ca^{++} - Calmodulin hình thành sẽ gây :

- a. Phân giải PIP_2 thành IP_3 và diacylglycerol
- b. Hoạt hóa một hệ thống enzym trong tế bào theo kiểu dây chuyền và dòng thác
- c. mở kênh Ca^{++} làm Ca^{++} từ bên ngoài đi vào bên trong tế bào
- d. Hoạt hóa men phosphodiesterase

Câu 296: Phát biểu đúng về phức hợp Ca^{2+} - Calmodulin, **ngoại trừ:**

- a. Calmodulin có 4 vị trí gắn Ca^{2+} , chỉ khi gắn đủ 4 vị trí thì mới thể hiện hoạt tính
- b. Phức hợp Ca^{2+} -Calmodulin linh hoạt hơn so với AMP vòng
- c. Protein troponin C không có hoạt tính enzyme
- d. Troponin C chủ yếu tìm thấy trong tế bào cơ vân, cơ tim

Câu 297: Hormone tác dụng làm tim đập nhanh theo cơ chế thông qua chất truyền tin thứ hai. Điều trị một bệnh nhân tim đập nhanh bằng cách dùng thuốc để, **chọn câu sai:**

- a. Ngăn hormone gắn vào receptor
- b. ức chế enzyme adenyl cyclase
- c. ức chế enzyme phosphoesterase
- d. ức chế AMPc

Câu 298: Verapamil dùng trong điều trị rối loạn nhịp tim, thuốc này giữ Ca^{2+} lại trong máu do Ca^{2+} có vai trò hạ huyết áp, thực chất Verapamil có vai trò:

- a. ức chế Ca^{2+} -protein
- b. chặn kênh Ca^{2+}
- c. ức chế receptor trên màng
- d. ức chế hệ enzyme hoạt hóa

Câu 299: Tiền chất tạo nên inositol triphosphat và diacyl glycerol có nguồn gốc từ:

- a. Nhân tế bào
- b. Màng tế bào

- c. Bào tương
- d. Thể golgi

Câu 300: Hormone tác dụng thông qua cơ chế hình thành và tác dụng của IP_3 và diacyl glycerol, ngoại trừ:

- a. TRH
- b. TSH
- c. GnRH
- d. ADH

Câu 301: Các hormone khác nhau cùng tác động thông qua trung gian một chất truyền tin thứ hai nhưng lại gây đáp ứng chuyên biệt là nhờ :

- a. Tính chất tan được trong nước hay lipid của hormone
- b. Vận chuyển trong máu dạng tự do hay kết hợp của hormone
- c. Vị trí khác nhau của receptor trong tế bào đích
- d. Bản chất và số lượng của hệ thống enzyme trong các tế bào đích khác nhau

Câu 302: Đặc điểm của hormon tác dụng theo cơ chế hoạt hóa gen :

- a. Tổng hợp sẵn trong tế bào
- b. Bài tiết nhanh
- c. Vận chuyển trong máu dưới dạng tự do
- d. Tác dụng chậm nhưng kéo dài

Câu 303: Chọn câu sai

- a. Các hormone steroid được tổng hợp sẵn, bài tiết nhanh
- b. Catecholamin tác động theo cơ chế theo cơ chế thông qua chất truyền tin thứ hai
- c. Các hormone di chuyển trong máu coi là chất truyền tin thứ nhất
- d. Các hormone steroid chỉ gây đáp ứng sinh lý bằng cách hoạt hóa hoặc ức chế gen điều hòa

Câu 304: Chọn tổ hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng
c. Nếu 2 và 4 đúng d. Nếu 4 đúng

Các hormone có bản chất peptide :

- 1. Vận chuyển trong máu dưới dạng tự do
- 2. Tổng hợp sẵn, bài tiết nhanh
- 3. Tác dụng theo cơ chế thông qua chất truyền tin thứ hai
- 4. Receptor nằm trong bào tương hoặc nhân tế bào

Câu 305: Chọn tổ hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng
c. Nếu 2 và 4 đúng d. Nếu 4 đúng

Các phát biểu sau đây đúng:

- 1. T3-T4 sau khi tổng hợp được dự trữ ở dạng hoạt động sẵn sàng tiết ra
- 2. Histamin gây tiết HCl ở dạ dày thông qua cơ chế hoạt hóa gen tế bào
- 3. Protein có ái lực với Ca^{2+} không có hoạt tính enzyme là troponin C
- 4. Milrinone tác dụng lên tim gây ức chế phosphodiesterase nên đã làm tăng vận chuyển Ca^{2+} vào nội bào dẫn đến tăng co bóp tim.

Nội dung 4. Điều hòa bài tiết hoạt chất sinh học

Câu 306: Các trục vùng dưới đồi – tuyến yên – tuyến nội tiết . Chọn câu sai :

- a. TRH – TSH – T_3T_4
- b. CRH – ACTH – Cortisol
- c. GHRH – GH – Glucagon
- d. GnRH – FSH – LH – Hormon sinh dục

Câu 307: Tuyến nội tiết sau không điều hòa bài tiết theo trục vùng hạ đồi – tuyến yên:

- a. Tuyến giáp
- b. Tuyến cận giáp và tuyến tụy

- c. Vỏ thượng thận
- d. Tuyển sinh dục nam và nữ

Câu 308: Chọn câu sai

- a. Hormone tiết ra liên tục với nồng độ ổn định trong suốt ngày và đêm
- b. Tác nhân kích thích hormone có thể là thần kinh hoặc thể dịch
- c. Cơ chế điều hòa feedback âm đóng vai trò chủ yếu duy trì cơ thể
- d. Các điều hòa feedback dương luôn tận cùng bằng một feedback âm

Câu 309: Điều hòa bài tiết hoạt chất sinh học, cơ chế quan trọng nhất :

- a. Điều hòa theo trục vùng hạ đồi, tuyến yên, tuyến nội tiết
- b. Điều hòa bài tiết theo nhịp sinh học
- c. Điều hòa bài tiết do tác nhân kích thích
- d. Điều hòa bài tiết theo cơ chế feedback


Câu 310: Corticoid cao nhất vào khoảng;

- a. 21 giờ đêm
- b. 24 giờ đêm
- c. 9 giờ sáng
- d. 4 giờ sáng

Câu 311: Không uống thuốc nhóm corticoid vào buổi chiều tối vì

- a. Dẫn đến ức chế, teo tuyến thượng thận
- b. Làm tuyến thượng thận hoạt động quá mức
- c. Làm nồng độ cortisol trong máu không ổn định
- d. Gây rối loạn chức năng tiết cortisol của tuyến thượng thận

Cho sơ đồ cơ chế feedback âm nhiều cấp trong điều hòa bài tiết của trục vùng hạ đồi – tuyến yên – tuyến giáp :



Bệnh nhân bị ưu nang tuyến giáp nguyên phát nếu nguyên nhân sinh bệnh tại tuyến giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức), ưu nang tuyến giáp thứ phát nếu nguyên nhân sinh bệnh tại tuyến yên và ưu nang tuyến giáp tam phát nếu nguyên nhân gây bệnh tại vùng hạ đồi

Câu 312: Trong trường hợp ưu nang tuyến giáp nguyên phát, nồng độ các hormone thay đổi :

- a. TRH, TSH giảm, T3-T4 tăng
- b. TRH giảm, TSH không đổi, T3-T4 tăng
- c. TRH không đổi, TSH giảm, T3-T4 tăng
- d. TRH tăng, TSH giảm, T3-T4 tăng

Câu 313: Trong trường hợp ưu nang tuyến giáp thứ phát, nồng độ các hormone thay đổi :

- a. TRH giảm, TSH tăng, T3-T4 tăng
- b. TRH giảm, TSH tăng, T3-T4 tăng
- c. TRH không đổi, TSH tăng, T3-T4 tăng
- d. TRH tăng, TSH tăng, T3-T4 tăng

Câu 314: Trong trường hợp ưu nang tuyến giáp tam phát, nồng độ các hormone thay đổi :

- a. TRH giảm, TSH tăng, T3-T4 tăng
- b. TRH tăng, TSH không đổi, T3-T4 không đổi
- c. TRH không đổi, TSH tăng, T3-T4 tăng
- d. TRH không đổi, TSH giảm, T3-T4 giảm

Tương tự ta có các bệnh nhược năng tuyến giáp nguyên phát, thứ phát và tam phát

Câu 315: Nhược năng tuyến giáp thứ phát có kết quả xét nghiệm:

- a. T3-T4 giảm, TSH giảm, TRH giảm
- b. T3-T4 giảm, TSH giảm, TRH tăng
- c. T3-T4 giảm, TSH tăng, TRH giảm
- d. T3-T4 tăng, TSH giảm, TRH giảm

CHUYÊN ĐỀ 2 – SINH LÝ THỂ DỊCH – NỘI TIẾT

Bài số 7

SINH LÝ NỘI TIẾT VÙNG HẠ ĐÔI – TUYẾN YÊN

Nội dung 1. Sinh lý nội tiết vùng hạ đồi

Câu 316: Các hormone do vùng dưới đồi bài tiết sẽ theo đến tác động lên chức năng tuyến yên

- a. Con đường mạch máu
- b. Con đường thần kinh
- c. Con đường mạch máu và thần kinh
- d. Các protein vận chuyển

Câu 317: Các hormone sau là hormone giải phóng vùng hạ đồi :

- a. GHRH , GHIH
- b. TRH , PIH
- c. CRH , TRH
- d. ADH và oxytocin

Câu 318: Hormon có cấu trúc đơn giản nhất là

- a. PIH
- b. GnRH
- c. TRH
- d. CRH

Câu 319: Tính chất chung của các hormone vùng hạ đồi, ngoại trừ:

- a. Tác dụng thông qua chất truyền tin thứ hai
- b. Receptor nằm trên màng
- c. Điều hòa theo cơ chế feedback âm
- d. Tổng hợp dạng tiền chất, bài xuất chậm

Câu 320: Sự tăng tiết hormone GHRH tại cùng hạ đồi do :

- a. Sự tăng nồng độ glucose máu
- b. Sự tiêu hóa glucose tại dạ dày và ruột
- c. Sự giảm nồng độ glucose trong máu
- d. Sự tái hấp thu glucose tại ống thận

Câu 321: Cấu trúc của hormone TRH gồm 3 acid amin:

- a. Glu-His-Pro
- b. Glu-Pro-His
- c. His-Glu-Pro
- d. His-Pro-Glu

Câu 322: Tác dụng của TRH là :

- a. Kích thích tuyến yên bài tiết T_3 - T_4
- b. Kích thích tuyến giáp bài tiết T_3 - T_4
- c. Kích thích tuyến yên bài tiết ACTH
- d. Kích thích tuyến yên bài tiết TSH

Câu 323: Cơ chế tác dụng của TRH tại tế bào thùy trước tuyến yên

- a. Thông qua AMP vòng
- b. Thông qua diacyl glycerol và PIP_2
- c. Thông qua Ca^{2+} - protein
- d. Cả b và c đúng

Nội dung 2. Sinh lý nội tiết tuyến yên – hormone tiền yên

Câu 324: Tuyến nội tiết nào thuộc hệ thần kinh:

- a. Tuyến yên
- b. Tuyến giáp
- c. Tuyến thượng thận
- d. Tuyến tụy

Câu 325: Các hormon có tác dụng chuyển hóa của thùy trước tuyến yên :

- a. ACTH, TSH, Prolactin, GH
- b. ACTH, TSH, MSH, GH
- c. MSH, TSH, ACTH, Prolactin
- d. FSH, ACTH, TSH, GH

A. HORMONE SINH TRƯỞNG (GH)

Câu 326: Tác dụng tăng trưởng của GH được thực hiện thông qua trung gian là :

- a. ICF (somatomedin)
- b. Serotonin
- c. Secretin
- d. Somatostatin

Câu 327: Tác động tạo xương của GH bao gồm, ngoại trừ:

- a. Tăng số lượng tế bào tạo xương
- b. Tăng vận chuyển Ca từ máu vào xương
- c. Tăng cốt hóa sụn liên hợp
- d. Tăng tạo khung protein

Câu 328: Tác dụng của GH là

- a. Tăng vận chuyển glucose vào tế bào
- b. Giảm vận chuyển acid amin vào tế bào
- c. Giảm thoái hóa glucose ở tế bào
- d. Giảm bài tiết insulin của tuyến tụy

Câu 329: GH làm tăng nồng độ Glucose trong máu do :

- a. Tăng chuyển glycogen thành glucose ở gan
- b. Tăng tạo đường mới
- c. Giảm thoái hóa Glucose ở tế bào
- d. Giảm bài tiết insulin của tuyến tụy

Câu 330: Dưới tác dụng của GH , cơ thể tạo năng lượng chủ yếu từ :

- a. Glucid
- b. Protid
- c. Lipid
- d. Glucid , Protid , Lipid

Câu 331: Khi GH tăng theo cơ chế feedback âm sẽ gây :

- a. tăng tiết GHRH , tăng tiết GHIH
- b. tăng tiết GHRH , giảm tiết GHIH
- c. giảm tiết GHRH , tăng tiết GHIH
- d. giảm tiết GHRH , giảm tiết GHIH

Câu 332: Sự tăng bài tiết GH do yếu tố sau, ngoại trừ:

- a. Nhịn đói
- b. Ngủ sâu
- c. Acid béo tự do trong máu giảm
- d. Đường huyết giảm

Câu 333: GH được bài tiết nhiều khi :

- a. Nồng độ acid amin huyết tương tăng
- b. Ngủ
- c. Nồng độ TRH huyết tương tăng
- d. Đường huyết tăng

Câu 334: Câu nào sau đây đúng với GH?

- a. Được bài tiết bởi tế bào **basophile** của tuyến yên
- b. **Làm phát triển đầu xương dài**
- c. Được bài tiết **không phụ thuộc** vào vùng dưới đồi
- d. **Tăng** sự tiêu thụ glucose ở tế bào

Câu 335: Chọn tổ hợp đúng a. Nếu 1, 2, 3 đúng b. Nếu 1, 3 đúng

 c. Nếu 2, 4 đúng d. Nếu 4 đúng

- 1. GH do tế bào **ura acid** của thùy trước tuyến yên tiết ra
- 2. GH vận chuyển trong máu ở **dạng tự do**
- 3. GH tác động lên gan theo cơ chế thông qua **chất truyền tin thứ hai**
- 4. **GH tác động lên tất cả** các tế bào trong cơ thể

Câu 336: Chọn tổ hợp đúng a. Nếu 1, 2, 3 đúng b. Nếu 1, 3 đúng

 c. Nếu 2, 4 đúng d. Nếu 4 đúng

- 1. GH trong máu **tăng kích thích** vùng hạ đồi tiết ra GHRH
- 2. Tăng tiết GH có thể dẫn đến đái tháo đường
- 3. GH có bản chất là một **peptide**
- 4. GH tác động làm tăng các tạo cốt bào trong xương

Câu 337: Ở một số người bị giảm lưu giữ protein trong phần lớn các mô cơ thể, do đó giảm khối cơ và chiều dài cơ gây nhăn da đồng thời giảm chức năng của các bộ máy cơ quan, biểu hiện bên ngoài có vẻ “già” trước tuổi. Điều này có thể do:

- a. Sự giảm bài tiết T3-T4
- b. Sự tăng bài tiết T3-T4
- c. **Sự giảm bài tiết GH**
- d. Sự tăng bài tiết GH

Câu 338: Bệnh **lùn cân đối** có nguyên nhân do **giảm tiết** :

- a. ACTH
- b. TSH
- c. **GH**
- d. GnGH

Câu 339: Bệnh **to viễn cực** (Acromégalie) do :

- a. **Thừa GH sau tuổi dậy thì**
- b. Thừa GH trước tuổi dậy thì
- c. Thừa ACTH sau tuổi dậy thì
- d. Thiếu GH sau tuổi dậy thì

Câu 340: Hội chứng tăng tiết GH có những triệu chứng sau , **ngoại trừ** :

- a. **Tăng lắng đọng mỡ dưới da**
- b. Tăng đường huyết
- c. Phát triển quá mức hệ xương kể cả xương trục và xương phụ
- d. Lắng đọng nhiều protein làm da dày , mũi , môi và lưỡi to bè

Câu 341: Bệnh không lồ có thể gây ra

- a. Tăng tổng hợp glycogen
- b. **Tăng đường huyết**

- c. Tăng caxi máu
- d. tất cả đúng

Câu 342: Các triệu chứng sau đây đều là của bệnh khổng lồ , ngoại trừ :

- a. Bàn chân , bàn tay to
- b. Phũ tạng to
- c. Đái đường
- d. Acid amin huyết tương tăng

Câu 343: Bệnh nhân bị u các tế bào ưa acid của tuyến yên có thể gặp các triệu chứng sau, trừ:

- a. bệnh khổng lồ ở trẻ em
- b. tăng tiết sữa vào nang
- c. hội chứng Cushing
- d. bệnh to đầu ngón ở người lớn

B. HORMONE KÍCH THÍCH TUYẾN GIÁP

Câu 344: Tác dụng của TSH là :

- a. Kích thích tuyến giáp sản xuất calcitonin
- b. Tăng kích thước tuyến giáp
- c. Giảm quá trình bắt iod của tế bào tuyến giáp
- d. Tăng chuyển hóa cơ sở

Câu 345: Chọn câu đúng về TSH:

- a. Nguồn gốc từ tế bào ưa acid
- b. Vận chuyển trong máu ở dạng tự do
- c. Mô đích là tuyến cận giáp
- d. Receptor nằm trong nhân tế bào

Câu 346: TSH làm tăng nồng độ hormone giáp trong máu bằng cách, ngoại trừ:

- a. Tăng nồng độ globulin gắn hormone giáp (TBG)
- b. Làm tiêu protein của thyroglobulin
- c. Tăng kích thước tế bào tuyến giáp
- d. Tăng số lượng tế bào tuyến giáp

Câu 347: Tăng tiết hormone TSH dẫn đến bệnh lý :

- a. Bướu cổ
- b. Cường giáp
- c. Ưu năng tuyến giáp thứ phát
- d. Cả ba đều đúng

Câu 348: Chọn tổ hợp đúng: a. Nếu 1, 2, 3 đúng b. Nếu 1, 3 đúng

- c. Nếu 2, 4 đúng
- d. Nếu 4 đúng

Bệnh lý do suy tuyến giáp :

- 1. Rối loạn kinh nguyệt
- 2. Suy tuyến thượng thận
- 3. Cơ thể chậm phát triển
- 4. Cường giáp

C. HORMONE KÍCH THÍCH TUYẾN THƯỢNG THẬN

Câu 349: Mô đích của ACTH, ngoại trừ :

- a. Lớp bó , lớp lưới của tuyến thượng thận
- b. Tế bào hắc tố
- c. Não
- d. Tuyến sinh dục

Câu 350: Theo nhịp sinh học ACTH được bài tiết nồng độ cao nhất lúc :

- a. 16 giờ - 20 giờ
- b. Nửa đêm gần về sáng
- c. 6 giờ - 8 giờ sáng
- d. 10 giờ - 12 giờ trưa

Câu 351: Giảm tiết ACTH gây teo vỏ thượng thận ở

- a. Lớp cầu và lớp bó
- b. Lớp bó và lớp lưới
- c. Lớp cầu và lớp lưới
- d. Lớp cầu , lớp bó và lớp lưới

Câu 352: Trong hội chứng Cushing khi xét nghiệm

- a. Nồng độ ACTH và cortisol đều tăng
- b. Nồng độ ACTH tăng, cortisol giảm
- c. Nồng độ ACTH giảm, cortisol tăng
- d. Nồng độ ACTH và cortisol đều giảm

Câu 353: Xạm da trong bệnh Addison (suy sỏ thượng thận nguyên phát) có liên quan đến hormon

- a. GH
- b. TSH
- c. ACTH
- d. GnGH

Câu 354: Bệnh nhân bị nhược năng vỏ thượng thận nguyên phát mạn tính sẽ có triệu chứng sau liên quan đến ACTH :

- a. Rối loạn điện giải
- b. Yếu cơ
- c. Xạm da
- d. Hạ huyết áp

Câu 355: Câu nào sau đây **đúng** với ACTH?

- a. Ước chế phản ứng viêm của tổ chức bằng cơ chế gián tiếp
- b. Trong trường hợp stress, được giải phóng nhanh khi xung động thần kinh tới tuyến yên trước
- c. Có cấu trúc đồng nhất với cấu trúc của phân tử MSH
- d. Do tế bào somatotrop của tuyến yên bài tiết

Câu 356: Hormon sau được xem là có ảnh hưởng lên học tập và trí nhớ :

- a. GH
- b. ACTH
- c. TSH
- d. Gonadotropin

Câu 357: Theo cơ chế feedback âm, khi dùng thuốc corticoid kéo dài sẽ gây:

- a. Tăng bài tiết TSH
- b. Giảm bài tiết TSH
- c. Tăng bài tiết ACTH
- d. Giảm bài tiết ACTH

D. HORMONE KÍCH DỤC TỔ VÀ HORMONE GÂY TIẾT SỮA

Câu 358: Mô đích của FSH là :

- a. ống sinh tinh và nang trứng
- b. tế bào Leydig và hoàng thể
- c. Não bộ và ống thận
- d. Tuyến giáp và tuyến thượng thận

Câu 359: Tác dụng của FSH trên nữ giới :

- a. Kích thích nang trứng phát triển
- b. Kích thích sản xuất estrogen
- c. Kích thích sản xuất progesterone
- d. Kích thích rụng trứng

Câu 360: Câu nào sau đây đúng với FSH?

- a. Kích thích nang trứng tiết ra estrogen
- b. Được bài tiết bởi thùy giữa tuyến yên
- c. Là một chuỗi peptide đơn
- d. Là một glycoprotein

Câu 361: Tác dụng của LH trên nam giới là :

- a. Kích thích phát triển ống sinh tinh
- b. Kích thích sản sinh tinh trùng
- c. Kích thích làm nở to tinh hoàn
- d. Kích thích sản xuất testosterone

Câu 362: Các hormon cần thiết cho chuyển dạ sinh con :

- a. prolactin , oxcitocin
- b. oxcitocin , relaxin
- c. relacin , HCS
- d. HCS , GH

Câu 363: Hormon prolactin có cùng nguồn gốc với :

- a. GH
- b. TSH
- c. ACTH
- d. Gonadotropin

Câu 364: Tác dụng của prolactin là :

- a. Phát triển ống tuyến vú và mô đệm.
- b. Phát triển ống tuyến và thùy tuyến
- c. Kích thích bài tiết sữa
- d. Phát triển tuyến vú và kích thích bài tiết sữa

Câu 365: Prolactin có tác dụng gây bài tiết sữa:

- a. Vào nang sữa sau khi tuyến vú đã chịu tác dụng của estrogen và progesteron
- b. Vào nang sữa sau khi tuyến vú đã chịu tác dụng của oxytocin
- c. Ra bên ngoài sau khi tuyến vú đã chịu tác dụng của oxytocin
- d. Ra bên ngoài sau khi tuyến vú đã chịu tác dụng của oxytocin

Câu 366: Để thực hiện chức năng tạo sữa nuôi, tuyến vú đã chịu tác dụng của các hormon theo thứ tự

- a. Estrogen , progesterone → oxytocin → prolactin
- b. Estrogen , progesteron → HCS → Prolactin → oxytocin
- c. Prolactin → oxytocin → estrogen → progesterone, HCS
- d. Oxytocin → Prolactin → estrogen, progesterone

Câu 367: Động tác mút núm vú của trẻ sẽ kích thích bài tiết :

- a. ADH và oxytocin
- b. ACTH và prolactin
- c. Oxytocin và prolactin
- d. ADH và ACTH

Câu 368: Hormone bài xuất sữa ra ngoài:

- a. Estrogen
- b. Progesteron

- c. Oxytocin
- d. Prolactin

Câu 369: Các tác dụng sau đây là của oxytocin , ngoại trừ :

- a. Tăng bài tiết sữa
- b. Tăng bài xuất sữa
- c. Tăng co bóp cơ tử cung
- d. Tăng hoạt động của tế bào cơ biểu mô tuyến vú

Câu 370: Bằng cách kích thích đầu núm vú, phụ nữ khi sinh có thể lấy được hơi dài hơn để rặn đẻ và duy trì được các cơn rặn đẻ khỏe hơn và lâu hơn. Bản chất của thủ thuật này là để kích thích tiết :

- a. Prolactin
- b. Oxytocin
- c. ACTH
- d. GH

Nội dung 3. Sinh lý nội tiết tuyến yên – Hormone hậu yên

Câu 371: Hormon của thùy sau tuyến yên :

- a. TSH và prolactin
- b. ADH và oxytocin
- c. PTH và calcitonin
- d. MSH và aldosteron

Câu 372: Nhân trên thị vùng dưới đồi chủ yếu bài tiết hormone nào sau đây?

- a. Oxytocin
- b. ADH
- c. FSH
- d. GH

Câu 373: Hormon được tổng hợp từ nhân cạnh não thất vùng hạ đồi là :

- a. Oxytocin
- b. FSH và LH
- c. TRH
- d. ADH

Câu 374: Tác dụng của ADH

- a. Tăng tái hấp thụ nước ở ống lượn gần , gây co mạch , có ảnh hưởng lên hành vi và trí nhớ
- b. Tăng tái hấp thụ nước ở ống lượn xa và ống góp , gây co mạch , có ảnh hưởng lên hành vi và trí nhớ
- c. Tăng tái hấp thụ nước ở ống lượn xa , tăng tái hấp thụ Na^+ ở quai Henle , gây co mạch .
- d. Tăng tái hấp thụ Na^+ ở ống lượn xa và ống góp , gây co mạch , có ảnh hưởng lên hành vi và trí nhớ

Câu 375: Vùng dưới đồi bài tiết ADH do các nguyên nhân sau đây kích thích , NGOẠI TRỪ :

- a. mất nước do nôn ói
- b. chảy máu nặng
- c. giảm áp suất thẩm thấu của máu
- d. tiêu chảy

Câu 376: Yếu tố làm tăng bài tiết ADH là :

- a. Tăng nồng độ glucose trong máu
- b. Tăng nồng độ protein trong máu
- c. Giảm nồng độ ion Na^+ trong máu
- d. Giảm thể tích máu

Câu 377: Câu nào sau đây **đúng** với oxytocin và ADH :

- a. **Tổng hợp ở tế bào thần kinh vùng dưới đồi**
- b. Bài tiết từ các tế bào thần kinh vùng dưới đồi
- c. Được kiểm soát bởi hormon giải phóng vùng dưới đồi
- d. Được dự trữ ở tuyến yên trước

Câu 378: Bệnh đái tháo nhạt (diabetes insipidus) có thể là do thiếu cấu trúc nào sau đây :

- a. Thùy trước tuyến yên
- b. Đảo Langerhans
- c. Vùng đồi thị
- d. **Vùng dưới đồi**

Câu 379: Điều hòa ngược âm tính (negative feedback) **không** phải là yếu tố điều hòa bài tiết của hormone nào dưới đây?

- a. ACTH
- b. FSH
- c. **Oxytocin**
- d. TSH

CHUYÊN ĐỀ 2 – SINH LÝ THỂ DỊCH – NỘI TIẾT

Bài số 8

SINH LÝ NỘI TIẾT TUYẾN GIÁP VÀ TUYẾN CẬN GIÁP

Nội dung 1. Sinh lý tuyến giáp

Câu 380: Tuyến nội tiết lớn nhất trong cơ thể :

- a. Tuyến yên
- b. Tuyến giáp
- c. Tuyến tụy
- d. Tuyến thượng thận

Câu 381: Điểm đáng chú ý về giải phẫu tuyến giáp so với các tuyến nội tiết khác, ngoại trừ

- a. Có cấu trúc nang
- b. Không có ống dẫn
- c. Kích thước lớn
- d. Vị trí nông

Câu 382: Câu nào sau đây đúng với đặc điểm nang giáp ?

- a. Đường kính có xu hướng lớn hơn khi TSH kích thích
- b. Có chiều dày từ 3-4 tế bào biểu mô
- c. Tạo ra hai hormone chỉ có tác dụng trên chuyển hóa
- d. Hormone từ nang giáp thấm trực tiếp vào máu

Câu 383: Các tế bào nang tuyến giáp tiết ra những hormone chính nào?

- a. Thyroxine, Triiodthyronin
- b. Calcitonin
- c. PTH
- d. Cả a và b đúng

Câu 384: Câu nào sau đây đúng với chất keo của tuyến giáp :

- a. Được tìm thấy trong tế bào giáp
- b. Là TBG dự trữ ngoài tế bào giáp
- c. Là sản phẩm của sự phân hủy hormone giáp
- d. Dự trữ Hormon giáp được tiết vào máu

A. HORMONE THYROXINE

Câu 385: Hormone thyroxin, ngoại trừ:

- a. Tan trong nước
- b. Receptor nằm trên màng tế bào
- c. Cấu tạo gồm tyrosin và iod
- d. Vận chuyển trong máu phần lớn ở dạng kết hợp với globulin

Câu 386: Chọn câu đúng khi nói về Thyroxin :

- a. Là hormon duy nhất được bài tiết bởi tuyến giáp
- b. Kích thích sự bài tiết TSH
- c. Là sản phẩm phân hủy của TSH
- d. Trong phân tử chứa 4 nguyên tử iod

Câu 387: Câu nào sau đây đúng với triiodothyronin?

- a. Chứa một nguyên tử nitrogen trong phân tử
- b. Được bài tiết dưới dạng diiodtyroxin rồi được gắn thêm iod thành T_3 trong dòng máu
- c. Gắn với protein mang trong huyết tương chặt hơn so với thyroxin
- d. Trong phân tử của nó có gắn 4 nguyên tử iod

Câu 388: T3-T4 được tổng hợp trong nang giáp qua mấy giai đoạn?

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5

Câu 389: Iod vận chuyển qua màng tế bào nang giáp theo phương thức:

- a. Vận chuyển chủ động nguyên phát
- b. Vận chuyển chủ động thứ phát
- c. Khuếch tán tự do
- d. Khuếch tán được gia tốc

Câu 390: Để tổng hợp hormone giáp, iod đi vào nang giáp và kết hợp với :

- a. Thyroglobuline
- b. Protein
- c. Tyrosine
- d. Thyroxine

Câu 391: Nhu cầu iod cung cấp cho cơ thể mỗi ngày:

- a. 2mg
- b. 2g
- c. 0,2mg
- d. 0,2g

Câu 392: Ở tuyến giáp năng động , bơm iode tập trung tại tuyến giáp gấp lần trong máu :

- a. 50 lần
- b. 100 lần
- c. 200 lần
- d. 250 lần

Câu 393: Ở đỉnh tế bào nang giáp, men nào sau đây góp phần oxy hóa iodur thành I_2 ?

- a. Catheptase
- b. Deiodase
- c. Peroxydase
- d. Cả ba đều sai

Câu 394: Iodur được dự trữ trong nang giáp chủ yếu dưới dạng nào sau đây

- a. Thyroxine
- b. Thyroglobulin
- c. Monoiodotyrosine
- d. Diiodotyrosine

Câu 395: Phần lớn hormone giáp vào máu tuần hoàn là dạng :

- a. T3
- b. T4
- c. MIT
- d. DIT

Câu 396: Trong vòng tuần hòa Hormon giáp phần lớn ở dạng :

- a. Triiodothyronine
- b. Thyroxine
- c. Thyrotropine
- d. Thyroglobuline

Câu 397: Thyroxin và triiodothyronin được vận chuyển trong huyết tương ở tất cả các dạng sau, ngoại trừ:

- a. TBG

- b. Gắn với albumin
- c. Gắn với prealbumin
- d. Gắn với thyroglobulin

Câu 398: Khuyến khích người dân sử dụng muối iod để điều trị dự phòng thiếu :

- a. Thyroid hormone
- b. Calcitonin
- c. Glucocorticoid
- d. Catecholamin

Câu 399: Iod hóa muối ăn nhằm mục đích gì nếu xét đối với người trưởng thành:

- a. giảm tỉ lệ bướu cổ
- b. đem lại sự thông minh, phát triển trí tuệ
- c. cung cấp muối cho vùng cao
- d. làm cho cơ thể cao lớn

Câu 400: T3-T4 làm tăng đường huyết do các tác dụng sau đây , trừ :

- a. Tăng phân giải glycogen thành glucose
- b. Tăng hấp thụ glucose ở ruột
- c. Tăng tạo đường mới
- d. giảm thoái hóa glucose ở tế bào

Câu 401: Hormone T3-T4 làm tăng hoạt động chuyển hóa năng lượng do, ngoại trừ:

- a. Kích thích sự biệt hóa tế bào
- b. Tăng tiêu thụ và thoái hóa thức ăn tạo năng lượng
- c. Tăng tốc độ phản ứng chuyển hóa các chất
- d. Tăng số lượng và kích thước ty thể

Câu 402: Tiêm thyroxin sẽ gây ra tác dụng nào sau đây?

- a. Tăng mức TRH huyết tương
- b. Tăng mức TSH huyết tương
- c. Tăng huyết áp tâm trương
- d. Tăng mức chuyển hóa

Câu 403: Tiêm hormone tuyến giáp cho con vật bình thường sẽ gây ra các tác dụng sau đây, ngoại trừ:

- a. Tăng mức độ tiêu thụ oxy
- b. Giảm mức tiêu lipid
- c. Tăng tổng hợp protein
- d. Giảm nồng độ cholesterol huyết tương

Câu 404: Mức chuyển hóa của cơ thể **không** bị ảnh hưởng khi tăng nồng độ chất nào sau đây?

- a. TRH
- b. TSH
- c. TBG
- d. T₃-T₄

Câu 405: Chọn câu **sai** về hormone tuyến giáp :

- a. Bản chất hóa học của T3-T4 là Tyrosin + iod
- b. Dạng dự trữ của hormon giáp là thyroglobulin ở tế bào cận giáp
- c. Dạng vận chuyển của T3-T4 là TBPA, TBG
- d. TSH có vai trò chuyển hormon giáp vào máu

Câu 406: Câu nào sau đây **đúng** với hormone tuyến giáp?

- a. Sự phát triển và chức năng bình thường của tuyến giáp phụ thuộc vào sự có mặt của tuyến yên và vùng dưới đồi
- b. TRH gây giải phóng hormone kích thích tuyến giáp TSH của tuyến tiền yên

- c. Hormone giáp được dự trữ trong các hạt bài tiết vào trong bào tương của tế bào nang giáp
- d. Thiếu iod mãn tính trong chế độ ăn sẽ dẫn tới tăng bài tiết hormone giáp như là một cơ chế bù trừ

Câu 407: Hậu quả của thiếu T3 – T4 bẩm sinh:

- a. **Đần độn**
- b. Lùn
- c. Run tay
- d. Nhịp tim nhanh

Câu 408: Một bệnh nhi bị thiếu năng trí tuệ, nhỏ bé hơn so với các trẻ cùng trang lứa, ngoài ra còn bị nói ngọng... xét nghiệm thiếu T3-T4 có thể chẩn đoán :

- a. **Do thiếu iod**
- b. Do không hấp thu được iod
- c. Do thiếu thyroxine
- d. Do không hấp thu được thyroxine

Câu 409: Bài tiết TSH phụ thuộc vào ... theo cơ chế ...

- a. Nồng độ T3-T4 tự do ; điều hòa ngược âm tính
- b. **Nồng độ T3-T4 toàn phần ; điều hòa ngược âm tính**
- c. TRH ; điều hòa ngược âm tính
- d. TRH ; điều hòa ngược dương tính

Câu 410: Một phụ nữ bị phù niêm, có nồng độ TSH huyết tương thấp nhưng lại tăng lên rõ khi tiêm TRH, vậy người đó có thể bị tình trạng nào sau đây?

- a. Cường giáp do u tuyến giáp
- b. Suy giáp nguyên phát
- c. Suy giáp thứ phát
- d. **Suy giáp tam phát**

Câu 411: Triệu chứng gợi ý chẩn đoán bệnh phù niêm (Mixoedeme) do suy tuyến giáp nặng:

- a. **Tăng cân tuy ăn kém.**
- b. Hạ đường huyết.
- c. Tụt cân nhanh.
- d. Suy hô hấp.

Câu 412: Thiếu thyroid hormone có thể, **ngoại trừ:**

- a. **Tim đập nhanh**
- b. Chậm phát triển trí tuệ
- c. Suy hô hấp
- d. Mất dự tính ở nam, băng kinh ở nữ

Câu 413: Bệnh nhân *ưu năng tuyến giáp* , **ngoại trừ :**

- a. **Lạnh, sợ lạnh, da khô**
- b. Run tay
- c. Tăng tần số tim
- d. Teo cơ

Câu 414: Bệnh nhân *nhược năng tuyến giáp* sẽ có triệu chứng , **ngoại trừ :**

- a. Lạnh , sợ lạnh , da khô
- b. Thiếu máu hồng cầu to , phù trước xương chày
- c. Chậm chậm , mỏi cơ , kém tập trung
- d. **Nhịp tim nhanh , huyết áp tăng**

Câu 415: Triệu chứng sau đây trong bệnh *Basedown* (ưu năng tuyến giáp) không phải do T3-T4 trực tiếp gây ra :

- a. Nhịp tim nhanh
- b. Tăng huyết áp
- c. Mất ngủ
- d. Run tay

Câu 416: Tất cả các dấu hiệu sau đây là biểu hiện của bệnh *suy tuyến giáp*, ngoại trừ:

- a. Nhịp tim chậm
- b. Mức chuyển hóa giảm
- c. Buồn ngủ
- d. Không chịu được nóng

B. HORMONE CALCITONIN

Câu 417: Chọn câu **sai** khi nói về calcitonin :

- a. Do tế bào cạnh nang giáp tiết ra
- b. Hormon tan trong nước
- c. Điều hòa bài tiết theo nồng độ calci huyết tương
- d. Có vai trò điều hòa thể tích dịch nội bào

Câu 418: Tìm câu **sai** , tác dụng Calcitonin

- a. Giảm nồng độ canxi huyết tương
- b. Giảm hoạt động của tế bào hủy xương
- c. Tăng lắng đọng muối Canxi ở xương
- d. Tăng hình thành các tế bào hủy xương mới

Câu 419: Hormon gây tăng hoạt động liên xương :

- a. GH
- b. Calcitonin
- c. Parathyroid hormone
- d. Thyroid hormone

Câu 420: Để phòng bệnh còi xương do thiếu vitamin D ở trẻ em cần khuyên các bà mẹ :

- a. Cho trẻ bú sữa mẹ
- b. ăn đậm đầy đủ các chất dinh dưỡng
- c. phơi nắng sáng
- d. tiêm chủng đầy đủ

Nội dung 2. Sinh lý tuyến cận giáp – hormone parathormon (PTH)

Câu 421: Tuyến nội tiết sau được mệnh danh là tuyến sinh mạng :

- a. Tuyến yên
- b. Tuyến giáp
- c. Tuyến tụy
- d. Tuyến cận giáp

Câu 422: Tuyến cận giáp được mệnh danh là tuyến sinh mạng vì thiếu hormone tuyến giáp có thể gây tử vong do giảm :


- a. K^+ máu
- b. Na^+ máu
- c. Ca^{++} máu
- d. Mg^{++} máu

Câu 423: Hormon tuyến cận giáp có tác dụng :

- a. Giảm Ca^{++} , phosphate máu , giảm Ca^{++} ,phosphat nước tiểu

- b. Tăng Ca^{++} máu , phosphate máu , tăng Ca^{++} nước tiểu, phosphate nước tiểu
- c. Tăng Ca^{++} máu , phosphate máu ; giảm Ca^{++} , phosphate nước tiểu
- d. Tăng Ca^{++} máu , Ca^{++} nước tiểu , phosphat nước tiểu và làm giảm phosphat máu

Câu 424: Cho sơ đồ: SƠ ĐỒ



Sơ đồ trên đều là vai trò của hormon

- a. PTH
- b. Calcitonin
- c. Aldosteron
- d. Cortisol

Câu 425: Thiếu hormone tuyến cận giáp sẽ làm

- a. Giảm trương lực cơ gây yếu cơ, chậm chạp
- b. Giảm Ca^{++} máu gây co cứng cơ
- c. Tim đập chậm, giảm huyết áp
- d. Giảm hoạt động của hệ thần kinh trung ương gây mệt mỏi, chậm chạp.

Câu 426: Tăng tiết PTH có thể gây ra

- a. Tăng tổng hợp protein
- b. Đa niệu
- c. Nhịp tim nhanh
- d. Loãng xương

Câu 427: Parathormon được bài tiết nhiều khi:

- a. Nồng độ ion phosphat huyết tương tăng
- b. Áp lực thẩm thấu của máu giảm
- c. Nồng độ ion calci huyết tương giảm
- d. Nồng độ calcitonin huyết tương giảm

Câu 428: Nhìn chung PTH có tác dụng ngược lại với hormon

- a. T3-T4
- b. Calcitonin
- c. Insulin
- d. Glucagon

Câu 429: Tái hấp thu Ca^{++} ở ống thận

- a. Xảy ra chủ yếu ở ống lượn xa
- b. Cơ chế vận chuyển thụ động
- c. Được điều hòa bởi PTH ở ống lượn xa
- d. Tất cả đều đúng

CHUYÊN ĐỀ 2 – SINH LÝ THỂ DỊCH – NỘI TIẾT

Bài số 9

SINH LÝ NỘI TIẾT TUYẾN TỤY

Nội dung 1. Hormone Insulin – Glucagon và sự điều hòa glucose máu

Câu 430: Câu nào sau đây đúng với đảo Langerhans?

- a. Có những ống nhỏ dài mang chất tiết của chúng
- b. Bài tiết một dịch chứa men tiêu hóa protein
- c. Được điều hòa bài tiết do vùng dưới đồi và tuyến yên
- d. Nằm xen kẽ và rải rác trong quần thể các nang Actini

Câu 431: Insulin là một polypeptide gồm mấy acid amin?

- a. 15
- b. 51
- c. 29
- d. 14

Câu 432: Glucagon là một polypeptide gồm mấy acid amin?

- a. 15
- b. 51
- c. 29
- d. 14

Câu 433: Tế bào nào của tuyến tụy có chức năng bài tiết insulin?

- a. tế bào α
- b. tế bào β
- c. tế bào δ
- d. tế bào PP

Câu 434: Tác dụng của insulin :

- a. giảm đường huyết, tăng tổng hợp protein, tăng dự trữ lipid
- b. giảm đường huyết, tăng phân giải protein, tăng dự trữ lipid
- c. giảm đường huyết, tăng thoái hóa protein, tăng thoái hóa lipid
- d. tăng đường huyết, tăng tổng hợp protein, tăng dự trữ lipid

Câu 435: Insulin có tác dụng làm tăng :

- a. dự trữ các chất glucid , lipid , protid
- b. thóa hóa các chất glucid , lipid và protid
- c. đường và acid béo trong máu
- d. vận chuyển đường vào tong máu tất cả các mô

Câu 436: Câu nào sau đây **đúng** với tác dụng của insulin?

- a. Biến đổi glycogen thành glucose
- b. Kích thích sinh đường mới
- c. Chuyển glucose thành acid béo ngay sau bữa ăn
- d. Tăng K^+ trong tế bào

Câu 437: Tiêm insulin tĩnh mạch cho con chuột bình thường sẽ gây tác dụng nào sau đây?

- a. Tăng tạo glucose từ glycogen
- b. Tăng tổng hợp glycogen từ glucose
- c. Giảm tổng hợp lipid
- d. Giảm nồng độ protein

Câu 438: Insulin có tác dụng sau đây, ngoại trừ :

- a. tăng phân giải glycogen thành glucose ở gan

- b. tăng thoái hóa glucose ở cơ
- c. giảm tạo đường mới
- d. tăng dự trữ glycogen ở gan và cơ

Câu 439: Insulin đặc biệt cần thiết làm tăng vận chuyển glucose vào tổ chức nào sau đây?

- a. tất cả các mô
- b. niêm mạc ruột non
- c. tế bào ống thận
- d. cơ vân

Câu 440: Câu nào sau đây **đúng** với tác dụng của insulin trên sự vận chuyển glucose?

- a. Cho phép vận chuyển chống lại bậc thang nồng độ
- b. Tăng vận chuyển qua màng tế bào của hầu hết các mô
- c. Tăng vận chuyển qua biểu mô ống thận
- d. Tăng vận chuyển qua biểu mô niêm mạc ruột

Câu 441: Có mấy loại tế bào không cần vai trò của insulin trong việc vận chuyển glucose qua màng?

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 6

Câu 442: Insulin làm tăng sự vận chuyển glucose theo cơ chế khuếch tán hỗ trợ vào các mô sau đây, ngoại trừ :

- a. Mô mỡ
- b. Cơ tim
- c. Cơ vân
- d. Niêm mạc ruột

Câu 443: Nồng độ chất nào trong máu ít ảnh hưởng đến sự bài tiết insulin nhất?

- a. Glucose
- b. Acid amin
- c. Acid béo
- d. Thể ceton

Câu 444: Các yếu tố làm tăng bài tiết insulin, ngoại trừ :

- a. nồng độ glucose trong máu tăng
- b. nồng độ acid béo trong máu tăng
- c. nồng độ acid amin trong máu tăng
- d. kích thích mạnh hệ thần kinh tự chủ (giao cảm và phó giao cảm)

Câu 445: Khi nói về insulin, câu nào sai?

- a. Vận chuyển trong máu dưới dạng tự do
- b. Tổng hợp thông qua cơ chế AMP vòng
- c. Kích thích giao cảm gây tăng tiết insulin
- d. Nồng độ đường máu cao gây tăng tiết insulin

Câu 446: Tác dụng nào sau đây đúng với glucagon?

- a. kích thích phân hủy glycogen trong cơ
- b. ức chế bài tiết insulin
- c. ức chế phospholipase C
- d. kích thích phân hủy glycogen trong gan

Câu 447: Glucagon có tác dụng sau đây, ngoại trừ :

- a. Sinh đường mới ở gan
- b. Tiêu lipid trong mô mỡ
- c. Phân hủy glycogen trong cơ

d. Ngăn cản huy động acid béo từ máu

Câu 448: Trong lao động kéo dài, nhu cầu năng lượng cho cơ vân được cung cấp bởi quá trình :

- a. giải phóng acid béo tự do từ mô mỡ
- b. tăng tiêu glycogen gan
- c. tăng sinh đường mới trong gan
- d. tăng hấp thu acid amin và glucose tại ruột

Câu 449: Yếu tố nào sau đây gây bài tiết glucagon?

- a. Nồng độ acid amin huyết tương thấp
- b. Nồng độ glucose huyết tương thấp
- c. Nồng độ glucose huyết tương cao
- d. Kích thích thần kinh giao cảm

Câu 450: Một số người có hiện tượng hạ đường huyết sau khi ăn sáng khoảng 30-60 phút và không xuất hiện khi họ bỏ bữa sáng. Hiện tượng này là do sự điều hòa đường máu chủ yếu của hormon:

- a. Insulin
- b. Glucagon
- c. GH
- d. Cortisol

Câu 451: Một bệnh nhân có nồng độ glucose 30mg/100ml huyết tương, ưu tiên nghĩ có sự tăng lên của hormon nào?

- a. Insulin
- b. Glucagon
- c. T3-T4
- d. GH

Câu 452: Trong lao động nặng, nồng độ glucagon trong máu tăng cao với ý nghĩa:

- a. Phòng ngừa sự giảm glucose máu trong lao động
- b. Tăng phân giải lipid thành acid béo để thoái hóa sinh năng
- c. Thúc vẩy việc tân tạo đường ở gan rồi thoái hóa để sinh năng
- d. Tăng hấp thu acid amin vào gan để tân tạo đường

Câu 453: Một bữa ăn giàu protein, chứa nhiều acid amin nhưng ít carbohydrat, kích thích bài tiết insulin, nhưng không gây ra giảm đường huyết vì lí do:

- a. bữa ăn gây ra tăng tiết hormone giáp
- b. cortisol trong máu tuần hoàn ngăn cản glucose vào cơ
- c. sự bài tiết glucagon cũng tăng vì bị kích thích do bữa ăn giàu acid amin
- d. acid amin trong bữa ăn biến đổi thành glucose

Câu 454: Chọn tổ hợp đúng a. Nếu 1, 2, 3 đúng b. Nếu 1, 3 đúng
 c. Nếu 2, 4 đúng d. Nếu 4 đúng

Điều hòa glucose máu:

1. Gan đóng vai trò chính trong điều hòa glucose máu
2. Glucose máu tăng gây kích thích tiết insulin
3. Trong điều kiện bình thường, feedback âm của insulin quan trọng hơn glucagon
4. Mức glucose máu giảm kích thích thần kinh phó giao cảm làm tăng đường huyết

Câu 455: Đường huyết tăng và bài xuất ra nước tiểu trong :

- a. Ưu năng tuyến giáp
- b. Teo tiểu đảo Langerhans
- c. U tuyến tụy nội tiết
- d. U tụy thượng thận

Nội dung 3. Liên quan đến bệnh đái tháo đường type 2

Câu 456: Triệu chứng điển hình của bệnh đái đường tụy, ngoại trừ:

- a. Uống nhiều
b. Ăn nhiều
c. Yếu cơ
d. Tăng huyết áp

Câu 457: Trong bệnh đái tháo đường tụy các các biểu hiện sau, **ngoại trừ:**

- a. Mất chất điện giải
b. Giảm nồng độ acid amin trong huyết tương
c. Tăng sinh thể ceton niệu
d. Gây lợi niệu thẩm thấu

Câu 458: Bệnh nhân đái tháo đường type 2 bị đề kháng với insulin, nghĩa là insulin vẫn được sản xuất ra nhưng không chuyển hóa được glucose dẫn đến, **ngoại trừ:**

- Thể ceton trong nước tiểu
- Đường máu qua màng lọc cầu thận vào nước tiểu
- Giảm cảm giác khát nước**
- Máu có thể bị nhiễm toan

Câu 459: Một trong những lời khuyên đối với bệnh nhân đái tháo đường lúc đầu trước khi đến giai đoạn dùng thuốc là nên tập thể dục nhẹ nhàng và thường xuyên để :

- Khi luyện tập, kích thích bài tiết glucagon, làm tăng chuyển glucose thành glycogen dự trữ trong gan và cơ
- Khi luyện tập, có thể làm hạ đường huyết do glucose vào tế bào không cần insulin lúc vận cơ**
- Khi luyện tập, glucose tuần hoàn trong máu tốt hơn đến các tế bào cơ sinh năng lượng
- Khi luyện tập, quá trình vận chuyển glucose đến thận được thúc đẩy, tăng thải đường làm hạ đường huyết

Câu 460: Chọn tổ hợp đúng a. Nếu 1, 2, 3 đúng b. Nếu 1, 3 đúng
c. Nếu 2, 4 đúng d. Nếu 4 đúng

Tiểu đường tuýp 2 phát triển khi cơ thể trở nên kháng với insulin hoặc khi tuyến tụy sản xuất không đủ insulin. Chọn câu đúng:

1. Đường không hấp thu vào được tế bào não dẫn đến thiếu hoạt động hệ thần kinh bị ức chế
2. Thừa cân là yếu tố nguy cơ chính của đái đường type 2
3. Bệnh nhân giảm cảm giác khát và đi tiểu ít thường xuyên hơn
4. Có thể giảm cân mặc dù ăn nhiều hơn bình thường để làm giảm đói

Nội dung 3. Hormon Somatostatin

Câu 461: Câu nào sau đây **chưa đúng** về Somatostatin :

- Có nguồn gốc từ tế bào Delta-Langerhans(10%)
- Ức chế bài tiết insulin , glucagon , gastrin , secretin
- Tăng các hoạt động tiêu hóa : cơ học , bài tiết , hấp thụ**
- Là 1 peptid có 14 acidamin

Câu 462: Somatostatin có các chức năng sau, ngoại trừ:

- Làm tăng tốc độ thức ăn được hấp thu vào máu
- Ức chế sự bài tiết insulin và glucagon của tuyến tụy
- Làm giảm vận động dạ dày, ruột và túi mật

d. Làm giảm bài tiết và hấp thu của đường tiêu hóa

CHUYÊN ĐỀ 2 – SINH LÝ THỂ DỊCH – NỘI TIẾT

Bài số 10

SINH LÝ NỘI TIẾT TUYẾN THƯỢNG THẬN

Nội dung 1. Hormon vỏ thượng thận

Câu 463: Hormon của tuyến thượng thận có tác dụng sinh mạng là :

- a. Adrenalin
- b. Noradrenalin
- c. Cortisol
- d. **Aldosteron**

Câu 464: Nhóm các hormone steroid có chung các đặc điểm sau , ngoại trừ :

- a. Tan được trong dầu , tổng hợp từ cholesterol
- b. Vận chuyển trong máu dưới dạng kết hợp
- c. Có khả năng gây giữ muối và nước
- d. **Tác dụng theo cơ chế thông qua chất truyền tin thứ hai**

Câu 465: Các hormone steroid có chung đặc tính sau

- a. **Tổng hợp dưới dạng tiền chất**
- b. Bài tiết nhanh
- c. Vận chuyển trong máu dưới dạng tự do
- d. Tác dụng nhanh và ngắn

Câu 466: Dạng tiền chất chung của các hormon steroid:

- a. **Cholesterol**
- b. Progessterol
- c. Pregnenolone
- d. 17-OH- Pregnenolone

A. MINERALOCORTICOID (Aldosteron)

Câu 467: Tác dụng của Aldosteron như sau , ngoại trừ :

- a. Tăng tái hấp thụ ion Na^+
- b. Tăng bài tiết ion K^+ , Cl^- ở ống thận
- c. **Làm tăng nồng độ rennin khi tăng tiết**
- d. Tăng huyết áp động mạch

Câu 468: Tăng bài tiết Aldosteron của vỏ thượng thận gây tăng :

- a. Nồng độ Na^+ trong nước tiểu
- b. Nồng độ K^+ trong máu
- c. Nồng độ Cl^- trong nước tiểu
- d. **Nồng độ H^+ trong nước tiểu**

Câu 469: Điểm quan trọng nhất trong hoạt tính của aldosteron là:

- a. **đào thải kali**
- b. tái hấp thu nước
- c. tính kháng viêm
- d. cả ba đều đúng

B. GLUCOCORTICOID (Cortisol)

Câu 470: Cortisol làm tăng đường huyết chủ yếu nhờ tác dụng :

- a. Tăng tạo đường mới ở gan
- b. Giảm thoái hóa glucose ở mô
- c. Tăng phân giải glycogen thành glucose ở gan
- d. Tăng hấp thụ glucose ở ruột

Câu 471: Cortisol có tác dụng chống viêm do các lý do sau đây , ngoại trừ :

- a. Làm tăng số lượng bạch cầu đa nhân trung tính
- b. Làm ổn định màng lysosom do đó ức chế giải phóng men phân giải protein
- c. Ức chế giải phóng histamine , bradykinin
- d. Ức chế tổng hợp prostaglandin

Câu 472: Chọn câu sai về tác dụng kháng viêm của cortisol :

- a. Ổn định màng tiêu thể tế bào
- b. Giảm tính thấm thành mạch
- c. Giảm hóa hướng động và thực bào của bạch cầu
- d. Tăng số lượng lympho và kháng thể

Câu 473: Cơ chế feedback dương trong điều hòa bài tiết cortisol xảy ra trong trường hợp sau:

- a. Hội chứng Cushing do dùng corticoid kéo dài
- b. Cơ thể bị stress
- c. Đường huyết tăng trong bệnh tiểu đường
- d. Bệnh tâm thần phân liệt

Câu 474: Trong cơ chế feedback dương để chống lại tình trạng stress, các hormon sau tăng tiết :

- a. FSH và LH
- b. Calcitonin và PTH
- c. Cortisol và ACTH
- d. T₃-T₄ và TSH

Câu 475: Sử dụng cortisol kéo dài có thể gây ra các biến chứng sau , ngoại trừ :

- a. Loét dạ dày tá tràng
- b. Teo cơ
- c. Bùng phát sẵn bệnh nhiễm trùng , bệnh tâm thần sẵn có
- d. Mất nước và muối qua đường tiết niệu

Câu 476: Hội chứng cushing do lạm dụng corticoid có những triệu chứng, ngoại trừ:

- a. Mất cân đối, bụng béo nhưng tay chân gầy.
- b. Tăng đường huyết.
- c. Nhiễm khuẩn.
- d. Sụt cân

Câu 477: Giảm bài tiết ACTH của tuyến yên , gây teo lớp nào sau đây của vỏ thượng thận :

- a. Cầu, bó, lưới
- b. Cầu, bó
- c. Cầu, lưới
- d. Bó, lưới

Câu 478: Chọn câu sai về hormon vỏ thượng thận :

- a. Một lượng lớn glucocorticoid có thể gây ức chế sự đáp ứng viêm
- b. Giảm sự hình thành Leukotrienes có tác dụng kháng viêm
- c. ACTH chủ yếu tăng sinh ở vùng bó thượng thận
- d. Nhược năng vỏ thượng thận là dấu hiệu bệnh đái đường

Câu 479: Một bé trai được đưa đến khám, có biểu hiện sớm của sự phát triển sinh dục, thử máu thấy đường huyết tăng, có khả năng tuyến nào sau đây bị ưu năng :

- a. Tuyến giáp
- b. Tuyến tụy
- c. **Vỏ thượng thận**
- d. Tủy thượng thận

Câu 480: Sạm da trong bệnh Addison (suy sỏ thượng thận nguyên phát) có liên quan đến Hormon :

- a. GH
- b. TSH
- c. **ACTH**
- d. GnGH

Câu 481: Bệnh nhân bị *nhược năng vỏ thượng thận nguyên phát* mạn tính sẽ có triệu chứng sau liên quan đến *ACTH* :

- a. Rối loạn điện giải
- b. Yếu cơ
- c. **Sạm da**
- d. Hạ huyết áp

Nội dung 2. Hormon tủy thượng thận – Catecholamin

Câu 482: Hormon tủy thượng thận được tổng hợp từ :

- a. **Tyrosin**
- b. Cholesteron
- c. Acid amin
- d. Steroid

Câu 483: Receptor α và β của catecholamin nằm ở:

- a. **Trên màng tế bào**
- b. Trong bào tương tế bào
- c. Trên màng nhân tế bào
- d. Trong nhân tế bào

Câu 484: Adrenalin do tủy thượng thận tiết ra gắn lên receptor α_1 của các tế bào mô cơ trơn thành mạch gây co thắt theo cơ chế:

- a. Hoạt hóa adenyl cyclase
- b. Thông qua hoạt hóa gen tế bào
- c. Ức chế adenyl cyclase
- d. **Kích thích phospholipase C tạo IP_3 và DAG**

Câu 485: Các tác dụng sau của catecholamin . **Ngoại trừ :**

- a. Tăng hoạt động của tim, tăng huyết áp
- b. Hưng phấn về tinh thần
- c. Ly giải glycogen và tân tạo đường
- d. **Co đồng tử**

Câu 486: Hiệu lực tác dụng của Noradrenalin mạnh hơn Adrenalin trên :

- a. Tim
- b. **Huyết áp**
- c. Cơ trơn
- d. Chuyển hóa

Câu 487: Bệnh lý nội tiết sau đây là nguyên nhân gây *tăng huyết áp*:

- a. Đa niệu nhạt (giảm ADH)
- b. Viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto

- c. Suy vỏ thượng thận
- d. U tủy thượng thận

CHUYÊN ĐỀ 2 – SINH LÝ THỂ DỊCH – NỘI TIẾT

Bài số 11

HỆ THỐNG NỘI TIẾT VÀ CÁC HORMONE ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung 1. Các hormon địa phương tác động lên tế bào máu

A – Hormon ảnh hưởng lên hồng cầu

Câu 488: Yếu tố điều hòa số lượng hồng cầu :

- a. Thromboplastin mô
- b. Thrombopoietin
- c. Erythropoietin
- d. Erythrocyte

Câu 489: Erythropoietin:

- a. Do tủy xương chế tiết có vai trò kích thích tủy xương tạo hồng cầu
- b. Do thận chế tiết có vai trò kích thích tủy xương tạo hồng cầu
- c. Do gan chế tiết có vai trò làm tăng huyết áp
- d. Do da chế tiết có vai trò làm tăng hấp thu Ca^{++} ở ruột

B – Hormon ảnh hưởng lên bạch cầu

Câu 490: Cơ chế của shock phản vệ có liên quan đến Hormon :

- a. Serotonin
- b. Histamin
- c. Angiotensin
- d. prostaglandin

Câu 491: Vai trò quan trọng của histamin trong shock do tiêm thuốc gây phản ứng quá mẫn là làm :

- a. Dẫn mạch, tăng tính thấm thành mạch
- b. Giảm sức co bóp cơ tim
- c. Hạ thân nhiệt, lạnh run
- d. Giảm kết tập tiểu cầu

Câu 492: Các hormon sau có tác dụng gây giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch

- a. Renin và Angiotensin
- b. Histamin và Prostaglandin
- c. Vasopressin, Serotonin
- d. Aldosteron, Cortisol

Dùng các ý (cột phải) để trả lời các câu hỏi (cột trái):

Câu 493: Tác dụng chính của cytokin trong chống viêm :

- a. Gây hóa hướng động
- b. Gây ứng động neutrophil

Câu 494: Histamin tác động lên receptor H_1 :

- c. Giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch

Câu 495: Histamin tác động lên receptor H_2 :

- d. Khuếch tán phản ứng miễn dịch

Câu 496: Vai trò của các kinin trong chống viêm:

Câu 497: Thuốc kháng viêm corticoid tác động lên khâu nào trên sơ đồ sinh tổng hợp các prostaglandin

- a. Lipoxygenase

- b. Phospholipase
- c. Cyclo oxygenase
- d. Cytochrom epoxxygenase

Câu 498: Nguyên liệu tổng hợp các eicosanoid có nguồn gốc :

- a. Tổng hợp từ nhân tế bào
- b. Phân giải từ màng tế bào
- c. Ngoại bào
- d. Từ mạng lưới nội chất hạt

Câu 499: Leucotrien:

- a. được giải phóng nhiều trong choáng phản vệ
- b. gây tăng tính thấm thành mạch lớn hơn histamin nhiều lần
- c. ức chế hóa ứng động và làm bền màng tiêu thể
- d. gây dẫn mạch, điều hòa huyết áp, cầm máu

Câu 500: Các hormon sau có tác dụng kháng viêm, ngoại trừ :

- a. Adiponectin
- b. Prostaglandin
- c. Histamin
- d. Leptin

C – Hormon ảnh hưởng lên tiểu cầu

Câu 501: Hormon kích thích làm tăng số lượng tiểu cầu có nguồn gốc :

- a. Tế bào biểu mô quanh ống thận
- b. Tế bào gan
- c. Dưỡng bào, bạch cầu ưa acid hay base
- d. Cả a và b đúng

Câu 502: Hormon tác động lên tiểu cầu có nguồn gốc từ gia đình eicosanoid, ngoại trừ:

- a. Prothrompoietin
- b. Prostacyclin
- c. Thromboxan A2
- d. Cả b và c đúng

Nội dung 2. Các hormon của hệ tiêu hóa

Câu 503: Các hormon địa phương của hệ tiêu hóa đều có bản chất hóa học :

- a. Steroid
- b. Glycoprotein
- c. Polypeptid
- d. Dẫn xuất acid amin

Câu 504: Các hormon sau gây kích thích bài tiết dịch mật:

- a. Gastrin, secretin
- b. Secretin, cholecystokinin
- c. Secretin
- d. Bombesin

Câu 505: Cặp hormon địa phương hệ tiêu hóa có tác dụng đối kháng:

- a. Bombesin và VIP
- b. Bombesin và secretin
- c. Secretin và gastrin
- d. Secretin và cholecystokinin

Câu 506: Hormon sau đây ức chế bài tiết dịch tiêu hóa?

- a. Gastrin
- b. Secretin

- c. Cholecystokinin
- d. VIP

Câu 507: Hormon sau làm tăng hấp thu Ca^{++} ở ruột :

- a. Vitamin D3
- b. Protein gắn tế bào trong xương
- c. Gla-protein
- d. Các yếu tố tăng trưởng

Dùng các ý (cột phải) để trả lời các câu hỏi (cột trái):

- | | |
|---|------------------|
| Câu 508: Ưc chế tế bào thành tiết HCl | a. Histamin |
| Câu 509: Tác dụng thông qua thụ thể Muscarinic | b. Prostaglandin |
| Câu 510: Tác dụng thông qua thụ thể H_2 | c. Somatostatin |
| Câu 511: Kích thích bài tiết HCO_3^- | d. Acetylcholin |

Câu 512: Các yếu tố sau đây có tác dụng lên bài tiết acid HCl của dạ dày:

- a. Histamin
- b. Acetylcholin
- c. Gastrin
- d. secretin

Nội dung 3. Các hormon ảnh hưởng lên tim mạch

Câu 513: Câu nào sau đây **đúng** với renin:

- a. Renin được bài tiết bởi tế bào cầu thận
- b. Tăng huyết áp động mạch thận gây kích thích sự bài tiết renin
- c. Renin biến đổi angiotensinogen thành angiotensin I
- d. Renin biến đổi angiotensin I thành angiotensin II

Câu 514: Tác dụng của hệ thống RAA, ngoại trừ:

- a. Gây khát
- b. Tăng tái hấp thu muối nước
- c. Gây dẫn mạch
- d. Tăng tiết ADH và aldosteron

Câu 515: Hormon sau đây được bài tiết từ sự căng lên của thành tâm nhĩ:

- a. Angiotensin II
- b. ANP
- c. Endothelin
- d. NO

Câu 516: Nhóm gia đình các Hormone sau có tác dụng làm giảm huyết áp

- a. ANP, BNP, CNP
- b. Renin, angiotensin, aldosteron
- c. Các prostaglandin
- d. Các hormone steroid

Câu 517: Chất đối kháng với NO trong tác dụng sinh lý là

- a. Endothelin
- b. ANP
- c. ADH
- d. Renin-angiotensin

Câu 518: Chất gây co mạch *mạnh nhất* so với các chất còn lại:

- a. Catecholamin
- b. Vassopressin
- c. Renin-angiotensin
- d. Endothelin

Câu 519: Các chất có tác dụng lên điều hòa huyết áp do có tác dụng lên mạch máu và đồng thời tác dụng lên tái hấp thụ ở ống thận là :

- a. Adrenalin và Noradrenalin
- b. Serotonin và Bradykinin
- c. Angiotensin II và Vasopressin
- d. Prostaglandin và Angiotensin

CHUYÊN ĐỀ 2 – SINH LÝ THỂ DỊCH – NỘI TIẾT

Bài số 12

MỘT SỐ CÂU HỎI TỔNG HỢP VỀ HOẠT CHẤT SINH HỌC VÀ CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

Nội dung 1. Tổng kết về nguồn gốc của hormon

Câu 520: Câu nào sau đây đúng với tuyến nội tiết và hormone được sản xuất:

- a. Tuyến cận giáp – Calcitonin
- b. Tuyến yên sau – Vasopressin
- c. Vùng dưới đồi – Hormone giải phóng LH
- d. Tuyến thượng thận – Aldosterone

Câu 521: Các hormon đóng vai trò sinh mạng lần lượt do hai tuyến nội tiết nào tiết ra?

- a. Tuyến cận giáp và tuyến thượng thận
- b. Tuyến giáp và tuyến thượng thận
- c. Tuyến cận giáp và tuyến yên
- d. Tuyến giáp và tuyến cận giáp

Câu 522: Hormon nào sau đây là hormon địa phương?

- a. Cortisol
- b. Calcitonin
- c. Serotonin
- d. Renin

Câu 523: Các hormon sau do thận tiết ra, ngoại trừ:

- a. Calcitonin
- b. Erythropoietin
- c. Renin
- d. Aldosterol

Dùng các câu trả lời sau cho các câu bên dưới, chọn câu đúng nhất

- a. Nhân bụng giữa
- b. Nhân lưng giữa
- c. Nhân trên chéo thị giác
- d. Nhân trước thị giác

Câu 524: Tổn thương nhân nào ở vùng dưới đồi làm giảm bài tiết Cortisol?

Câu 525: Tổn thương nhân nào ở vùng dưới đồi làm giảm bài tiết Vasopressin?

Câu 526: Tổn thương nhân nào ở vùng dưới đồi gây béo phì ?

Nội dung 2. Tổng kết các hormone theo tính tan và các tính chất liên quan

Câu 527: Các hormone do tuyến nội tiết sau đều có bản chất peptid hoặc polypeptid:

- a. Tuyến cận giáp
- b. Tuyến giáp
- c. Tuyến yên

d. Tuyến thượng thận

Câu 528: Hormon có bản chất steroid, ngoại trừ:

- a. Cortisol
- b. Estrogen
- c. Vitamin D3
- d. Endothelin

Câu 529: Hormon dẫn xuất từ amin là :

- a. Testosterone, progesteron, mineralo corticoid
- b. Insulin, glucagon, adrenalin
- c. Adrenalin, noradrenalin, histamin, thyroid hormone
- d. Oxytocin, vasopressin, FSH

Câu 530: Hormone sau tan được trong nước, ngoại trừ:

- a. Catecholamin
- b. Prolactin
- c. T3-T4
- d. Erythropoietin

Câu 531: Hormone sau có receptor nằm trong tế bào:

- a. FSH
- b. PTH
- c. Prolactin
- d. Cortisol

Câu 532: Các hormone có receptor nằm trên tế bào đích :

- a. GH, ACTH, prolactin
- b. Aldosteron, corticoid
- c. Estrogen, progesteron, testosterone
- d. T3, T4

Câu 533: Các hormone sau đây đều có tác dụng đặc hiệu lên một mô đích , trừ :

- a. GH
- b. Prolactin
- c. ACTH
- d. TSH

Câu 534: Hormone nào sau đây có receptor nằm trong nhân tế bào?

- a. GH
- b. T3-T4
- c. PTH
- d. Aldosteron

Câu 535: Hormon sau tác động thông qua chất truyền tin thứ 2

- a. T3-T4
- b. Aldosteron
- c. Insulin
- d. Cortisol

Câu 536: Hormon có hệ thống tác dụng trên hệ thống gen của tế bào là :

- a. Vasopressine
- b. Cortisol
- c. Calcitonin
- d. Glucagon

Câu 537: Các hormone sau tác dụng theo cơ chế AMPc, ngoại trừ:

- a. Histamin
- b. ADH
- c. ACTH
- d. Troponin C

Câu 538: Hormon sau đây có tác dụng trái ngược nhau phụ thuộc vào loại receptor:

- a. Mineralocorticoid
- b. Glucocorticoid
- c. Androgen
- d. Catecholamin

Nội dung 3. Tổng kết các hormone theo chức năng đáp ứng sinh lý

A – Tác dụng lên sự chuyển hóa năng lượng và chuyển hóa các chất

Câu 539: Hormon sau đây đều làm tăng chuyển hóa năng lượng bằng cơ chế thể dịch, ngoại trừ:

- a. T3, T4
- b. cortisol
- c. Aldosteron
- d. GH

Câu 540: Hormon có tác dụng biệt hóa tế bào?

- a. GH
- b. Cortisol
- c. Catecholamin
- d. T3, T4

Câu 541: Hormone nào sau đây không có tác dụng trên sự phát triển cơ thể ?

- a. GH
- b. T4
- c. Testosteron
- d. Vasopressin

Câu 542: Các hormon sau đối lập với insulin trong việc hấp thụ glucose vào tế bào, ngoại trừ

- a. GH và cortisol
- b. Glucagon và catecholamin
- c. T3 và T4
- d. ADH và angiotensin

Câu 543: Tăng đường huyết là tác dụng chính của hormone nào trong các hormone sau:

- a. Insulin
- b. GH
- c. Glucagon
- d. Cortisol

Câu 544: Giảm đường huyết gây kích thích bài tiết các hormone sau , Ngoại trừ :

- a. Insulin
- b. Glucagon
- c. GH
- d. Catecholamin

Câu 545: Trên một con vật bình thường, **không** gây tăng đường huyết nếu :

- a. Tiêm tinh chất tủy thượng thận
- b. Tiêm GH
- c. Cắt bỏ tuyến tụy
- d. Cắt bỏ tuyến giáp

Câu 546: Hormon sau có tác dụng điều hòa đường huyết bằng cách kiểm soát sự ngon miệng và tích trữ năng lượng :

- a. GH
- b. Insulin
- c. Cortisol
- d. Leptin

Câu 547: Bệnh tiểu đường có thể xảy ra do rối loạn các hormone sau , ngoại trừ :

- a. GH
- b. Insulin
- c. Cortisol
- d. Aldosteron

Câu 548: Các Hormon sau làm tăng thoái hóa Lipid ở mô dự trữ, ngoại trừ

- a. GH
- b. T₃-T₄
- c. Insulin
- d. Catecholamin

Câu 549: Các hormon làm tăng tổng hợp protein, ngoại trừ

- a. GH
- b. Glucagon
- c. Insulin
- d. T₃-T₄ thời kì tăng trưởng

Câu 550: Chọn câu không đúng :

- a. Epinephrine : Tăng phân giải glycogen ở cơ vân
- b. Glucagon : Tăng tổng hợp glucose
- c. Insulin : Tăng tổng hợp Protein
- d. Progesterone : Tăng nồng độ glucose máu

B – Các hormone tác động lên hệ xương

Câu 551: Nhóm các hormone sau ảnh hưởng có lợi trên hệ xương

- a. Nhóm các hormone steroid, PTH và glucagon
- b. Nhóm các hormone tiền yên, Oxytocin , ADH
- c. Nhóm các hormone sinh dục, Calcitonin , GH
- d. Nhóm các hormone vỏ thượng thận và catecholamine

Câu 552: Các yếu tố sau có tác dụng kích thích sự hấp thụ Ca⁺⁺ . NGOẠI TRỪ :

- a. Hormone tuyến cận giáp
- b. Citric acid
- c. Phosphat
- d. 1,25-dihydroxycholecalciferol

Câu 553: Hạ calci máu kéo dài có liên quan đến

- a. Suy tuyến giáp
- b. Suy tuyến cận giáp
- c. Suy tuyến yên
- d. Suy tuyến thượng thận

Câu 554: Lạm dụng thuốc nào sau đây có thể dẫn đến loãng xương :

- a. Calcitonin
- b. Vitamin D
- c. Insulin
- d. Corticoid

C – Các hormon tác động lên hệ tim mạch

Câu 555: Các hormone sau gây tăng nhịp tim của *một cách trực tiếp*, **ngoại trừ**:

- a. T3, T4 của tuyến giáp
- b. Catecholamin của tủy thượng thận
- c. Glucagon nồng độ cao của tuyến tụy
- d. **Hydrocortison của vỏ thượng thận**

Câu 556: Nhóm các hormone có đều tác dụng làm tăng huyết áp:

- a. GH , TSH , ACTH
- b. **ADH , Angiotensin II , Catecholamin**
- c. Insulin , Glucagon , Cortisol
- d. PTH , Calcitonin , Vitamin D

Câu 557: Các hormon gây co mạch, tăng huyết áp, **ngoại trừ**:

- a. ADH
- b. Renin, agiotensin
- c. **Calcitonin**
- d. catecholamin

Câu 558: Các chất sau đây có tác dụng gây giãn mạch, **ngoại trừ**:

- a. Bradykinin
- b. Histamin
- c. Prostaglandin
- d. **Serotonin**

Câu 559: Chọn tổ hợp đúng a. Nếu 1, 2, 3 đúng b. Nếu 1, 3 đúng
 c. Nếu 2, 4 đúng d. Nếu 4 đúng

- 1. Hệ thống RAA chỉ kích hoạt khi thể tích dịch ngoại bào giảm
- 2. Vassopressin ở liều cao mới có tác dụng gây co mạch
- 3. Endothelin gây co mạch mạnh hơn so với angiotensin và ADH
- 4. Các natriuretic ANP tiết ra khi thành tim bị căng có tác dụng co mạch tăng huyết áp

D – Các hormon tác động lên hệ tiết niệu và sự xuất nhập muối nước

Câu 560: Nhóm hormon có tác dụng gây giữ muối và nước:

- a. Acid amin
- b. Peptid
- c. Glucoprotein
- d. **Steroid**

Câu 561: Các hormon sau đây **không** trực tiếp gây giữ muối và nước:

- a. Aldosteron và cortisol
- b. **FSH và LH**
- c. Estrogen và progesteron
- d. Dehydroepiandrosteron và testosterone

Câu 562: Các hormon sau có tác dụng lên chuyển hóa muối và nước , **NGOẠI TRỪ** :

- a. Aldosteron
- b. Cortisol
- c. ADH
- d. **Oxytocin**

CHUYÊN ĐỀ 3 – SINH LÝ HỆ SINH DỤC

Bài số 13

SINH LÝ SINH DỤC NAM

Nội dung 1. Chức năng của tinh hoàn

A – Chức năng ngoại tiết : Sản xuất tinh trùng

Câu 563: Mỗi ngày trung bình có 120 triệu tinh trùng được tạo ra ở :

- a. Tế bào Leydig
- b. Ống sinh tinh
- c. Mào tinh
- d. Túi tinh

Câu 564: Chọn phát biểu **sai**:

- a. Quá trình sản sinh tinh trùng xảy ra ở ống sinh tinh.
- b. Sự thành thực của tinh trùng xảy ra ở mào tinh.
- c. Dự trữ tinh trùng ở túi tinh.
- d. Tinh trùng bắt đầu hoạt động khi được phóng xuất vào đường sinh dục nữ.

Câu 565: Dấu hiệu nào sau đây đánh dấu *sự trưởng thành* của tinh trùng:

- a. Bắt đầu hình thành đầy đủ cấu trúc: đầu, đuôi.
- b. Có khả năng tự dinh dưỡng.
- c. Có khả năng di động theo đường thẳng.
- d. Xâm nhập được vào noãn.

Câu 566: Dấu hiệu nào sau đây cho thấy tinh trùng đã trưởng thành

- a. Có đầy đủ đầu và đuôi
- b. Có khả năng di động
- c. Được dự trữ đủ 1 tháng
- d. Được phóng thích cùng với dịch tuyến tiền liệt và túi tinh

Câu 567: Sự thành thực của tinh trùng xảy ra ở:

- a. ống sinh tinh
- b. mào tinh
- c. túi tinh
- d. ống dẫn tinh

Câu 568: Trình trùng thật sự di động ở :

- a. ống phóng tinh
- b. túi tinh
- c. mào tinh
- d. ống dẫn tinh

Câu 569: Tốc độ di chuyển trung bình của tinh trùng:

- a. 1-2 mm/ phút
- b. 3-4 mm/ phút
- c. 5-10 mm/ phút
- d. 10-15 mm/ phút

Câu 570: Tinh trùng trưởng thành được dự trữ trong dịch của

- a. Mào tinh
- b. Ống dẫn tinh
- c. Túi tinh
- d. Tiền liệt tuyến

Câu 571: Nếu không thụ tinh, tinh trùng có thể duy trì khả năng thụ tinh trong:

- a. 1 tháng
- b. 2 tháng
- c. 3 tháng
- d. 4 tháng

Câu 572: Chọn câu sai

- a. Tinh trùng được dự trữ dưới dạng hoạt động ở ống dẫn tinh
- b. Tinh trùng có khả năng di động từ khi ở mào tinh
- c. Nếu sau 1 tháng không phóng tinh thì tinh trùng ở ống dẫn tinh sẽ chết đi
- d. Tiến trình sản sinh tinh trùng mới từ mầm tế bào nguyên thủy là 74 ngày

Câu 573: Tinh trùng trưởng thành dự trữ hormon nào sau đây vừa được tiết ra ở dạ dày vừa được tiết ra ở ruột non?

- a. Cholecystokinin
- b. Histamin
- c. Somatostatin
- d. secretin

Câu 574: Các yếu tố sau đây ảnh hưởng lên hoạt động của tinh trùng trong đường sinh dục nữ, NGOẠI TRỪ

- a. Glycogen
- b. Prostaglandin
- c. Nhiệt độ
- d. pH dịch âm đạo

Câu 575: Yếu tố làm tăng hoạt động của tinh trùng (tinh trùng hoạt động trong điều kiện)

- a. Nhiệt độ 37°C , pH trung tính hoặc hơi kiềm
- b. Nhiệt độ 32°C , pH trung tính hoặc hơi kiềm
- c. Nhiệt độ 37°C , pH acid
- d. Nhiệt độ 32°C , pH acid

Câu 576: Cho tinh dịch vào môi trường có nhiệt độ 37°C , pH trung tính, tinh trùng sẽ:

- a. Hoạt động mạnh
- b. Tạm ngưng hoạt động
- c. Biến dạng
- d. Bị giết chết

Câu 577: Tinh hoàn được đưa từ ổ bụng xuống bìu trong thời kỳ bào thai để đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho việc:

- a. Sản sinh tinh trùng
- b. Hoạt động của tinh trùng
- c. Tổng hợp hormon
- d. Tạo pH tinh dịch

Câu 578: Tách tinh trùng ra khỏi tinh dịch và cho vào môi trường có nhiệt độ 37°C , pH acid, tinh trùng có thể, ngoại trừ:

- a. Hoạt động mạnh
- b. Giảm hoạt động
- c. Ngưng hoạt động
- d. Bị giết chết

Câu 579: Các tác nhân sau có thể dẫn đến giảm sản sinh tinh trùng, ngoại trừ:

- a. Rượu, ma túy, tia X, tia phóng xạ.
- b. Căng thẳng tinh thần kéo dài.
- c. Kháng thể có sẵn trong máu.

d. Virus quai bị.

B – Chức năng nội tiết : Sản xuất hormon sinh dục nam Testosteron

Câu 580: Testosteron:

- a. Nguồn gốc: tế bào sertoli
- b. Bản chất: peptid
- c. Vận chuyển trong máu: dạng tự do là chủ yếu
- d. Điều hoà bài tiết bởi HCG và LH

Câu 581: Các tác dụng sau của testosteron mạnh hơn của estrogen, ngoại trừ:

- a. Đồng hoá protein
- b. Tăng chuyển hoá cơ bản
- c. Tăng số lượng hồng cầu
- d. Cốt hoá sụn liên hợp ở các đầu xương

Câu 582: Tác dụng nào sau đây **không phải** của testosteron:

- a. Biệt hoá đường sinh dục nam
- b. Đưa tinh hoàn từ ổ bụng xuống bìu
- c. Đồng hoá protein
- d. Phát triển khung chậu theo chiều ngang

Câu 583: Hormon sau có tác dụng trực tiếp lên sự sản sinh tinh trùng:

- a. GnRH
- b. FSH
- c. LH
- d. Inhibin

Câu 584: Tác dụng của Inhibin do tinh trùng sản xuất

- a. Ức chế bài tiết FSH
- b. Ức chế bài tiết GnRH
- c. Kích thích bài tiết LH
- d. Kích thích bài tiết testosteron

Câu 585: Sự bài tiết FSH của thùy trước tiết yên ở người nam bị ức chế bởi tác dụng điều hòa ngược của

- a. LH.
- b. Inhibin.
- c. Testosteron.
- d. GnRH.

Câu 586: Hormon inhibin do tế bào nào tiết ra?

- a. Tế bào leydic tiết ra
- b. Tế bào sertoli tiết ra
- c. Tế bào giai đoạn đầu thai kỳ tiết ra
- d. Cả a và b đúng

Chọn tổ hợp đúng ở cột trái và cột phải

Câu 587: Hormon GnRH :

a. Kích thích sản sinh tinh trùng

Câu 588: Hormon LH

b. Kích thích tế bào Leydic bài tiết testosteron

Câu 589: Hormon FSH

c. Kích thích tuyến yên bài tiết kích dục tố

Câu 590: Hormon Testosteron

d. Kích thích phát triển ống sinh tinh và tế bào

Câu 591: Hormon Somatomedin

Sertoli

(c-d-b-a-a)

Nội dung 2. Hoạt động sinh dục nam

A – Hiện tượng cương dương và hiện tượng phóng tinh

Câu 592: Hiện tượng cương và phóng tinh đều có các đặc điểm sau, **ngoại trừ:**

- a. Là những phản xạ có trung tâm nằm ở tuỷ sống
- b. Chịu sự chi phối của hệ thần kinh thực vật
- c. **Biểu hiện trên sự co giãn cơ trơn ở bộ máy sinh dục**
- d. Ước chế được bởi tác động có ý thức từ vỏ não

Câu 593: Đáp ứng của phản xạ di chuyển tinh dịch vào niệu đạo là:

- a. Dẫn các tiểu động mạch ở dương vật
- b. Co cơ trơn ống sinh tinh và mào tinh
- c. **Co cơ trơn ống dẫn tinh và các tuyến phụ thuộc**
- d. Co các cơ tại hành lang

B – Hoạt động của các tuyến phụ thuộc

Câu 594: Thành phần chính của dịch túi tinh:

- a. **Fructose, fibrinogen, prostaglandin**
- b. Acid citric, Ca^{++}
- c. Enzym đông đặc, tiền fibrinolysin, prostaglandin
- d. Fibrinogen, enzym đông đặc, prostaglandin

Câu 595: Chức năng của dịch túi tinh, **ngoại trừ:**

- a. Đẩy tinh trùng ra khỏi niệu đạo
- b. Gây đông nhẹ tinh dịch ngay sau phóng tinh làm tăng tiếp nhận tinh trùng
- c. **Làm loãng tinh dịch trở lại sau 15-30 phút**
- d. Dinh dưỡng cho tinh trùng

Câu 596: Chức năng của prostaglandin trong tinh dịch:

- a. Đông nhẹ tinh dịch ngay sau phóng tinh
- b. Loãng tinh dịch trở lại sau 15-30 phút
- c. **Giúp tinh trùng di chuyển về loa vòi trứng**
- d. Bảo vệ tinh trùng trong đường sinh dục nữ

Câu 597: Chức năng của fibrinolysin trong tinh dịch:

- a. Đông nhẹ tinh dịch ngay sau phóng tinh
- b. **Loãng tinh dịch trở lại sau 15-30 phút**
- c. Giúp tinh trùng di chuyển về loa vòi trứng
- d. Bảo vệ tinh trùng trong đường sinh dục nữ

Câu 598: Fibrinogen trong dịch túi tinh có vai trò:

- a. Dinh dưỡng cho tinh trùng
- b. Đẩy tinh trùng ra khỏi niệu đạo
- c. **Tăng tiếp nhận tinh trùng**
- d. Giúp tinh trùng di chuyển về phía loa vòi trứng

Câu 599: Chức năng của dịch tiền liệt tuyến, **ngoại trừ:**

- a. Gây đông nhẹ tinh dịch ngay sau phóng tinh làm tăng tiếp nhận tinh trùng
- b. Làm loãng tinh dịch trở lại sau 15-30 phút
- c. **Dinh dưỡng cho tinh trùng**
- d. Bảo vệ tinh trùng và giúp tinh trùng di chuyển về loa vòi trứng

C – Tinh dịch

Câu 600: Tinh dịch là một hỗn hợp gồm:

- a. **10% ống dẫn tinh, 60% dịch túi tinh, 30% dịch tiền liệt tuyến**
- b. 30% ống dẫn tinh, 60% dịch túi tinh, 10% dịch tiền liệt tuyến
- c. 60% ống dẫn tinh, 30% dịch túi tinh, 10% dịch tiền liệt tuyến

- d. 60% ống dẫn tinh, 10% dịch túi tinh, 30% dịch tiền liệt tuyến

Câu 601: Tiêu chuẩn tinh dịch bình thường của WHO:

- a. pH tinh dịch < 7
- b. Số lượng tinh trùng ≥ 20 triệu/ml
- c. Tinh trùng di động tiến tới $\geq 40\%$
- d. Tỷ lệ tinh trùng sống $\geq 58\%$

Câu 602: Theo tiêu chuẩn của WHO tỷ lệ *tinh trùng sống* trong mẫu tinh dịch phải đạt trên

- a. 75%
- b. 50%
- c. 30%
- d. 20%

Câu 603: Theo tiêu chuẩn của WHO tỷ lệ *tinh trùng khỏe* trong mẫu tinh dịch phải đạt trên

- a. 75%
- b. 50%
- c. 30%
- d. 20%

Câu 604: Theo tiêu chuẩn của WHO thể tích tinh dịch một lần phóng tinh phải đạt trên

- a. 2 mL
- b. 3 mL
- c. 4 mL
- d. 5 mL

Câu 605: Một người nam được coi là vô sinh khi trong 1ml tinh dịch có số lượng tinh trùng cao nhất là:

- a. 100 triệu.
- b. 20 triệu.
- c. 10 triệu.
- d. 1 triệu.

CHUYÊN ĐỀ 3 – SINH LÝ HỆ SINH DỤC

Bài số 14

SINH LÝ SINH DỤC NỮ

Nội dung 1. Vấn đề liên quan đến nang trứng

Câu 606: Giai đoạn nang trứng :

- a. Từ ngày 1 đến ngày 5 trong chu kỳ kinh nguyệt
- b. Nang trứng phát triển bắt đầu từ ngày thứ 6 của chu kỳ kinh nguyệt
- c. Lớp áo trong tiết chủ yếu là progesteron
- d. Hóc chứa dịch bên trong nang trứng đẩy noãn về trung tâm của nang

Câu 607: Thời điểm nang trứng nguyên thủy phát triển tạo thành nang trứng sơ cấp là ngày thứ mấy của chu kỳ kinh nguyệt?

- a. Ngày 1 – 2
- b. Ngày 6 – 8
- c. Ngày 9 – 10
- d. Ngày 12 – 13

Câu 608: Thời điểm nang trứng bắt đầu tiết estrogen ?

- a. Ngày 1 – 2
- b. Ngày 6 – 8
- c. Ngày 9 – 10
- d. Ngày 12 – 13

Câu 609: Trong nang trứng phát triển, estrogen được bài tiết ra từ :

- a. Lớp áo ngoài
- b. Lớp áo trong
- c. Noãn
- d. Tất cả đều đúng

Câu 610: Cơ chế phóng noãn có liên quan trực tiếp đến hormon :

- a. FSH
- b. LH
- c. Estrogen
- d. Progesteron

Câu 611: Cơ chế phóng noãn có liên quan thứ cấp đối với hormon :

- a. Estrogen
- b. Progesteron
- c. FSH
- d. LH

Câu 612: Cơ chế của progesteron gây phóng noãn :

- a. Feedback dương lên tuyến yên và hypothalamus
- b. Làm tăng bài tiết estrogen và tạo đỉnh FSH/LH
- c. Làm tăng tiết men phân giải protein và prostaglandin
- d. Kích thích loa vòi trứng cử động và tạo lực hút trứng

Câu 613: Nồng độ estrogen tăng cao và giữa chu kỳ kinh có tác dụng :

- a. Feedback (+) lên tuyến yên
- b. Feedback (-) lên tuyến yên
- c. Không ảnh hưởng đến tuyến yên
- d. Làm giảm nồng độ FSH và LH trong máu

Câu 614: Hiện tượng phóng noãn xảy ra khoảng bao nhiêu ngày trước ngày hành kinh của chu kỳ sau

- a. 10 – 12 ngày
- b. 14 – 16 ngày
- c. 7 – 8 ngày
- d. 21 – 22 ngày

Câu 615: Một người phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt 32 ngày, thời điểm rụng trứng có thể nằm trong khoảng những ngày nào trong chu kỳ?

- a. Ngày thứ 16 của chu kỳ.
- b. Ngày thứ 12 – 16 của chu kỳ.
- c. Ngày thứ 16 – 20 của chu kỳ.
- d. Ngày thứ 14 của chu kỳ.

Câu 616: Về phương diện nội tiết, hiện tượng phóng noãn là hậu quả của việc:

- a. Giảm bài tiết FSH và LH, giảm bài tiết estrogen và progesteron
- b. Giảm bài tiết FSH và LH, tăng bài tiết estrogen và progesteron
- c. Tăng bài tiết FSH và LH, giảm bài tiết estrogen và progesteron
- d. Tăng bài tiết FSH và LH, tăng bài tiết estrogen và progesteron

Câu 617: Hiện tượng rụng trứng:

- a. Được chẩn đoán tốt nhất bằng đo nồng độ FSH thấy tăng
- b. Xảy ra khi nồng độ LH tăng cao trong máu
- c. Thường kèm với giảm thân nhiệt
- d. Xảy ra ở cả hai buồng trứng trong cùng một chu kỳ

Câu 618: Hiện tượng nào sau đây xảy ra sau khi rụng trứng?

- a. Nồng độ progesterone trong huyết tương giảm
- b. Nội mạc tử cung chuyển sang dạng xuất tiết
- c. Chất nhầy cổ tử cung giảm dần
- d. LH bắt đầu được tiết

Câu 619: Dấu hiệu sau cho thấy trứng đã rụng:

- a. Phiên đồ niêm dịch cổ tử cung mất hình ảnh cây dương xỉ
- b. Thân nhiệt giảm
- c. Biểu mô âm đạo mỏng
- d. Tử cung co bóp nhiều

Câu 620: Trong thời gian từ ngày 14-21 của chu kỳ kinh, ở buồng trứng có :

- a. Nang trứng nguyên thủy.
- b. Nang trứng phát triển.
- c. Hoàng thể phát triển.
- d. Hoàng thể thoái hóa .

Câu 621: Vào cuối giai đoạn bài tiết (giai đoạn hoàng thể) ở buồng trứng có hiện tượng:

- a. Phóng noãn và hình thành hoàng thể.
- b. Hoàng thể phát triển mạnh nhất, bài tiết nhiều progesteron và estrogen.
- c. Hoàng thể thoái hoá giảm bài tiết estrogen và progesteron.
- d. Hoàng thể biến mất để lại sẹo và nang trứng bắt đầu phát triển.

Câu 622: Câu nào sau đây đều đúng với nang trứng ở người, NGOẠI TRỪ:

- a. Được tạo thành từ lúc dậy thì và tồn tại vài năm.
- b. Hầu hết bị teo đi.
- c. Phóng noãn và tạo thể vàng.
- d. Biến mất lúc mãn kinh.

Nội dung 2. Vấn đề liên quan đến hoàng thể

Câu 623: Hoàng thể được hình thành từ :

- a. Các hợp bào được hình thành từ
- b. Các nang trứng bị thoái hóa
- c. Phần còn lại của nang trứng sau khi phóng noãn
- d. Các tế bào Leydig

Câu 624: Khi không có thai, đời sống hoàng thể kéo dài :

- a. 6 – 8 ngày
- b. 8 – 10 ngày
- c. 10 – 12 ngày
- d. 12 – 14 ngày

Câu 625: Tính theo chu kỳ kinh nguyệt, hoàng thể phát triển to nhất vào ngày thứ mấy ?

- a. 7 – 8
- b. 12 – 16
- c. 21 – 22
- d. 14 – 28

Câu 626: Các hormon do hoàng thể bài tiết:

- a. FSH và LH
- b. Progesteron và estrogen
- c. HCG
- d. GnRH

Câu 627: Hormon nào có tác dụng duy trì sự phát triển của hoàng thể?

- a. Estrogen
- b. HCG
- c. LH
- d. Progesteron

Câu 628: Hoàng thể :

- a. Được hình thành sau khi rụng trứng
- b. Được duy trì trong thời gian mang thai nhờ hormon FSH
- c. Bị thoái biến nếu có thụ tinh
- d. Bị thoái biến dưới tác dụng của prolactin

Câu 629: Sau khi có thai hoàng thể phát triển tối đa vào :

- a. Ngày 14
- b. Tháng 3
- c. Tháng 4
- d. Chuyển dạ

Nội dung 3. Vấn đề liên quan đến nội mạc tử cung

Câu 630: So với nửa đầu chu kỳ kinh nguyệt, nội mạc tử cung ở nửa sau có :

- a. Kích thước dày hơn
- b. Các động mạch xoắn hơn
- c. Các tuyến thẳng hơn
- d. Bài tiết dịch hơn

Câu 631: So với nửa đầu chu kỳ kinh nguyệt, kinh nguyệt tử cung ở nửa sau có:

- a. Chiều dày mỏng hơn

- b. Co bóp mạnh hơn
- c. Các động mạch thẳng hơn
- d. Các tuyến cong queo hơn

Câu 632: So với nửa sau chu kỳ kinh nguyệt, cơ thể ở nửa đầu chu kỳ có:

- a. Thân nhiệt cao hơn
- b. Niêm dịch cổ tử cung quánh hơn
- c. Các tuyến niêm mạc tử cung thẳng hơn
- d. Thủy tuyến có phát triển hơn

Câu 633: Niêm mạc tử cung dày nhất ở ngày nào?

- a. Ngày 12 – 16
- b. Ngày 14
- c. Ngày 21 – 22
- d. Ngày 28

Câu 634: Nội mạc tử cung dày 5-6mm, các tuyến bài tiết “sữa tử cung”, động mạch xoắn cho thấy tử cung đang ở điểm :

- a. Hành kinh
- b. Nửa đầu chu kỳ kinh nguyệt
- c. Phóng noãn
- d. Nửa sau chu kỳ kinh nguyệt

Câu 635: Dưới tác dụng của estrogen, niêm dịch cổ tử cung loãng hơn có ý nghĩa:

- a. Giúp cho tinh trùng di chuyển dễ dàng
- b. Nuôi dưỡng tinh trùng
- c. Đào thải các chất lạ xâm nhập
- d. Kích thích tử cung co bóp

Câu 636: Chọn câu sai.

- a. Niêm mạc tử cung mỏng nhất vào thời kỳ hành kinh
- b. Khi đạt đến đỉnh LH/FSH = 1/3 thì nang trứng chín
- c. LH có tác dụng kích thích nang trứng tiết ra progesteron thúc đẩy sự phóng noãn
- d. Sau khi phóng noãn, niêm mạc tử cung vẫn tiếp tục dày lên

Câu 637: Niêm mạc tử cung lớp chức năng bắt đầu bị thoái hóa vào thời điểm

- a. Hành kinh
- b. Phóng noãn
- c. 5 – 6 ngày sau phóng noãn
- d. Cuối chu kỳ kinh nguyệt

Câu 638: Niêm mạc tử cung lớp chức năng bị thoái hóa thật sự vào thời điểm

- a. Ngày 21-22 của chu kỳ kinh nguyệt
- b. Phóng noãn
- c. Hành kinh
- d. Cuối chu kỳ kinh nguyệt

Câu 639: Niêm mạc tử cung lớp chức năng bị thoái hóa bắt đầu từ :

- a. Ngừng tiết dịch “sữa tử cung”
- b. Co mạch ở giữa lớp nền và lớp chức năng
- c. Tróc các tế bào biểu mô lát tầng
- d. Co mạch giữa giữa các lớp chức năng

Nội dung 4. Vấn đề liên quan đến hành kinh và máu kinh nguyệt

Câu 640: Trong chu kỳ kinh nguyệt, thời kỳ hành kinh kéo dài ;

- a. Từ ngày 1-5
- b. Từ ngày 14-28
- c. Từ ngày 12-16
- d. Từ ngày 5-14

Câu 641: Ở nữ, nồng độ các hormon sinh dục và hướng sinh dục thấp nhất vào thời điểm :

- a. **Hành kinh**
- b. Nửa đầu chu kỳ kinh nguyệt
- c. Lúc phóng noãn
- d. Nửa sau chu kỳ kinh nguyệt

Câu 642: Trong chu kỳ kinh nguyệt, giai đoạn hành kinh là giai đoạn:

- a. Mở đầu những thay đổi ở niêm mạc tử cung
- b. **Kết thúc những biến đổi ở niêm mạc tử cung**
- c. Đánh dấu sự rụng trứng
- d. Đánh dấu sự hình thành hoàng thể

Câu 643: Chọn **câu sai** về tính chất của máu kinh nguyệt:

- a. Khoảng 30-80ml/lần hành kinh
- b. **Chủ yếu là máu tĩnh mạch**
- c. Màu đỏ sẫm, không đông
- d. Lẫn nhiều tạp chất

Câu 644: Máu kinh nguyệt có các tính chất sau, **ngoại trừ**:

- a. Có lẫn nhiều tạp khuẩn
- b. **Màu đỏ sẫm, đông lại sau 5-7 phút**
- c. Chủ yếu là máu động mạch
- d. Khoảng 30-80ml/phút từ ngày 1-5 trong chu kỳ kinh nguyệt

Nội dung 5. Các hormon sinh dục nữ

Câu 645: Các hormon sinh dục có bản chất là:

- a. Acid amin
- b. Peptid
- c. **Steroid**
- d. Acid béo

Câu 646: Nguồn gốc của estrogen:

- a. Tủy thượng thận
- b. Quá trình thom hóa ở ngoại vi từ pregnandiol
- c. Thùy trước tuyến yên
- d. **Vỏ thượng thận**

Câu 647: Nguồn gốc của estrogen, **ngoại trừ**:

- a. Hoàng thể
- b. Nhau thai
- c. Các tế bào hạt lớp áo trong của nang trứng
- d. **Tất cả sai**

Câu 648: Estrogen có chung nguồn gốc tổng hợp với

- a. **Aldosteron**
- b. Catecholamin
- c. Glucagon
- d. LH

Câu 649: Nguồn gốc của estrogen được tổng hợp từ

- a. **Cholesterol và acetyl CoA**

- b. Cholesterol và prostaglandin
- c. Androgen và cholesterol
- d. Androgen và prostaglandin

Câu 650: Dạng estrogen chính lưu hành trong máu :

- a. Estron
- b. 17- β Estradiol
- c. Estriol
- d. Tất cả đều đúng

Câu 651: Hiệu lực tác dụng của β -estradiol mạnh hơn estron gấp:

- a. 3 lần
- b. 12 lần
- c. 24 lần
- d. 80 lần

Câu 652: Tác dụng của estrogen, ngoại trừ:

- a. Làm tế bào biểu mô của niêm mạc cổ tử cung bài tiết dịch trong, dai và loãng
- b. Làm chất nhầy cổ tử cung khi kéo lam, để khô sẽ có hình ảnh “cây dương xỉ”
- c. Làm giảm co bóp nội mạc tử cung
- d. Phát triển hệ thống ống tuyến và mô đệm ở tuyến vú

Câu 653: Estrogen có các tác dụng sau, ngoại trừ:

- a. Làm phát triển cơ tử cung
- b. Tăng hoạt động của các tế bào biểu mô lông rung vòi trứng
- c. Làm xương chậu phát triển thành hình ống
- d. Tăng lắng đọng mỡ dưới da, giảm cholesterol máu

Câu 654: Estrogen có tác dụng sau, ngoại trừ:

- a. Tăng hoạt động các tế bào lông rung ở vòi trứng
- b. Phát triển các thùy và các tuyến sữa ở tuyến vú
- c. Làm tăng tổng hợp protein ở tử cung, tuyến vú và xương
- d. Tăng hoạt động xương, phát triển khung chậu theo chiều ngang

Câu 655: Câu nào sau đây đúng với estrogen?

- a. Kích thích sự phát triển và bài tiết của tuyến niêm mạc tử cung
- b. Làm cốt hóa sụn đầu xương
- c. Tăng bài tiết Na^+ và nước ở các ống thận
- d. Tăng hoạt động của các hủy cốt bào

Câu 656: Tác dụng của estrogen trên âm đạo:

- a. Sừng hoá biểu mô và bài tiết dịch base bảo vệ tinh trùng
- b. Ngăn sừng hoá biểu mô chống ung thư và bài tiết dịch ưa base
- c. Sừng hoá biểu mô và bài tiết dịch acid chống đỡ với chấn thương và nhiễm trùng
- d. Ngăn sừng hoá biểu mô và bài tiết dịch acid bảo vệ đường sinh dục

Câu 657: Các đặc tính sinh dục nữ thứ phát được hình thành do tác dụng của hormon:

- a. Estrogen
- b. Progesterone
- c. Aldosterone
- d. Androgen

Câu 658: Cơ chế feedback dương trong điều hòa bài tiết estrogen xảy ra vào thời điểm :

- a. Hành kinh
- b. Nửa đầu chu kỳ kinh nguyệt
- c. Giữa chu kỳ kinh nguyệt
- d. Nửa sau chu kỳ kinh nguyệt

Câu 659: Progesteron được bài tiết từ, ngoại trừ:

- a. Tế bào hạt nang trứng
- b. Hoàng thể
- c. Tuyến vỏ thượng thận
- d. Quá trình thom hóa ở ngoại vi

Câu 660: Progesteron có tác dụng :

- a. Làm giảm cholesterol máu
- b. Làm tăng hoạt động của các tế bào tạo xương
- c. Làm thành âm đạo dày và tiết dịch có tính acid
- d. Làm tăng thân nhiệt lên $0,3 - 0,5^{\circ}\text{C}$

Câu 661: Progesterone có các tác dụng sau, ngoại trừ:

- a. Làm giảm co bóp tử cung
- b. Làm tăng bài tiết dịch có chứa chất dinh dưỡng ở vòi trứng
- c. Làm phát triển thùy và nang tuyến vú
- d. Làm giảm thân nhiệt $0,3-0,5^{\circ}\text{C}$

Câu 662: Tác dụng của progesteron, ngoại trừ:

- a. Tăng kích thước cơ tử cung
- b. Giảm co bóp tử cung
- c. Tăng thân nhiệt
- d. Phát triển thùy và nang tuyến vú

Câu 663: Câu nào sau đây **đúng** với progesterone?

- a. Làm chất nhầy cổ tử cung loãng, tinh trùng dễ di chuyển
- b. Làm niêm mạc ống dẫn trứng tiết các chất dinh dưỡng để nuôi trứng
- c. Làm phát triển các ống dẫn của tuyến sữa
- d. Được tổng hợp từ pregnandiol

Câu 664: Chọn câu **sai** về progessteron

- a. Chủ yếu làm dày niêm mạc tử cung ở giai đoạn hoàng thể
- b. Làm tăng co bóp cơ tử cung
- c. Làm phát triển thùy và nang tuyến vú
- d. Làm tăng tái hấp thu muối nước ở ống lượn xa

Câu 665: Progessteron có tác dụng:

- a. Làm dày niêm mạc tử cung chậm hơn tốc độ dài động mạch nuôi
- b. Làm cho các tế bào biểu mô niêm mạc cổ tử cung tiết dịch trong, dai, loãng
- c. Làm giảm thân nhiệt cơ thể lên khoảng $0,3 - 0,5^{\circ}\text{C}$
- d. Làm tăng hoạt động các lớp tế bào có lông niêm mạc vòi trứng

Câu 666: Nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt và thai nghén thân nhiệt cũng như chuyển hóa cơ sở đều tăng chủ yếu là do tăng hormon:

- a. estrogen
- b. FSH
- c. LH
- d. progessteron

Câu 667: Progessteron có vai trò quan trọng trong thời kỳ mang thai. Tất cả các hoạt động sau cần có progessterone, ngoại trừ:


- a. Kích thích co thắt tử cung
- b. Phát triển thùy và nang tuyến vú
- c. Phát triển niêm mạc tử cung
- d. Làm niêm mạc vòi trứng tiết chất dinh dưỡng

Nội dung 6. Biến thiên nồng độ các hormon liên quan đến sinh dục trong huyết tương


Câu 668: Nồng độ LH trong huyết tương của người phụ nữ *cao nhất* vào thời điểm

- a. Trước khi rụng trứng
- b. Sau khi rụng trứng
- c. Trước khi hành kinh
- d. Sau khi hành kinh


Câu 669: Trong sơ đồ sau rụng trứng vào thời điểm :



Câu 670: Đường biểu diễn nào mô tả sự thay đổi nồng độ estrogen trong chu kỳ kinh nguyệt?



Câu 671: Trong sơ đồ sau rụng trứng vào thời điểm:



Câu 672: Biểu đồ nồng độ hormon sau đây trong chu kỳ kinh nguyệt có hai đỉnh

- a. FSH
- b. LH
- c. Estrogen

d. Progesteron

Câu 673: Số liệu nào sau đây **sai**:

- a. β -estrogen mạnh hơn estron 12 lần
- b. Tỷ lệ FSH/LH trong phóng noãn là 1/3
- c. HCG xuất hiện trong máu vào ngày thứ 8-9 của thai kỳ
- d. Trong giai đoạn hoàng thể, nồng độ LH > FSH

CHUYÊN ĐỀ 3 – SINH LÝ HỆ SINH DỤC

Bài số 15

SINH LÝ SINH SẢN

Nội dung 1. Dậy thì và mãn dục

Câu 674: Nói về thời kỳ dậy thì:

- a. Buồng trứng bắt đầu bài tiết HCG
- b. Cơ chế dậy thì được giả thuyết là do sự chín của hệ viển
- c. Bắt đầu phát triển chiều cao và trọng lượng
- d. Dậy thì thật sự được đánh dấu bằng lần có kinh đầu tiên

Câu 675: Chọn câu **sai**. Lần có kinh đầu tiên của các bé gái:

- a. Đang có xu hướng xuất hiện càng sớm
- b. Đánh dấu bắt đầu giai đoạn dậy thì
- c. Thường rơi vào khoảng 13 – 14 tuổi
- d. Đánh dấu hoàn thành giai đoạn dậy thì

Câu 676: Thời điểm bắt đầu dậy thì ở nam là khi thể tích dịch tinh hoàn

- a. > 2ml
- b. > 3ml
- c. > 4ml
- d. > 5ml

Câu 677: Thời kỳ mãn kinh:

- a. Các cơ quan sinh dục teo nhỏ, thoái hoá
- b. Tăng nguy cơ bệnh lý đường sinh dục
- c. Các chức năng khác của cơ thể cũng suy giảm
- d. Các tuyến nội tiết tăng bài tiết hormon

Câu 678: Tuổi mãn kinh của người phụ nữ thường được dao động trong khoảng :

- a. 40-45 tuổi
- b. 45-55 tuổi
- c. 55-60 tuổi
- d. Trên 60 tuổi

Câu 679: Thời kỳ mãn kinh:

- a. Hoạt động sinh sản chấm dứt
- b. Nồng độ các hormon sinh dục nữ giảm xuống rất thấp
- c. Chu kì kinh nguyệt thưa dần rồi hết hẳn
- d. Buồng trứng vẫn duy trì được chức năng

Câu 680: Chọn câu sai. Hiện tượng mãn dục :

- a. Ở phụ nữ thường trẻ hơn so với nam giới
- b. Ở nam biểu hiện tình dục giảm dần rồi chấm dứt hoàn toàn
- c. Kéo theo nhiều nguy cơ bệnh lý tim mạch, béo phì, đái tháo đường ở phụ nữ
- d. Ở nữ là lúc buồng trứng ngừng hoạt động, không rụng trứng, dứt kinh

Câu 681: Ở phụ nữ, mãn kinh thật sự được chẩn đoán :

- a. Mất 1 lần hành kinh
- b. Sau 6 tháng vô kinh
- c. Sau 12 tháng vô kinh
- d. Sau 24 tháng vô kinh

Câu 682: Phụ nữ mãn kinh có những nguy cơ bệnh lý sau do thiếu estrogen, ngoại trừ:

- a. xơ vữa động mạch
- b. loãng xương
- c. nhiễm trùng đường tiết niệu
- d. hạ đường huyết

Nội dung 2. Một số vấn đề về sự thụ thai, mang thai, chuyển dạ và thời kỳ hậu sản

Câu 683: Khả năng thụ thai của tinh trùng sau khi phóng thích không quá :

- a. 12 giờ
- b. 24 giờ
- c. 48 giờ
- d. 72 giờ

Câu 684: Khả năng thụ tinh của trứng sau khi phóng kéo dài :

- a. 1 ngày
- b. 2 ngày
- c. 3 ngày
- d. 4 ngày

Câu 685: Bình thường sự thụ tinh xảy ra ở :

- a. Trên bề mặt buồng trứng
- b. 1/3 ngoài vòi trứng
- c. Đáy tử cung
- d. Cổ tử cung

Câu 686: Sự thụ tinh ở người:

- a. Xảy ra 5 ngày sau khi rụng trứng
- b. Bình thường xảy ra ở loa vòi
- c. Hợp tử tạo thành di chuyển ngay vào buồng trứng tử cung để làm tổ
- d. Do sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

Câu 687: Bình thường, phôi phát triển thành thai ở :

- a. 1/3 ngoài vòi tử cung
- b. Loa vòi tử cung
- c. Cổ tử cung
- d. Niêm mạc trong lòng tử cung

Câu 688: Chọn câu **sai**. Thai ngoài tử cung :

- a. Nguyên nhân hàng đầu là viêm nhiễm vòi trứng
- b. Ngoài tử cung, thai chỉ có thể bám trong vòi trứng
- c. Dễ vỡ gây xuất huyết, nguy hiểm tính mạng
- d. Có thể do nạo phá thai nhiều lần

Câu 689: Các biến đổi ở đường sinh dục nữ có ý nghĩa giữ cho trứng đã thụ tinh làm tổ xảy ra trong :

- a. Giai đoạn tăng sinh dưới tác dụng chủ yếu của estrogen
- b. Giai đoạn phân tiết dưới tác dụng chủ yếu của estrogen
- c. Giai đoạn tăng sinh dưới tác dụng chủ yếu của progesteron
- d. Giai đoạn phân tiết dưới tác dụng chủ yếu của progesteron

Câu 690: Trong thai kỳ:

- a. Tất cả các hormon đều được tăng tiết
- b. Hoàng thể dễ được duy trì đến khi sinh để giữ thai
- c. Nồng độ HCG luôn hằng định
- d. Nhu cầu tiêu thụ các chất dinh dưỡng tăng

Câu 691: Chọn câu sai. Trong thời kỳ mang thai, đáp ứng của người mẹ:

- a. Tăng thông khí hô hấp
- b. Tăng thể tích máu
- c. Tăng cung lượng tim
- d. Tăng bài tiết nước tiểu

Câu 692: Theo nhu cầu dinh dưỡng, chế độ ăn phù hợp cho thai kỳ:

- a. Chủ yếu protein
- b. Chủ yếu lipid
- c. Chủ yếu glucid SDA
- d. Chế độ ăn hỗn hợp SDA

Câu 693: Chọn câu sai. Trong một thai kỳ

- a. Sự tồn tại của hoàng thể được duy trì bằng HCG do tế bào lá nuôi nhau thai tiết ra
- b. Trong 2 tuần đầu, thai phát triển nhờ dinh dưỡng của dịch tiết ra từ nội mạc tử cung
- c. Tế bào lá nuôi nhau thai tồn tại cho đến khoảng tuần thứ 10-12 của thai kỳ
- d. Lượng progesteron và estrogen tăng dần cho đến khi chuyển dạ sinh con

Câu 694: Nguyên nhân gây co tử cung, ngoại trừ:

- a. Do lượng progesteron nhiều hơn estrogen tăng gây co bóp tử cung
- b. Do oxytocin làm co bóp tử cung được kích thích bởi progesteron
- c. Do thai cử động kích thích làm co tử cung
- d. Do feedback dương xảy ra khi đầu em bé thúc xuống cổ tử cung

Câu 695: Khi chuyển dạ sinh con, hoàng thể và nhau thai:

- a. Tiết Estrogen ít hơn progesteron
- b. Tiết Estrogen nhiều hơn progesteron
- c. Giảm tiết progesteron
- d. Chỉ tiết estrogen

Câu 696: Chế độ dinh dưỡng thời kỳ hậu sản :

- a. Chủ yếu protein
- b. Chủ yếu lipid
- c. Chủ yếu glucid
- d. Hỗn hợp

Nội dung 3. Một số vấn đề về các hormon trong thời kỳ mang thai

Câu 697: Hormon do tế bào lá nuôi nhau thai tiết ra :

- a. HCS
- b. HCG
- c. Relaxin
- d. Progesteron

Câu 698: Hormon nào sau đây được nhau thai tiết ra sớm nhất :

- a. HCG
- b. Estrogen và progesteron
- c. Relaxin
- d. HCS

Câu 699: HCG bắt đầu xuất hiện trong nước tiểu vào thời điểm :

- a. 8-9 ngày sau khi thụ tinh
- b. 14 ngày sau khi thụ tinh
- c. Tuần thứ 10-12 của thai kỳ
- d. Tuần thứ 16-20 của thai kỳ

Câu 700: Que thử thai là test chẩn đoán nhanh sự thụ thai phát hiện định tính nồng độ cao hormone nào trong nước tiểu?

- a. LH
- b. FSH
- c. HCG
- d. HCS

Câu 701: HCG có nồng độ cao nhất vào thời điểm sau khi thụ tinh:

- a. 7 – 8 ngày
- b. 14 ngày
- c. 10 – 12 ngày
- d. 16 tuần

Câu 702: Tiêm HCG vào máu của thỏ, sau 24 đến 48 giờ quan sát thấy hiện tượng, ngoại trừ:

- a. Kích thích buồng trứng to gấp 2-3 lần
- b. Buồng trứng màu đỏ sẫm, sung huyết
- c. Buồng trứng bị nứt, tràn dịch ra ngoài
- d. Bề mặt buồng trứng gồ ghề

Câu 703: Chất hóa học của tình yêu :

- a. Relaxin
- b. Oxytocin
- c. Progessteron
- d. Estrogen

Câu 704: Tác dụng của hormon sau trong thời kì mang thai là SAI

- a. HCG ngăn hoàng thể thoái hóa
- b. Relaxin làm mềm tử cung, bảo vệ thai
- c. HCS có tác dụng tăng trưởng giống GH
- d. Estrogen và Progesteron làm phát triển tuyến vú

Câu 705: Chọn câu sai. Cuối thai kỳ:

- a. Estrogen tăng gấp 3 lần so với bình thường
- b. Thân nhiệt tăng 0,3 – 0,5⁰C
- c. Tử cung đặc biệt nhạy cảm đối với oxytocin
- d. Relaxin làm giãn cổ tử cung cho chuyển dạ

Câu 706: Hormon đóng vai trò là hormon trợ thai:

- a. Estrogen
- b. Relaxin
- c. HCS
- d. Progessteron

Câu 707: Progesteron thường có trong thuốc trợ thai bởi vì :

- a. Giúp cho tinh trùng và trứng gặp nhau
- b. Làm giảm co bóp tử cung và phát triển niêm mạc tử cung
- c. Làm xuất hiện và bảo tồn các đặc tính sinh dục nữ thứ phát
- d. Giúp phát triển tuyến vú để tạo sữa nuôi con

Ghép ý thích hợp ở cột trái và phải. Khi nói về vai trò của hormon trong sự phát triển tuyến vú

Câu 708: Estrogen

a. Làm phát triển thùy và nang tuyến sữa

Câu 709: Progessteron

b. Đẩy sữa từ ống tuyến sữa bài xuất ra ngoài

Câu 710: Prolactin

c. Kích thích sữa tuyến vào lòng nang sữa

Câu 711: Oxytocin

d. Làm phát triển hệ thống ống sữa

(1d – 2a – 3c – 4b)

Câu 712: Chọn câu sai

- a. Động tác mút núm vú ở trẻ kích thích bài tiết oxytocin
- b. Rượu, thuốc lá đều làm giảm tiết oxytocin
- c. Tiếng khóc của trẻ kích thích quá trình tạo sữa
- d. Các stress có thể làm tăng tiết oxytocin

Nội dung 3. Cơ sở sinh lý của các biện pháp tránh thai

Câu 713: Cơ sở sinh lý của biện pháp tránh thai bằng thuốc tránh thai (thành phần progestin và estrogen) là:

- a. Feedback âm lên sự bài tiết FSH và LH của tuyến yên gây ức chế phóng noãn
- b. Kích thích bài tiết estrogen gây phù nề mô đệm và giảm tiết dịch tử cung
- c. Kích thích bài tiết progesteron gây giảm tiết dịch nhầy cổ tử cung và teo mỏng nội tử cung
- d. Giữ nồng độ estrogen và progesteron cao trong máu gây feedback dương lên sự bài tiết FSH và LH

Câu 714: Cơ chế sinh lý của thuốc tránh thai dạng vi 21 viên là:

- a. Tạo phản ứng miễn dịch ở tử cung ngăn hiện tượng làm tổ
- b. Làm giảm khả năng di chuyển của tinh trùng
- c. Tạo feedback âm lên trục vùng hạ đồi-tuyến yên-tuyến sinh dục
- d. Giảm khả năng thụ thai của trứng và tinh trùng

Câu 715: Cơ sở sinh lý về tác dụng của vòng tránh thai là:

- a. Ngăn cản trứng đã thụ tinh làm tổ
- b. Ngăn cản trứng thụ tinh với tinh trùng
- c. Ngăn cản quá trình rụng trứng
- d. Ngăn cản phôi phát triển thành nhau thai

Câu 716: Theo phương pháp sinh đẻ kế hoạch *Kyusaku Ogino* và *Hermann Knaus*, ngày giao hợp an toàn trong chu kỳ kinh nguyệt là:

- a. Ngày thứ 6 – 8 và 18 – 28
- b. Ngày thứ 8 – 10 và 17 – 28
- c. Ngày thứ 10 – 12 và 15 – 28
- d. Ngày thứ 6 – 13 và 15 – 28

Câu 717: Cơ sở sinh lý của biện pháp tránh thai bằng phương pháp *Kyusaku Ogino* và *Hermann Knaus*:

- a. Phóng noãn cho ngày thứ 12-16 trước kỳ kinh tiếp theo; khả năng thụ tinh của trứng tối đa là 24 giờ, của tinh trùng là 72 giờ.
- b. Phóng noãn cho ngày thứ 12-16 trước kỳ kinh tiếp theo; khả năng thụ tinh của trứng tối đa là 72 giờ, của tinh trùng là 24 giờ.
- c. Phóng noãn cho ngày thứ 14 trước kỳ kinh tiếp theo; khả năng thụ tinh của trứng tối đa là 24 giờ, của tinh trùng là 72 giờ.
- d. Phóng noãn cho ngày thứ 14 trước kỳ kinh tiếp theo; khả năng thụ tinh của trứng tối đa là 48 giờ, của tinh trùng là 72 giờ.

Câu 718: Phương pháp tránh thai *Kyusaku Ogino* và *Herman Khaus* cần lưu ý những điều kiện sau, ngoại trừ:

- a. Khả năng sống và thụ tinh của tinh trùng, noãn
- b. Tính chất của chu kỳ kinh nguyệt đều hay không
- c. Trạng thái cảm xúc
- d. Tần số giao hợp

CHUYÊN ĐỀ 4 – SINH LÝ MÁU

Bài số 16

SINH LÝ HỒNG CẦU NHÓM MÁU

Nội dung 1. Sự sản sinh hồng cầu

A – Quá trình tạo hồng cầu

Câu 719: Phân loại các tế bào máu, ngoại trừ

- a. Lớp tế bào gốc
- b. Lớp các tế bào tăng sinh và biệt hóa
- c. Lớp các tế bào thực hiện chức năng
- d. **Lớp tế bào hủy nhân**

Câu 720: Sự tạo máu đầu tiên ở thời kỳ phôi thai diễn ra ở cơ quan nào

- a. **Túi noãn hoàng**
- b. Gan
- c. Lách
- d. Hạch

Câu 721: Cơ quan tạo máu đầu tiên :

- a. **Gan**
- b. Lách
- c. Hạch
- d. Tủy xương

Câu 722: Trong tháng thứ 3 ở thời kỳ bào thai, quá trình sản sinh hồng cầu được thực hiện ở

- a. **Gan và lách**
- b. Tủy xương
- c. Mạch máu
- d. Lá thai giữa

Câu 723: Tủy xương là nơi duy nhất sản sinh hồng cầu vào tháng thứ mấy của thai kỳ :

- a. Tháng thứ 2
- b. Tháng thứ 3
- c. Tháng thứ 4
- d. **Tháng thứ 5**

Câu 724: Câu nào sau đây **không đúng** khi nói về vị trí tạo máu trong điều kiện bình thường?

- a. Gan là cơ quan tạo máu chính trong giai đoạn bào thai
- b. Tủy xương tham gia tạo máu bắt đầu từ tháng thứ 5 của thai, kéo dài đến sau đẻ và thời kỳ trưởng thành
- c. **Thời kỳ sau sinh, các xương dài không còn khả năng tạo máu**
- d. Sự tạo máu chỉ diễn ra ở phần tủy đỏ của xương gồm nhiều trung tâm tạo máu có màu đỏ

Câu 725: Chọn câu **sai** : Sau 20 tuổi, tủy xương khu trú phần lớn ở :

- a. Xương sống
- b. Xương sườn
- c. Xương sọ
- d. **Xương đùi**

Câu 726: Trong quá trình sản sinh hồng cầu:

- a. **Kích thước hồng cầu giảm dần**
- b. Kích thước hồng cầu tăng dần
- c. Kích thước hồng cầu không thay đổi

d. Kích thước hồng cầu tăng rồi giảm

Câu 727: Sự tổng hợp Hemoglobin bắt đầu từ giai đoạn nào ?

- a. Tiền nguyên hồng cầu
- b. Nguyên hồng cầu ưa base
- c. Nguyên hồng cầu ưa acid
- d. Hồng cầu lưới

Câu 728: Tham gia vào quá trình tạo hồng cầu của 1 người đàn ông 30 tuổi

- a. Tuỷ của tất cả các xương là nơi sản xuất hồng cầu
- b. Erythropoietin kích thích tăng sản xuất hồng cầu
- c. Cần vitamin B₁₂ để tổng hợp hemoglobin
- d. Cả ba đều đúng

Câu 729: Thứ tự tăng dần mức sinh sản hồng cầu là?

- a. Người trưởng thành , trẻ em , người già
- b. Trẻ em , người trưởng thành , người già
- c. Người già , người trưởng thành , trẻ em
- d. Người trưởng thành , người già , trẻ em

Câu 730: Suy giảm chức năng cơ quan nào sau đây **không** liên quan đến quá trình sản sinh hồng cầu

- a. Thận
- b. Gan
- c. Tụy
- d. Dạ dày

B – Hồng cầu và các chất cấu tạo

Câu 731: Các chất cần thiết cho sự thành lập hồng cầu , ngoại trừ :

- a. Acid folic
- b. Vitamin B12
- c. Sắt
- d. Thrombopoietin

Câu 732: Vitamin B12 được dự trữ trong

- a. Tuỷ xương
- b. Tụy
- c. Lách
- d. Gan

Câu 733: Ở người gan dự trữ B12 gấp bao nhiêu lần so với nhu cầu hàng ngày ?

- a. 500 lần
- b. 1000 lần
- c. 1500 lần
- d. 2000 lần

Câu 734: Vitamin B12 kết hợp với yếu tố nội tại sẽ được bảo vệ khỏi sự phá hủy các men ở :

- a. Gan
- b. lách
- c. dạ dày
- d. Ruột

Câu 735: Các nguyên nhân thường gặp gây thiếu vitamin B12, NGOẠI TRỪ:

- a. Cắt dạ dày
- b. Viêm teo niêm mạc dạ dày
- c. Ăn chay trường
- d. Viêm hồi tràng

Câu 736: Vitamin B12 được cung cấp từ những loại thức ăn nào sau đây?

- a. Củ dền, đậu xanh, thịt bò
- b. Củ dền, rau xanh, thịt bò
- c. Trứng, sữa, thịt bò
- d. Cá, rau xanh, thịt gà

Câu 737: Thiếu Vitamin B12 sẽ dẫn đến

- a. Không sản sinh được hồng cầu
- b. Ngưng biệt hóa hồng cầu
- c. Hồng cầu không trưởng thành
- d. Hồng cầu không có khả năng chuyên chở oxi

Câu 738: Thiếu máu đại hồng cầu thứ phát do thiếu vitamin B₁₂ sẽ đáp ứng với điều trị bằng yếu tố nội tại, trường hợp này gây ra bởi.

- a. Cắt dạ dày.
- b. Cắt lách.
- c. Suy gan.
- d. Suy tủy.

Câu 739: Acid folic hấp thụ ở ruột dưới thể :

- a. Glutamat
- b. Monoglutamat
- c. Glucuronic
- d. Diglutamat

Câu 740: Acid folic có đặc điểm nào sau đây:

- a. Là một vitamin tan trong dầu
- b. Không có nhiều trong mô động vật
- c. Nhu cầu hàng ngày cần 50-100 microgam
- d. Hấp thụ ở ruột mà chủ yếu là tá tràng

Câu 741: Thiếu acid folic gây ra

- a. Thiếu máu hồng cầu to
- b. Thiếu màu hồng cầu nhỏ
- c. Thiếu máu ác tính
- d. Thiếu máu nhược sắc

Câu 742: Vai trò của sắt trong quá trình tạo máu:

- a. Tạo nên hình dạng đặc trưng của hồng cầu
- b. Thành lập nhân hồng cầu
- c. Cấu tạo heme
- d. Là thành phần các hạt của tiểu cầu

Câu 743: Nhu cầu sắt trong ngày là bao nhiêu?

- a. 0,6mg/ngày
- b. 0,9mg/ngày
- c. 1,1mg/ngày
- d. 1,3mg/ngày

Câu 744: Khi hấp thụ tại dạ dày, hầu hết sắt chuyển thành dạng Fe⁺⁺ nhờ dịch vị dạ dày và:

- a. Vitamin B2
- b. Vitamin B12
- c. Vitamin C
- d. Vitamin A

Câu 745: Sắt được dự trữ trong cơ thể dưới dạng nào sau đây ?

- a. Transferrin
- b. Heme
- c. Ferritin
- d. Myoglobin

Câu 746: Các yếu tố sau có tác dụng kích thích hấp thu Fe^{++} , NGOẠI TRỪ

- a. Trữ lượng sắt cơ thể giảm
- b. Acid ascorbic
- c. Phytic acid
- d. Tăng sản xuất hồng cầu

Câu 747: Thiếu máu do thiếu sắt

- a. Thiếu máu nhược sắt, hồng cầu nhỏ
- b. Thiếu máu ưu sắt, hồng cầu nhỏ
- c. Thiếu máu nhược sắt, hồng cầu to
- d. Thiếu máu ưu sắt, hồng cầu to

Câu 748: Một bệnh nhân được chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt do thiếu cung cấp, nhóm thức ăn nào nên dùng trong các loại sau:

- a. Thịt gà, cá, đậu
- b. Thịt bò, gan, đậu
- c. Cá, gan, rau
- d. Rau, thịt bò, thịt gà

Dùng các ý sau để trả lời các câu hỏi bên dưới

Câu 749: Quá trình hấp thu sắt

a. Hồi tràng

Câu 750: Quá trình hấp thu vitamin B12

b. Hồi tràng

Câu 751: Quá trình hấp thu acid folic

c. Tá tràng

Câu 752: Yếu tố nội tại cần thiết cho sự hấp thu vitamin B12 có nguồn gốc từ

d. Dạ dày

(c-a-b-d)

Câu 753: Thiếu máu nhược sắc do :

- a. Thiếu acid folic
- b. suy tủy
- c. Thiếu chất sắt
- d. Thiếu protein

Câu 754: Thiếu máu ác tính do

- a. Cơ thể không hấp thụ được vitamin B12
- b. Thiếu sự bài tiết các yếu tố nội tại
- c. Thiếu sự bài tiết erythropoietin của thận
- d. a và b đúng

Câu 755: Nguyên nhân dẫn đến thiếu máu ác tính, NGOẠI TRỪ:

- a. Thiếu vitamin B12
- b. Viêm teo niêm mạc dạ dày
- c. Thiếu cung cấp chất sắt trong thời gian dài
- d. Cắt bỏ dạ dày toàn bộ mà không tiêm B12 thường xuyên

Nội dung 2. Đặc điểm chung của hồng cầu

A – Hình dạng hồng cầu

Câu 756: Hình dạng của hồng cầu trưởng thành là

- a. Hình cầu, lõm 2 mặt, có nhân
- b. Hình cầu, lõm 2 mặt, không có nhân
- c. Hình đĩa, lõm 2 mặt, có nhân
- d. Hình đĩa, lõm 2 mặt, không có nhân

Câu 757: Hồng cầu :

- a. Là những tế bào có nhân, hình đĩa, lõm hai mặt
- b. Là những tế bào có nhân, hình đĩa, kích thước 7-8 μm
- c. Là những tế bào không nhân, hình cầu, kích thước 7-8 μm
- d. Là những tế bào không nhân, hình đĩa, kích thước 7-8 μm

Câu 758: Hồng cầu :

- a. Là các tế bào có nhân , hình đĩa lõm 2 mặt
- b. Có kích thước từ $5-6.10^{-6}\text{m}$
- c. Là các tế bào không có nhân , hình đĩa lõm hai mặt . Có kích thước từ $7-8.10^{-6}\text{m}$
- d. Tất cả đều sai

Câu 759: Nguyên nhân giúp hình đĩa lõm hai mặt của hồng cầu thích hợp với khả năng vận chuyển khí, **NGOẠI TRỪ**:

- a. Tăng diện tích tiếp xúc
- b. Tăng tốc độ khuếch tán
- c. Tăng vận tốc của hồng cầu khi lưu hành trong lòng mạch
- d. Giúp hồng cầu biến dạng dễ dàng khi xuyên qua các mao mạch nhỏ

Câu 760: Chọn tổ hợp đúng a. Nếu 1, 2, 3 đúng b. Nếu 1, 3 đúng

 c. Nếu 2, 4 đúng d. Nếu 4 đúng

Hình dạng hồng cầu thích hợp với khả năng vận chuyển khí vì:

- 1. Làm giảm diện tích tiếp xúc.
- 2. Làm tăng tốc độ khuếch tán khí.
- 3. Làm tăng phân ly HbO_2 .
- 4. Biến dạng dễ dàng khi đi qua mao mạch.

B – Đặc tính màng hồng cầu

Câu 761: Thành phần cấu tạo của hồng cầu :

- a. Gồm màng bán thấm bao bên trong nhân hồng cầu
- b. Gồm màng bán thấm bao bên ngoài hồng cầu
- c. Trộn màng hồng cầu có các phân tử acid sialic tích điện âm hoặc dương
- d. Trong điều kiện bình thường các hồng cầu có khả năng dính vào nhau

Câu 762: Màng hồng cầu :

- a. Gồm 3 lớp
- b. Trên màng hồng cầu có các phân tử acid sialic tích điện âm hoặc dương
- c. Trong điều kiện bình thường, đôi khi hồng cầu dính lại được với nhau
- d. Tốc độ máu lắng bình thường ở người nam trưởng thành sau 1 giờ $< 20\text{mm}$

Câu 763: Chất Glycolipid có trong lớp nào của màng hồng cầu ?

- a. Lớp ngoài và lipid
- b. Lớp trong và lipid
- c. Lớp ngoài
- d. Lipid

Câu 764: Thành phần cấu tạo nào sau đây làm cho hồng cầu mang điện tích âm?

- a. Phân tử acid sialic trên bề mặt
- b. Men pyruvat kinase
- c. Màng bán thấm
- d. Men G6PD

Câu 765: Hồng cầu không dính nhau do lớp ngoài có

- a. Glycoprotein
- b. Glycolipid
- c. Acid sialic tích điện âm
- d. Nhiều lỗ nhỏ

Câu 766: Trong xét nghiệm về tốc độ lắng máu, tốc độ lắng máu bình thường ở nam

- a. < 15mm
- b. > 15mm
- c. < 20mm
- d. > 20mm

Câu 767: Yếu tố tăng sự kết đặc của hồng cầu là :

- a. nồng độ ion huyết tương
- b. thể tích hồng cầu
- c. giảm acid sialid màng
- d. tăng điện tích âm của màng hồng cầu

Câu 768: Khi bệnh nhân bị viêm cấp tính, hàm lượng protein trong máu tăng làm giảm điện tích âm của màng hồng cầu, khi xét nghiệm VS:

- a. Hồng cầu lắng nhanh hơn
- b. Hồng cầu lắng chậm hơn
- c. Hồng cầu không lắng xuống
- d. Tốc độ lắng hồng cầu không thay đổi

Câu 769: Vì sao tế bào hồng cầu và các tế bào khác trong cơ thể người không bị vỡ?

- a. Vì tế bào của người ở trong dung dịch nước mô đẳng trương
- b. Vì tế bào của người ở trong dung dịch nước mô nhược trương
- c. Vì tế bào của người ở trong dung dịch nước mô ưu trương
- d. Vì tế bào của người có thành tế bào che chở

Câu 770: Hồng cầu trong máu động mạch có độ bền cao hơn hồng cầu trong máu tĩnh mạch do :

- a. Động mạch lớn hơn tĩnh mạch
- b. Hồng cầu trong động mạch lớn hơn tĩnh mạch
- c. Hồng cầu trong tĩnh mạch trương to do CO₂ và Clo nên dễ vỡ hơn
- d. Hồng cầu trong động mạch trương to do CO₂ và clo nên bền hơn

Câu 771: Các yếu tố làm thay đổi sức bền của hồng cầu , chọn câu sai :

- a. Thành phần men trong hồng cầu
- b. Cấu trúc màng hồng cầu
- c. Cấu trúc của phân tử Hemoglobin
- d. Số lượng các chuỗi polypeptid trong phân tử Hemoglobin

Câu 772: Sức bền tối đa của màng hồng cầu trong máu toàn phần :

- a. NaCl 4,6‰
- b. NaCl 4,8‰
- c. NaCl 3,4‰
- d. NaCl 3,6‰

C – Cấu tạo hóa học của hồng cầu

Câu 773: Thành phần nào là một sắc tố tạo nên màu đỏ cho tế bào hồng cầu ?

- a. Sắt
- b. Hem
- c. Globin
- d. Acid amin

Câu 774: Hemoglobin :

- a. Gồm 3 thành phần : Fe, hem và globin
- b. Globin là một sắc tố đỏ giống nhau ở tất cả các loài
- c. Cấu trúc Hb tương tự globin, giống nhau giữa các loài
- d. Trong sự thành lập Hb, ngoài acid amin, sắt, còn có một số chất phụ khác như Cu, B₆, Co, Ni

Câu 775: Sắc tố đỏ của hồng cầu chủ yếu do thành phần nào quy định?

- a. Nhân porhydrin
- b. Heme
- c. Globin
- d. Protein màng hồng cầu

Câu 776: Các loại hemoglobin khác nhau là do thành phần nào sau đây?

- a. Nhân porhydrin
- b. Gốc heme
- c. Các chuỗi globin
- d. Vị trí gắn Fe

Câu 777: Các loại Hemoglobin ở người bình thường là :

- a. HbA và HbF
- b. HbA và HbS
- c. HbF và HbS
- d. HbS và HbJ

Câu 778: Hemoglobin chủ yếu ở người trưởng thành bình thường là loại:

- a. HbA
- b. HbF
- c. HbS
- d. HbE

Câu 779: Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm do trong máu có chứa:

- a. HbA
- b. HbF
- c. HbC
- d. HbS

Câu 780: Thành phần chủ yếu của chuỗi globin của hemoglobin A gồm:

- a. 2 chuỗi alpha, 2 chuỗi zeta
- b. 2 chuỗi alpha, 2 chuỗi gamma
- c. 2 chuỗi alpha, 2 chuỗi beta
- d. 2 chuỗi alpha, 2 chuỗi delta

Câu 781: Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm :

- a. Các hồng cầu hình liềm rất dễ vỡ
- b. Do sự bất thường trong cấu trúc của vòng porphyrin
- c. Do sự bất thường trong cấu trúc các chuỗi alpha
- d. Câu a và b đúng

Câu 782: Đột biến gen làm giảm tổng hợp chuỗi alpha hoặc beta của globin sẽ dẫn đến bệnh lý:

- a. Thiếu máu ác tính
- b. Thiếu máu nhược sắc
- c. Hồng cầu hình liềm
- d. Thalassemia

Câu 783: Theo WHO, nồng độ Hb trong hồng cầu là :

- a. 13-14g/dl
- b. 13-16g/dl

- c. 14-16g/dl
- d. Tất cả đều sai

Câu 784: Thành phần nào được tái sử dụng trong quá trình chuyển hóa của hemoglobin:

- a. Sắt
- b. Globin
- c. Acid amin
- d. Heme

Câu 785: Khi hồng cầu già, thành phần sau đây sẽ thoái biến :

- a. Globin
- b. Heme
- c. Ion Fe^{++}
- d. Acid amin

Câu 786: Sản phẩm thoái biến của Hemoglobin là:

- a. Bilirubin
- b. Acid glucuronic
- c. Transferrin
- d. Glucuronyltransferase

Câu 787: Bilirubin được thoái biến từ heme được vận chuyển đến cơ quan nào để chuyển hóa tiếp?

- a. Lách
- b. Tủy xương
- c. Gan
- d. Đường dẫn mật

D – Số lượng hồng cầu và các chỉ số hồng cầu

Câu 788: Số lượng hồng cầu phụ thuộc vào:

- a. Lượng oxy đến mô càng ít số lượng hồng cầu ít
- b. Mức độ hoạt động của cơ thể
- c. Tuổi càng cao, số lượng hồng cầu càng tăng
- d. Sự bài tiết erythropoietin của tuyến thượng thận

Câu 789: Những yếu tố sau đây ảnh hưởng đến số lượng hồng cầu, ngoại trừ:

- a. sống ở vùng núi cao
- b. lao động
- c. cơ thể thiếu oxy và erythropoitein
- d. dị ứng với nhiệt độ

Câu 790: Số lượng hồng cầu giảm trong các trường hợp

- a. nôn nhiều
- b. mất máu do tai nạn
- c. ỉa chảy
- d. mất huyết tương do bỏng

Câu 791: Số lượng hồng cầu tăng trong trường hợp bệnh lý sau đây, NGOẠI TRỪ:

- a. Đa hồng cầu
- b. Xuất huyết
- c. Mất nước nhiều do tiêu chảy, nôn ói
- d. Suy tim lâu dài

Câu 792: Một bệnh nhân nam, 50 tuổi, tiền sử teo niêm mạc 4 năm nay, không tái khám điều trị gì. Xét nghiệm : số lượng hồng cầu $3.050.000/mm^3$, hồng cầu to, ưu sắc. Nghĩ nhiều đến chẩn đoán nào sau đây :

- a. Thiếu máu do thiếu sắc

- b. Thiếu máu do thiếu acid folic
- c. Thiếu máu do thiếu vitamin B12
- d. Thiếu máu trên người già

Câu 793: Hormon nào sau đây có vai trò chủ yếu trong quá trình điều hòa tạo hồng cầu?

- a. Thrombopoietin
- b. Erythropoietin
- c. Testosteron
- d. Thyroxin

Câu 794: Hematocrit của một mẫu xét nghiệm cho kết quả 41% có nghĩa là :

- a. Hemoglobin chiếm 41% trong huyết tương
- b. Huyết tương chiếm 41% thể tích máu toàn phần
- c. Các thành phần hữu hình chiếm 41% thể tích máu toàn phần
- d. Hồng cầu chiếm 41% thể tích máu toàn phần

Nội dung 3. Chức năng của hồng cầu

Câu 795: Chức năng chính của tế bào hồng cầu :

- a. Chức năng áp suất keo
- b. Chức năng tạo áp suất thủy tĩnh
- c. Chức năng hô hấp
- d. Chức năng miễn dịch

Câu 796: Nói về chức năng của tế bào hồng cầu. **CHỌN CÂU SAI.**

- a. Hô hấp
- b. Vận chuyển khí O_2 và CO_2
- c. Được thực hiện nhờ hemoglobin trong hồng cầu
- d. Tất cả sai

Câu 797: Chức năng hô hấp của hồng cầu được thực hiện nhờ

- a. Hemoglobin
- b. Calmodulin
- c. Sự bài tiết Erythropoietin
- d. Thrombopoietin

Câu 798: Chuyên chở khí oxy trong máu :

- a. Bằng ba dạng: hòa tan, kết hợp với Hb, và dạng HCO_3^-
- b. Chuyên chở khí oxy trong máu dưới dạng hòa tan là chủ yếu
- c. Oxy ở dạng kết hợp với Hb bị giới hạn bởi lượng Hb có thể gắn O_2
- d. Tất cả đều đúng

Câu 799: Các yếu tố ảnh hưởng đến ái lực Hb và O_2 :

- a. Nhiệt độ tăng làm giảm ái lực đối với O_2
- b. pH làm Hb giảm ái lực đối với O_2
- c. Hợp chất phosphat thải ra lúc hoạt động làm Hb giảm ái lực với O_2
- d. Tất cả đều đúng

Câu 800: Các yếu tố sau làm tăng ái lực hemoglobin đối với oxy, **NGOẠI TRỪ:**

- a. pH tăng
- b. Nhiệt độ tăng
- c. Phân áp oxy tăng
- d. Chất 2,3-DPG

Câu 801: Nguyên nhân chủ yếu khiến cho những người sống ở vùng cao có da thường ửng đỏ hơn là:

- a. Phân áp O_2 thấp, dẫn đến quá trình vận chuyển oxy kém
- b. Thiếu oxy nên cơ thể điều hòa bằng cách tăng sản sinh hồng cầu
- c. Chất 2,3-DPG trong hồng cầu tăng nên làm sắc tố đỏ tăng lên

d. Nhiệt độ lạnh, cơ chế điều nhiệt làm cho mạch máu giãn to

Câu 802: Phản ứng kết hợp giữa Hemoglobin và O_2 :

a. O_2 được gắn với Fe^{+++} trong thành phần heme

b. Đây là phản ứng oxy hóa

c. Một phân tử Hb có thể gắn với 4 phân tử O_2

d. Sự kết hợp hay phân ly giữa Hb và O_2 phụ thuộc chủ yếu vào nồng độ trong máu

Câu 803: Trong sự gắn kết giữa oxy và hemoglobin, điều nào sau đây SAI?

a. Oxy là oxy nguyên tử

b. Phản ứng giữa oxy và Hb không phải là phản ứng oxy hóa

c. Sắt vẫn là hóa trị II

d. Một phân tử Hb gắn được 4 phân tử oxy

Câu 804: Bệnh nhân bị MetHb sẽ có hiện tượng nào sau đây;

a. Fe^{++} trong hồng cầu sẽ chuyển thành Fe^{+++}

b. Hồng cầu không còn khả năng vận chuyển oxy

c. Bệnh nhân sẽ có triệu chứng xanh tím trên lâm sàng

d. Tất cả đều đúng

Câu 805: Chuyên chở CO_2 trong máu:

a. Ở 3 dạng: dạng hòa tan, dạng carbamin và dạng HCO_3^-

b. CO_2 được chuyên chở trong máu dưới dạng hòa tan chiếm 30%

c. Dạng chuyên chở CO_2 chủ yếu trong máu là dạng carbamin

d. Hiện tượng hamburger: HCO_3^- khuếch tán ra huyết tương trao đổi với H^+ đi vào hồng cầu

Câu 806: Hầu hết các CO_2 được vận chuyển trong máu dưới dạng

a. Hòa tan huyết tương

b. gắn với nhóm $-NH_2$ của protein huyết tương

c. gắn với nhóm $-NH_2$ của globin

d. ở dạng $NaHCO_3$

Câu 807: Trong trường hợp ngộ độc CO người ta cho bệnh nhân thở hỗn hợp khí có 95% O_2 và 5% CO_2 để làm gì

a. Phân ly HbCO

b. Kích thích hô hấp

c. Tăng ái lực của O_2 với Hb

d. a và b và c đúng

Câu 808: Hồng cầu có vai trò miễn dịch vì có các khả năng sau đây , ngoại trừ :

a. Giữ lấy các phức hợp kháng nguyên – kháng thể - bổ thể tạo thuận lợi cho thực bào

b. Bám vào các lympho T, giúp sự “giao nạp” các kháng nguyên cho tế bào này

c. Các kháng nguyên trên màng hồng cầu đặc trưng cho các nhóm máu

d. Các IgE thường bám trên bề mặt màng hồng cầu đặc trưng cho các nhóm máu

Câu 809: Phát biểu đúng về khả năng điều hòa thăng bằng toan kiềm của hồng cầu , ngoại trừ :

a. Hệ đệm hemoglobinat/hemoglobin chiếm 70% vai trò trong điều hòa pH máu

b. Hồng cầu tham gia điều hòa pH máu chủ yếu thông qua cơ chế điều hòa lượng CO_2 máu

c. Khi nồng độ CO_2 máu cao, Cl^- sẽ trao đổi với HCO_3^- qua màng hồng cầu để cân bằng ion

d. Bản chất đệm của hemoglobin là do nhân imidazol của histidin tạo ra sự cân bằng acid-base

Câu 810: Thành phần nào của hồng cầu tạo nên áp suất keo của máu?

a. Heme

b. Sắt

c. Acid sialic

d. Protein (globin)

Nội dung 4. Nhóm máu

Câu 811: Nhóm máu được xác định dựa trên :

- a. Sự hiện diện của kháng nguyên trong huyết tương
- b. Sự hiện diện của kháng thể trong huyết thanh
- c. Thành phần protein trên màng hồng cầu
- d. Sự hiện diện hay vắng mặt của các kháng thể trên màng hồng cầu

Câu 812: Kháng thể hệ ABO là:

- a. Kháng thể IgG
- b. Kháng thể tự nhiên
- c. Kháng thể miễn dịch
- d. Kháng thể tự miễn

Câu 813: Kháng thể hệ Rhesus là:

- a. Kháng thể tế bào
- b. Kháng thể tự nhiên
- c. Kháng thể miễn dịch
- d. Kháng thể tự miễn

Câu 814: Để xác định nhóm máu bằng phương pháp xuôi, người ta sử dụng :

- a. Hồng cầu mẫu
- b. Huyết tương mẫu
- c. Huyết thanh mẫu
- d. Máu toàn phần

Câu 815: Để xác định nhóm máu bằng phương pháp ngược , người ta sử dụng :

- a. Hồng cầu mẫu
- b. Huyết tương mẫu
- c. Huyết thanh mẫu
- d. Máu toàn phần

Câu 816: Thành phần nào sau đây được sử dụng để xác định nhóm máu bằng nghiệm pháp hồng cầu:

- a. Hồng cầu mẫu – huyết thanh cần thử
- b. Huyết tương mẫu – hồng cầu cần thử
- c. Huyết thanh mẫu – hồng cầu thử
- d. Máu toàn phần cần thử - huyết thanh mẫu

Câu 817: Một người đàn ông có nhóm máu A, có 2 con, có huyết thanh của một trong 2 người con làm ngưng kết hồng cầu người bố, còn huyết thanh của người con kia không gây ngưng kết hồng cầu người bố. Chọn tình huống đúng nhất sau:

- a. Người bố phải là đồng hợp tử nhóm A
- b. Hai người con phải là con của hai người đàn bà khác nhau
- c. Người con “gây ngưng kết” có thể mang nhóm máu O
- d. Người con “không gây ngưng kết” có thể mang nhóm máu B

Câu 818: Khi xét nghiệm nhóm máu cho người cha và hai con sống ở Hà Nội, kết quả cho thấy người cha có nhóm máu B và cả hai con đều có huyết thanh gây ngưng kết với hồng cầu của người bố. Khẳng định nào sau đây đáng tin cậy nhất?

- a. Điều này hoàn toàn có thể phù hợp với sinh lý bình thường
- b. Hai người con này đều là nhóm máu A dị hợp tử
- c. Đủ cơ sở nghi ngờ rằng người vợ của anh ta đã có con với người khác
- d. Hai người con này chắc chắn mang nhóm máu O.

Câu 819: Nguyên tắc truyền máu , ngoại trừ :

- a. Không để cho kháng nguyên và kháng thể tương ứng gặp nhau trong máu người nhận
- b. Kháng nguyên trên màng hồng cầu không bị ngưng kết bởi kháng thể tương ứng trong huyết tương người nhận

d. Thường xảy ra với nhóm máu hệ Rhesus ở những lần sinh sau

CHUYÊN ĐỀ 4 – SINH LÝ MÁU

Bài số 17

SINH LÝ BẠCH CẦU VÀ HỆ THỐNG MIỄN DỊCH

Nội dung 1. Sự sản sinh bạch cầu

Câu 829: Từ tế bào gốc vạn năng biệt hóa thành 2 dòng là dòng tủy và dòng lympho. Dòng tủy lại được phát triển thành :

- a. 3 dòng
- b. 4 dòng
- c. 5 dòng
- d. 6 dòng

Câu 830: Nơi sinh sản và biệt hóa tế bào Lympho B:

- a. vùng tủy của hạch bạch huyết
- b. tủy trắng của lách
- c. mô bạch huyết của tủy xương
- d. tuyến ức

Câu 831: Nơi sinh sản và biệt hóa tế bào Lympho T:

- a. vùng tủy của hạch bạch huyết
- b. tủy trắng của lách
- c. tủy đỏ của lách
- d. tuyến ức

Câu 832: Các yếu tố phát triển đơn dòng trong sản sinh bạch cầu, ngoại trừ:

- a. Interleukin-3
- b. M-CSF
- c. G-CSF
- d. E-CSF


Nội dung 2. Đặc điểm chung của bạch cầu

A – Hình dạng, số lượng, đời sống bạch cầu

Câu 833: Loại bạch cầu nào sau đây có kích thước lớn nhất?


- a. Bạch cầu lympho
- b. Bạch cầu neutrophil
- c. Bạch cầu mono
- d. Bạch cầu eosinophil

Câu 834: Loại bạch cầu trên vi trường sau là;



- a. Basophil
- b. Neutrophil
- c. Eosinophil
- d. Monocyte

Câu 835: Loại bạch cầu trên vi trường sau là;



- a. Eosinophil
- b. Basophil
- c. Lymphocyte
- d. Neutrophil

Câu 836: Bạch cầu sau đều thuộc bạch cầu có hạt khi nhuộm, ngoại trừ:

- a. Bạch cầu trung tính
- b. Bạch cầu lympho
- c. Bạch cầu ưa acid
- d. Bạch cầu ưa kiềm

Câu 837: Số lượng bạch cầu ở người trưởng thành bình thường :

- a. 4000-6000/mm³
- b. 6000-8000/mm³
- c. 8000-10000/mm³
- d. 4000-10000/mm³

Câu 838: Chọn câu sai

- a. Số lượng bạch cầu ở trẻ em nhiều hơn người lớn
- b. Mỗi loại bạch cầu có thời gian sống khác nhau
- c. Sau khi vào mô, bạch cầu mono phát triển thành đại thực bào
- d. Số lượng bạch cầu tăng khi cơ thể nhiễm độc, nhiễm xạ, suy tủy

Câu 839: Trường hợp nào sau đây làm giảm số lượng bạch cầu trong máu nói chung:

- a. Nhiễm khuẩn cấp tính
- b. Thiếu oxy
- c. Nhiễm xạ
- d. Các bệnh lý dị ứng

Câu 840: Một bệnh nhân nữ, 36 tuổi, vào viện vì mệt và rong huyết. Xét nghiệm số lượng hồng cầu 2.900.000/mm³, số lượng bạch cầu : 3.200/mm³, số lượng tiểu cầu 56.000/mm³. Nghĩ nhiều đến chẩn đoán nào sau đây:

- a. Thiếu máu do thiếu sắt
- b. Nhiễm trùng
- c. Suy tủy
- d. Ung thư dòng bạch cầu

B – Các đặc tính của bạch cầu

Câu 841: Đặc điểm nào sau đây không phải của bạch cầu?

- a. Xuyên mạch
- b. Thực bào
- c. Chuyển động bằng chân giả
- d. Cảm ứng động

Câu 842: Loại bạch cầu nào sau đây sau khi xuyên mạch sẽ tạo thành các đại thực bào?

- a. Bạch cầu mono
- b. Bạch cầu ưa acid
- c. Bạch cầu ưa kiềm
- d. Bạch cầu trung tính

Câu 843: Quá trình xuyên mạch khi có tình trạng nhiễm trùng ở mô được bởi tác dụng của

- a. Các cytokin
- b. Bradykinin, Histamin
- c. Gia đình Eicosanoid
- d. Serotonin

Câu 844: Bạch cầu có thể chuyển động với vận tốc:

- a. 20µm/phút
- b. 30µm/phút
- c. 40µm/phút
- d. 50µm/phút

Câu 845: Quá trình thực bào thực chất bao gồm 2 cơ chế :

- a. Hòa màng và phân giải bởi enzyme
- b. Hòa màng và co bóp
- c. Vận chuyển tích cực và phân giải bởi enzyme
- d. Vận chuyển tích cực và co bóp

Câu 846: Các đặc điểm nào sau đây làm *hiện tượng thực bào* xảy ra nhanh hơn, **NGOẠI TRỪ**

- a. Bề mặt vật lạ thô nhám, gồ ghề
- b. Vật lạ mang điện tích trái dấu với bạch cầu
- c. Vật lạ có kích thước càng lớn
- d. Vật lạ được opsonin hóa

Câu 847: Các enzym và những thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình thực bào nằm trong :

- a. nhân
- b. ty thể
- c. lưới nội sinh chất
- d. lysosome

Câu 848: Loại tế bào **không** có khả năng thực bào là :

- a. Bạch cầu mono trong máu
- b. Bạch cầu lympho trong máu
- c. Tế bào Kupffer
- d. Đại thực bào mô

Câu 849: Khi xảy ra quá trình viêm :

- a. Bạch cầu hạt trung tính có mặt ngay sau vài phút
- b. Đại thực bào mô là những tế bào trưởng thành có thể bắt đầu ngay quá trình thực bào
- c. Tăng huy động bạch cầu trung tính từ tủy xương và các kho dự trữ
- d. Bạch cầu mono tập trung nhanh chóng tại vùng viêm

Câu 850: Khả năng thực bào giảm dần theo thứ tự :

- a. Bạch cầu ưa acid, bạch cầu mono, bạch cầu trung tính
- b. Bạch cầu trung tính, bạch cầu mono, bạch cầu ưa acid
- c. Bạch cầu mono, bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa acid
- d. Bạch cầu mono, bạch cầu ưa acid, bạch cầu trung tính

Câu 851: Chức năng chủ yếu nhất của bạch cầu hạt trung tính:

- a. Tham gia miễn dịch không đặc hiệu
- b. Khuếch đại phản ứng viêm không đặc hiệu
- c. Khử độc các protein lạ

d. Chống ký sinh trùng

Câu 852: Bạch cầu hạt trung tính có đặc tính sau :

- a. Có khả năng khử độc protein lạ
- b. Có khả năng bám mạch và xuyên mạch
- c. Mỗi bạch cầu trung tính có khả năng thực bào
- d. Có khả năng giải phóng ra plaminogen

Câu 853: Bạch cầu ưa acid làm tan cục máu đông nhờ tiết ra:

- a. Fibrinogen
- b. Plasminogen
- c. Thrombolastin
- d. Rosenthal

Câu 854: Loại bạch cầu **không** có chức năng *thực bào*:

- a. Neutrophil
- b. Eosinophil
- c. Basophil
- d. Monocyte

Câu 855: Bạch cầu ưa acid thường tập trung nhiều ở các nơi sau đây , **Ngoại trừ** :

- a. Đường hô hấp
- b. Hạch bạch huyết
- c. Đường tiết niệu
- d. Đường sinh dục

Câu 856: Basophil chứa các loại hóa chất sau đây, **NGOẠI TRỪ**:

- a. Heparin.
- b. Plasminogen.
- c. Serotonin.
- d. Bradykinin

Câu 857: Histamin do basophil tiết ra gắn lên globulin miễn dịch nào ngăn phản ứng dị ứng :

- a. IgA
- b. IgM
- c. IgE
- d. IgG

Nội dung 3. Công thức bạch cầu, chức năng bạch cầu và các trường hợp tăng giảm bạch cầu

Câu 858: Nói về tỉ lệ các loại bạch cầu

- a. Bạch cầu lympho chiếm nhiều nhất
- b. Bạch cầu hạt ưa acid chiếm ít nhất
- c. Bạch cầu mono chiếm ít nhất trong bạch cầu không hạt
- d. Bạch cầu không hạt chiếm nhiều hơn bạch cầu hạt

Câu 859: Tỉ lệ bạch cầu trung tính trong tổng số bạch cầu của cơ thể chiếm bao nhiêu ?

- a. 60-66%
- b. 2-11%
- c. 20-25%
- d. 2-2,5%

Câu 860: Trong công thức bạch cầu, loại bạch cầu chiếm tỉ lệ thấp nhất là:

- a. Bạch cầu trung tính
- b. Bạch cầu ưa kiềm
- c. Bạch cầu ưa acid

d. Bạch cầu lympho

Câu 861: Bạch cầu trung tính tăng trong trường hợp :

- a. Bị nhiễm độc kim loại nặng như chì
- b. **Mắc các bệnh nhiễm khuẩn cấp tính**
- c. Dùng các loại corticoid
- d. Bị nhiễm ký sinh trùng

Câu 862: Bạch cầu *Eosinophil* tăng trong các trường hợp sau, **ngoại trừ** :

- a. Một số bệnh ngoài da
- b. **Nhiễm trùng cấp tính**
- c. Nhiễm ký sinh trùng
- d. Dị ứng thuốc

Câu 863: Bạch cầu ưa acid thay đổi trong các trường hợp sau , **ngoại trừ** :

- a. Bị nhiễm virus
- b. **Bị các bệnh nhiễm khuẩn cấp tính**
- c. Bị các bệnh ký sinh trùng
- d. Khi dùng các loại corticoid

Câu 864: Lympho bào giảm trong trường hợp nào sau đây :

- a. **Thương hàn nặng , sốt phát ban**
- b. Ung thư máu , nhiễm khuẩn máu
- c. Nhiễm trùng cấp
- d. Nhiễm độc kim loại nặng

Câu 865: Trong trường hợp *viêm mạn tính*, tế bào nào sau đây sẽ tăng:

- a. Neutrophil
- b. Basophil
- c. Eosinophil
- d. **Monocyte**

Câu 866: Trong trường hợp *nhiễm khuẩn cấp tính*, loại tế bào nào sau đây sẽ tăng lên?

- a. **Neutrophil**
- b. Eosinophil
- c. Basophil
- d. Lymphocyte

Câu 867: Khi cơ thể bị *nhiễm ký sinh trùng* tế bào nào sau đây sẽ tăng

- a. Bạch cầu hạt trung tính
- b. **Bạch cầu hạt ưa acid**
- c. Bạch cầu hạt ưa bazo
- d. Đại thực bào

Câu 868: Các tế bào sau đây có liên quan đến *tình trạng dị ứng*:

- a. Neutrophil và eosinophil
- b. Neutrophil và basophil
- c. **Eosinophil và basophil**
- d. Basophil và monocyte

Câu 869: Công thức máu đóng vai trò giúp thăm dò tốc độ sinh sản và phá hủy của BC:

- a. Công thức máu toàn phần
- b. **Công thức Arneth**
- c. Công thức Schilling
- d. Cả a và c

Câu 870: Một bệnh nhân với kết quả xét nghiệm bạch cầu trong đó tỷ lệ bạch cầu 2 múi tăng rất nhiều liên quan đến bệnh lý:

- a. Bệnh bạch cầu cấp
- b. **Bệnh nhiễm trùng**
- c. Viêm mạn tính
- d. Thiếu máu ác tính

Câu 871: Một bệnh nhân với kết quả xét nghiệm bạch cầu trong đó tỷ lệ bạch cầu 5 mới tăng rất nhiều liên quan đến bệnh lý:

- a. Bệnh bạch cầu cấp
- b. Bệnh nhiễm trùng
- c. Viêm mạn tính
- d. **Thiếu máu ác tính**

Nội dung 4. Hệ thống miễn dịch

Câu 872: Các kháng thể miễn dịch khác với kháng thể tự nhiên ở chỗ. **CHỌN CÂU SAI**

- a. Các khoảng thể miễn dịch không qua được hàng rào nhau thai
- b. **Hoạt tính mạnh ở 37°C**
- c. Nếu bị kích thích lặp lại thì hoạt tính lên cao
- d. Cường độ, hiệu giá và độ nhạy cao nhiều

Câu 873: Các kháng thể của hệ thống lympho B tấn công trực tiếp vật xâm lấn bằng cách, ngoại trừ:

- a. Ngưng kết
- b. Kết tủa
- c. **Gây viêm**
- d. Trung hòa

Câu 874: Trong quá trình đáp ứng miễn dịch

- a. Các đại thực bào có vai trò đặc biệt trong việc khởi động quá trình miễn dịch
- b. Bạch cầu lympho B có chức năng miễn dịch tế bào
- c. **Các cytokin do lympho B tiết ra sẽ “khuếch đại” tác dụng phá hủy kháng nguyên lên nhiều lần**
- d. Bạch cầu lympho T có chức năng miễn dịch dịch thể

CHUYÊN ĐỀ 4 – SINH LÝ MÁU

Bài số 18

SINH LÝ TIỂU CẦU VÀ CẢM MÁU

Nội dung 1. Đặc điểm chung của tiểu cầu

A – Hình dạng, cấu trúc, số lượng và đời sống tiểu cầu

Câu 875: Đặc điểm của tiểu cầu , ngoại trừ :

- a. Được sản xuất trong tủy xương
- b. Mảnh tế bào nhỏ, hình dáng không nhất định
- c. **Tế bào có nhân**
- d. Đường kính từ 2-4 micromet

Câu 876: Sự phân bố của tiểu cầu bình thường ở ngoại biên là:

- a. **2/3 ở máu ngoại biên, 1/3 ở lách**
- b. 1/3 ở máu ngoại biên, 2/3 ở lách
- c. 3/4 ở máu ngoại biên, 1/4 ở lách
- d. 1/4 ở máu ngoại biên, 3/4 ở lách

Câu 877: Đời sống của tiểu cầu trong máu ngoại biên là:

- a. 4 – 5 ngày
- b. 5 – 8 ngày
- c. **8 – 12 ngày**
- d. 100 – 120 ngày

Câu 878: Tiểu cầu trong máu được đổi mới hoàn toàn trong thời gian

- a. **4 ngày**
- b. 6 ngày
- c. 8 ngày
- d. 10 ngày

Câu 879: Một bệnh nhân sau phẫu thuật cắt lách có số lượng huyết cầu thay đổi thế nào?

- a. Hồng cầu tăng, tiểu cầu giảm
- b. **Hồng cầu và tiểu cầu đều tăng**
- c. Hồng cầu và tiểu cầu đều giảm
- d. Hồng cầu giảm, tiểu cầu tăng

B – Các đặc tính của tiểu cầu

Câu 880: Điều kiện cần thiết để các chất tham gia quá trình cảm máu được vận chuyển đến nơi cần thiết là :

- a. Khả năng kết dính tiểu cầu
- b. **Khả năng hấp phụ và vận chuyển các chất**
- c. Khả năng ngưng tập
- d. Khả năng thay đổi hình dạng và kích thích các chất

Câu 881: Thành phần nào sau đây của tiểu cầu đóng vai trò hấp thu các yếu tố đông máu để vận chuyển đến nơi cần thiết ?

- a. Vùng sol-gel dưới màng
- b. **Vùng ngoại vi**
- c. Vùng tiểu thể
- d. Hệ thống liên kết màng

Câu 882: Sự hoạt hóa tiểu cầu được đánh dấu bởi đặc tính :

- a. **Hấp phụ**

Câu 891: Hiện tượng nào **không** xảy ra trong quá trình cầm máu:

- a. Thành mạch tổn thương, bộc lộ lớp collagen dưới nội mô
- b. Các chất gây co mạch được giải phóng
- c. Tiểu cầu kết dính – kết tụ vào nơi tổn thương
- d. Một mạng lưới fibrin đan xen với nút tiểu cầu

Câu 892: Sự co thắt mạch máu khi thành mạch bị tổn thương có tác dụng gì trong các tác dụng sau đây

- a. Tăng giải phóng các yếu tố gây đông máu
- b. Giảm bớt lượng máu bị mất
- c. Tăng sự kết dính tiểu cầu
- d. Hoạt hóa các yếu tố gây đông máu

Câu 893: Khi thành mạch bị tổn thương có sự co thắt mạch máu là do, **NGOẠI TRỪ**:

- a. Phản xạ thần kinh
- b. Co thắt tại chỗ
- c. Kích thích hệ đối giao cảm
- d. Tiểu cầu tiết ra một số chất gây co mạch

Câu 894: Các chất giúp cho mạch máu co thắt mạnh hơn là chất nào sau?

- a. ADP
- b. Serotonin
- c. Adrenalin
- d. B và C đúng

Câu 895: Sự gia tăng tính bám dính của tiểu cầu vào thành mạch tổn thương phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

- a. ADP
- b. ATP
- c. Plasmin
- d. Độ nhớt của máu

Câu 896: Khả năng ngưng tập của tiểu cầu là :

- a. Là khả năng tiểu cầu kết dính vào lớp lưới nội mạc của mạch máu
- b. Là khả năng các tiểu cầu gắn kết lẫn nhau tạo nên nút chặn tiểu cầu
- c. Là khả năng tiểu cầu hấp phụ các chất trong huyết tương
- d. Là khả năng tiểu cầu thay đổi hình dạng và bài xuất các chất sau khi được hoạt hóa

Câu 897: Tiểu cầu **không** kết dính với lớp collagen nếu thiếu chất nào sau đây ?

- a. Thromboplastin
- b. ADP
- c. Yếu tố Willebrand
- d. Tất cả đều sai

Câu 898: Yếu tố nào đóng vai trò cầu nối giữa các tiểu cầu khi hình thành nút chặn tiểu cầu?

- a. Protein kết dính Von-Willebrand
- b. Fibrinogen
- c. Thromboplastin
- d. Thrombin

Câu 899: Để nút chặn tiểu cầu được bền vững, cần có hoạt động của yếu tố nào ?

- a. Fibrinogen
- b. Adrenalin và serotonin
- c. GPIIb/IIIa

d. Hệ thống vi ống vùng sol-gel

Câu 900: Xét nghiệm thời gian máu chảy tính từ lúc thành mạch bị tổn thương đến khi:

- a. Các tiểu cầu kết dính nhau
- b. Tiêu sợi huyết
- c. Co thành mạch
- d. Nút chặn tiểu cầu hình thành xong

Câu 901: Xét nghiệm thời gian máu chảy, chọn câu **đúng**

- a. Đánh giá giai đoạn từ lúc bắt đầu tổn thương thành mạch cho đến khi hình thành sợi tơ huyết
- b. Thời gian máu chảy tính bằng phút là một số giọt máu nhỏ ra đến khi đông lại
- c. Ở người bình thường, giọt đầu tiên lớn nhất so đó giảm dần theo thời gian
- d. Thời gian máu chảy luôn luôn nhỏ hơn so với thời gian máu đông

Câu 902: Xét nghiệm nào sau đây **không** đánh giá đoạn cầm máu ban đầu:

- a. Thời gian máu chảy (TS)
- b. Thời gian Quick
- c. Đếm số lượng tiểu cầu
- d. Thực hiện dấu hiệu dây thắt

Câu 903: Xét nghiệm thường dùng trong chẩn đoán sớm bệnh sốt xuất huyết :

- a. Thời gian máu chảy
- b. Thời gian máu đông
- c. Dấu hiệu dây thắt
- d. Đếm số lượng tiểu cầu

B – Quá trình đông máu

Câu 904: Các yếu tố gây đông máu, ngoại trừ:

- a. Yếu tố I
- b. Yếu tố IV
- c. Yếu tố VI
- d. Yếu tố XI

Câu 905: Các yếu tố đông máu sau được tổng hợp tại gan, ngoại trừ:

- a. Fibrinogen
- b. Yếu tố VII
- c. Yếu tố VIII
- d. Yếu tố IX

Câu 906: Yếu tố đông máu của huyết tương, ngoại trừ:

- a. Ion Ca^{2+}
- b. Thromboplastin
- c. Prothrombin
- d. Fibrinogen

Câu 907: Trong giai đoạn thành lập thrombin từ prothrombin có yếu tố nào sau đây tham gia ?

- a. Vitamin K và Ca^{++}
- b. Thromboplastin và Ca^{++}
- c. Prothrombinase và Ca^{++}
- d. Phospholipid và Ca^{++}

Câu 908: Vitamin K cần thiết cho quá trình tổng hợp yếu tố dòng máu nào

- a. Prothrombin
- b. Fibrinogen
- c. Thromboplastin
- d. Yếu tố Hageman

Câu 909: Vitamin K cần thiết cho quá trình tổng hợp yếu tố đông máu nào sau đây:

- a. Antihemophilie B
- b. Fibrinogen
- c. Thromboplastin
- d. Yếu tố hageman

Câu 910: Nhóm các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K:

- a. II, VII, IX, X
- b. II, VII, XI, XII
- c. II, VIII, X, XI
- d. II, VIII, IX, X

Câu 911: Nhóm các yếu tố đông máu có đặc tính tác dụng qua lại với thrombin, bị tiêu thụ trong quá trình đông máu:

- a. I, V, VII, XII
- b. I, V, VIII, XIII
- c. II, V, VII, XII
- d. II, V, VIII, XIII

Câu 912: Xét nghiệm thời gian Quick (TQ) khảo sát các yếu tố đông máu nào sau đây?

- a. VII, X, VI, II, I
- b. II, III, V, VII, X
- c. VII, VIII, IX, X, XI
- d. XII, XI, I, X, VIII, VII

Câu 913: Thời gian Quick khảo sát các yếu tố đông máu liên quan đến

- a. Con đường đông máu nội sinh
- b. Con đường đông máu ngoại sinh
- c. Vitamin K
- d. Tác dụng qua lại với thrombin

Câu 914: Thời gian Quick kéo dài gợi ý :

- a. Suy gan
- b. Lách to
- c. Tắc mạch
- d. Tiểu đường

Câu 915: Xét nghiệm nào dưới đây khảo sát các yếu tố liên quan đến đường đông máu nội sinh?

- a. Thời gian TCK
- b. Thời gian Quick
- c. Thời gian TS
- d. Thời gian TC

Câu 916: Hiện tượng xuất huyết có thể xảy ra do nguyên nhân sau đây, NGOẠI TRỪ :

- a. Giảm số lượng tiểu cầu
- b. Giảm chất lượng tiểu cầu
- c. Giảm các yếu tố chống đông máu
- d. Giảm các yếu tố đông máu

Câu 917: Các chất chống đông có sẵn trong máu , ngoại trừ :

- a. Protein S
- b. Antithrombin
- c. Heparin
- d. Plasminogen

Câu 918: Câu nào sau đây Sai khi nói về yếu tố chống đông máu ?

- a. Giảm sinh Thrombin

- b. Tăng sinh Thrombin ở vị trí tổn thương
- c. Ngăn cản sự khởi phát đông máu
- d. Bao gồm các yếu tố : TFPI, Protein S, Antithrombin

Câu 919: Heparin là chất chống đông do nó có tác dụng ức chế

- a. Sự tạo ra thrombin
- b. Gắn kết làm mất tác dụng Ca^{++}
- c. Sự tạo thành fibrinogen
- d. Sự tạo thành prothrombin


Câu 920: Khi mạch máu bị tổn thương máu sẽ tiếp xúc với nơi tổn thương, mô tổn thương tiết ra yếu tố đông máu đầu tiên là:

- a. Fibrinogen
- b. Prothrombin
- c. Thromboplastin
- d. Ca^{++}

Câu 921: Sự khác biệt cơ bản giữa con đường nội sinh và con đường ngoại sinh là :

- a. Thời gian tác dụng, con đường ngoại sinh diễn ra nhanh hơn
- b. Thời gian tác dụng, con đường nội sinh diễn ra nhanh hơn
- c. Mức độ tác dụng, con đường ngoại sinh diễn ra triệt để hơn
- d. Mức độ tác dụng, con đường nội sinh diễn ra triệt để hơn

Từ câu đến câu điền vào các yếu tố còn thiếu trên sơ đồ đông máu sau:



Câu 922: A là :

- a. Yếu tố đông máu số I
- b. Yếu tố đông máu số I hoạt hóa
- c. Yếu tố đông máu số IV
- d. Yếu tố đông máu số X

Câu 923: B là :

- a. Yếu tố đông máu số I
- b. Yếu tố đông máu số I hoạt hóa
- c. Yếu tố đông máu số IV
- d. Yếu tố đông máu số X

Câu 924: C là:

- a. Yếu tố đông máu số XIa
- b. Yếu tố đông máu số I hoạt hóa
- c. Yếu tố đông máu số XIIIa
- d. Yếu tố đông máu số Xa

Câu 925: Những yếu tố sau làm máu đông hơn, **NGOẠI TRỪ**:

- a. Mất cắt mô tươi
- b. Huyết tương tươi
- c. Dicoumarin
- d. Vitamin K

Câu 926: Khi có vết thương nông ở da, thời gian chảy máu kéo dài thường gặp ở người

- a. Có bệnh suy giảm chức năng gan.
- b. Có bệnh suy giảm chức năng thận.
- c. Đã từng bị tổn thương thành mạch tại vị trí đó.
- d. Chưa từng bị tổn thương thành mạch tại vị trí đó.

CHUYÊN ĐỀ 6 – SINH LÝ HỆ THẦN KINH

Bài số 19

SINH LÝ THẦN KINH NEURON VÀ SYNAPSE

Nội dung 1. Neuron – cấu tạo chức năng và các đặc điểm dẫn truyền

Câu 927: Noron có các thành phần:

- a. Thân, sợi trục, đuôi gai
- b. Thân, sợi trục, đuôi gai, synap
- c. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai
- d. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, synap

Câu 928: Nói về đuôi gai của noron, câu nào sau đây **đúng** :

- a. Mỗi noron thường chỉ có một đuôi gai
- b. Phần cuối đuôi gai có cúc tận cùng
- c. Đuôi gai có thể tạo ra một phần của synap
- d. Đuôi gai là bộ phận duy nhất tiếp nhận xung động thần kinh truyền đến noron

Câu 929: Các noron đều có nhiều đuôi gai, **ngoại trừ** :

- a. Tháp
- b. Ngoại tháp
- c. Hạch gai
- d. Hậu hạch phó giao cảm

Câu 930: Bộ phận của noron tiếp nhận xung động thần kinh truyền đến là :

- a. Thân
- b. Đuôi gai
- c. Chủ yếu ở thân, một phần ở đuôi gai
- d. Chủ yếu ở đuôi gai, một phần ở thân

Câu 931: Cấu trúc tế bào thần kinh đảm nhiệm chức năng xử lý tín hiệu:

- a. Thân tế bào
- b. Đuôi gai
- c. Sợi trục
- d. Cúc tận cùng

Câu 932: Thân noron **không** có chức năng nào sau đây :

- a. dinh dưỡng cho noron
- b. Tiếp nhận xung động thần kinh truyền đến noron
- c. phát sinh xung động thần kinh
- d. dẫn truyền xung động thần kinh đi ra khỏi noron

Câu 933: Chọn câu sai

- a. Noron hạch gai chỉ có 1 đuôi và đuôi này rất dài
- b. Thân noron có màu xám là do có chứa nhiều thể Nissl
- c. Trong cúc tận cùng có chứa chất truyền đạt thần kinh
- d. Trong sợi trục không chứa ty thể

Câu 934: Chọn câu **sai**. Đặc điểm hưng phấn của noron:

- a. Ngưỡng kích thích rất thấp
- b. Hoạt tính chức năng cao
- c. Thời gian trơ kéo dài
- d. Chuyển hoá mạnh

Câu 935: Đặc điểm về khả năng hưng phấn của neuron :

- a. Ngưỡng kích thích và hoạt tính chức năng thấp

- b. Ngưỡng kích thích thấp và hoạt tính chức năng cao
- c. Ngưỡng kích thích cao và hoạt tính chức năng thấp
- d. Ngưỡng kích thích và hoạt tính chức năng cao

Câu 936: Kích thích tế bào thần kinh với cường độ dưới ngưỡng :

- a. Gây điện thế động với biên độ thấp
- b. Gây điện thế động với biên độ cao
- c. Gây một sự thay đổi điện thế tại chỗ kích thích nhưng không đáp ứng
- d. Không có sự thay đổi điện thế nào tại điểm kích thích

Câu 937: Tăng cường độ kích thích gây :

- a. Tăng điện thế hoạt động ở neuron sau synap
- b. Tăng điện thế hoạt động ở cơ quan cảm giác
- c. Tăng tần số xung ở receptor
- d. Tăng điện thế của receptor

Câu 938: Điện thế receptor lớn hơn ngưỡng gây tăng :

- a. Điện thế hoạt động trên sợi thần kinh
- b. Tần số điện thế hoạt động trên sợi thần kinh
- c. Điện thế hoạt động ở cơ quan cảm giác
- d. Điện thế hoạt động ở thân neuron

Câu 939: Kích thích với cường độ tăng dần trên ngưỡng thì xung động thần kinh neuron sẽ:

- a. Tăng cả biên độ và tần số
- b. Tăng biên độ, tần số không đổi
- c. Tăng tần số, biên độ không đổi
- d. Không thay đổi về cả tần số và biên độ

Câu 940: Yếu tố sau làm giảm tính hưng phấn của neuron:

- a. Nhiễm kiềm
- b. Thiếu oxy
- c. Thuốc tê
- d. Thuốc mê

Câu 941: Thời gian trơ tuyệt đối của tế bào thần kinh :

- a. Cổng Na^+ bị bất hoạt và đóng
- b. Cổng Na^+ hoạt động nhưng cần một ngưỡng lớn
- c. Cổng Ca^{++} bị bất hoạt và đóng
- d. Cổng K^+ bị bất hoạt và đóng

Câu 942: Năng lượng của dây thần kinh, ngoại trừ:

- a. Chủ yếu dùng để giữ cho sự phân cực màng
- b. Chủ yếu được cung cấp bởi sự thủy phân ATP
- c. Tăng lên khi hoạt động tế bào thần kinh tăng
- d. Không chuyển hóa thành nhiệt năng khi tiêu hóa

Câu 943: Những nguyên tắc dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục :

- a. Dẫn truyền một chiều và điện thế giảm dần dọc theo sợi trục
- b. Dẫn truyền hai chiều và điện thế giảm dần khi xa thân neuron
- c. Dẫn truyền một chiều và điện thế không hao hụt
- d. Dẫn truyền hai chiều và điện thế không hao hụt

Câu 944: Chọn phát biểu sai về đặc điểm dẫn truyền xung thần kinh trên một sợi trục?

- a. Dẫn truyền theo hai chiều
- b. Sợi có bao myelin chậm hơn sợi không có bao myelin
- c. Tuân theo quy luật tất cả hoặc không
- d. Đường kính càng to dẫn truyền càng nhanh

Câu 945: Đặc điểm dẫn truyền xung động trong hệ thần kinh :

- a. Chỉ dẫn truyền theo một chiều trên sợi trục.
- b. Chỉ dẫn truyền theo một chiều qua synap.
- c. Lan từ sợi này sang sợi khác trong một bó sợi trục.
- d. Không tuân theo định luật “tất cả hoặc không”

Câu 946: Đặc điểm dẫn truyền xung động trên một sợi trục, **chọn câu sai**

- a. Dẫn truyền một chiều
- b. Dẫn truyền trên sợi trục có bao myelin nhanh hơn không có bao myelin
- c. Tốc độ dẫn truyền tỉ lệ thuận với đường kính sợi trục
- d. Theo quy luật: “ Tất cả hoặc không có gì”

Câu 947: Chọn câu sai . Đặc điểm dẫn truyền xung động trên sợi trục

- a. Tuân theo quy luật “tất cả hoặc không” và chỉ dẫn truyền trên noron còn nguyên vẹn
- b. Tốc độ dẫn truyền phụ thuộc vào đường kính của sợi và sự có mặt của myelin
- c. Dẫn truyền xung động trên từng sợi không lan sang sợi khác trong một bó sợi
- d. Xung động chỉ lan truyền một chiều từ đuôi gai sang thân và đến sợi trục

Câu 948: Dẫn truyền xung động trên sợi có myelin so với sợi không có myelin

- a. Nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn
- b. Nhanh nhưng tốn nhiều năng lượng hơn
- c. Chậm và tiết kiệm năng lượng hơn
- d. Chậm và tốn nhiều năng lượng hơn

Câu 949: Đặc điểm dẫn truyền xung điện trên sợi trục noron , **chọn câu sai:**

- a. Sợi có myelin nhanh hơn sợi không có myelin
- b. Sợi có đường kính lớn nhanh hơn sợi có đường kính nhỏ
- c. Cường độ kích thích càng lớn thì biên độ xung động càng cao
- d. Không lan tỏa ra các sợi lân cận trong bó sợi trục

Câu 950: Xung động thần kinh , **chọn câu sai :**

- a. Xung thần kinh lan truyền đến cực tận cùng, làm mở các kênh Ca^{++}
- b. Xung thần kinh có thể có biên độ khác nhau khi kích thích với cường độ khác nhau
- c. Xung động thần kinh chỉ có thể dẫn truyền trên noron còn nguyên vẹn
- d. Sự dẫn truyền xung động có thể lan tỏa sang các sợi khác

Câu 951: Sợi trục nào sau đây có tốc độ dẫn truyền nhanh nhất?

- a. Sợi A_α
- b. Sợi A_β
- c. Sợi A_γ
- d. Sợi A_δ

Câu 952: Sợi C có tốc độ dẫn truyền :

- a. 0,5 – 2 cm/s
- b. 0,5 – 2 dm/s
- c. 0,5 – 2 m/s
- d. 0,5 – 2 mm/s

Câu 953: Sợi A delta có tốc độ dẫn truyền nhanh vì các lí do sau, **ngoại trừ:**

- a. Đường kính sợi trục to
- b. Là sợi có bao myelin
- c. Chất truyền đạt thần kinh là glutamat
- d. Ngưỡng tiếp nhận của receptor thấp

Câu 954: Thoái hóa myelin trên tế bào thần kinh gây ảnh hưởng :

- a. Giảm tốc độ dẫn truyền
- b. Giảm tốc độ đáp ứng
- c. Không tiếp nhận và xử lý tín hiệu thần kinh

d. Cả ba đều đúng

Nội dung 2. Synapse – cấu tạo chức năng và cơ chế truyền đạt thông tin

Câu 955: Sinap là chỗ nối giữa

- a. Hai nơron ở trung ương
- b. Hai nơron ở ngoại biên
- c. Nơron với tế bào cơ quan
- d. Nơron vận động với nơron cảm giác

Câu 956: Cấu trúc của synap gồm có :

- a. trước synap, khe synap và màng sau synap
- b. Cúc tận cùng, màng sau sinap, khe synap
- c. Các túi nhỏ chứa chất trung gian hóa học và các thụ cảm thể
- d. Màng Các tận cùng thần kinh, các túi synap và khe synap

Câu 957: Cấu trúc trên nơron tạo nên màng trước synap

- a. Thân
- b. Đuôi gai
- c. Cúc tận cùng
- d. Gò sợi trục

Câu 958: Trao đổi thông tin theo hệ thần kinh, chọn câu sai :

- a. Qua khe synap
- b. Chất truyền tin là hóa chất trung gian
- c. Bộ phận nhận tin là các R_c trên màng sau synap
- d. Chất truyền tin là các hormones

Câu 959: Toàn bộ hệ thần kinh có khoảng bao nhiêu loại synap :

- a. 40
- b. 50
- c. 60
- d. 70

Câu 960: Sự dẫn truyền trên sợi trục và qua khe synap:

- a. Dẫn truyền trên sợi trục và qua khe synap đều nhờ chất trung gian hóa học
- b. Dẫn truyền trên sợi trục và qua khe synap đều dẫn truyền theo hai chiều
- c. Trên sợi trục dẫn truyền theo hai chiều, dẫn truyền qua synap theo một chiều
- d. Trên sợi thần kinh và qua khe synap dẫn truyền đều không bị hao hụt

Câu 961: Cơ chế giải phóng chất truyền đạt thần kinh ở màng trước synapse có liên quan đến ion

- a. Na⁺
- b. K⁺
- c. Cl⁻
- d. Ca⁺⁺

Câu 962: Ion Ca⁺⁺ tham gia :

- a. Dẫn truyền xung thần kinh
- b. Đông máu
- c. Cơ chế co cơ
- d. Tất cả đều đúng

Câu 963: Tác dụng của chất truyền đạt thần kinh gây ức chế lên màng sau synap là :

- a. Làm mở các kênh Na⁺
- b. Làm mở các kênh K⁺ và tăng vận chuyển Cl⁻ vào trong
- c. Hạn chế các kênh K⁺ và kênh Cl⁻

d. Làm đóng các kênh Ca^{++}

Câu 964: Điện thế kích thích ở màng sau synap:

- a. Làm mở kênh K^+ ở màng sau synap
- b. Làm mở kênh Cl^- ở màng sau synap
- c. Gây khử cực một phần màng noron sau synap
- d. Làm đóng kênh K^+ ở màng sau synap

Câu 965: Yếu tố nào sau đây quyết định sự dẫn truyền xung động qua synap?

- a. Cấu trúc hóa học của chất dẫn truyền thần kinh
- b. Thụ thể ở màng sau synap
- c. Nhịp tái hấp thu chất dẫn truyền thần kinh bởi cúc tận cùng
- d. Vận tốc chuyên chở dọc theo sợi trục trong noron trước synap

Câu 966: Các yếu tố sau đây ảnh hưởng đến dẫn truyền xung động ở synap, ngoại trừ :

- a. Ion calci làm các bọc dễ hòa màng với màng cúc tận cùng
- b. pH kiềm của dịch kẽ làm tăng tính hưng phấn của noron
- c. thiếu oxy làm tăng tính hưng phấn của noron
- d. Thuốc làm giảm ngưỡng kích thích của noron

Câu 967: Cơ chế sau không phải là cơ chế chấm dứt dẫn truyền qua sinap của chất truyền đạt thần kinh

- a. Dùng enzyme phân hủy
- b. Khuếch tán ra xung quanh
- c. Sử dụng Ca^{++} gây phóng thích
- d. Tái hấp thụ vào màng trước synap

Nội dung 3. Chất truyền đạt thần kinh

Câu 968: Chất truyền đạt thần kinh được sản xuất ở :

- a. Thân noron và cúc tận cùng
- b. Thân noron và sợi trục
- c. Sợi trục và cúc tận cùng
- d. Cúc tận cùng

Câu 969: Chất truyền đạt thần kinh , chọn câu sai :

- a. Chất truyền đạt thần kinh phân tử nhỏ ở túi synap được tái sử dụng
- b. Chất truyền đạt thần kinh phân tử lớn ở túi synap không được tái sử dụng
- c. Được tổng hợp ở sợi trục và cúc tận cùng
- d. Chất truyền đạt thần kinh phân tử nhỏ được khử bằng 3 cách

Câu 970: Chất truyền đạt thần kinh phân tử nhỏ có những đặc điểm sau , chọn câu sai:

- a. Được tổng hợp ở thân noron
- b. Mỗi noron chỉ tổng hợp 1 chất
- c. Tác dụng nhanh và ngắn
- d. Được loại bỏ bằng 3 cách

Câu 971: Chất truyền đạt thần kinh nhỏ có đặc điểm :

- a. Mỗi noron chỉ tổng hợp một chất
- b. Tác dụng chậm
- c. Tác dụng kéo dài
- d. Chỉ được loại bỏ bằng cách khuếch tán ra môi xung quanh

Câu 972: Chất dẫn truyền thần kinh phân tử nhỏ có đặc điểm :

- a. Tổng hợp tại nhân
- b. Thời gian tác dụng chậm và dài
- c. Túi synapse được tái sử dụng trở lại
- d. Một số chất điển hình như chất P Endorphin

Câu 973: Chất **không** thuộc nhóm chất dẫn truyền thần kinh phân tử nhỏ

- a. Achetylcholin
- b. Noradrenalin
- c. Serotonin
- d. Vasopressin

Câu 974: Noron chi phối cơ vân giải phóng ra chất truyền đạt thần kinh là

- a. Serotonin
- b. Dopamin
- c. Noradrenalin
- d. Acetylcholin

Câu 975: Chất nào sau đây **không** được tổng hợp trong noron hậu hạch giao cảm :

- a. Acetylcholin
- b. Histamin
- c. Dopamin
- d. Noreadrenalin

Câu 976: Trong cơ chế truyền xung động qua nơi tiếp hợp thần kinh-cơ, acetylcholin có tác dụng nào sau đây?

- a. Gây khử cực màng tế bào trước synap
- b. Ngăn chặn sự khử cực của màng tế bào cơ
- c. Gây khử cực màng tế bào cơ sau synap
- d. Gây tăng phân cực màng tế bào sau synap

Câu 977: Tất cả các chất dẫn truyền thần kinh sau đây bị bất hoạt khi khuếch tán ra ngoài khe và được bơm vào cúc tận cùng, **ngoại trừ**:

- a. Serotonin
- b. Glycin
- c. Dopamin
- d. Acetylcholin

Câu 978: Chọn câu đúng. GABA :

- a. Là chất dẫn truyền thần kinh kích thích lớn
- b. Là chất dẫn truyền thần kinh ức chế
- c. Kích thích $GABA_A$ làm giảm dòng Cl^- vào tế bào
- d. Kích thích $GABA_B$ làm giảm dòng K^+ vào tế bào

Câu 979: Chọn câu **sai**. Norepinephrine :

- a. Có trong hệ thần kinh trung ương
- b. Tăng trong stress
- c. Có ở nơi tiếp hợp thần kinh – cơ trơn trong hệ thần kinh thực vật
- d. Được tổng hợp từ acetyl-CoA

Câu 980: Kích hoạt thụ thể sau đây sẽ làm giảm bớt lo lắng :

- a. Thụ thể cholinergic nicotinic
- b. Thụ thể glutamat
- c. Thụ thể GABA
- d. Thụ thể α_1 adrenergic

Câu 981: Chất truyền đạt thần kinh có phân tử lớn là :

- a. Dopamin
- b. Acetylcholin
- c. Enkephalin
- d. GABA

Câu 982: Hormon được tổng hợp trong thân tế bào thần kinh và giải phóng từ đầu sợi trục của nó :

- a. ADH

- b. GH
- c. Adrenalin
- d. Cortisol

Câu 983: Chất truyền đạt thần kinh phân tử lớn có đặc điểm

- a. Mỗi noron tổng hợp 1 chất
- b. tác dụng nhanh
- c. tác dụng ngắn
- d. được loại bỏ bằng khuếch tán ra mô xung quanh

Câu 984: Chọn câu **sai**. Chất truyền đạt thần kinh phân tử lớn có đặc điểm:

- a. Được tổng hợp ở thân noron
- b. **Mỗi noron chỉ tổng hợp 1 chất**
- c. Thời gian tác dụng chậm nhưng kéo dài
- d. Được phân hủy bằng cách khuếch tán khỏi khe synap

Câu 985: Chọn câu **SAI**. Chất truyền đạt thần kinh được loại trừ bằng những cách sau :

- a. Khuếch tán ra mô xung quanh
- b. Dùng enzym phân hủy
- c. Hấp thụ ngược lại màng trước synap
- d. **Hấp thụ vào màng sau synap**

Câu 986: Chất truyền đạt thần kinh được chuyển hóa chủ yếu theo 3 cách, **ngoại trừ**

- a. **Gắn vào receptor ở màng sau synap và đi vào noron sau synap**
- b. Khuếch tán ra khỏi khe synap vào các dịch xung quanh
- c. Phân hủy tại khe synap dưới tác dụng của enym
- d. Vận chuyển tích cực trở lại cúc tận cùng và được tái sử dụng

Nội dung 4. Một số đặc điểm dẫn truyền xung thần kinh qua synapse

Câu 987: Hiện tượng cộng kích thích theo thời gian là hiện tượng cộng các điện thế :

- a. Kích thích xuất hiện đồng thời
- b. **Kích thích xuất hiện liên tiếp nhau và đủ nhanh**
- c. Kích thích và ức chế xuất hiện đồng thời
- d. Kích thích và ức chế xuất hiện không đồng thời

Câu 988: Khi làm việc học tập liên tục kéo dài sẽ dẫn đến mệt mỏi, giảm khả năng tập trung do:

- a. Hiện tượng cộng synapse.
- b. **Hiện tượng mỏi synapse.**
- c. Hiện tượng chậm synapse.
- d. Hiện tượng phân kỳ dẫn truyền.

Câu 989: Mỗi synap là hiện tượng

- a. Chất truyền đạt thần kinh bị phá hủy ngay khi vừa giải phóng
- b. Chất truyền đạt thần kinh được tái sử dụng khá nhiều
- c. **Ngừng dẫn truyền qua synap khi synap bị kích thích liên tục**
- d. Xung động đi qua synap mất thời gian chờ đợi

Câu 990: Mỗi synap là hiện tượng :

- a. Cường độ kích thích quá cao vượt ngưỡng chịu đựng của notron
- b. Cộng gộp tác dụng của nhiều chất truyền đạt thần kinh ức chế lên màng sau synap
- c. **Noron bị kích thích liên tục đến một lúc nào đó sẽ dừng dẫn truyền qua synap**
- d. Xung động lan đến cúc tận cùng phải mất một thời gian nhất định mới sang được notron sau

Câu 991: Hiện tượng mỏi Synap là

- a. **Giảm dần tần số xung động ở màng sau synap khi màng sau syna bị kích thích với tần số cao**
- b. Tăng dần chất truyền đạt thần kinh ở cúc tận cùng

- c. Tăng tái hấp thu Ca^{++} vào màng sau synap
- d. Chậm synap tối thiểu 0,5 giây để xung động có thể lan truyền qua synap

Câu 992: Hiện tượng mỗi synap là hiện tượng:

- a. Cộng đồng thời điện thế kích thích và ức chế sau synap gây triệt tiêu lẫn nhau
- b. Cộng theo thời gian điện thế kích thích và ức chế sau synap gây triệt tiêu lẫn nhau
- c. Giảm dần tần số xung động ở màng sau synap khi màng sau synap bị kích thích với tần số cao
- d. Chậm synap tối thiểu 0,5 giây để xung động có thể lan truyền qua synap.

Câu 993: Cơ chế tạo nên hiện tượng mỗi synap, ngoại trừ:

- a. Bất hoạt các receptor ở màng sau synap
- b. Cạn kiệt các chất dẫn truyền ở màng trước synap
- c. Chậm tái hấp thu Ca^{++} vào màng sau synap làm mở kênh K^+ gây hiệu ứng ức chế.
- d. Chậm tái hấp thu Ca^{++} vào màng sau synap làm mở kênh Cl^- gây hiệu ứng ức chế.

Câu 994: Chậm synap là :

- a. Chậm mở kênh Ca^{++} làm giảm Ca^{++} nội bào
- b. Chậm khuếch tán chất truyền đạt thần kinh qua khe Synap
- c. Chậm gắn kết chất truyền đạt thần kinh lên màng sau synap
- d. Thời gian cần thiết để dẫn truyền xung động qua khe synap

CHUYÊN ĐỀ 6 – SINH LÝ HỆ THẦN KINH

Bài số 20

SINH LÝ THẦN KINH CẢM GIÁC

Nội dung 1. Các thành phần của thần kinh cảm giác nông

Câu 995: Thành phần của hệ thần kinh cảm giác, ngoại trừ :

- a. Đường dẫn truyền hướng tâm
- b. Đường dẫn truyền ly tâm
- c. Bộ phận nhận cảm
- d. Trung tâm xử lý thông tin

Câu 996: Đặc điểm điện thế receptor :

- a. Tạo ra do sự khử cực tới ngưỡng
- b. Tất cả đều được dẫn truyền từ ngoại vi về não
- c. Khoảng cách lan truyền ngắn
- d. Tăng cường độ kích thích làm tăng tần số xuất hiện điện thế hoạt động

Câu 997: Cảm giác nông sau đây có receptor ở các tạng, ngoại trừ:

- a. Cảm giác xúc giác
- b. Cảm giác đau
- c. Cảm giác nhiệt
- d. Cảm giác thăng bằng

Câu 998: Hệ thống cảm giác nông không có :

- a. Receptor xúc giác
- b. Receptor khớp
- c. Receptor đau
- d. Receptor nhiệt

Câu 999: Các receptor cảm giác nông và cảm giác bản thể được phân loại theo các cách sau, ngoại trừ

- a. Vị trí receptor
- b. Nguồn gốc kích thích
- c. Bản chất hóa học
- d. Tốc độ thích nghi

Câu 1000: Receptor không có tính thích nghi là receptor tiếp nhận cảm giác gì?

- a. Cảm giác xúc giác
- b. Cảm giác đau
- c. Cảm giác vị giác
- d. Cảm giác nóng-lạnh

Câu 1001: Receptor **không** nhận cảm hóa học:

- a. Nụ vị giác
- b. Biểu mô khứu
- c. Receptor nóng, lạnh
- d. Receptor quai động mạch chủ và xoang cảnh

Câu 1002: Cảm giác nào **không** có trung tâm xác định trên các thùy vỏ não

- a. Cảm giác xúc giác
- b. Cảm giác nhiệt
- c. Cảm giác đau
- d. Cảm giác sâu có ý thức

Câu 1003: Tính đặc hiệu của một cảm giác chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau, ngoại trừ :

- a. Tính đặc hiệu của kích thích
- b. Tính đặc hiệu của receptor
- c. Tổ chức của hệ thống cảm giác
- d. **Ngưỡng kích thích của receptor cao**

Câu 1004: Receptor cảm giác có các đặc tính chung sau đây, **ngoại trừ:**

- a. Có tính đáp ứng với kích thích đặc hiệu
- b. Có mối tương quan giữa lượng cảm giác và lượng kích thích
- c. **Có mối tương quan giữa lượng cảm giác và thời gian kích thích**
- d. Có sự biến đổi kích thích thành xung động thần kinh

Câu 1005: Tiểu thể pacini hay những tận cùng có vỏ bọc nhận cảm giác về

- a. Nóng
- b. Lạnh
- c. **Áp suất**
- d. Xúc giác

Câu 1006: Chọn phát biểu **sai** khi nói về cảm giác xúc giác ?

- a. Độ nhạy cảm receptor phụ thuộc cá thể và sự tập luyện
- b. Receptor nhận cảm là đầu tự do của dây thần kinh
- c. **Receptor nhận cảm xúc giác có nhiều ở mặt trước cẳng tay, mặt trong cẳng chân**
- d. Kích thích gây cảm giác xúc giác thường là kích thích cơ học

Câu 1007: Receptor nhận cảm lạnh :

- a. **được phân bố rộng rãi trên cơ thể**
- b. Nằm sâu hơn receptor nhận cảm nóng
- c. Bị kích thích ở nhiệt độ 12 – 15 độ
- d. Ngừng hoạt động ở 25 độ

Câu 1008: Receptor **không** nhận cảm về hóa học :

- a. Nụ vị giác
- b. Biểu mô khứu
- c. **Receptor nóng , lạnh**
- d. Receptot quai động mạch chủ và xoang cảnh

Câu 1009: Receptor cảm giác có ở khắp nơi trên gia, **ngoại trừ:**

- a. Quanh lỗ chân lông
- b. Đầu mũi
- c. **Vành tai**
- d. Đầu ngón tay

Câu 1010: Receptor cảm giác nóng hoạt động mạnh nhất ở nhiệt độ :

- a. 37 – 40°C
- b. **38 – 43°C**
- c. 38 – 45°C
- d. 32 – 48°C

Câu 1011: Đặc điểm receptor nhận nhiệt cảm giác nóng, **ngoại trừ:**

- a. Nằm ở lớp nông của da
- b. Ngưng hoạt động khi nhiệt độ thấp hơn 20 – 25°C, giới hạn cao nhất 45 – 47°C
- c. Hoạt động mạnh ở 38 – 43°C
- d. **Nhiều gấp 3 – 10 lần receptor lạnh**

Câu 1012: Đường dẫn truyền cảm giác xúc giác ở chằng thứ nhất thực hiện bởi :

- a. Sợi A_α và C
- b. Sợi A_δ và C
- c. **Sợi A_β và C**
- d. Sợi B và C

Câu 1013: Đặc điểm dẫn truyền cảm giác xúc giác:

- a. Dẫn truyền theo sợi trục A_{β} đi theo bó gai thị trước
- b. Dẫn truyền theo sợi trục A_{α} đi theo bó gai thị trước
- c. Dẫn truyền theo sợi trục C đi theo bó gai thị trước
- d. Dẫn truyền theo sợi A_{δ} đi theo bó gai thị trước

Câu 1014: Cảm giác xúc giác tinh tế được dẫn truyền :

- a. Theo bó tủy – đồi thị trước và bên
- b. Theo bó tủy – đồi thị trước
- c. Theo bó tủy – đồi thị sau
- d. Theo bó tủy – đồi thị trước và sau

Câu 1015: Chọn câu sai.

- a. Receptor nhận cảm nóng là các tiểu thể bên trong có các sợi không có bao myelin
- b. Loại sợi C không có bao myelin dẫn truyền chậm cảm giác nóng
- c. Receptor nhiệt (nhất là receptor) lạnh có tính thích nghi nhưng không hoàn toàn
- d. Loại sợi A_{δ} có bao myelin dẫn truyền cảm giác nóng

Câu 1016: Bó cung giữa là những sợi cảm giác của neuron thứ hai dẫn truyền thông tin đến

- a. Đồi thị
- b. Hành não
- c. Tủy sống
- d. Vỏ não

Câu 1017: Đường dẫn truyền cảm giác nhiệt :

- a. Bó gai thị trước – bắt chéo tại sừng sau tủy sống
- b. Bó gai thị sau – bắt chéo tháp tại hành não
- c. Bó gai thị trước – bắt chéo tháp tại hành não
- d. Bó gai thị sau – bắt chéo tại sừng sau tủy sống

Câu 1018: Trên đường dẫn truyền của cảm giác đau có cho nhánh bên vào cấu tạo lưới ở chặng :

- a. Chặng 1 : Từ ngoại biên và sừng sau tủy sống
- b. Chặng 2 : Từ sừng sau tủy sống lên đồi thị
- c. Chặng 3 : Từ đồi thị lên vỏ não
- d. Trung tâm nhận cảm đau ở vỏ não thùy đỉnh

Câu 1019: Nhận thức cảm giác thân thể xảy ra ở :

- a. Đồi thị
- b. Hành não
- c. Cầu não
- d. Vỏ não sau rãnh trung tâm

Câu 1020: Ngón trở thường rất nhạy cảm, vì :

- a. Kích thước mỗi vùng tiếp nhận rất nhỏ
- b. Mật độ receptor lớn
- c. Vùng đại diện trên vỏ não có diện tích lớn
- d. Nằm ở ngoại biên

Câu 1021: Đặc điểm của cảm giác đau :

- a. Là cảm giác nông chỉ có receptor ở da và niêm
- b. Có tính thích nghi
- c. Cho nhánh bên vào cấu tạo lưới để hoạt hóa toàn bộ vỏ não
- d. Đường dẫn truyền bắt chéo ở hành não

Câu 1022: Cảm giác đau có đặc điểm sau, ngoại trừ :

- a. Receptor không có tính thích nghi
- b. Mức độ đau chỉ phụ thuộc vào tác nhân gây đau

- c. Vị trí của cảm giác đau nhanh được xác định chính xác hơn
- d. Đường dẫn truyền hay đi kèm với cảm giác xúc giác

Câu 1023: Cảm giác đau :

- a. Là cảm giác nông , các receptor chỉ phân bố ngoài da
- b. Có ý nghĩa bảo vệ cơ thể nên không thích nghi và liên quan với hệ lưới
- c. Các xung động về đau được dẫn truyền với một tốc độ duy nhất vào đồi thị
- d. Trung tâm cảm giác hoàn toàn khu trú trong thùy đỉnh vỏ não

Câu 1024: Cảm giác đau cho đường dẫn truyền bên chất lưới nhằm :

- a. Xử lý thông tin và đưa ra yêu cầu đáp ứng
- b. Hoạt hóa toàn bộ vỏ não để tham gia vào đáp ứng
- c. Ức chế tùy sống ngăn sự dẫn truyền cảm giác đau liên tiếp
- d. Khu trú đường dẫn truyền theo 1 hướng

Câu 1025: Ý nghĩa của hệ lưới hoạt hóa truyền lên ở vùng hành – cầu não :

- a. Tạo trạng thái tỉnh táo, cảnh giác giúp nhận cảm giác tốt hơn
- b. Khuếch đại toàn bộ cảm giác nông lên thùy đỉnh của vỏ não
- c. Tăng hưng phấn vỏ não bằng các tín hiệu điện khuếch đại
- d. Xử lý thông tin truyền lên từ đồi thị khi chặng 3 bị tổn thương

Câu 1026: Thuốc gây mê dùng trong phẫu thuật đã có tác động ức chế trên :

- a. Receptor đau ở ngoài da
- b. Đường dẫn truyền riêng của các receptor đau trên thành các tạng
- c. Hệ lưới ở hành – cầu não
- d. Tiểu não

Câu 1027: Chặng 2 của đường dẫn truyền cảm giác chung cho tất cả cảm giác nông

- a. Bắt chéo ở tủy sống và tận cùng đồi thị đối bên
- b. Theo bó gai thị trước và sau lên đến tiểu não cùng bên
- c. Cho nhánh bên và cầu tạo lưới và bắt chéo ở cầu não
- d. Đi thẳng cùng bên lên đến nhân thon , nhân chêm ở hành não

Câu 1028: Đồi thị là

- a. Trung tâm của mọi cảm giác và giác quan
- b. Trạm dừng của mọi cảm giác và giác quan
- c. Trạm dừng của mọi cảm giác, giác quan, trung tâm dưới vỏ của cảm giác đau
- d. Trạm dừng của mọi cảm giác, giác quan, trung tâm dưới vỏ của cảm giác đau , tham gia điều hòa các vận động có liên quan đến cảm xúc

Câu 1029: Nhận định nào sau đây sai :

- a. Cảm giác xúc giác có độ nhạy cảm thay đổi theo cá thể , tập luyện
- b. Cảm giác nóng lạnh có khả năng thích nghi
- c. Cảm giác đau đầu không có khả năng thích nghi
- d. Cảm giác đau nội tạng có đường dẫn truyền riêng .

Câu 1030: Cảm giác nóng, lạnh, đau . Chọn câu sai :

- a. Cảm giác nóng có thụ cảm thể là Ruffini
- b. Cảm giác lạnh có thụ cảm thể là Knauss
- c. Cảm giác đau không có thụ cảm thể đặc hiệu
- d. Sợi C dẫn truyền cảm giác đau nhanh , đau cấp.

Nội dung 2. Các thành phần của thần kinh cảm giác sâu

Câu 1031: Cảm giác bản thể là :

- a. Cảm giác về trương lực cơ xuất phát từ suốt thần kinh – cơ
- b. Cảm giác về tư thế, cử động của cơ thể hoặc một phần thân thể

- c. Cảm giác không ý thức xuất phát từ suốt thần kinh – cơ hoặc thể golgi
- d. **Cảm giác có hoặc không ý thức xuất phát từ gân, cơ, xương, khớp**

Câu 1032: Loại receptor **không** nhận cảm giác bản thể :

- a. Suốt cơ
- b. Cơ quan golgi ở gân
- c. **Receptor xúc giác và áp suất**
- d. Receptor ở khớp

Câu 1033: Receptor nhận cảm về trương lực cơ bị kích thích khi :

- a. Cơ co ngắn lại
- b. Sức căng của cơ tăng lên
- c. **Sợi cơ bị kéo dài ra**
- d. Hai đầu sợi nội suốt dẫn ra

Câu 1034: Cảm giác sâu có ý thức được dẫn truyền :

- a. Theo bó Flechsig
- b. Theo bó Gowers
- c. **Theo bó Burdach và Goll**
- d. Theo bó Goll

Câu 1035: So với cảm giác sâu không ý thức, cảm giác sâu có ý thức :

- a. Không có receptor bản thể
- b. Bắt chéo ở tủy sống
- c. **Được dẫn truyền vào tiểu não**
- d. Giúp phối hợp động tác tự động

Câu 1036: Đường dẫn truyền thần kinh sau đây **không** liên hệ với tiểu não :

- a. Đường tháp
- b. **Đường cảm giác đau, nóng lạnh**
- c. Đường cảm giác sâu có ý thức
- d. Đường cảm giác sâu không ý thức

Câu 1037: Về cảm giác sâu không ý thức và có ý thức :

- I. Cả hai cảm giác đều dẫn truyền cảm giác bản thể
- II. Cảm giác sâu có ý thức có đường cảm giác tận cùng ở tiểu não
- III. Cả hai đều xuất phát từ các bộ phận nhận cảm ở gân, cơ và khớp
- IV. Cả hai đều đi vào tủy sống qua rễ sau
- V. Cảm giác sâu không ý thức dẫn truyền đến tiểu não, cảm giác trương lực cơ để phối hợp động tác

Chọn Tập Hợp Câu Đúng :

- a. II, III, IV
- b. I, II, III
- c. III, IV, V
- d. **I, III, V**

Nội dung 3. Các thành phần của thần kinh giác quan

A – Thị giác

Câu 1038: Điều tiết là khả năng :

- a. Thể thủy tinh thay đổi độ khúc xạ
- b. Đồng tử thay đổi kích thước
- c. Thủy dịch thay đổi thể tích
- d. **Giác mạc thay đổi độ cong**

Câu 1039: Yếu tố nào sau đây quan trọng liên quan đến thị lực ?

- a. Khoảng cách giữa các tế bào gậy

- b. Đường kính của điểm vàng
- c. Độ cong của giác mạc
- d. Đường kính của đồng tử

Câu 1040: Lỗ trung tâm của điểm vàng là nơi thị lực cao nhất vì:

- a. Tại đây chỉ có các tế bào nón
- b. Tại đây số tế bào gậy ít hơn số tế bào nón
- c. Tại đây có nhiều mạch máu lớn
- d. Các tia sáng sẽ tự động rơi vào lỗ trung tâm khi đi vào mắt

Câu 1041: Sử dụng kính hội tụ trong bệnh :

- a. Cận thị
- b. Viễn thị
- c. Lão thị
- d. Loạn thị

Câu 1042: Sử dụng kính phân kỳ trong bệnh :

- a. Cận thị
- b. Viễn thị
- c. Lão thị
- d. Loạn thị

Câu 1043: Yếu tố đảm bảo tăng lượng ánh sáng đi vào mắt :

- a. Độ cong giác mạc
- b. Phản xạ đồng tử
- c. Tỷ lệ tế bào hình nón và hình gậy
- d. Hiện tượng khúc xạ

Câu 1044: Cận thị là một tật khúc xạ do nguyên nhân nào sau đây ?

- a. Nhãn cầu đường kính ngắn hơn bình thường nên hình ảnh từ xa được hội tụ phía sau võng mạc
- b. Nhãn cầu có đường kính dài hơn bình thường, hình ảnh từ xa được hội tụ phía trước võng mạc
- c. Thủy tinh không còn khả năng điều tiết nên lúc nào cũng phải nhìn gần
- d. Độ cong giác mạc không đồng đều nên hình ảnh bị mờ vì có nhiều điểm hội tụ trên võng mạc

Câu 1045: Cơ chế cảm thụ ánh sáng là một hiện tượng:

- a. quang hóa
- b. quang điện
- c. điện hóa
- d. quang học

Câu 1046: Chức năng của Rhodopsin

- a. Giúp mắt điều tiết ánh sáng
- b. Giúp nhìn màu sắc và phân biệt chi tiết
- c. Hấp thụ và biến đổi năng lượng ánh sáng ở cường độ rất nhỏ
- d. Tạo ra scotopsin và cis-retinal

Câu 1047: Chọn câu sai. Quang sắc tố của tế bào nón gồm 3 loại sắc tố màu nhạy cảm với màu gì?

- a. Màu đỏ
- b. Màu vàng
- c. Màu xanh lá
- d. Màu xanh dương

Câu 1048: Chọn câu đúng

- a. Tế bào hình gậy có quang sắc tố là photopsin.
- b. Tế bào hình gậy nhạy cảm với ánh sáng hơn tế bào hình nón
- c. Sắc tố caroten : retinal là aldehyd của vitamin C

d. Tế bào que giúp phân biệt được các chi tiết, màu sắc, giới hạn sự vật

Câu 1049: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi ánh sáng kích thích tế bào gậy?

- a. Luồng Na^+ đi vào đoạn ngoài của tế bào gậy tăng
- b. Chất trung gian thần kinh được phóng thích nhiều hơn vào khe synap với tế bào lưỡng cực
- c. **Nồng độ GMP vòng trong tế bào hình gậy giảm**
- d. Phosphodiesterase hoạt hóa transducin

Câu 1050: Các câu sau đây đều đúng khi nói về các tế bào nhận cảm ánh sáng, ngoại trừ :

- a. **Tế bào gậy và tế bào nón có độ nhạy cảm giống nhau đối với ánh sáng**
- b. Đoạn ngoài có các kênh Na^+ được giữ ở trạng thái mở do GMP vòng
- c. Vùng synap tiếp xúc với cả tế bào lưỡng cực lẫn tế bào ngang
- d. Khi tế bào ở trong bóng tối, đoạn trong bơm liên tục Na^+ từ tế bào ra ngoài

Câu 1051: Trung tâm cảm nhận cảm giác thị giác nằm ở:

- a. Thùy trán
- b. Thùy đỉnh
- c. Thùy thái dương
- d. **Thùy chẩm**

B – Thính giác

Câu 1052: Chọn câu đúng với vai trò của chuỗi xương con :

- a. Làm tăng lực tác dụng của sóng âm lên đáy xương bàn đạp với tác dụng trên màng nhĩ
- b. Chỉ dẫn truyền các sóng âm có tần số thích hợp với hoạt động của chuỗi xương con
- c. Tăng biên độ rung của màng nhĩ dưới tác dụng của sóng âm
- d. Nếu không có chuỗi xương con sẽ không có sự dẫn truyền sóng âm

Câu 1053: Vị trí của cơ quan corti

- a. **Nằm trên màng Reissener**
- b. Trong ngoại dịch tai trong
- c. Phủ lên màng mái
- d. Gắn trên sợi nền

Câu 1054: Câu nào sau đây đúng với tế bào lông ốc tai?

- a. Có liên hệ thần kinh với thể gối ngoài
- b. **Các lông được cố định trên màng lưới**
- c. Nằm trên màng mái
- d. Có nhiệm vụ chống đỡ màng nền

Câu 1055: Khi các tế bào lông của cơ quan Corti bị kích thích :

- a. **K^+ tràn vào ở đỉnh tế bào, gây khử cực màng**
- b. Na^+ tràn vào đỉnh tế bào, gây khử cực màng
- c. Ca^{++} tràn vào ở đáy tế bào, gây khử cực màng
- d. Ca^{++} vào ít hơn ở đáy tế bào, gây tăng sản xuất chất dẫn truyền thần kinh

Câu 1056: Chọn câu đúng.

- a. Chuỗi xương trong tai giữa làm nhiệm vụ truyền đạt và phóng đại âm thanh lên 3 lần
- b. Cơ quan corti nằm trong thang nhĩ
- c. Tế bào thụ cảm có lông lớp trong tiếp nhận âm thanh cường độ mạnh
- d. **Sự tiếp nhận âm thanh có tần số khác nhau phụ thuộc vào đoạn dịch thể dao động và màng nền trong vỏ corti**

Câu 1057: Câu nào sau đây đúng với ống bán khuyên :

- a. Gồm 3 ống thẳng góc nhau ở mỗi bên tai
- b. Bị kích thích trong chuyển động thẳng tăng tốc
- c. **Bị kích thích tối đa khi cơ thể chuyển động trong mặt phẳng của ống**

d. Hoạt động ngay cả khi cơ thể không chuyển động

Câu 1058: Phần nào của cơ quan nhận cảm ốc tai mã hóa được âm thanh cường độ mạnh tần số cao :

- a. Các tế bào thụ cảm lớp ở phần đỉnh ốc tai
- b. Các tế bào thụ cảm lớp trong ở phần đỉnh ốc tai
- c. Các tế bào thụ cảm lớp trong ở đoạn đầu ốc tai
- d. Các tế bào thụ cảm lớp ngoài ở phần giữa ốc tai

Câu 1059: Sóng âm có thể đến được tai trong qua các con đường sau , ngoại trừ :

- a. Làm rung động màng nhĩ , chuỗi xương con
- b. Đến trực tiếp của sổ bầu dục qua vòi Eustache
- c. Làm rung động khối xương sọ
- d. Làm chuyển động dịch trong ống bán khuyên , xoang nang , cầu nang đến cửa sổ tròn

Câu 1060: Sự phân biệt độ cao của âm dựa trên :

- a. Số lượng tế bào lông bị kích thích cùng lúc
- b. Tần số phát xung động của thần kinh ốc tai
- c. Sự khác biệt trong sự khuếch đại thanh có tần số khác nhau tại tai giữa
- d. Vị trí màng nền bị kích thích tối đa bởi sóng âm

Câu 1061: Bộ phận tai trong của thính giác , chọn câu sai

- a. Sợi ngắn nằm gần đáy có khuynh hướng rung với tần số thấp
- b. Sợi dài nằm gần đỉnh có khuynh hướng rung với tần số cao
- c. Cơ quan Corti được cấu tạo bởi các tế bào lông
- d. Màng Reissner là màng ngăn giữa thang giữa và thang ốc tai

Câu 1062: Noron thứ nhất của đường dẫn truyền xung động thính giác xuất phát từ các tế bào thần kinh trên cơ quan Corti đến:

- a. Nhân lưng và nhân bụng
- b. Nhân tiền đình
- c. Nhân lưng và nhân tiền đình
- d. Nhân bụng và nhân tiền đình

Câu 1063: Đường dẫn truyền của thính giác bao gồm mấy noron?

- a. 1 noron
- b. 2 noron
- c. 3 noron
- d. 4 noron

Câu 1064: Vùng thính giác của vỏ não nằm ở :

- a. Thùy đỉnh
- b. Thùy trán
- c. Thùy thái dương
- d. Thùy chẩm

C – Vị giác

Câu 1065: Receptor tiếp nhận cảm giác vị giác là

- a. Các phân tử protein nằm trên bề mặt lưỡi
- b. Các tế bào vị giác nằm ở lưỡi
- c. Các nụ vị giác nằm ở lưỡi
- d. Các gai vị giác nằm ở lưỡi

Câu 1066: Bốn vị cơ bản được nhận biết là :

- a. Đắng, cay, mặn, ngọt
- b. Chua, cay, mặn, ngọt
- c. Mặn, ngọt, chua, chát
- d. Đắng, chua, mặn, ngọt

Câu 1067: Câu nào sau đây **không** đúng với vị trí cảm nhận vị giác của lưỡi ?

- a. Vị ngọt – đầu lưỡi
- b. Vị mặn – đầu lưỡi
- c. Vị chua – cuối lưỡi
- d. Vị đắng – cuối lưỡi

Câu 1068: Chồi (nụ) vị giác **không** có đặc tính sau :

- a. Được chi phối bởi dây 3,7,9
- b. Đáp ứng với các chất hóa học tan trong nước bọt
- c. Có khả năng khử cực và giải phóng hóa chất trung gian
- d. Là những receptor trong

Câu 1069: Cảm giác vị giác có các đặc điểm sau, **ngoại trừ** :

- a. Ngưỡng kích thích của các cảm giác vị giác vị giác giống nhau
- b. Có tính thích nghi nhanh
- c. Ưu thích một vị nào đó liên quan đến nhu cầu và sự trải nghiệm trong đời sống
- d. Cảm giác vị giác chịu ảnh hưởng của nhiều cảm giác khác

Câu 1070: Trong sự cảm nhận vị giác có sự cảm giác của cấu trúc sau, **ngoại trừ**

- a. Vỏ não thùy đỉnh
- b. Các dây thần kinh V, VII, IX, X
- c. Tuyến nước bọt
- d. Đồi thị

Câu 1071: Dây thần kinh sọ liên quan đến cảm giác vị giác:

- a. 1/3 trước lưỡi do dây V₃, 2/3 sau lưỡi do dây IX
- b. 2/3 trước lưỡi do dây V₃, 1/3 sau lưỡi do dây IX
- c. 1/3 trước lưỡi do dây IX, 2/3 sau lưỡi do dây V₃
- d. 2/3 trước lưỡi do dây IX, 1/3 sau lưỡi do dây V₃

D – Khứu giác

Câu 1072: Đặc điểm bộ phận nhận cảm khứu giác, **ngoại trừ**:

- a. Ngưỡng kích thích rất thấp
- b. Khả năng phân biệt các thay đổi nhỏ cường độ các mùi kém
- c. Các tế bào nhận cảm chiếm một vùng 2,4cm² mỗi bên, màu vàng nhạt
- d. Receptor nằm ở niêm mạc xương cuống mũi dưới

Câu 1073: Khứu giác **không** có đặc điểm sau :

- a. Receptor là neuron hai cực
- b. Trung tâm nhận cảm là vùng limbic của vỏ não
- c. Liên quan đến cảm giác
- d. Các neuron cảm giác không có khả năng tái tạo

Câu 1074: Cơ chế chủ yếu kích thích các tế bào khứu giác là:

- a. Cơ chế thần kinh vì phân tử mang mùi phải kích thích vào receptor rồi truyền về trung tâm.
- b. Cơ chế thể dịch vì phân tử mang mùi phải hoà tan trong lớp niêm dịch rồi mới tác động vào tế bào khứu.
- c. Cơ chế vật lý vì chỉ có những chất bay hơi được hít vào mũi mới nhận biết được mùi.
- d. Cơ chế hoá học vì phân tử mang mùi phải gắn vào receptor làm mở kênh ion và gây khử cực tế bào khứu

Câu 1075: Chọn câu **sai** : Vỏ não thùy đỉnh là trung tâm của cảm giác :

- a. Xúc giác
- b. Nhiệt
- c. Vị giác

d. Khứu giác

Nội dung 4. Suy luận về những tổn thương đường dẫn truyền cảm giác và trung tâm xử lý

Câu 1076: Khi bệnh nhân bị tổn thương mất vỏ não, vẫn còn cảm giác

- a. Cảm giác nhiệt
- b. Cảm giác đau
- c. **Cảm giác xúc giác**
- d. Cảm giác sâu có ý thức

Câu 1077: Tổn thương vùng cầu não bên phải gây :

- a. Mất cảm giác xúc giác bên phải
- b. **Mất cảm giác xúc giác bên trái**
- c. Mất 1 phần cảm giác xúc giác 2 bên
- d. Mất toàn bộ cảm giác xúc giác 2 bên

Câu 1078: Tổn thương vùng nào gây giảm mọi cảm giác ở một nửa người và tăng cảm giác đau :

- a. Tổn thương tủy sống
- b. Tổn thương vùng dưới đồi
- c. **Tổn thương đồi thị**
- d. Tổn thương thùy đỉnh ở vỏ não đối bên

Câu 1079: Bệnh nhân nữ 80 tuổi, được chẩn đoán đột quỵ, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân còn cảm giác sâu ở chân, và mất cảm giác sâu ở tay. Có thể chẩn đoán vị trí tổn thương thần kinh ở đây là:

- a. Bó tiểu não thẳng
- b. **Bó chên**
- c. Bó thon
- d. Bó tiểu não chéo

Câu 1080: Những rối loạn cảm giác của *hội chứng Brown- Séquard*:

- a. **Bên lành còn cảm giác sâu, mất cảm giác nông. Bên tổn thương còn cảm giác nông và xúc giác thô sơ, mất cảm giác sâu và xúc giác tinh tế.**
- b. Mất mọi cảm giác ở phần cơ thể dưới chỗ bị cắt.
- c. Bên lành còn cảm giác nông, mất cảm giác sâu và xúc giác tinh tế. Bên tổn thương còn cảm giác sâu, mất cảm giác nông.
- d. Bên lành còn mọi cảm giác. Bên tổn thương mất mọi cảm giác.

Câu 1081: Tổn thương vùng số 18, 19 (thùy chẩm) ở cả hai bên vỏ não sẽ gây nên hậu quả :

- a. Bị điếc
- b. Mất cảm giác vị của thức ăn
- c. Mất cảm giác mùi
- d. **Nhìn thấy vật nhưng không biết vật gì**

Câu 1082: Tổn thương dải thị bên trái sẽ gây mù

- a. Thị trường mũi mắt trái và thị trường mũi mắt phải
- b. Thị trường mũi mắt trái và thị trường thái dương mắt phải
- c. **Thị trường thái dương mắt trái và thị trường mũi mắt phải**
- d. Thị trường thái dương mắt trái và thị trường thái dương mắt phải

Câu 1083: Bị mù nửa thị trường đối bên gợi ý tổn thương xảy ra tại:

- a. Dải thị
- b. **Giao thoa thị**
- c. Tia thị
- d. Thùy chẩm

Câu 1084: Tổn thương vùng thùy chẩm cả bên vỏ não sẽ gây hậu quả :

- a. Bị điếc

- b. Mất cảm giác vị của thức ăn
- c. Nhìn thấy vật nhưng không biết là vật gì**
- d. Mất cảm giác mùi

CHUYÊN ĐỀ 6 – SINH LÝ HỆ THẦN KINH

Bài số 21

SINH LÝ THẦN KINH VẬN ĐỘNG

Nội dung 1. Các thành phần của hệ vận động tháp

Câu 1085: Cơ quan vận động bao gồm :

- a. Bộ phận nhận cảm – đường ly tâm – bộ phận đáp ứng
- b. Trung tâm – đường ly tâm – bộ phận đáp ứng
- c. Bộ phận nhận cảm – đường hướng tâm – trung tâm
- d. Trung tâm – đường hướng tâm – đường ly tâm

Câu 1086: Vùng đại diện của cơ quan nào *lớn nhất* trên vỏ não ?

- a. Bàn tay
- b. Bàn chân
- c. Cẳng chân
- d. Cẳng tay

Câu 1087: Vỏ não vận động, **chọn câu sai**

- a. Vùng vận động sơ cấp chi phối cùng bên
- b. Vùng vận động bổ sung kiểm soát các hoạt động tinh tế của bàn tay, bàn chân
- c. Vùng tiền vận động góp phần tạo nên các động tác phối hợp
- d. Diện tích vùng đại diện trên vỏ não càng lớn khi cơ quan cử động càng nhiều

Câu 1088: Tồn thương vùng tiền vận động :

- a. Liệt toàn thân
- b. **Phối hợp các động tác không nhịp nhàng**
- c. Mất sự tinh tế trong từng tiểu động tác
- d. Liệt một số cơ quan ít cử động

Câu 1089: Đường dẫn truyền tháp :

- a. Bắt chéo từ nhân thon, nhân chêm lên đồi thị
- b. 100% bắt chéo tại tủy sống
- c. 100% bắt chéo tại hành não
- d. **9/10 bắt chéo tại hành não, 1/10 bắt chéo tại tủy sống**

Câu 1090: Sợi trục trong đường dẫn truyền ly tâm ở các vận động có ý thức chủ yếu:

- a. Bó tháp thẳng
- b. **Bó tháp chéo**
- c. Bó tủy đồi thị sau
- d. Bó gai thị trước

Câu 1091: Vị trí bắt chéo trên đường dẫn truyền ly tâm của bó tháp thẳng trong vận động tháp?

- a. Cầu não
- b. **Hành não**
- c. Sừng sau tủy sống
- d. Tủy sống

Câu 1092: Đặc điểm nào sau đây **không phải** của đường tháp:

- a. Bắt chéo
- b. Xuất phát từ vỏ não
- c. **Chi phối động tác đánh tay khi đi**
- d. Tận cùng ở các cơ vân

Câu 1093: Vòng nhân đuôi có vai trò :

- a. Là trung tâm của các vận động không có ý thức

- b. Tạo ra các động tác đơn giản
- c. Giúp thực hiện các động tác phức tạp đã được học tập và trở thành vô thức
- d. **Lập kế hoạch cho nhiều động tác liên tiếp nhau**

Câu 1094: Hoạt động viết khi đã thành thạo (như vô thức) được thực hiện dưới sự kiểm soát của

- a. Nhân đồ
- b. **Vòng nhân bèo**
- c. Vòng nhân đuôi
- d. Đồi thị

Câu 1095: Cấu trúc giúp lập kế hoạch về trình tự thời gian cho nhiều hình thức vận động đồng thời và kế tiếp nhau

- a. Tiểu não
- b. Vòng của nhân bèo
- c. **Vòng của nhân đuôi**
- d. Hệ lưới hoạt hóa truyền lên

Câu 1096: Biểu hiện bệnh Parkison trên bệnh nhân do ảnh hưởng của tổn thương:

- a. Vỏ não vận động
- b. **Vòng nhân bèo**
- c. Vòng nhân đuôi
- d. Bó ngoại tháp

Nội dung 2. Các thành phần của hệ vận động ngoại tháp

Câu 1097: Các cấu trúc nào sau đây đều nằm ở hành não?

- a. Củ não sinh tư
- b. Cấu tạo lưới kích thích truyền xuống
- c. Nhân bèo và nhân đuôi
- d. **Nhân đồ, nhân trám và nhân tiền đình**

Câu 1098: Đường dẫn truyền sau đây **không** bắt chéo

- a. Bó tháp
- b. Bó đồ tủy
- c. **Bó tiền đình tủy**
- d. Bó mái tủy

Câu 1099: Noron alpha ở sừng trước tủy sống bị ức chế bởi :

- a. **Nhân đồ**
- b. Củ não sinh tư
- c. Cấu tạo lưới ở cầu não
- d. Nhân tiền đình

Câu 1100: Noron alpha ở sừng trước tủy sống đoạn cùng cắt **không** tiếp nhận thông tin đến từ

- a. Nhân đồ
- b. **Củ não sinh tư**
- c. Cấu tạo lưới
- d. Nhân tiền đình

Câu 1101: Cấu tạo lưới ở hành não

- a. **Ức chế truyền xuống và làm giảm trương lực cơ**
- b. Ức chế truyền xuống và làm tăng trương lực cơ
- c. Kích thích truyền xuống làm tăng trương lực cơ
- d. Kích thích truyền xuống làm giảm trương lực cơ

Câu 1102: Tác dụng của ức chế truyền xuống, tăng cường truyền xuống, tăng cường truyền lên và tham gia sự hình thành hành vi, thái độ xử trí trên con vật thực nghiệm là chức năng của:

- a. Tủy sống và vỏ não
- b. Vùng dưới đồi và vỏ não
- c. **Cấu tạo lưới thuộc hành cầu não trước hành cầu não giữa và thân não**
- d. Tủy sống, hành não và vỏ não

Câu 1103: Kích thích cấu tạo lưới của cầu não của động vật thực nghiệm sẽ gây :

- a. Tăng các phản xạ tủy bao gồm cả phản xạ trương lực cơ
- b. Hoạt hóa vỏ não, giúp não con vật ở trạng thái tỉnh táo hơn
- c. Ức chế vỏ não, con vật ngủ liên miên
- d. **Giảm các phản xạ tủy bao gồm cả phản xạ trương lực cơ**

Câu 1104: Đường dẫn truyền sau đây là đường dẫn truyền ức chế :

- a. Hệ lưới truyền lên
- b. Bó tiền đình tủy
- c. Hệ lưới truyền xuống từ cầu não
- d. **Hệ lưới truyền xuống từ hành não**

Câu 1105: Hành não có chức năng điều hòa trương lực cơ vì :

- a. Chứa nhân đỏ làm tăng trương lực cơ
- b. Chứa nhân tiền đình làm giảm trương lực cơ
- c. **Chứa nhân tiền đình làm tăng trương lực cơ**
- d. Chứa nhân đỏ và nhân tiền đình để điều hòa trương lực cơ

Câu 1106: Bó tiền đình tủy sống xuất phát từ nhân tiền đình ở hành não :

- a. **đi thẳng xuống sừng trước tủy sống cùng bên và kích thích noron vận động**
- b. đi thẳng xuống sừng trước tủy sống cùng bên và ức chế noron vận động
- c. Bắt chéo đi xuống sừng trước tủy sống , đối diện và kích thích noron vận động
- d. bắt chéo đi xuống sừng trước tủy sống, đối diện và ức chế noron vận động

Câu 1107: Hai trung tâm sau có chức năng đối trọng trên trương lực cơ

- a. Hệ lưới truyền lên và hệ lưới truyền xuống
- b. Củ não sinh tư trước và củ não sinh tư sau
- c. **Nhân đỏ và nhân tiền đình**
- d. Tiểu não và hành não

Câu 1108: Trung tâm của phản xạ định hướng với ánh sáng :

- a. Nhân tiền đình
- b. Nhân mái
- c. **Củ não sinh tư trước**
- d. Củ não sinh tư sau

Câu 1109: Trung tâm của phản xạ định hướng với âm thanh :

- a. Nhân tiền đình
- b. Nhân mái
- c. Củ não sinh tư trước
- d. **Củ não sinh tư sau**

Câu 1110: Chọn câu **sai** về các đường dẫn truyền *ngoại tháp* :

- a. Nhân đỏ và bó đỏ tủy làm giảm trương lực cơ
- b. Củ não sinh tư và bó mái tủy tham gia thực hiện các phản xạ định hướng với ánh sáng và âm thanh
- c. Cấu tạo lưới và bó lưới tủy gây hoạt hóa và ức chế truyền xuống
- d. **Nhân tiền đình và bó tiền đình tủy điều hòa các phản xạ thực vật về tim và hô hấp**

Câu 1111: Phản xạ tư thế có liên quan đến những trung tâm sau:

- a. Sừng trước tủy sống
- b. **Nhân đỏ và nhân tiền đình**

- c. Tiểu não
- d. Nhân đầu và nhân đuôi

Câu 1112: Khi tổn thương hai củ não trước, bệnh nhân có biểu hiện :

- a. Tăng trương lực cơ
- b. Giảm trương lực cơ
- c. Mất phản xạ định hướng với ánh sáng
- d. Mất phản xạ định hướng với âm thanh

Câu 1113: Biểu hiện *đuối cứng mắt não* ở động vật thực nghiệm, **ngoại trừ**:

- a. Chân và đuôi gấp về lưng
- b. Liệt nửa bên mình
- c. Lưng cong lại hơn bình thường
- d. Chân duỗi thẳng không cử động

Câu 1114: Tình trạng *đuối cứng mắt não* xảy ra khi :

- a. Cắt ngang não con vật phía trên nhân đỏ
- b. Cắt ngang não con vật phía dưới nhân tiền đình
- c. Phá hủy tiểu não
- d. Cắt ngang não con vật phía dưới nhân đỏ

Câu 1115: Một bệnh nhân có biểu hiện đầu ngửa ra sau, tay duỗi áp sát thân mình, chân duỗi, hai bàn tay nắm và xoay ngoài. Tổn thương thần kinh trong trường hợp này

- a. ức chế nhân đỏ, còn tác dụng của nhân tiền đình
- b. ức chế nhân tiền đình, còn tác dụng nhân đỏ
- c. ức chế cả nhân đỏ và nhân tiền đình
- d. kích thích cả nhân đỏ và nhân tiền đình

Nội dung 3. Các thành phần của hệ vận động thực vật

Câu 1116: Về mặt giải phẫu, hệ thần kinh chia làm 2 phần :

- a. Hệ thần kinh động vật và hệ thần kinh thực vật
- b. Não bộ và tủy sống
- c. Thần kinh giao cảm và phó giao cảm
- d. Hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên

Câu 1117: Chọn câu đúng. Cấu trúc hạch giao cảm nằm ở vị trí nào?

- a. Trên não
- b. Trong tủy sống
- c. Cạnh cột sống
- d. Tại tạng

Câu 1118: Đặc điểm của hệ thần kinh phó giao cảm

- a. Trung tâm nằm liên tục ở sừng bên chất xám tủy sống
- b. Hạch giao cảm nằm gần trung tâm, xa tạng
- c. Khi noron hưng phấn thì nhu cầu chuyển hóa tăng cao
- d. Kích thích sẽ làm tăng hoạt động cơ học của hệ tiêu hóa

Câu 1119: Hệ phó giao cảm có đặc điểm sau :

- a. Trung tâm nằm liên tục bên chất xám tủy sống đoạn ngực và lưng
- b. Hạch gần trung tâm và xa tạng tạo thành chuỗi hạch
- c. Một sợi tiền hạch tạo synap với trung bình 20 sợi hậu hạch
- d. Sợi tiền hạch dài, sợi hậu hạch ngắn

Câu 1120: Hệ thần kinh giao cảm :

- a. Trung tâm nằm rải rác trong tủy sống

- b. Sợi tiền hạch ngắn, sợi hậu hạch dài
- c. Hạch giao cảm gần hạch xa trung tâm
- d. Một sợi tiền hạch chỉ tạo một synap với một sợi hậu hạch

Câu 1121: Đặc điểm thần kinh giao cảm, ngoại trừ:

- a. Sợi tiền hạch ngắn, sợi hậu hạch dài
- b. Ảnh hưởng giao cảm thường khu trú
- c. Hạch giao cảm gần trung tâm, xa tạng
- d. Khi bị kích thích tiết adrenalin hoặc noradrenalin

Câu 1122: Trung tâm của hệ phó giao cảm được phân bố ở

- a. Cuống não, não giữa, tủy sống
- b. Dọc theo các đốt sống cổ và tủy cùng
- c. Dọc theo đốt sống thắt lưng
- d. Hành não và đốt sống thắt lưng

Câu 1123: Phần trung tâm của hệ giao cảm được phân bố ở :

- a. Dọc theo đốt sống cổ tới đốt sống thắt lưng
- b. Sừng bên chất xám tủy sống từ lưng 1 đến thắt lưng 2
- c. Dọc theo đốt sống thắt lưng tới cùng cụt
- d. Sừng bên chất xám tủy sống từ lưng 1 đến lưng 5

Câu 1124: So sánh thần kinh giao cảm và phó giao cảm

- a. Thần kinh phó giao cảm sợi tiền hạch ngắn, sợi hậu hạch dài
- b. Hạch giao cảm nằm ngay trên thành cơ quan nó chi phối
- c. Trung tâm phó giao cảm nằm tập trung liên tục ở sừng bên chất xám tủy sống
- d. Kích thích giao cảm thường gây kích ứng lan rộng

Câu 1125: Chất trung gian hóa học của hệ thần kinh tự chủ, chọn câu đúng :

- a. Tất cả sợi sau hạch giao cảm đều bài tiết norepinephrin
- b. Phần lớn sợi sau hạch phó giao cảm bài tiết acetylcholine
- c. Sợi giao cảm chi phối cho tuyến thượng thận bài tiết ra norepinephrin
- d. Tất cả đều sai

Câu 1126: Hệ adrenergic bao gồm :

- a. Các sợi tiền hạch giao cảm
- b. Các sợi tiền hạch phó giao cảm
- c. Phần lớn sợi hậu hạch giao cảm
- d. Tất cả các sợi hậu hạch phó giao cảm

Câu 1127: Sợi adrenergic là sợi bài tiết chủ yếu :

- a. Acetylcholin
- b. Adrenalin
- c. Noadrenalin
- d. Adrenalin và noradrenalin

Câu 1128: Thần kinh giao cảm chi phối hoạt động của tuyến thượng thận thông qua chất trung gian hóa học nào sau đây :

- a. Epinephrin
- b. Norepinephrin
- c. Dopamin
- d. Acetylcholin

Câu 1129: Chất trung gian hóa học của hệ thần kinh tự chủ. Chọn câu đúng :

- a. Tất cả sợi sau hạch giao cảm đều bài tiết norepinephrin
- b. Phần lớn sợi sau hạch phó giao cảm bài tiết acetylcholine

- c. Sợi giao cảm chi phối cho tuyến thượng thận bài tiết ra norepinephrin
- d. Tất cả đều sai

Câu 1130: Cấu trúc nào sau đây không thuộc về hệ Cholinergic

- a. Sợi tiền hạch phó giao cảm
- b. Sợi hậu hạch phó giao cảm
- c. Sợi tiền hạch giao cảm
- d. Sợi hậu hạch giao cảm

Câu 1131: Receptor của acetylcholin là :

- a. Alpha
- b. Beta
- c. Muscarinic
- d. Nicotinic và muscarinic

Câu 1132: Đặc điểm nào sau đây **không phải** là đặc điểm của acetylcholine:

- a. Tác dụng nhanh và ngắn
- b. Tác dụng lên notron hậu hạch cả giao cảm và phó giao cảm
- c. Được phân hủy bởi men cholinesterase
- d. Làm giảm hoạt động cơ học và bài tiết của ống tiêu hóa

Câu 1133: Receptor alpha và beta nằm trên màng :

- a. Noron hậu hạch trong synap với sợi tiền hạch giao cảm
- b. Noron hậu hạch trong synap với sợi tiền hạch phó giao cảm
- c. Tế bào đáp ứng trong synap với sợi hậu hạch giao cảm
- d. Tế bào đáp ứng trong synap với sợi hậu hạch phó giao cảm

Câu 1134: CHỌN CẤU ĐÚNG. Cấu trúc hạch giao cảm nằm ở vị trí nào

- a. Trên não
- b. Trong tủy sống
- c. Cạnh cột sống
- d. Tại tạng

Câu 1135: Hạch phó giao cảm bao gồm các hạch sau , ngoại trừ :

- a. Hạch mi
- b. Hạch tai
- c. Hạch dưới hàm
- d. Hạch vòm khẩu cái

Câu 1136: Chuyển hóa năng lượng toàn cơ thể tăng khi kích thích cấu trúc của thần kinh nào sau đây

- a. Thần kinh giao cảm
- b. Phó giao cảm
- c. Đồi thị
- d. Phần trước vùng dưới đồi

Câu 1137: Hành não có vai trò sinh mạng do nó có :

- a. Là đường đi qua tất cả các bó dẫn truyền cảm giác và vận động
- b. Có nhân dây X, nhân tiền đình và các nơi bó tháp đi qua
- c. Có các trung khu điều hòa hô hấp và điều hòa tim mạch
- d. Có cấu tạo lưới và trung tâm điều hòa trương lực cơ

Câu 1138: Nhìn chung, hoạt động của các hệ cơ quan đều tăng lên khi kích thích giao cảm, ức chế phó giao cảm; ngoại trừ :

- a. Hệ tim mạch
- b. Hệ hô hấp
- c. Hệ tiết niệu
- d. Hệ tiêu hóa

Câu 1139: Biểu hiện nào đúng khi tăng cường hưng phấn hệ thần kinh giao cảm ?

- a. Tăng hoạt động của tim, tăng nhu động ruột, tăng tiết mồ hôi co đồng tử
- b. Tăng hoạt động của tim, giảm nhu động ruột, tăng tiết mồ hôi, giãn đồng tử
- c. Giảm hoạt động của hệ tuần hoàn, tiêu hóa, giảm tiết mồ hôi, co đồng tử .
- d. Giảm hoạt động của tim, giảm nhu động ruột, giảm tiết mồ hôi, giãn đồng tử .

Câu 1140: Kích thích giao cảm sẽ gây ra tác dụng nào sau đây, ngoại trừ :

- a. giãn tử mật
- b. giảm bài tiết adrenalin và noradrenalin của tuyến thượng thận
- c. giảm bài tiết enzyme tiêu hóa của tuyến tụy
- d. Bài tiết renin của tổ chức cạnh cầu thận

Câu 1141: Nhìn trong kích thích phó giao cảm gây :

- a. Co đồng tử , giảm hoạt động tim mạch và tiêu hóa
- b. Dẫn đồng tử , tăng hoạt động tim mạch và tiêu hóa
- c. Co đồng tử , giảm hoạt động tim mạch, tăng hoạt động tiêu hóa
- d. Dẫn đồng tử , tăng hoạt động tim mạch , giảm hoạt động tiêu hóa

Câu 1142: Hệ thần kinh tự chủ có các tác dụng sau đây , ngoại trừ :

- a. Kích thích giao cảm làm tăng giải phóng glucose ở gan
- b. Kích thích giao cảm làm giảm lưu lượng lọc ở thận
- c. Kích thích phó giao cảm làm co tử mật
- d. Kích thích phó giao cảm làm giãn cơ thể mi

Câu 1143: Chọn câu sai.

- a. Kích thích phần trước của vùng hạ đồi gây kích thích thần kinh giao cảm
- b. Hormon thyroxine có tác dụng tăng cường hoạt động hệ giao cảm
- c. Catecholamin của tủy thượng thận được coi là thuộc hệ cholinergic
- d. Vỏ não có ảnh hưởng lên hầu hết các trung tâm điều hòa hệ thần kinh tự chủ

CHUYÊN ĐỀ 6 – SINH LÝ HỆ THẦN KINH

Bài số 22

SINH LÝ PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN

Nội dung 1. Thành phần của cung phản xạ

Câu 1144: Một cung phản xạ có mấy thành phần cơ bản?

- a. 3 thành phần
- b. 4 thành phần
- c. 5 thành phần
- d. 6 thành phần

Câu 1145: Một cung phản xạ thần kinh tự chủ gồm 3 nơron theo thứ tự :

- a. Nơron truyền vào, nơron trung gian, nơron truyền ra.
- b. Nơron truyền vào, nơron trước hạch, nơron sau hạch
- c. Nơron truyền vào, nơron sau hạch, nơron trước hạch
- d. Nơron cảm giác, nơron trung gian, nơron truyền ra

Câu 1146: Thành phần trong cung phản xạ giúp tiếp nhận và xử lý thông tin từ đường truyền hướng tâm về :

- a. Bộ phận nhận cảm
- b. Trung tâm cảm giác
- c. Trung tâm vận động
- d. Bộ phận đáp ứng

Nội dung 2. Phản xạ tủy

Câu 1147: Quy luật cùng bên trong phản xạ tủy, nơron trung gian

- a. Đi từ sừng trước đến sừng sau tận cùng ở sừng sau tủy sống
- b. Đi từ sau ra đến sừng trước, tận cùng ở sừng trước tủy sống
- c. Đi từ khoang tủy này đến khoang tủy khác
- d. Đi từ bộ phận nhận cảm đến sừng trước tủy sống, tận cùng ở sừng trước tủy sống

Câu 1148: Khi kích thích rất nhẹ:

- a. Chỉ gây phản xạ cùng bên
- b. Gây phản xạ cùng bên và đối bên (trên cùng một khoang tủy)
- c. Chỉ gây phản xạ dọc theo khoang tủy
- d. Gây phản xạ toàn cơ thể

Câu 1149: Tủy sống có chức năng :

- a. Dẫn truyền cảm giác, vận động và là trung tâm của mọi phản xạ
- b. Dẫn truyền cảm giác, vận động và là trung tâm phản xạ trương lực cơ, phản xạ gân, phản xạ da và phản xạ thực vật
- c. Dẫn truyền cảm giác và là trung tâm dưới vỏ của cảm giác đau.
- d. Dẫn truyền cảm giác, vận động và là trung tâm của nhiều phản xạ có tính sinh mạng.

Câu 1150: Phản xạ sau đây không phải là phản xạ của tủy sống

- a. Phản xạ bài tiết nước bọt
- b. Phản xạ trương lực cơ
- c. Phản xạ gân xương
- d. Phản xạ da niêm

Câu 1151: Tủy sống là trung tâm của các phản xạ sau, ngoại trừ:

- a. Phản xạ tư thế

- b. Phản xạ gân cơ
- c. Phản xạ da
- d. Phản xạ giác mạc

Câu 1152: Một bệnh nhân nam bị tổn thương đoạn tủy thắt lưng có thể bị

- a. Mất toàn bộ phản xạ gân xương
- b. Mất hết phản xạ da vùng bụng
- c. Rối loạn phản xạ cương và phóng tinh
- d. Liệt hai chi dưới

Câu 1153: Noron thứ nhất của cung phản xạ 2 noron tủy sống ở tận cùng ở

- a. Hạch gai
- b. Sừng sau chất xám tủy sống
- c. Sừng bên chất xám tủy sống
- d. Sừng trước chất xám tủy sống

Câu 1154: Phản xạ tủy sau đều có cung phản xạ 2 noron, ngoại trừ:

- a. Phản xạ da
- b. Phản xạ gấp
- c. Phản xạ gân cơ
- d. Phản xạ trương lực cơ

Câu 1155: Phản xạ gân cơ, chọn câu sai.

- a. Khi gõ làm lớp cân cơ co đột ngột
- b. Cung phản xạ gồm có 2 noron
- c. Phản xạ cơ nhị đầu làm cánh tay duỗi ra
- d. Phản xạ gân gối làm duỗi gối thẳng ra

Câu 1156: Phản xạ gân cơ nhị đầu có trung tâm nằm ở tủy sống đoạn :

- a. C₁ – C₃
- b. C₃ – C₄
- c. C₅ – C₆
- d. C₆ – C₈

Câu 1157: Phản xạ gân cơ tam đầu có trung tâm nằm ở tủy sống đoạn :

- a. C₁ – C₃
- b. C₆ – C₈
- c. C₅ – C₆
- d. L₃ – C₅

Câu 1158: Phản xạ gân gối có trung tâm nằm ở :

- a. D₁₀ – D₁₂
- b. L₁ – L₂
- c. L₃ – L₅
- d. S₁ – S₂

Câu 1159: Kích thích vào gân cơ tứ đầu đùi sẽ dẫn truyền xung thần kinh theo đường hướng tâm đến

- a. L₃ – L₅
- b. C₈
- c. C₅ – C₇
- d. S₁ – S₂

Câu 1160: Kích thích vào gân gót sẽ dẫn truyền xung thần kinh theo đường hướng tâm đến

- a. C₈
- b. L₃ – L₅
- c. S₁ – S₂
- d. C₅ – C₇

Câu 1161: Chọn câu sai. Phản xạ da :

- a. Cung phản xạ có 3 nơron
- b. Nơron trung gian nằm trong bó tủy – đồi thị trước
- c. Phản xạ chỉ xuất hiện khi kích thích cơ học trên da
- d. **Cả ba đều sai.**

Câu 1162: Phản xạ nào sau đây thường **không hoàn toàn** ?

- a. Phản xạ gân cơ
- b. Phản xạ trương lực cơ
- c. Phản xạ da
- d. **Phản xạ gấp**

Câu 1163: Tính chất của phản xạ gấp, ngoại trừ :

- a. Tùy thuộc vào tần số kích thích
- b. **Có sự tham gia bộ máy tiền đình**
- c. Hiện tượng triệt bớt
- d. Tập cộng

Câu 1164: Phản xạ tủy nào đóng vai trò giải phóng cơ thể ra khỏi nguyên nhân kích thích?

- a. Phản xạ duỗi
- b. Phản xạ trương lực cơ
- c. **Phản xạ duỗi chéo**
- d. Phản xạ gấp

Câu 1165: Phản xạ tủy nào đóng vai trò tạo cho cơ thể có một tư thế nhất định trong không gian?

- a. **Phản xạ duỗi chéo**
- b. Phản xạ trương lực cơ
- c. Phản xạ gấp
- d. Phản xạ duỗi

Câu 1166: Chọn câu đúng khi nói về phản xạ trương lực cơ.

- a. **Đường dẫn truyền ly tâm có 2 dây alpha và gamma có chức năng riêng**
- b. Duy trì lực cơ cơ sở ở trạng thái nghỉ ngơi
- c. Trung tâm phản xạ phản xạ gối và đứng đều nằm ở vùng S₁-S₂
- d. Phản xạ gối làm tăng trương lực cơ duỗi hai chi dưới

Câu 1167: Khi nói về phản xạ da, chọn câu sai.

- a. **Là phản xạ một synap**
- b. Phản xạ da lòng bàn chân có trung tâm ở S₁-S₂
- c. Vạch trên da gây co cơ ở đó
- d. Phản xạ da bụng có trung tâm dọc theo D₆-D₁₂

Câu 1168: Tổn thương nửa khoanh tủy do khối u hay tổn thương cột sống có biểu hiện, **ngoại trừ**

- a. Mất cảm giác đau và nhiệt đối bên
- b. Mất cảm giác sâu cùng bên
- c. **Mất toàn bộ cảm giác dưới nơi tổn thương.**
- d. Liệt ở dưới nơi bị tổn thương

Câu 1169: Bệnh nhân bị liệt 2 chi dưới khi khám lâm sàng mất phản xạ gân gối, mất phản xạ da bìu thì có thể do tổn thương tủy sống :

- a. **Vùng thất lưng – cùng**
- b. Vùng cổ
- c. Vùng thất lưng
- d. Vùng ngực – lưng

Nội dung 3. Phản xạ thân não – gian não

Câu 1170: Hành não có chức năng điều hòa trương lực cơ vì :

- a. Chứa nhân đỏ làm tăng trương lực cơ
- b. Chứa nhân tiền đình làm giảm trương lực cơ
- c. Chứa nhân tiền đình làm tăng trương lực cơ
- d. Chứa nhân đỏ và nhân tiền đình để điều hòa trương lực cơ

Câu 1171: Phản xạ của hành-cầu não, ngoại trừ :

- a. Phản xạ định hướng âm thanh-ánh sáng
- b. Phản xạ chảy nước mắt, phản xạ giác mạc
- c. Phản xạ tư thế-chỉnh thể
- d. Phản xạ nhu động của ống tiêu hóa

Câu 1172: Cấu trúc nào sau đây **không** nằm ở hành não?

- a. Trung tâm vận mạch
- b. Trung tâm điều hòa nhịp tim
- c. Nhân tiền đình làm tăng trương lực cơ
- d. Nhân đỏ làm giảm trương lực cơ

Câu 1173: Khi *kep động mạch cảnh* của ếch, các áp cảm thụ quan bị ức chế tác động lên các trung tâm hô hấp và tim mạch nằm ở :

- a. Trung não
- b. Hành não
- c. Tiểu não
- d. Vỏ não

Câu 1174: Những cấu trúc sau có tham gia vào phản xạ tư thế-chỉnh thể, ngoại trừ:

- a. Tủy sống
- b. Hành-cầu não
- c. Tiểu não
- d. Đồi thị

Câu 1175: Các câu sau đây đều đúng về hành não, ngoại trừ:

- a. Hành não kiểm soát các chức năng quan trọng có tính quyết định sinh mạng của cơ thể
- b. Hành não tham gia kiểm soát hô hấp
- c. Hành não giữ vai trò chủ yếu trong điều hòa trương lực cơ
- d. Hành não kiểm soát hệ thống tim mạch

Câu 1176: Trong thân não, *Mydocalm* ức chế đường phản xạ lưới - tủy sống, từ đó gây :

- a. Tăng hoạt động của cơ
- b. Làm tăng trương lực cơ gây co cứng
- c. Làm giảm trương lực cơ gây giãn cơ
- d. Giảm hoạt động của cơ

Câu 1177: Phản xạ có sự tham gia của nhân tiền đình :

- a. Phản xạ Babinski
- b. Phản xạ đá tai
- c. Phản xạ duỗi chéo
- d. Phản xạ gân

Câu 1178: Câu nào sau đây đúng với xung động từ nhân tiền đình xuống sừng trước tủy sống?

- a. Tăng trương lực cơ
- b. Giảm trương lực cơ
- c. Điều hòa trương lực cơ

d. Có liên quan đến tiểu não

Câu 1179: Phản xạ nào sau đây là đặc trưng của phản xạ tiền đình ?

- a. Phản xạ chỉnh thể
- b. Phản xạ rung giật nhãn cầu
- c. Phản xạ thực vật liên quan đến tiền đình
- d. Phản xạ định hướng trong không gian

Câu 1180: Cảm giác say tàu xe là do :

- a. Hệ thống tiền đình bị kích thích quá mức
- b. Hệ thống tiền đình bị ức chế quá mức
- c. Thường xảy ra khi bị viêm nhiễm mạn tính sợi thần kinh tiền đình hoặc viêm tai giữa, rối loạn điện giải
- d. Phản xạ thực vật quá mức mức gây nôn, giảm huyết áp

Câu 1181: Khi tổn thương, đồi thị sẽ có các rối loạn sau, ngoại trừ

- a. Mất cảm giác
- b. Loạn cảm giác
- c. Run
- d. Liệt vận động tùy ý

Câu 1182: Đặc điểm vùng dưới đồi :

- a. Là một phần của gian não
- b. Có 2 loại noron : Noron bài tiết Hormon và noron bài tiết chất trung gian hóa học
- c. Vừa có chức năng thần kinh vừa có chức năng nội tiết
- d. Tất cả đều đúng

Câu 1183: Vùng dưới đồi liên quan đến, ngoại trừ

- a. Việc ăn uống
- b. Nhận thức không ý thức
- c. Điều hòa lượng nước trong cơ thể
- d. Điều hòa tuần hoàn

Câu 1184: Vùng dưới đồi mang các trung tâm phản xạ sau, ngoại trừ:

- a. Trung tâm các phản xạ có điều kiện
- b. Trung tâm điều nhiệt
- c. Trung tâm phản xạ thực vật
- d. Trung tâm no, khát

Câu 1185: Câu nào sau đây không đúng đối với chức năng điều hòa hoạt động thần kinh thực vật của vùng dưới đồi ?

- a. Điều hòa tuần hoàn
- b. Điều hòa thân nhiệt
- c. Điều hòa cảm giác thèm ăn
- d. Điều hòa phản xạ giữ thăng bằng

Câu 1186: Câu nào sau đây đúng với trung khu đói?

- a. Các tế bào của trung khu đói đối với các thụ thể của glucose
- b. Không hoạt động khi ăn bình thường
- c. Nằm ở hành não
- d. Bị kích thích bởi trung khu no

Nội dung 4. Phản xạ tiểu não

Câu 1187: Tiểu não chi phối các phản xạ có đặc điểm

- a. Chi phối cùng bên
- b. Trực tiếp chi phối các vận động có ý thức và không có ý thức

- c. Không ảnh hưởng lên thần kinh thực vật
- d. Tất cả đều đúng

Câu 1188: Tiểu não có vai trò :

- a. Tạo ra tất cả các dạng vận động cùng bên.
- b. Tạo ra tất cả các dạng vận động đối bên.
- c. **Kiểm soát và điều chỉnh trương lực cơ cùng bên.**
- d. Kiểm soát và điều chỉnh trương lực cơ đối bên.

Câu 1189: Chức năng của tiểu não gồm :

- a. Giữ thăng bằng, trung tâm vận động và điều hòa trương lực cơ
- b. Giữ thăng bằng, điều hòa trương lực cơ, phối hợp động tác tùy ý
- c. **Giữ thăng bằng, điều hòa phối hợp động tác tùy ý và không tùy ý, điều hòa trương lực cơ**
- d. Giữ thăng bằng, làm tăng trương lực cơ, điều hòa phối hợp động tác tùy ý và không tùy ý

Câu 1190: Tiểu não có vai trò tạo cho động tác được đúng ..(a).. và đúng .. (b) ..

- a. **(a) hướng , (b) tầm**
- b. (a) tốc độ , (b) biên độ
- c. (a) thời gian , (b) không gian
- d. (a) nhịp độ , (b) tiến độ

Câu 1191: Tiểu não giúp cho chúng ta thực hiện các chức năng sau :

- a. Dễ dàng đi lại bằng hai chân
- b. Nằm yên trên giường
- c. **Tránh vấp ngã khi đi lại**
- d. Viết được chữ

Câu 1192: Phản xạ tiểu não kiểm soát trương lực cơ vùng đầu mặt cổ và phản xạ thăng bằng

- a. Phản xạ có bộ phận nhận cảm đi từ vỏ não
- b. Phản xạ có bộ phận nhận cảm ở gân – cơ – xương - khớp
- c. Phản xạ hành cầu não
- d. **Phản xạ có bộ phận nhận cảm ở cơ quan tiền đình**

Câu 1193: Phản xạ chỉnh thể của tiểu não :

- a. Có bộ phận nhận cảm nằm ở gân, cơ, xương, khớp
- b. **Có trung tâm nằm ở vỏ tiểu não cổ và nhân mái**
- c. Dẫn truyền hướng tâm theo đường dẫn truyền cảm giác sâu
- d. Điều hòa trương lực cơ tứ chi và thân mình

Câu 1194: Phản xạ điều chỉnh trương lực cơ có thụ thể nằm ở :

- a. Gân, cơ, xương, khớp
- b. Cơ quan tiền đình
- c. Các nhân nền não
- d. **Cả a và b đúng**

Câu 1195: Kiểm soát và điều chỉnh thân bằng cơ thể là do:

- a. Tân tiểu não
- b. Các hạch nền não
- c. Tân tiểu não và nhân đỏ
- d. **Cổ tiểu não**

Câu 1196: Tín hiệu từ cơ quan tiền đình (tai trong) truyền về tiểu não cổ theo dây thần kinh số nào?

- a. Dây số VI
- b. Dây số VII
- c. **Dây số VIII**
- d. Dây số V

Câu 1197: Phản xạ chỉnh thể của tiểu não là phản xạ, ngoại trừ:

- a. điều hòa trương lực cơ vùng đầu và cổ
- b. kiểm soát và điều chỉnh thăng bằng
- c. có bản chất là một phản xạ tùy
- d. trung tâm nằm ở vỏ tiểu não cổ và nhân má

Câu 1198: Phản xạ tư thế-chỉnh thể là tập hợp những phản xạ phức tạp nhằm :

- a. Tạo ra một tư thế mới khi tư thế cũ bị mất đi
- b. Giữ thăng bằng cho cơ thể ở một tư thế nhất định
- c. Điều chỉnh lại tư thế cho phù hợp với động tác lao động
- d. Đảm bảo thực hiện các động tác được chính xác với một tư thế nhất định

Câu 1199: Nhân má của tiểu não hoạt động có liên quan với

- a. Vỏ não và các nhân nền não
- b. Các receptor bản thể và cơ quan tiền đình
- c. Võ tiểu não mới
- d. Nhân đỏ và đồi thị

Câu 1200: Trung tâm phản xạ ở tiểu não các vận động có ý thức :

- a. Nhân má
- b. Nhân răng
- c. Nhân tiền đình
- d. Nhân đỏ

Câu 1201: Nhân răng của tiểu não là trung tâm của phản xạ

- a. Kiểm soát và điều chỉnh trương lực cơ cùng bên
- b. Định hướng với âm thanh và ánh sáng
- c. Điều hòa các vận động tùy ý
- d. Tim mạch và hô hấp

Câu 1202: Đáp ứng trong việc kiểm soát, điều khiển vận động tùy ý, ngoại trừ:

- a. Điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động nhanh, chính xác
- b. Lập trình vận động uyển chuyển mềm mại
- c. Hoạt động khởi đầu, kết thúc một động tác
- d. Kiểm soát phối hợp động tác và duy trì tư thế trong không gian

Câu 1203: Hội chứng tiểu não không có triệu chứng sau đây :

- a. Tăng trương lực cơ
- b. Run
- c. Sai tâm, sai hướng
- d. giật nhãn cầu

Câu 1204: Phá một bên tiểu não cóc, người ta nhìn thấy chân bên tiểu não bị phá ít cử động, duỗi thẳng ra, điều này là do:

- a. Do cơ gấp chân tăng trương lực cơ
- b. Do cơ duỗi chân tăng trương lực cơ
- c. Các chân này co duỗi kém
- d. Khả năng thăng bằng kém do mất tiểu não

CHUYÊN ĐỀ 6 – SINH LÝ HỆ THẦN KINH

Bài số 23

SINH LÝ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN

Nội dung 1. Đặc điểm của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Câu 1205: Phản xạ là những đáp ứng của cơ thể đối với:

- a. Các kích thích của môi trường ngoài thông qua hệ thần kinh
- b. Các kích thích thông qua não
- c. Các kích thích thông qua hệ thần kinh trung ương
- d. Các kích thích thông qua hệ thần kinh

Câu 1206: Phản xạ có điều kiện có những tính chất sau, ngoại trừ:

- a. Tập luyện
- b. **Chủng loài**
- c. Tạm thời
- d. Không di truyền

Câu 1207: Phản xạ có điều kiện có những tính chất sau đây, ngoại trừ:

- a. **Bẩm sinh**
- b. Cá thể
- c. Tạm thời
- d. Không di truyền

Câu 1208: Nói về phản xạ có điều kiện, chọn câu sai

- a. Mang tính chất cá thể
- b. **Có trung tâm nằm ở dưới vỏ**
- c. Được hình thành qua quá trình tập luyện
- d. Không di truyền

Câu 1209: Phản xạ có điều kiện có những tính chất sau đây, ngoại trừ:

- a. **Bẩm sinh**
- b. Cá thể
- c. Tạm thời
- d. Không di truyền

Câu 1210: Phản xạ có điều kiện :

- a. Có tính di truyền
- b. **Để tạo phản xạ có điều kiện, cần có sự tham gia của vỏ não**
- c. Phụ thuộc tính chất của tác nhân kích thích và bộ phận nhận cảm
- d. Cung phản xạ cố định

Câu 1211: Đặc điểm nào sau **không phải** là phản xạ có điều kiện :

- a. Được thành lập trong đời sống , sau quá trình tập luyện
- b. **Cung phản xạ cố định**
- c. Trung tâm ở vỏ não
- d. Không phụ thuộc vào tính chất của tác nhân kích thích và bộ phận cảm thụ

Câu 1212: Chọn phát biểu **sai** về các loại phản xạ có điều kiện (PXCĐK)

- a. **PXCĐK tự nhiên: dễ thành lập, bền vững, thường tồn tại suốt đời và có tính chất loài**
- b. PXCĐK cảm thụ ngoài: kích thích có điều kiện tác động lên bộ phận cảm thụ ngoài
- c. PXCĐK do tác nhân thời gian: thời gian là kích thích có điều kiện
- d. PXCĐK do tác nhân dược lý: tác dụng thuốc là kích thích có điều kiện

Câu 1213: Tình huống nào sau đây **không phải** là của phản xạ có điều kiện?

- a. Chó vẫy đuôi mừng chủ

- b. Chó sủa người lạ
- c. Thú biểu diễn xiếc
- d. Tiết nước bọt khi nghe kể về một loại trái cây chua

Nội dung 2. Cơ chế hình thành phản xạ và ức chế

Câu 1214: Để xây dựng phản xạ có điều kiện, kích thích có điều kiện cần phải:

- a. Đơn giản và củng cố nhiều lần
- b. Đi sau kích thích không điều kiện một thời gian ngắn
- c. Thích hợp với đáp ứng của một phản xạ
- d. Gây một hưng phấn mạnh

Câu 1215: Câu nào **không đúng** khi nói về các điều kiện cơ bản để thành lập phản xạ có điều kiện?

- a. Kích thích không điều kiện phải đi trước kích thích có điều kiện vài giây
- b. Kích thích có điều kiện phải đi trước kích thích không điều kiện vài giây
- c. Bộ não và bộ phận nhận cảm lạnh mạnh
- d. Không có yếu tố cản trở trong quá trình thành lập phản xạ có điều kiện

Câu 1216: Cơ chế thành lập phản xạ có điều kiện là sự:

- a. Biệt hoá tự nhiên của hệ thần kinh
- b. Hình thành đường liên lạc tạm thời
- c. Thay đổi chức năng của vỏ não
- d. Tiến hoá từ loài vượn thành người

Câu 1217: Cơ sở của đường liên lạc tạm thời :

- a. Qui luật khuếch tán hưng phấn
- b. Qui luật tập trung hưng phấn
- c. Qui luật cảm ứng trong không gian
- d. Qui luật cảm ứng trong thời gian

Câu 1218: Chất nào sau đây giữ vai trò quyết định trong quá trình thành lập phản xạ có điều kiện?

- a. DNA
- b. ATP
- c. RNA
- d. Men ribonuclease

Câu 1219: Đường liên lạc tạm thời được hình thành nhờ yếu tố nào sau đây, **ngoại trừ**:

- a. Hoạt hóa synap
- b. Các gai trên sợi nhánh tế bào thần kinh phát triển
- c. Tạo thêm các synap mới
- d. Điện thế nghỉ của tế bào thần kinh âm hơn

Câu 1220: Để thành lập phản xạ có điều kiện cần phải thực hiện qua trình tự mấy bước?

- a. 6 bước
- b. 5 bước
- c. 4 bước
- d. 3 bước

Câu 1221: Đường liên lạc tạm thời có những tính chất sau, **ngoại trừ**:

- a. Là đường chức năng
- b. Tồn tại tạm thời
- c. Xuất hiện ở vỏ não
- d. Chuyển động một chiều

Câu 1222: Sự truyền các luồng xung động thần kinh từ điểm hưng phấn này sang điểm hưng phấn khác thực hiện dựa trên yếu tố nào?

- a. Sự hóa hóa các synap
- b. Sự tạo thêm các synap mới

- c. Ngưỡng kích thích giảm
- d. a và b đúng

Câu 1223: Trong phản xạ có điều kiện tiết nước bọt do ánh sáng đèn, trung tâm có điều kiện cao cấp nằm ở nơi nào sau đây?

- a. Thùy trán
- b. Thùy đỉnh
- c. Thùy liên hợp
- d. Thùy chẩm

Câu 1224: Thành phần thứ ba trong cung phản xạ có điều kiện tiết nước bọt ở chó do ánh sáng đèn là cấu trúc thần kinh nào sau đây?

- a. Chất xám tủy sống và vỏ não
- b. Vùng dưới đồi và vỏ não
- c. Hành não và vỏ não
- d. Hệ thần kinh thực vật và vỏ não

Câu 1225: Phản xạ có điều kiện sẽ mất đi nếu:

- a. Không được củng cố
- b. Kích thích không điều kiện xuất hiện
- c. Kích thích có điều kiện xuất hiện
- d. Hoạt hoá đường mòn dấu vết

Câu 1226: Các ức chế sau là ức chế có điều kiện, ngoại trừ:

- a. ức chế trên giới hạn
- b. ức chế phân biệt
- c. ức chế dập tắt
- d. ức chế làm chậm phản xạ

Câu 1227: Phản xạ “cái gì thế” là cơ sở của dạng ức chế nào?

- a. ức chế dập tắt
- b. ức chế ngoài
- c. ức chế trên giới hạn
- d. ức chế phân biệt

Câu 1228: Câu nào sau đây đúng với ức chế ngoài?

- a. Là ức chế có điều kiện của phản xạ không điều kiện
- b. Là ức chế bảo vệ thần kinh
- c. Là ức chế xảy ra ở cấu trúc ngoài vỏ não
- d. Là phản xạ tìm hiểu

Câu 1229: Các phát minh khoa học thường được cho là xuất hiện từ quá trình

- a. Ức chế ngoài
- b. Ức chế trên giới hạn
- c. Ức chế phân biệt
- d. Ức chế có điều kiện

Câu 1230: Câu nào sau đây sai với ức chế dập tắt?

- a. Ức chế không điều kiện của phản xạ có điều kiện
- b. Ức chế có điều kiện của phản xạ có điều kiện
- c. Ức chế xảy ra khi không củng cố phản xạ có điều kiện
- d. Ức chế dập tắt phản xạ càng nhanh khi phản xạ chưa bền vững

Câu 1231: Câu nào sau đây đúng với ức chế phân biệt ?

- a. Ức chế bảo vệ thần kinh
- b. Ức chế có điều kiện của phản xạ có điều kiện
- c. Ức chế xảy ra khi không củng cố một phản xạ có điều kiện

d. Ức chế làm chậm phản xạ

Câu 1232: Câu nào sau đây đúng với ức chế tri hoãn?

- a. Nhằm phân biệt những kích thích không điều kiện
- b. Là một loại ức chế chỉ có ở người
- c. Có tính chất bẩm sinh
- d. Là ức chế làm chậm phản xạ

Câu 1233: Dạng ức chế nào có ý nghĩa bảo vệ thần kinh ?

- a. ức chế vượt ngưỡng
- b. ức chế làm chậm phản xạ
- c. ức chế ngoài
- d. ức chế phân biệt

Câu 1234: Các quá trình ức chế có tính chất sau:

- a. Tiêu cực làm xoá bỏ các phản xạ có điều kiện
- b. Tích cực giúp phân biệt và chọn lọc các kích thích
- c. Chỉ hình thành trong đời sống do tập luyện
- d. Không thể xoá bỏ được

Câu 1235: Ức chế thứ phát là ức chế được phát sinh do nguyên nhân nào sau đây?

- a. Quá trình hưng phấn kéo dài
- b. Các xung động thần kinh truyền qua synap ức chế
- c. Biến đổi màng synap theo cơ chế phân cực
- d. Các nút tận cùng thần kinh tiết ra acetyl cholin

Câu 1236: Khảo sát hoạt động thần kinh cao cấp , người ta làm thí nghiệm sau : *Chiếu đèn, hai phút sau cho chó ăn, lặp lại nhiều lần. Về sau chiếu đèn, hai phút sau mới chảy nước bọt* . Đây là :

- a. phản xạ có điều kiện do tác nhân thời gian
- b. phản xạ có điều kiện cấp cao
- c. ức chế làm chậm phản xạ
- d. ức chế có điều kiện

Câu 1237: Trên con chó đã được tập để có điều kiện do ánh sáng đèn điện 40 watts làm chó tiết 19 giọt nước bọt trong 30 giây, khi kích thích bằng đèn điện 200 watts, nước bọt ở chó sẽ được tiết thế nào?

- a. Tiết 20 giọt/30 giây
- b. Tiết 30 giọt/30 giây
- c. Tiết 40 giọt/30 giây
- d. Không tiết nước bọt

Nội dung 3. Các hoạt động thần kinh cao cấp

A – Các quy luật của thần kinh cao cấp

Câu 1238: Trong vỏ não có các loại cảm ứng sau, ngoại trừ:

- a. Cảm ứng trong không gian
- b. Cảm ứng đồng thời
- c. Cảm ứng trong thời gian
- d. Cảm ứng nội và ngoại

Câu 1239: Trong hoạt động thần kinh cao cấp , khi hưng phấn xuất hiện tại một điểm trên vỏ não thì sau đó quá trình ức chế sẽ xuất hiện ngay tại điểm đó . Đây là qui luật :

- a. Khuếch tán của quá trình hưng phấn và ức chế
- b. Tập trung quá trình hưng phấn và ức chế
- c. Cảm ứng trong không gian
- d. Cảm ứng trong thời gian

Câu 1240: Qui luật sau đây là cơ sở cho sự hình thành đường liên lạc tạm thời :

- a. Qui luật khuếch tán
- b. Qui luật tập trung
- c. Qui luật cảm ứng trong không gian
- d. Qui luật cảm ứng theo thời gian

Câu 1241: Khi đi thi nếu thuộc bài mọi hoạt động sẽ dễ dàng hơn. Đây là thí dụ cho quy luật hoạt động thần kinh cao cấp:

- a. Quy luật khuếch tán
- b. Quy luật tập trung
- c. Quy luật cảm ứng trong thời gian
- d. Quy luật cảm ứng trong không gian

Câu 1242: Các cử động thuần thực của một người thợ là do quá trình nào sau đây ?

- a. Các phản xạ có điều kiện và không điều kiện diễn ra hàng loạt.
- b. Các phản xạ gom lại thành những nhóm định hình.
- c. Các xung động trong não cảm ứng trong khoảng gian và thời gian.
- d. Hoạt động phân tích và tổng hợp của vỏ não diễn ra nhanh.

B – Các hoạt động thần kinh cao cấp đáng chú ý

Câu 1243: Hoạt động sau đây **không phải** là hoạt động thần kinh cao cấp?

- a. ngôn ngữ
- b. trương lực
- c. động cơ
- d. hành vi

Câu 1244: Các vùng cảm giác cấp II ở vỏ não:

- a. Tổng hợp thông tin từ nhiều vùng cấp I và cho một tư duy hoàn chỉnh
- b. Tổng hợp thông tin từ nhiều vùng cấp I và cho biết ý nghĩa của kích thích
- c. Nhận thông tin từ vùng cấp I tương ứng và cho biết ý nghĩa của kích thích
- d. Nhận thông tin trực tiếp từ ngoại biên về và cho biết đặc điểm của kích thích

Câu 1245: Đối với người thuận tay phải, bán cầu não phải là:

- a. Bán cầu minh bạch có chức năng ngôn ngữ
- b. Bán cầu minh bạch có chức năng nghệ thuật
- c. Bán cầu biểu tượng có chức năng ngôn ngữ
- d. Bán cầu biểu tượng có chức năng nghệ thuật

Câu 1246: Trong quá trình hình thành tư duy khả năng nào sau chỉ có ở loài người:

- a. Cảm giác
- b. Tri giác
- c. Biểu tượng
- d. Khái niệm

Câu 1247: Bệnh nhân không có khả năng có ý thức trở lại, sống đời sống thực vật được coi là :

- a. Hôn mê
- b. Ngất xỉu
- c. Chết não
- d. Tâm thần

Câu 1248: Ngôn ngữ được xem là

- a. Sản phẩm của bán cầu não biểu tượng
- b. Tiền đề để thành lập phản xạ có điều kiện cấp 1
- c. Tín hiệu của tín hiệu
- d. Kích thích không điều kiện

Câu 1249: Hệ thống tín hiệu thứ nhất :

- a. Là những tín hiệu có đặc trưng trừu tượng
- b. **Gồm các kích thích có điều kiện và không điều kiện**
- c. Là đặc trưng riêng của loài người
- d. Gồm chữ viết và lời nói

Câu 1250: Câu nào sau đây **không đúng** đối với hệ thống tín hiệu thứ nhất?

- a. Là tín hiệu có thể nhận thấy được nhờ giác quan
- b. Gồm kích thích không điều kiện và có điều kiện
- c. Có đặc tính cụ thể : sờ, nghe, nhìn, nếm, ngửi
- d. **Có đặc tính trừu tượng**

Câu 1251: Để tìm thấy hệ thống tín hiệu thứ hai phải có sự tham gia của, **ngoại trừ:**

- a. **Phản xạ không điều kiện**
- b. Phản xạ có điều kiện
- c. Tư duy
- d. Ngôn ngữ

Câu 1252: Mất ngôn ngữ Broca :

- a. Do điếc dẫn đến câm
- b. Vẫn nghe và nhắc được lời nói nhưng không hiểu lời nói đó
- c. **Biết định nói gì nhưng không điều khiển được hệ phát âm**
- d. Do sa sút trí tuệ toàn bộ

Câu 1253: Mất ngôn ngữ cảm giác (Wernicke) do tổn thương vùng Wernicke

- a. **Vẫn nghe và nhắc được lời nói nhưng không hiểu lời nói đó**
- b. Biết định nói gì nhưng không điều khiển được hệ phát âm
- c. Do điếc dẫn đến câm
- d. Do sa sút trí tuệ toàn bộ

Câu 1254: Chọn câu sai :

- a. Vỏ não là trung tâm hoạt động tư duy
- b. Chức năng vận động chiếm diện tích lớn nhất trên vỏ não
- c. Vùng lời nói trên vỏ não có 2 vùng : Vùng Broca và Vùng Wernicke
- d. **Vùng lời nói luôn phân bố đều ở 2 bên bán cầu đại não**

Câu 1255: Trí nhớ có liên quan đến:

- a. Đường mòn dấu vết giữa các nhân xám dưới vỏ
- b. Hoạt động của trung tâm thưởng và phạt trong não
- c. **Sự xuất hiện của một chất chỉ tồn tại trong não**
- d. Kiểu học : kiểu Pavlov nhớ lâu hơn kiểu Skinner

Câu 1256: Thí nghiệm của Cornell cho thấy trí nhớ có liên quan với

- a. Dây thần kinh
- b. **Một chất nào đó**
- c. Chỉ riêng bộ não
- d. Tất cả đều sai

Câu 1257: Thí nghiệm của Connel về trí nhớ đã chứng minh

- a. Điều kiện hóa đáp ứng sẽ mau quên hơn điều kiện hóa hành động
- b. Trung tâm thưởng và phạt có liên quan đến học tập và trí nhớ
- c. Đường mòn dấu vết sẽ mất đi khi không được củng cố
- d. **Trí nhớ có liên quan đến một chất nào đó**

Câu 1258: Trong điều kiện hóa đáp ứng có tính chất :

- a. Chủ động
- b. **Thụ động**

- c. Tình cơ
- d. Ngẫu hứng

Câu 1259: Đặc điểm của điều kiện hóa kiểu Skinner là :

- a. Chủ động
- b. Thụ động
- c. Nhóm
- d. Theo người dạy

Câu 1260: Cấu trúc nào sau đây **không** thuộc về cấu trúc dưới vỏ của hệ viền ?

- a. Vùng vách.
- b. Vùng cận khứu giác.
- c. Nhân trước đồi thị.
- d. Chất đen.

Câu 1261: Các chức năng của hệ viền, ngoại trừ :

- a. Thúc đẩy động cơ, gây thích thú hoặc chán ghét.
- b. Có vai trò trong học tập và trí nhớ.
- c. Hoạt động xúc cảm .
- d. Hình thành ngôn ngữ.

Câu 1262: Kiểm soát hành vi là chức năng của :

- a. Hệ viền.
- b. Toàn bộ vỏ não.
- c. Vùng vận động vỏ não.
- d. Cấu tạo lưới hành cầu não.

Câu 1263: Vai trò của hạnh nhân trong hành vi ăn uống, ngoại trừ:

- a. Kích thích cử động cắn, nhai.
- b. Kích thích bài tiết nước bọt.
- c. Kích thích cảm giác đói.
- d. Kích thích bài tiết dịch vị.

CHUYÊN ĐỀ 7 – SINH LÝ HỆ VẬN ĐỘNG

Bài số 24

SINH LÝ HỆ CƠ – XƯƠNG – KHỚP

Nội dung 1. Đặc điểm cấu trúc hệ cơ và cơ chế của sự co cơ

Câu 1264: Vân sáng trên nhục tiết của tế bào cơ xương được tạo thành bởi :

- a. Myosin
- b. Actin
- c. Tropomyosin
- d. Myelin

Câu 1265: Dải I trong sacromere là :

- a. Dải sáng do các sợi actin tạo thành.
- b. Dải sáng do các sợi myosin tạo thành.
- c. Dải tối do các sợi actin tạo thành.
- d. Dải tối do các sợi myosin tạo thành.

Câu 1266: Vùng tối của sacromere là :

- a. Dải I
- b. Dải H
- c. Dải A
- d. Dải Z

Câu 1267: Các cầu nối của nhục tiết trong sợi cơ xương được cấu tạo bởi :

- a. Actin
- b. Myosin
- c. Troponin
- d. tropomyosin

Câu 1268: Thành phần nào **không** có trong cấu trúc cơ trơn:

- a. Actin
- b. Myosin
- c. Troponin
- d. Tropomyosin

Câu 1269: Phần đầu của mỗi phân tử myosin gồm có :

- a. 2 chuỗi nặng và 4 chuỗi nhẹ
- b. 2 chuỗi nặng
- c. 4 chuỗi nặng và 2 chuỗi nhẹ
- d. 2 chuỗi nhẹ

Câu 1270: Nhận xét **không đúng** về protein actin?

- a. Được cấu tạo bởi hàng trăm phân tử actin G.
- b. Còn được gọi là actin F.
- c. Được sắp xếp thành 2 chuỗi xoắn với nhau.
- d. Chứa protein điều hòa là troponin trong các rãnh xoắn.

Câu 1271: Đặc điểm của cơ vân, **chọn câu sai**

- a. Đàn hồi
- b. Tự hưng phấn
- c. Co – giãn
- d. Sinh công

Câu 1272: Nói về noron vận động chậm, CHỌN CÂU SAI

- a. Tỷ lệ hưng phấn thấp

- b. Tốc độ dẫn truyền chậm
- c. Tần số xung động chậm
- d. Độ bền bỉ kém

Câu 1273: Điện thế hoạt động của tế bào cơ vân :

- a. Có pha bình nguyên kéo dài
- b. Lan ra tất cả các phần của cơ và hệ thống ống T
- c. Là nguyên nhân gây tăng nồng độ Ca^{++} trong bể chứa tận cùng của mạng lưới nội bào
- d. Kéo dài hơn so với điện thế động của tế bào cơ tim

Câu 1274: Điện thế hoạt động của tế bào cơ vân (cơ xương) :

- a. Có giai đoạn bình nguyên kéo dài
- b. Lan vào tất cả các phần của cơ quan ống T
- c. Khởi mào hiện tượng co cơ, Ca^{++} được phóng thích gắn vào troponin C
- d. Lâu hơn điện thế hoạt động của tế bào cơ tim

Câu 1275: Noron chi phối cơ vân giải phóng ra chất truyền đạt thần kinh là

- a. Serotonin
- b. Dopamin
- c. Noradrenalin
- d. Acetylcholin

Câu 1276: Chất dẫn truyền thần kinh trong synap thần kinh – cơ là

- a. Achetylcholin
- b. Adrenalin
- c. Dopamin
- d. Serotonin

Câu 1277: Vai trò của ống ngang (ống T) trong kích thích co cơ xương :

- a. Cung cấp con đường để điện thế hoạt động lan truyền vào bên trong
- b. Được dùng như nơi dự trữ Ca^{++}
- c. Nối các nhuc tiết theo kiểu gối đầu
- d. Được dùng như nơi phóng thích Ca^{++}

Câu 1278: Cơ chế co cơ gồm mấy bước chính?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

Câu 1279: Ion cần thiết cho sự co cơ:

- a. Na^{+}
- b. Ca^{++}
- c. K^{+}
- d. Cl^{-}

Câu 1280: Vị trí gắn kết của Ca^{++} trên tế bào cơ vân gây co cơ:

- a. Tropomyosin
- b. Actin
- c. Troponin C
- d. Troponin I

Câu 1281: Vị trí ion Ca^{++} gắn lên hoạt hóa myosin :

- a. Cấu trúc hình cầu ở chuỗi nặng phần đầu myosin
- b. Cấu trúc hình cầu ở chuỗi nhẹ phần đầu myosin
- c. Cấu trúc hình cầu ở chuỗi nặng phần đuôi myosin
- d. Cấu trúc hình cầu ở chuỗi nhẹ phần đuôi myosin

Câu 1282: Vai trò của Ca^{++} trong kích thích cơ xương và cơ tim :

- a. Gây khử cực màng tế bào cơ.
- b. Loại bỏ tác dụng ức chế phản ứng giữa sợi actin và myosin.
- c. Kích hoạt phân tử myosin đến mức chúng phản ứng với actin.
- d. Kết hợp với calmodulin để khởi động phản ứng thành lập cầu nối.

Câu 1283: Loại troponin nào có tác dụng ức chế giữa actin và myosin

- a. Troponin T
- b. Troponin I
- c. Troponin C
- d. Troponin U

Câu 1284: Khi co cơ, cấu trúc nào sau đây **không thay đổi** về chiều dài:

- a. Băng sáng I
- b. Băng tối A
- c. Băng sáng H
- d. Khoảng cách giữa hai đường Z

Câu 1285: Chức năng của tropomyosin trong tế bào cơ xương

- a. Trượt trên sợi actin làm cho cơ bị rút ngắn
- b. Phóng thích Ca^{++} sau khi khởi động co cơ
- c. Gắn với myosin trong khi co cơ
- d. Tác dụng như một protein giãn cơ, khi nghỉ ngơi bằng cách che vị trí mà myosin gắn vào actin

Câu 1286: Protein nào sau đây giữ vai trò quan trọng nhất trong co cơ vân và cơ trơn?

- a. Calmodulin
- b. Troponin
- c. Tropomyosin
- d. Actin

Câu 1287: Câu nào sau đây **không đúng** đối với cơ chế co cơ?

- a. Cử động xảy ra do sự rút ngắn các tơ cơ.
- b. Phản xạ có chu kỳ giữa các cầu nối của myosin và sợi actin tạo ra cử động.
- c. Ion Ca^{++} gắn vào phần troponin C của các tơ cơ, làm bộc lộ vị trí gắn với đầu myosin.
- d. Cầu nối được thành lập, ion phosphat tách khỏi ATP, cung cấp năng lượng cho co cơ.

Câu 1288: Phức hợp kích thích co cơ vân liên quan đến tất cả các sự kiện sau đây, ngoại trừ:

- a. Gây ra điện thế động
- b. Gắn Ca^{++} vào myosin
- c. Thành lập cầu nối giữa actin và myosin
- d. Khử cực dọc ống ngang

Câu 1289: Đáp ứng co cơ vân :

- a. Bắt đầu sau khi có điện thế động.
- b. Không kéo dài lâu như điện thế động.
- c. Tạo nhiều sức căng khi co cơ đẳng trương hơn là khi co cơ đẳng trương.
- d. Tạo nhiều công khi co cơ đẳng trương hơn là khi co cơ đẳng trương.

Câu 1290: Sau khi co, cơ giãn trở về trạng thái nghỉ ban đầu do, CHỌN CÂU SAI:

- a. Ngừng tín hiệu điện học từ thần kinh
- b. Bơm ion Na^+ từ tơ cơ và hệ thống ống T
- c. Các thành phần đàn hồi và hoạt động của nhóm cơ đối vận sẽ đưa cơ về chiều dài ban đầu
- d. Hoạt hóa bơm calci, bơm ion Ca^{++} vào trong bể chứa tận cùng

Nội dung 2. Nguồn năng lượng co cơ, trương lực cơ và điều hòa hoạt động co cơ

Câu 1291: Năng lượng chủ yếu cần cho sự co cơ là:

- a. ATP

- b. Phosphocreatin
- c. Glycogen
- d. Acid béo tự do

Câu 1292: Những người vận động mạnh sau một thời gian bị mỏi cơ do tích tụ :

- a. Acid fomic
- b. Acid lactic
- c. Acid hyaluronic
- d. Acid citric

Câu 1293: Bộ phận nhận cảm trong phản xạ trương lực cơ của cơ vân là :

- a. Sợi cơ ngoại suốt
- b. Phần đầu sợi cơ nội suốt
- c. Phần trung tâm sợi cơ nội suốt
- d. Khớp nối kiểu cài chốt

Câu 1294: Cơ nào ít bị thần kinh chi phối :

- a. Cơ trơn một đơn vị
- b. Cơ trơn đa đơn vị
- c. Cơ vân
- d. Cơ tim

Câu 1295: Chất truyền tin thứ hai trong cơ chế co cơ trơn :

- a. Acetyl cholin
- b. AMP vòng
- c. Calmodulin
- d. Adrenalin

Câu 1296: Nói về cơ trơn, câu nào sau đây **không đúng**

- a. Chịu sự chi phối của hệ thần kinh thực vật
- b. Sử dụng năng lượng ATP thấp hơn cơ vân
- c. Lực co của cơ trơn yếu hơn cơ vân
- d. Mức độ cơ trơn lúc co ngắn hơn cơ vân

Câu 1297: Kích thích lặp đi lặp lại sợi cơ xương sẽ làm tăng lực co thất vì làm tăng:

- a. Thời gian chu kỳ đầu cuối
- b. Nồng độ Ca^{++} chu kỳ cầu nối
- c. Độ lớn của điện thế tằm động
- d. Số lượng sợi cơ phát sinh lực

Câu 1298: Hoạt động của cơ trơn được điều hòa bởi :

- a. Noron vận động alpha
- b. Noron vận động gamma
- c. Đơn vị vận động
- d. Thần kinh tự chủ

Nội dung 3. Sinh lý hệ xương-khớp

Câu 1299: Thành phần hàm lượng lớn nhất trong các chất căn bản tạo xương?

- a. Collagen typ I
- b. Non-collagen
- c. Muối calci
- d. Cả a và b

Câu 1300: Tế bào đóng vai trò tạo ra khoảng trống Howship ?

- a. Tiền tạo cốt bào
- b. Hủy cốt bào
- c. Tạo cốt bào

d. Tế bào xương

Câu 1301: Tế bào đóng vai trò tạo ra các lá xương trong hệ thống Havers?

- a. Tiền tạo cốt bào
- b. Tế bào xương
- c. Hủy cốt bào
- d. Tạo cốt bào

Câu 1302: Chọn câu đúng.

- a. Các tạo cốt bào chủ yếu tạo nên thành phần khoáng của xương
- b. Tế bào xương không có khả năng sinh sản
- c. Hủy cốt bào nhỏ hơn so với tạo cốt bào về kích thước
- d. Hủy cốt bào xóa đi những khoảng trống Howship

Câu 1303: Chức năng của hệ xương, ngoại trừ:

- a. Tạo máu và trao đổi chất
- b. Vận động
- c. Nâng đỡ
- d. Tạo trương lực cơ

Câu 1304: Các hormon có thể gây loãng xương khi nồng độ tăng cao, ngoại trừ:

- a. GH
- b. T3-T4
- c. PTH
- d. Cortisol

Câu 1305: Tầm vận động khớp :

- a. Thường có giá trị lớn hơn cung chuyển động khớp.
- b. Được xác định bằng cách lấy biên độ hõm khớp trừ biên độ lồi cầu.
- c. Bị hạn chế bởi các cấu trúc “hãm” là dây chằng, gân cơ, khối cơ, mỏm xương.
- d. Tất cả đều đúng

Câu 1306: Thành phần quyết định độ nhót khớp trong dịch khớp là

- a. Muối calci
- b. Acid hyaluronic
- c. Collagen
- d. Protein non-collagen

CHUYÊN ĐỀ 7 – SINH LÝ HỆ TIM MẠCH

Bài số 25 SINH LÝ TIM

Nội dung 1. Đặc điểm cấu tạo chức năng tim

Câu 1307: Tim không có đặc điểm sau :

- a. Là cái bơm vừa đẩy vừa hút máu
- b. Trong 24 giờ tim bóp 20.000 lần được 3000 lít máu
- c. Khối cơ rỗng nặng khoảng 300 gam
- d. Gắn với động mạch phổi và cung động mạch chủ

Câu 1308: Chọn câu đúng. Cấu tạo cơ tim:

- a. Có vân sáng và vân tối
- b. Giống cơ vân là nhân nằm giữa các sợi cơ
- c. Màng tế bào cơ tim có nhiều kênh calci chậm
- d. Sợi cơ tim không chứa glycogen

Câu 1309: Thành tâm thất phải mỏng hơn thành tâm thất trái vì :

- a. Tâm thất phải chứa ít máu hơn.
- b. Thể tích tâm thu của tâm thất phải nhỏ hơn.
- c. Tâm thất phải tổng máu với áp lực thấp hơn.
- d. Tâm thất phải tổng máu qua lỗ van động mạch phổi rộng hơn lỗ van động mạch chủ.

Câu 1310: Thành tâm thất trái dày hơn thành tâm thất phải vì :

- a. Nó tổng máu với thể tích tâm thu lớn hơn.
- b. Nó phải tổng máu qua một lỗ hẹp là van tổ chim.
- c. Nó phải tổng máu với một áp suất cao hơn.
- d. Nó phải tổng máu với một tốc độ cao hơn.

Câu 1311: Sức co bóp của thất trái lớn hơn thất phải bởi vì thất trái có đặc điểm

- a. Thể tích máu bơm ra mỗi lần tim co bóp lớn hơn
- b. Tiền tải lớn hơn
- c. Hậu tải lớn hơn
- d. Thành tâm thất dày hơn

Câu 1312: Nút xoang bình thường là nút tạo nhịp cho toàn tim vì lý do :

- a. Tạo các xung thần kinh
- b. Nhịp xung cao hơn các nơi khác
- c. Chịu sự kiểm soát của hệ thần kinh tự chủ
- d. Gần nút nhĩ thất

Câu 1313: Loại tế bào cơ tim đáp ứng nhanh bao gồm

- a. Cơ nhĩ, cơ thất, mô dẫn truyền
- b. Cơ nhĩ, nút nhĩ thất và mô dẫn truyền
- c. Cơ thất, nút xoang và mô dẫn truyền
- d. Cơ nhĩ, nút xoang và mô dẫn truyền

Nội dung 2. Hoạt động điện của cơ tim

A – Các giai đoạn của một sóng điện tim

Câu 1314: Pha khử cực của tế bào loại đáp ứng nhanh :

- a. Na^+ đi vào làm khử cực màng
- b. Ca^{++} đi vào làm khử cực màng
- c. Na^+ đi ra làm khử cực màng

d. Ca^{++} đi ra làm khử cực màng

Câu 1315: Pha khử cực của tế bào nút xoang là do quá trình nào dưới đây?

- a. Tăng dòng Na^+ vào trong tế bào
- b. Giảm dòng K^+ ra ngoài tế bào
- c. Trao đổi $\text{Na}^+ - \text{Ca}^{++}$
- d. Giảm dòng Cl^- ra ngoài tế bào

Câu 1316: Trong pha *tái cực nhanh* của điện thế mà tim loại đáp ứng nhanh có đặc điểm, ngoại trừ

- a. Bất hoạt kênh chậm
- b. K^+ khuếch tán ra ngoài bào
- c. Điện thế màng giảm nhanh
- d. Ca^{2+} đi vào trong tế bào

Câu 1317: Các kênh calci chậm được mở ra khi :

- a. Điện thế màng tăng từ -90mV lên 0mV
- b. Điện thế màng tăng từ 0mV lên 15mV
- c. Điện thế màng tăng từ 0mV lên 30mV
- d. Điện thế màng giảm từ 30mV xuống 15mV

Câu 1318: Trong giai đoạn *bình nguyên* của điện thế động tâm thất, độ dẫn của kênh sau đây là lớn nhất:

- a. Na^+
- b. K^+
- c. Ca^{++}
- d. Cl^-

Câu 1319: Điện thế hoạt động của cơ tim có giai đoạn bình nguyên vì :

- a. Tế bào cơ tim có kênh calci chậm và màng tế bào cơ tim tăng tính thấm với ion kali.
- b. Tế bào cơ tim có kênh calci chậm và màng tế bào cơ tim tăng tính thấm với ion natri.
- c. Tế bào cơ tim có kênh calci chậm và màng tế bào cơ tim giảm tính thấm với ion kali.
- d. Tế bào cơ tim có kênh calci chậm và màng tế bào cơ tim giảm tính thấm với ion natri.

Câu 1320: Thuốc chẹn kênh calci dùng trong điều trị tăng huyết áp tác dụng trên pha nào của chu kì tim?

- a. Pha khử cực
- b. Pha tái hồi cực
- c. Pha bình nguyên
- d. Pha nghỉ

Câu 1321: Sự phân cực màng tế bào xảy ra khi có sự kích thích của, ngoại trừ:

- a. Sự tăng cơ
- b. Acetyl cholin
- c. Kích thích phó giao cảm
- d. Kích thích giao cảm

Câu 1322: Chọn câu sai.

- a. Hoạt động điện tế bào loại đáp ứng chậm không có pha bình nguyên
- b. Khi tái hồi cực, tế bào loại đáp ứng chậm chỉ giảm xuống thấp nhất khoảng -90mV
- c. Loại tế bào đáp ứng chậm quyết định hiệu quả của chu kỳ tim
- d. Đường biểu diễn khử cực của tế bào loại đáp ứng chậm không dốc đứng

B – Các tính chất sinh lý liên quan đến hoạt động điện của cơ tim

Câu 1323: Tính hưng phấn của cơ tim là khả năng đáp ứng với kích thích :

- a. Theo qui luật “tất cả hoặc không”.
- b. Theo qui luật tương quan cường độ kích thích và cường độ đáp ứng.
- c. Ngay cả khi cơ tim đang co.
- d. Khi cơ đã giãn ra tối đa.

Câu 1324: Cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không” vì :

- a. Cơ tim có đặc tính trơ có chu kỳ.
- b. Cơ tim hoạt động có tính nhịp điệu.
- c. Cơ tim có cầu dẫn truyền hưng phấn.
- d. Cơ tim là cấu trúc hợp bào tương tự cơ trơn.

Câu 1325: Tính hưng phấn của tế bào cơ tim:

- a. Cơ tim co càng mạnh khi cường độ kích thích càng cao.
- b. Cơ tim bị co cứng khi kích thích liên tục.
- c. Cơ tim đáp ứng khi kích thích vào lúc cơ đang dẫn.
- d. Cơ tim đáp ứng khi kích thích vào lúc cơ đang co

Câu 1326: Tính trơ có chu kỳ :

- a. Là tính không đáp ứng của cơ tim.
- b. Là tính không đáp ứng với kích thích của cơ tim.
- c. Là tính không đáp ứng có chu kỳ của cơ tim.
- d. Là tính không đáp ứng với kích thích có chu kỳ của cơ tim.

Câu 1327: Tính chất sinh lý của cơ tim đảm bảo cho tim không bị co cứng khi bị kích thích liên tục:

- a. Tính hưng phấn
- b. Tính trơ có chu kỳ
- c. Tính dẫn truyền
- d. Tính nhịp điệu

Câu 1328: Cơ tim không thể co cứng theo kiểu uốn ván vì lý do nào sau đây?

- a. Giai đoạn trơ tuyệt đối dài.
- b. Điện thế động truyền quá chậm dọc theo mô dẫn truyền để tái kích thích cơ.
- c. Co thất chỉ có thể xảy ra khi tim đầy máu.
- d. Nút xoang phát xung chậm.

Câu 1329: Chọn câu đúng về tính chất sinh lý cơ tim.

- a. Kích thích điện vào lúc cơ tim đang co thì không đáp ứng.
- b. Kích thích điện đúng vào lúc nút xoang phát nhịp thì gây ngoại tâm thu có nghỉ bù.
- c. Nghỉ bù là do co bóp phụ (ngoại tâm thu) gây tiêu hao nhiều năng lượng, làm tim phải nghỉ một thời gian.
- d. Bó His có khả năng phát xung động với tần số 50- 60 xung /phút.

Câu 1330: Tính nhịp điệu của cơ tim là khả năng:

- a. Tự phát nhịp của tất cả cơ tim cùng một lúc
- b. Tự phát nhịp của một bộ phận cơ tim gọi là chủ nhịp
- c. Dẫn truyền xung động của tất cả cơ tim
- d. Dẫn truyền xung động của hệ thống dẫn truyền

Câu 1331: Vị trí dẫn nhịp bình thường trong tim người là nơi nào sau đây?

- a. Nút nhĩ thất
- b. Nút xoang
- c. Bó Bachman
- d. Bó His

Câu 1332: Hệ thống nút nhận sự chi phối của thần kinh giao cảm và thần kinh X là

- a. Nút xoang và mạng Purkinje
- b. Nút xoang và bó His
- c. Nút nhĩ thất và mạng Purkinje
- d. Nút xoang và nút nhĩ thất

Câu 1333: Chọn câu sai khi nói về sự phát nhịp của cơ tim.

- a. Tim phát xung động điện một cách đều đặn chu kỳ 0,8s
- b. Bình thường nút xoang áp đặt nhịp cho tâm nhĩ và tâm thất

- c. Khi nút xoang bị tổn thương, tâm thất và tâm nhĩ tự co bóp theo nhịp chính nó.
- d. Khi tách tim ra khỏi cơ thể và đặt vào môi trường dinh dưỡng, tim vẫn co bóp.

Câu 1334: Sự lan truyền điện thế động trong tim nhanh nhất ở vùng:

- a. Nút xoang
- b. Bó His
- c. Sợi Purkinje
- d. Cơ thất

Câu 1335: Sự lan truyền điện thế động trong tim chậm nhất ở:

- a. Sợi Purkinje
- b. Nút xoang
- c. Cơ thất
- d. Bó His

Câu 1336: Điều kiện xảy ra hiện tượng vào lại :

- a. Đường dẫn truyền hầu như tắt nhánh phải
- b. Thời gian trơ có hiệu quả của vùng vào lại dài hơn thời gian truyền qua vòng
- c. Thời gian dẫn truyền dài
- d. Thời gian trơ tuyệt đối dài

Nội dung 3. Chu chuyển tim

Câu 1337: Mỗi chu kỳ tim kéo dài :

- a. 0,2s
- b. 0,4s
- c. 0,6s
- d. 0,8s

Câu 1338: Đặc điểm của chu kỳ tim, ngoại trừ:

- a. Mỗi chu kỳ tim dài 0,8s
- b. Gồm các giai đoạn : tâm nhĩ thu, tâm thất thu và tâm trương toàn bộ
- c. Giai đoạn tâm thất thu gồm : thời kỳ tăng áp và thời kỳ tổng máu
- d. Tất cả đều sai

Câu 1339: Trong thì tâm nhĩ thu :

- a. Áp suất trong tâm nhĩ nhỏ hơn trong tâm thất
- b. Van nhĩ thất đang đóng
- c. Tổng nốt lượng máu còn lại trong tâm nhĩ xuống tâm thất
- d. Chiếm phần lớn thời gian của chu chuyển tim

Câu 1340: Giai đoạn tâm nhĩ thu **không** có tính chất sau :

- a. Kéo dài khoảng hơn 0,08s
- b. Áp suất tâm nhĩ lớn hơn áp suất tâm thất
- c. Van nhĩ thất mở
- d. Tổng khoảng 70% máu xuống tâm thất

Câu 1341: Máu về tâm thất trong thời kỳ :

- a. Tâm nhĩ thu
- b. Tâm nhĩ thu và tâm trương
- c. Tâm trương
- d. Tâm trương toàn bộ

Câu 1342: Máu về thất trong kỳ tâm nhĩ thu chiếm :

- a. 30%
- b. 50%

- c. 70%
- d. 90%

Câu 1343: Tâm thất thu :

- a. Là giai đoạn dài nhất trong các giai đoạn của chu chuyển tim.
- b. Là giai đoạn kết thúc khi van nhĩ thất đóng.
- c. Là giai đoạn máu được tổng vào động mạch.
- d. Là giai đoạn được tính từ khi van tổ chim mở.

Câu 1344: Đóng van nhĩ thất được khởi đầu bởi quá trình nào sau đây :

- a. Co nhĩ
- b. Co cơ cột
- c. Giãn thất
- d. Áp suất máu trong tâm thất cao hơn trong tâm nhĩ

Câu 1345: Van nhĩ thất đóng lúc bắt đầu pha nào của chu kỳ tim?

- a. Co đồng thể tích
- b. Giữa tâm trương
- c. Giãn đồng thể tích
- d. Máu về thất nhanh

Câu 1346: Trong thời kỳ tăng áp :

- a. Sợi cơ tâm thất co ngắn lại
- b. Van nhĩ thất đóng lại
- c. Van tổ chim mở ra
- d. Máu phun vào động mạch

Câu 1347: Ở giai đoạn tăng áp của chu kỳ tim

- a. van nhĩ thất đóng, van tổ chim mở.
- b. van nhĩ thất và van tổ chim đều mở
- c. van nhĩ thất và van tổ chim đều đóng
- d. van nhĩ thất mở, van tổ chim đóng

Câu 1348: Thể tích tâm thu (thể tích nhát bóp) :

- a. Là thể tích máu do một tâm thất bơm vào động mạch trong một phút
- b. Là thể tích máu do hai tâm thất bơm vào động mạch trong một phút
- c. Là thể tích máu do một tâm thất bơm vào động mạch trong một lần co bóp
- d. Là thể tích máu do một hai thất bơm vào động mạch trong một lần co bóp

Câu 1349: Lượng máu mà tim co bóp tổng máu ra động mạch chủ trong một lần co bóp :

- a. 70-90ml
- b. 50-70ml
- c. 20-40ml
- d. 100-120ml

Câu 1350: Trong giai đoạn tổng máu nhanh, lượng máu tim trái tổng ra so với thể tích tâm thu :

- a. 1:2
- b. 2:3
- c. 3:4
- d. 4:5

Câu 1351: Khi máu được tổng ra ở kỳ tổng máu thì đến cuối giai đoạn này trong buồng thất còn :

- a. 30ml
- b. 40ml
- c. 50ml
- d. 60ml

Câu 1352: Thể tích tối đa của buồng tâm thất trái :

- a. 110ml
- b. 120ml
- c. 130ml
- d. 140ml

Câu 1353: Trong giai đoạn bơm máu, độ sai biệt áp suất là **nhỏ nhất** giữa :

- a. Thất phải và nhĩ phải
- b. Thất trái và nhĩ trái
- c. **Thất trái và động mạch chủ**
- d. Động mạch chủ và mao mạch

Câu 1354: Tốc độ bơm máu từ thất ra ngoài lúc tâm thu :

- a. **Cao nhất ở đầu của kỳ tâm thu**
- b. Cao nhất ở giữa
- c. Cao nhất ở cuối
- d. Bằng nhau trong suốt kỳ tâm thu

Câu 1355: Trong thì tâm trương toàn bộ :

- a. **Áp suất trong tâm nhĩ lớn hơn trong tâm thất**
- b. Van nhĩ thất đã mở sẵn từ trước
- c. Tổng nốt lượng máu còn lại trong tâm nhĩ xuống tâm thất
- d. Chiếm ít thời gian nhất trong chu kỳ tim

Câu 1356: Van động mạch chủ đóng ở thời kỳ :

- a. Tổng máu
- b. **Giãn đồng thể tích**
- c. Co cơ đẳng trường
- d. Tâm nhĩ thu

Câu 1357: Sự đóng van động mạch phổi xảy ra do :

- a. Sự chênh lệch áp suất giữa động mạch chủ và tâm thất phải
- b. **Sự chênh lệch áp suất giữa động mạch phổi và tâm thất phải**
- c. Sự chênh lệch áp suất giữa động mạch chủ và động mạch phổi
- d. Sự chênh lệch áp suất giữa động mạch chủ và tâm thất trái

Câu 1358: Lượng máu thất hút về đóng góp vào đổ đầy thất chiếm :

- a. 80%
- b. **70%**
- c. 60%
- d. 50%

Câu 1359: Nhận xét chu chuyển tim sinh lý và chu chuyển tim lâm sàng

- a. Chu chuyển tim sinh lý dài hơn chu chuyển tim lâm sàng.
- b. Chu chuyển tim lâm sàng dài hơn chu chuyển tim sinh lý
- c. Chu chuyển tim sinh lý không tính đến nhĩ thu còn chu chuyển tim lâm sàng có tính đến
- d. **Chu chuyển tim lâm sàng chỉ tính đến hoạt động của tâm thất**

Nội dung 4. Một số biểu hiện của chu chuyển tim

Câu 1360: Lưu lượng tim

- a. Lưu lượng tim hoàn toàn tỉ lệ thuận với nhịp tim
- b. **Lưu lượng tim bằng thể tích tâm thu nhân với nhịp tim**
- c. Lưu lượng tim người lớn lúc nghỉ ngơi là 10-12 lít/phút
- d. Lưu lượng tim là thể tích máu 2 tâm thất bơm được/phút

Câu 1361: Lưu lượng tim tỷ lệ với :

- a. Lực co cơ tim.
- b. Nhịp tim.
- c. Độ đàn hồi của mạch máu.
- d. Mức tiêu thụ oxy của mô.

Câu 1362: Khi nghỉ ngơi, ở người khỏe mạnh, cung lượng tim (lít/phút):

- a. 1-2
- b. 2-3
- c. 4-6
- d. 8-10

Câu 1363: Lượng máu do tim bơm ra trong một nhịp có thể giảm bởi nguyên nhân nào sau đây ?

- a. Tăng co thất thất
- b. Tăng nhịp tim
- c. Giảm tổng kháng lực ngoại biên
- d. Giảm áp suất máu

Câu 1364: Khi vận động, yếu tố nào sau đây tăng lên ?

- a. Lưu lượng tim
- b. Áp suất tâm trương
- c. Áp suất động mạch phổi
- d. Kháng lực động mạch phổi

Câu 1365: Tiếng tim thứ nhất:

- a. Kết thúc thời kỳ tâm nhĩ co
- b. Mở đầu thời kỳ tâm thất co
- c. Kết thúc thời kỳ tâm thất co
- d. Mở đầu thời kỳ tâm thất trương

Câu 1366: Đúng vào lúc nghe tiếng tim thứ nhất thì :

- a. Nhĩ đang giãn, thất vừa mới co
- b. Thất đang co
- c. Nhĩ đang giãn, thất đang tổng máu
- d. Nhĩ đang co, thất đang tổng máu

Câu 1367: Hiện tượng nào sau đây xảy ra sau tiếng tim thứ nhất và trước tiếng tim thứ hai?

- a. Giai đoạn tim bơm máu.
- b. Sóng P của điện tâm đồ.
- c. Giãn đẳng trương.
- d. Thu hút máu về.

Câu 1368: Tiếng tim thứ hai sinh ra là do :

- a. Đóng van nhĩ thất
- b. Máu được tổng vào động mạch
- c. Đóng van tổ chim
- d. Máu về tâm thất

Câu 1369: Đúng vào lúc nghe được tiếng tim thứ hai thì :

- a. Nhĩ đang co
- b. Thất vừa giãn, nhĩ đang giãn
- c. Thất đã giãn hoàn toàn, nhĩ đang co
- d. Thất đang co, nhĩ bắt đầu co

Câu 1370: Tiếng tim thứ hai xảy ra trong thời kỳ nào sau đây:

- a. Co đẳng trương
- b. Co đẳng trương
- c. Giãn đẳng trương

d. Cả ba đều sai

Câu 1371: Tiếng tim thứ tư tạo ra do yếu tố chính nào sau đây

- a. Đóng van động mạch chủ và động mạch phổi
- b. Rung thành tâm thất trong kỳ tâm thu
- c. Khi máu về tâm thất
- d. Đóng van 2 lá và van 3 lá

Câu 1372: Yếu tố sau đây là chỉ số chính của tiền tải :

- a. Thể tích máu
- b. Áp suất tĩnh mạch trung tâm
- c. Thể tích thất trái cuối tâm trương
- d. Áp suất thất trái cuối tâm trương

Câu 1373: Yếu tố sau đây là chỉ số chính của hậu tải :

- a. Áp suất thất trái cuối tâm trương
- b. Áp suất động mạch chủ trong lúc van động mạch chủ mở
- c. Áp suất nền động mạch phổi
- d. Áp suất máu động mạch trung bình

Nội dung 5. Điều hòa hoạt động tim

Câu 1374: Định luật Frank – Starling :

- a. Lực co cơ tim tỷ lệ thuận với chiều dài sợi cơ trước khi co.
- b. Lực co cơ tim tỷ lệ nghịch với chiều dài sợi cơ trước khi co.
- c. Máu về tâm nhĩ phải nhiều sẽ gây kích thích nút xoang.
- d. Co kéo các tạng trong ổ bụng khi phẫu thuật có thể gây ngừng tim.

Câu 1375: Chọn câu đúng.

- a. lực Starling tỷ lệ với thể tích đầu tâm trương
- b. lực Starling luôn tăng khi lượng máu về tim tăng
- c. ở những tư thế khác nhau có những đường cong Starling khác nhau.
- d. khi lực co cơ tăng, đường cong starling dịch trái

Câu 1376: Luật Starling nói lên :

- a. Dây X lên lực co cơ tim.
- b. Các ion lên tần số tim.
- c. Lượng máu về tim lên lực co cơ tim.
- d. Các hormon lên lực co cơ tim.

Câu 1377: Định luật Starling của tim :

- a. Không còn khi cắt các dây thần kinh chi phối tim.
- b. Nói lên ảnh hưởng của hệ giao cảm lên tim.
- c. Nói lên ảnh hưởng của hormon lên tim.
- d. Thể hiện sự điều hòa hoạt động của tim.

Câu 1378: Khi kích phó giao cảm làm ảnh hưởng đến hoạt động tim, chọn câu sai

- a. Tăng nhịp tim
- b. Giảm trương lực cơ tim
- c. Giảm lực co tim
- d. Kéo dài thời gian dẫn truyền

Câu 1379: Lực co cơ tim tăng lên khi :

- a. Tăng nhiệt độ máu đến tim.
- b. Kích thích dây X chi phối tim.
- c. Giảm lượng máu về tim.
- d. Kích thích dây giao cảm chi phối tim.

- Câu 1380:** Bình thường lượng máu do tim tổng ra trong mỗi nhịp sẽ tăng trong điều kiện nào?
- Tăng hoạt động dây X.
 - Giảm áp suất nhĩ phải.**
 - Tăng sức cản ngoại biên toàn bộ.
 - Giảm hoạt động giao cảm.
- Câu 1381:** Tăng kích thích dây X sẽ làm tăng hoạt động :
- Nhịp tim
 - Dẫn truyền trong tim
 - Bài tiết acetylcholin**
 - Bài tiết norepinephrin
- Câu 1382:** Trên màng tế bào cơ tim, Acetylcholin có thể tác dụng trên :
- Thụ thể muscarinic.**
 - Thụ thể nicotinic.
 - Thụ thể muscarinic và nicotinic.
 - Kích thích men adenyl cyclase.
- Câu 1383:** Nồng độ norepinephrin trong máu tăng gây hậu quả nào sau đây?
- Giảm lượng máu trong một nhát bóp
 - Giảm nhịp tim
 - Tăng cung lượng tim**
 - Giảm co thất cơ tim
- Câu 1384:** Tiêm atropin sẽ xuất hiện tượng nào sau đây của hoạt động tim mạch?
- Giảm sức co thất cơ tim, tăng dẫn truyền cơ tim và giãn mạch.
 - Làm chậm việc dẫn truyền trong tim, tăng sức co bóp cơ tim.
 - Đối kháng cạnh tranh với acetylcholine gắn kết lên receptor muscarinic.**
 - Tăng cường sự bài tiết norepinephrine ở sợi hậu hạch giao cảm.
- Câu 1385:** Những yếu tố nào sau đây **không** gây tăng nhịp tim:
- Kích thích hệ giao cảm tim
 - Nhiễm độc tuyến giáp**
 - Cắt dây thần kinh số IX, X
 - Khi hít vào
- Câu 1386:** Ảnh hưởng của dây thần kinh tự chủ lên tim, **chọn câu đúng**
- Kích thích sợi dây X đến tim làm tăng tần số phát nhịp của các tế bào phát nhịp nằm xen trong cơ tim.
 - Hệ giao cảm hưng phấn tăng tần số phát nhịp của các tế bào phát nhịp nằm xen trong cơ tim.
 - Hệ giao cảm làm tăng tính dẫn truyền của cơ tim còn hệ phó giao cảm có tác dụng ngược lại.**
 - Hệ phó giao cảm làm tăng tính hưng phấn của cơ tim còn hệ giao cảm có tác dụng ngược lại.
- Câu 1387:** Phản xạ nào sau đây đóng vai trò ngăn ứ máu trong tim?
- Phản xạ áp cảm thụ quan
 - Phản xạ hóa cảm thụ quan
 - Phản xạ tim-tim (Bainbridge)**
 - Phản ứng Golz
- Câu 1388:** Phản xạ tim-tim xuất hiện khi :
- Máu về tim nhiều**
 - Máu về tâm nhĩ phải nhiều
 - Máu về tâm nhĩ trái nhiều
 - Máu về tâm thất nhiều
- Câu 1389:** Phản xạ áp cảm thụ qua có tác dụng :
- Nhịp tim chậm, gây giãn mạch**
 - Nhịp tim nhanh, gây giãn mạch
 - Nhịp tim nhanh, gây co mạch

d. Nhịp tim không thay đổi, huyết áp giảm

Câu 1390: Khi nói về tác dụng của *phản xạ áp cảm thụ quan* khi huyết áp tăng:

- a. Kích thích áp cảm thụ quan
- b. Ức chế áp cảm thụ quan
- c. Tăng hoạt động giao cảm đến tim
- d. Tăng trương lực tiểu động mạch

Câu 1391: Khi các áp cảm thụ quan giảm kích thích *tất cả các yếu tố sau sẽ tăng, ngoại trừ:*

- a. Cung lượng tim.
- b. Hoạt động thần kinh phó giao cảm.
- c. Tổng kháng lực ngoại biên.
- d. Hoạt động thần kinh giao cảm.

Câu 1392: Khi xoa vào xoang cảnh làm tim đập chậm lại bởi vì

- a. Làm giảm tác dụng của hệ giao cảm trên nút xoang
- b. Tăng tác dụng của thần kinh X trên nút xoang
- c. Tăng tác dụng của thần kinh X trên dẫn truyền từ nhĩ đến thất
- d. Giảm tác dụng của hệ giao cảm trên dẫn truyền từ nhĩ đến thất

Câu 1393: Khi co kéo mạnh các tạng trong bụng sẽ dẫn đến

- a. Phản xạ Bainbridge – tăng nhịp tim
- b. Phản xạ Golz – tăng nhịp tim
- c. Phản xạ Bainbridge – giảm nhịp tim
- d. Phản xạ Golz – giảm nhịp tim

Câu 1394: Phản xạ tăng nhịp tim xuất hiện khi :

- a. Nồng độ O₂ máu tăng, CO₂ giảm
- b. Nồng độ O₂ máu tăng, CO₂ tăng
- c. Nồng độ O₂ máu giảm, CO₂ giảm
- d. Nồng độ O₂ máu giảm, CO₂ tăng

Câu 1395: Câu nào sau đây diễn tả **đúng** ảnh hưởng của hô hấp lên nhịp tim?

- a. Nhịp tim giảm khi hít vào và tăng khi thở ra.
- b. Nhịp tim tăng khi hít vào và giảm khi thở ra.
- c. Nhịp tim tăng khi hít vào và tăng khi thở ra.
- d. Nhịp tim giảm khi hít vào và giảm khi thở ra.

Câu 1396: Chọn câu đúng. Giảm oxy trong máu:

- a. Làm tăng co bóp tim
- b. Làm giảm co bóp tim
- c. Chỉ tác dụng lên nhịp tim
- d. Giảm oxy ít tác dụng kích thích, giảm oxy nhiều tác dụng ức chế

Câu 1397: Nhịp tim tăng lên khi :

- a. Tăng áp suất máu trong quai động mạch chủ
- b. Tăng phân áp oxy trong máu động mạch
- c. Tăng nồng độ Ca⁺⁺ trong máu đến tim
- d. Giảm phân áp CO₂ trong máu động mạch

Câu 1398: Tần số tim tăng khi :

- a. Áp suất máu trong quai động mạch chủ tăng
- b. Áp suất máu trong xoang động mạch cảnh tăng
- c. Lượng máu về tâm nhĩ trái tăng
- d. Phân áp CO₂ trong máu động mạch tăng

Câu 1399: Phản xạ làm giảm nhịp tim xuất hiện khi ;

- a. Tăng huyết áp ở quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh
- b. Lượng máu về tâm nhĩ phải tăng
- c. Phân áp O₂ giảm trong máu động mạch

d. Phản áp CO_2 tăng trong máu động mạch

Câu 1400: Phản xạ giảm áp xuất hiện khi :

- a. Tim đập nhanh làm máu đến động mạch nhiều
- b. Tim co bóp mạnh làm máu đến động mạch nhiều
- c. Máu về tim nhiều làm máu đến động mạch nhiều
- d. Áp suất máu trong quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh tăng

CHUYÊN ĐỀ 7 – SINH LÝ HỆ TIM MẠCH

Bài số 26

SINH LÝ MẠCH MÁU

Nội dung 1. Các vấn đề về huyết động học

Câu 1401: Chọn câu **sai** về vận tốc máu :

- a. Vận tốc máu là khoảng cách di chuyển trong một đơn vị thời gian (mm/s)
- b. **Lưu lượng máu là vận tốc máu di chuyển trong một giây (ml/s)**
- c. Ở mao mạch có vận tốc máu thấp nhất
- d. Ở động mạch chủ có vận tốc mạch cao nhất

Câu 1402: Lưu lượng máu chảy trong mạch:

- a. Tăng theo bán kính của mạch
- b. **Thường hằng định, quyết định bởi cung lượng tim**
- c. Lưu lượng máu động mạch lớn hơn trong mao mạch
- d. Tính bằng thể tích máu di chuyển trong một phút

Câu 1403: Yếu tố nào sau đây **không** dùng để xác định lưu lượng máu?

- a. Độ sai biệt áp suất
- b. Đường kính mạch máu
- c. **Độ pH của máu**
- d. Tổng kháng lực ngoại biên

Câu 1404: Chọn câu đúng.

- a. Trong hệ mạch, vận tốc máu không đổi, lưu lượng máu tỉ lệ thuận với thiết diện
- b. Trong hệ mạch, lưu lượng máu không đổi, vận tốc máu tỉ lệ thuận với thiết diện
- c. **Trong hệ mạch, lưu lượng máu không đổi, vận tốc máu tỉ lệ nghịch với thiết diện**
- d. Trong hệ mạch, vận tốc máu không đổi, lưu lượng máu tỉ lệ thuận với thiết diện

Câu 1405: Vận tốc máu lớn nhất trong:

- a. **Cung động mạch chủ**
- b. Tĩnh mạch chủ
- c. Tiểu động mạch
- d. Mao mạch

Câu 1406: Vận tốc máu chậm nhất tại :

- a. Động mạch chủ
- b. Động mạch lớn
- c. **Mao mạch**
- d. Tĩnh mạch chủ

Câu 1407: Tổng thiết diện lớn nhất đối với :

- a. Cung động mạch chủ
- b. Tiểu động mạch
- c. **Mao mạch**
- d. Tĩnh mạch chủ

Câu 1408: Thể tích máu trong hệ mạch nhiều nhất ở :

- a. Trong động mạch
- b. Trong mao mạch
- c. **Trong tĩnh mạch**
- d. Trong các xoang tĩnh mạch

Câu 1409: Huyết áp động mạch :

- a. Tăng khi đột ngột máu giảm

- b. Giảm khi bán kính mạch tăng
- c. Giảm khi độ dài đoạn mạch tăng
- d. Giảm khi lượng protein trong máu tăng

Câu 1410: Độ nhớt máu tùy thuộc vào, ngoại trừ

- a. Dung tích hồng cầu lắng đọng
- b. Hình dạng tế bào máu
- c. Lượng protein trong huyết tương
- d. Tuổi của hồng cầu

Câu 1411: Bình thường, sức cản của mạch trong hệ mạch thay đổi theo :

- a. Bán kính mạch
- b. Độ nhớt máu
- c. Chiều dài mạch
- d. Lưu lượng máu

Câu 1412: Khi đường kính mạch máu lúc nghỉ ngơi giảm 1,41 lần, kháng lực đối với dòng máu tăng bao nhiêu lần?

- a. 2
- b. 4
- c. 8
- d. 16

Câu 1413: Trong hệ mạch, khi các mạch nối song song :

- a. Sức cản toàn phần bằng tổng sức cản mỗi phần
- b. Sức cản từng phần nhỏ hơn sức cản mỗi phần
- c. Sức cản toàn phần lớn hơn sức cản mỗi phần
- d. Sức cản toàn phần nhỏ hơn tổng sức cản mỗi phần

Câu 1414: Kháng lực mạch tăng lên khi:

- a. Khi bạch cầu tăng
- b. Khi tế bào máu tăng
- c. Khi protein trong huyết tương giảm
- d. Khi tiểu cầu giảm

Câu 1415: Tăng protein huyết tương trong các trường hợp viêm nhiễm :

- a. Tăng sức cản mạch, tăng huyết áp
- b. Tăng sức cản mạch, hạ huyết áp
- c. Giảm sức cản mạch, tăng huyết áp
- d. Giảm sức cản mạch, hạ huyết áp

Câu 1416: Các yếu tố ảnh hưởng làm tăng huyết áp :

- a. Tần số tim > 140 lần/phút
- b. Độ nhớt của máu tăng
- c. Đường kính mạch tăng
- d. Trương lực thành mạch giảm

Câu 1417: Yếu tố làm tăng huyết áp động mạch, chọn câu sai

- a. Kháng lực ngoại biên tăng.
- b. Cung lượng tim giảm.
- c. Độ nhớt máu tăng.
- d. Tất cả đều sai.

Câu 1418: Áp suất đóng mạch là:

- a. Khi áp suất máu bằng 0.
- b. Khi mạch xẹp áp suất máu bằng 0.
- c. Khi mạch xẹp áp suất máu chưa bằng 0.

- d. Khi mạch chưa xẹp, áp suất máu bằng 0.

Nội dung 2. Tuần hoàn động mạch – huyết áp động mạch

Câu 1419: Hai tính chất sinh lý của động mạch :

- a. Tính đàn hồi và tính dẫn truyền
- b. Tính đàn hồi và tính co thắt
- c. Tính co thắt và tính hưng phấn
- d. Tính hưng phấn và tính dẫn truyền

Câu 1420: Đặc điểm sinh lý của động mạch :

- a. Tính đàn hồi : động mạch giãn ra lúc tâm thu và co lại lúc tâm trương
- b. Tính co thắt : thành động mạch có cơ trơn co lại làm hẹp lòng mạch máu
- c. Tất cả đều đúng
- d. Tất cả đều sai

Câu 1421: Chọn câu sai. Tính đàn hồi của động mạch

- a. Giúp cho máu di chuyển trong mạch liên tục
- b. Ở người trẻ tuổi, sức đàn hồi của động mạch chủ cao ở các áp suất hấp
- c. Sức đàn hồi giảm theo độ tuổi do tăng độ cứng thành mạch
- d. Làm tăng lượng máu lưu chuyển

Câu 1422: Chọn câu sai về đặc tính co thắt của động mạch

- a. Tính co thắt của động mạch do cơ trơn tạo ra.
- b. Huyết áp tăng khi các sợi cơ trơn co lại.
- c. Cơ trơn thành động mạch chứa các thụ thể là đích tác động của norepinephrin
- d. Tính co thắt giúp động mạch thay đổi thiết diện, điều hòa lượng máu đến các nơi của cơ thể

Câu 1423: Đặc tính nào sau đây của thành mạch ít quan trọng nhất?

- a. Co thắt được
- b. Nhiều cơ trơn
- c. Có tính đàn hồi
- d. Nhiều đầu tận cùng thần kinh

Câu 1424: Chọn câu đúng về huyết áp tối đa :

- a. Là huyết áp của kỳ tâm trương, có trị số 90-140 mmHg
- b. Là huyết áp của kỳ tâm thu, có trị số 90-140mmHg
- c. Là huyết áp của kỳ tâm trương, có trị số 50-90 mmHg
- d. Là huyết áp của kỳ tâm thu, có trị số 50-90 mmHg

Câu 1425: Chọn câu đúng về huyết áp tối thiểu :

- a. Là huyết áp của kỳ tâm thu, có trị số 90-140mmHg.
- b. Là huyết áp của kỳ tâm trương, có trị số 90-140 mmHg.
- c. Là huyết áp của kỳ tâm thu, có trị số 50-90 mmHg.
- d. Là huyết áp của kỳ tâm trương, có trị số 50-90 mmHg.

Câu 1426: Huyết áp trung bình :

- a. Là trung bình cộng của huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.
- b. Phản ánh sự ứ trệ tuần hoàn khi bị kẹt.
- c. Bằng một phần ba hiệu áp cộng huyết áp tối đa.
- d. Phản ánh hiệu lực làm việc thực sự của tim trong một chu kỳ .

Câu 1427: Đặc điểm của huyết áp động mạch:

- a. Có thể đạt tối đa khoảng 140mmHg và tối thiểu vào khoảng 50mmHg
- b. Bình thường hiệu áp vào khoảng 90mmHg
- c. Sự tăng giảm áp suất máu theo thời gian giảm dần khi càng càng về xa tim
- d. Huyết áp tối đa để đánh giá sức co bóp của cơ tim

Câu 1428: Một người đo huyết áp gián tiếp bằng máy đo áp suất thấy áp suất tâm trương là 122 mmHg và huyết áp tâm thu là 80mmHg. Huyết áp trung bình của bệnh nhân này là

- a. 101 mmHg
- b. 122 mmHg
- c. 94 mmHg
- d. 92 mmHg

Câu 1429: Khi trương mạch máu bình thường, lực co cơ tim giảm cho:

- a. Huyết áp trung bình tăng
- b. Huyết áp hiệu áp tăng
- c. Huyết áp tối thiểu giảm
- d. Huyết áp hiệu áp giảm

Câu 1430: Yếu tố nào sau đây làm giảm suất đẩy (hiệu áp) ở động mạch?

- a. Giảm sức đàn động mạch.
- b. Giảm sức đàn tĩnh mạch.
- c. Giảm thể tích máu.
- d. Tăng áp suất tĩnh mạch trung ương.

Câu 1431: Ở người già, thành mạch máu xơ cứng dẫn đến:

- a. Tăng sức cản thành mạch, huyết áp tăng
- b. Giảm tính đàn hồi, huyết áp giảm
- c. Tăng sức cản thành mạch, huyết áp giảm
- d. Tăng tính đàn hồi, huyết áp tăng

Câu 1432: Huyết áp động mạch tăng trong bệnh lý:

- a. ỉa chảy mất nước
- b. suy dinh dưỡng thiếu protein
- c. xơ vữa động mạch
- d. suy tim trái hoặc phải

Câu 1433: Huyết áp động mạch giảm trong trường hợp

- a. Xơ vữa động mạch
- b. Tăng tiết ADH
- c. Sau bữa ăn quá mặn
- d. Suy dinh dưỡng thiếu protein

Câu 1434: Các yếu tố sau đây có thể làm tăng huyết áp, ngoại trừ:

- a. Chế độ ăn nhiều cholesteron
- b. Căng thẳng thần kinh kéo dài
- c. Nghiện thuốc lá
- d. Thường xuyên thuốc lá

Câu 1435: Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp lên tổng sức cản ngoại biên trong các trường hợp bệnh lý tim mạch, ngoại trừ:

- a. Thành mạch dày lên và cứng lại
- b. Lòng mạch gồ ghề do bám mỡ
- c. Lòng mạch hẹp lại
- d. Lượng máu do tim bơm ra trong một nhịp

Câu 1436: Tăng sức cản ngoại biên :

- a. Làm tăng huyết áp tâm thu nhiều hơn huyết áp tâm trương.
- b. Làm giảm hiệu áp của động mạch.
- c. Huyết áp trung bình không đổi.
- d. Làm tăng huyết áp tâm trương nhiều hơn huyết áp tâm thu.

Câu 1437: Chọn câu đúng về ảnh hưởng của nhịp tim lên huyết áp động mạch.

- a. Nhịp tim càng tăng thì cung lượng tim càng lớn dẫn đến huyết áp càng lớn.
- b. Nhịp tim tăng cao thì lượng máu một lần bơm ra giảm dẫn đến huyết áp giảm.
- c. Nhịp tim tăng cao thì theo cơ chế điều hòa ngược âm tính làm huyết áp giảm.
- d. Nhịp tim càng tăng thì máu về tim càng nhiều dẫn đến huyết áp càng lớn.

Câu 1438: Chọn câu **không đúng** trong các câu sau:

- a. Các yếu tố ảnh hưởng lên hoạt động tim đều ảnh hưởng lên huyết áp.
- b. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu phụ thuộc vào lực co cơ tim.
- c. Áp suất động mạch tỉ lệ thuận với lưu lượng tim và kháng trở ngoại biên.
- d. Huyết áp động mạch tỷ lệ nghịch với lũy thừa bậc 4 bán kính mạch máu.

Câu 1439: Chọn câu **đúng nhất**.

- a. Nhịp tim tăng thì huyết áp tăng.
- b. Độ nhót máu tăng làm huyết áp giảm.
- c. Cung lượng tim tăng làm huyết áp tăng.
- d. Huyết áp động mạch nhỏ hơn áp suất mao mạch.

Câu 1440: Chọn câu **không đúng**.

- a. Lao động nặng huyết áp tăng.
- b. Khi tập luyện thể thao, huyết áp tăng.
- c. Ở người bị xơ vữa động mạch, huyết áp tăng.
- d. Chế độ ăn mặn nhiều dẫn đến huyết áp tăng.

Câu 1441: Huyết áp động mạch giảm xuống khi:

- a. Áp suất máu trong quai động mạch chủ tăng lên
- b. Áp suất máu trong xoang động mạch càng giảm
- c. Tăng sức cản của hệ tuần hoàn
- d. Thở ra

Câu 1442: Tiêu động mạch dẫn ra khi :

- a. Tăng phân áp oxy.
- b. Tăng bradykinin.
- c. Tăng nồng độ ion Ca^{++} .
- d. Giảm histamin.

Nội dung 3. Đặc điểm chức năng của mao mạch

Câu 1443: Sự trao đổi các chất dinh dưỡng và khí giữa máu và mô xảy ra tại:

- a. Động mạch
- b. Tiêu động mạch
- c. Mao mạch
- d. Tĩnh mạch

Câu 1444: Oxy và CO_2 di chuyển qua mao mạch nhờ cơ chế :

- a. Khuếch tán có gia tốc
- b. Khuếch tán đơn giản
- c. Tan trong nước
- d. Ẩm bào

Câu 1445: Áp suất máu đầu động mạch của mao mạch :

- a. 15 mmHg
- b. 32 mmHg
- c. 40 mmHg
- d. 50 mmHg

Câu 1446: Tuần hoàn mao mạch :

- a. Tuần hoàn mao mạch phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố toàn thân
- b. Các mao mạch luôn đóng mở giống nhau

- c. Áp suất trong mao mạch cao vì đường kính mao mạch nhỏ
- d. Trong một hệ mao mạch, các mao mạch thay nhau đóng mở

Câu 1447: Chọn câu sai khi nói về tuần hoàn mao mạch?

- a. Trong một hệ thống mao mạch, các mao mạch đóng mở cho sự thay đổi oxy của mô.
- b. Tuần hoàn mao mạch phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố tại chỗ.
- c. Áp suất máu trong mao mạch phụ thuộc vào thể tích máu hơn là lưu lượng máu qua mao mạch.
- d. Trong mao mạch máu luôn chảy liên tục.

Câu 1448: Áp suất keo trong huyết tương :

- a. Tăng từ đầu tiểu động mạch sang đầu tiểu tĩnh mạch.
- b. Không đổi từ đầu tiểu động mạch sang đầu tiểu tĩnh mạch.
- c. Giảm từ đầu tiểu động mạch sang đầu tiểu tĩnh mạch.
- d. Giảm đột ngột khi đi vào hệ mao mạch.

Câu 1449: Áp suất thủy tĩnh trong huyết tương :

- a. Tăng từ đầu tiểu động mạch sang đầu tiểu tĩnh mạch.
- b. Giảm đột ngột khi đi vào hệ mao mạch.
- c. Không đổi từ đầu tiểu động mạch sang đầu tiểu tĩnh mạch.
- d. Giảm từ đầu tiểu động mạch sang đầu tiểu tĩnh mạch.

Câu 1450: Chọn câu đúng về đặc điểm áp suất mao mạch và dịch kẽ.

- a. Áp suất thủy tĩnh trong mao mạch tăng dần từ đầu tiểu động mạch đến đầu tiểu tĩnh mạch.
- b. Áp suất keo trong mao mạch giảm dần từ đầu tiểu động mạch đến đầu tiểu tĩnh mạch.
- c. Áp suất keo trong dịch kẽ giảm dần từ đầu tiểu động mạch đến đầu tiểu tĩnh mạch.
- d. áp suất keo của huyết tương giảm quá thấp có thể gây phù do thoát nước từ mao mạch ra khoảng kẽ.

Câu 1451: Dịch trong lòng mao mạch vào khoang kẽ tăng lên là do:

- a. Giảm áp suất máu động mạch.
- b. Giảm áp suất máu tĩnh mạch.
- c. Tăng áp suất keo của dịch kẽ.
- d. Tăng chênh lệch áp suất thủy tĩnh và áp suất keo trong mao mạch.

Câu 1452: Dịch từ lòng mao mạch đi vào khoảng kẽ tăng lên khi :

- a. Giảm áp suất động mạch.
- b. Tăng áp suất keo huyết tương.
- c. Tăng áp suất thủy tĩnh ở tĩnh mạch.
- d. Tăng áp suất thủy tĩnh ở khoảng kẽ.

Câu 1453: Nhịp độ di chuyển nước qua màng mao mạch

- a. Gấp 10 lần nhịp độ huyết tương chảy dọc mao mạch.
- b. Gấp 20 lần nhịp độ huyết tương chảy dọc mao mạch.
- c. Gấp 50 lần nhịp độ huyết tương chảy dọc mao mạch.
- d. Gấp 80 lần nhịp độ huyết tương chảy dọc mao mạch.

Câu 1454: Phù sẽ xảy ra khi có sự thay đổi về áp suất thủy tĩnh mao tĩnh mạch hoặc áp suất keo huyết tương như thế nào?

- a. Tăng áp suất thủy tĩnh và áp suất keo
- b. Giảm áp suất thủy tĩnh và áp suất keo huyết tương
- c. Tăng áp suất thủy tĩnh và giảm áp suất keo huyết tương
- d. Giảm áp suất thủy tĩnh và tăng áp suất keo

Câu 1455: Yếu tố quan trọng nhất điều hòa hoạt động cơ thất tiền mao mạch?

- a. Nồng độ O_2
- b. Nồng độ CO_2

- c. Catecholamin
- d. Nhiệt độ

Câu 1456: Cơ thắt trước mao mạch giãn ra khi:

- a. Giảm nồng độ oxy ở dịch kẽ
- b. Giảm nồng độ CO₂ ở dịch kẽ
- c. Giảm histamin ở dịch kẽ
- d. Giảm nhiệt độ máu

Nội dung 4. Tuần hoàn tĩnh mạch – huyết áp tĩnh mạch

Câu 1457: Đặc điểm của tĩnh mạch, chọn câu sai.

- a. Có tính đàn hồi tốt hơn động mạch.
- b. Có tổng thiết diện lớn hơn động mạch.
- c. Khả năng chứa trên 50% thể tích máu cơ thể.
- d. Có các xoang tĩnh mạch.

Câu 1458: Chọn phát biểu đúng về đặc điểm của tĩnh mạch :

- a. Có khả năng dẫn yếu.
- b. Khả năng chứa máu ít hơn động mạch.
- c. Thành tĩnh mạch ít cơ trơn.
- d. Hầu hết không có van.

Câu 1459: Tính chất sinh lý chính của tĩnh mạch là khả năng :

- a. Co mạch.
- b. Chứa máu.
- c. Thực bào.
- d. Tạo mạch.

Câu 1460: Tỷ lệ giữa tuần hoàn mao mạch và cung lượng tim:

- a. 0,11
- b. 0,68
- c. 0,32
- d. 0,57

Câu 1461: Nguyên nhân chính của tuần hoàn tĩnh mạch là:

- a. Sức bơm của tim.
- b. Sức bơm của lồng ngực.
- c. Hệ thống van trong tĩnh mạch.
- d. Động mạch đập, ép vào tĩnh mạch.

Câu 1462: Nguyên nhân quan trọng nhất của tuần hoàn tĩnh mạch là:

- a. Sức hút của tâm thất lúc thất giãn.
- b. Sức đẩy còn lại của tâm thất thu.
- c. Cơ vân co, ép vào tĩnh mạch.
- d. Động mạch đi kèm đập, ép vào tĩnh mạch.

Câu 1463: Chọn câu đúng khi nói về tuần hoàn mao mạch.

- a. Phần lớn máu trong tĩnh mạch trở về tim được là nhờ trọng lực.
- b. Hệ thống tĩnh mạch có khả năng chứa toàn bộ khối lượng máu cơ thể.
- c. Khu vực tuần hoàn trong mao mạch, tĩnh mạch và tiểu tuần hoàn là khu vực có áp suất thấp.
- d. Tuần hoàn mao mạch phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố toàn thân.

Câu 1464: Trị số thấp nhất của áp suất tĩnh mạch đo được ở :

- a. Tĩnh mạch phổi.
- b. Tĩnh mạch chủ bụng.
- c. Tâm nhĩ trái.

d. Tâm nhĩ phải.

Câu 1465: Trị số áp lực tĩnh mạch trung tâm CVP là áp lực máu đo tại

- a. Nơi tĩnh mạch chủ đầu và nhĩ trái
- b. Nơi mao mạch đổ vào tiểu tĩnh mạch
- c. Các tĩnh mạch lớn
- d. Các tĩnh mạch nhỏ

Câu 1466: Chọn câu sai. Đặc điểm của huyết áp tĩnh mạch là:

- a. Tĩnh mạch nhỏ có áp suất 8-10 mmHg.
- b. Các tĩnh mạch lớn trong lồng ngực có áp suất khoảng 5,5 mmHg.
- c. Áp suất tại tâm nhĩ khoảng 4,6 mmHg.
- d. Áp suất tĩnh mạch ngoại biên chịu ảnh hưởng của trọng lực.

Nội dung 5. Các yếu tố điều hòa huyết áp

A – Cơ chế thần kinh điều hòa huyết áp

Câu 1467: Huyết áp tăng kích thích vào bộ phận nhận cảm áp suất sẽ gây:

- a. Tăng lực co tim
- b. Tăng nhịp tim
- c. Kích thích thần kinh phó giao cảm chi phối tim
- d. Tăng huyết áp ngoại vi

Câu 1468: Phản xạ nào sau đây đóng vai trò chủ yếu để duy trì áp suất động mạch ít thay đổi ?

- a. Phản xạ áp cảm thụ quan.
- b. Phản xạ hóa cảm thụ quan.
- c. Phản xạ cơ tĩnh mạch.
- d. Phản xạ của thần kinh trung ương.

Câu 1469: Phản xạ nào sau đây đóng vai trò trong điều hòa huyết áp nhanh trong trường hợp khẩn cấp?

- a. Phản xạ hóa cảm thụ quan.
- b. Phản xạ áp cảm thụ quan.
- c. Phản xạ của thần kinh trung ương.
- d. Phản xạ Bainbridge.

Câu 1470: Phản xạ áp thụ quan có tác dụng làm :

- a. Tần số tim chậm, gây giãn mạch.
- b. Tần số tim nhanh, gây giãn mạch.
- c. Tần số tim nhanh, gây co mạch.
- d. Tần số tim không thay đổi, huyết áp giảm.

Câu 1471: Cơ thể có cơ chế điều hòa làm áp suất động mạch giảm xuống khi:

- a. Áp suất máu trong quai động mạch chủ tăng lên.
- b. Áp suất máu trong xoang tĩnh mạch cảnh giảm.
- c. Tăng sức cản của hệ tuần hoàn.
- d. Nhịp tim chậm

Câu 1472: Phản xạ hóa cảm thụ qua có tác dụng :

- a. Co mạch.
- b. Giãn mạch.
- c. Không có tác dụng trên hệ mạch.
- d. Ức chế trung tâm vận mạch.

Câu 1473: Phản xạ hóa cảm thụ quan làm tăng huyết áp trong trường hợp :

- a. PCO₂ tăng, PO₂ giảm, pH tăng
- b. PCO₂ giảm, PO₂ tăng, pH tăng
- c. PCO₂ giảm, PO₂ tăng, pH giảm

d. PCO_2 tăng, PO_2 giảm, pH giảm

Câu 1474: Phản xạ phổi – nhĩ, **chọn câu sai**

- a. Thụ cảm thể nằm ở thành tâm nhĩ.
- b. Trung tâm phản xạ ở hành não.
- c. Kích thích tăng bài tiết ADH ở thùy sau tuyến yên.
- d. **Ức chế tái hấp thu nước ở ống lượn xa và ống góp.**

Câu 1475: **Chọn câu sai** khi nói về các phản xạ điều hòa huyết áp ?

- a. Tăng áp suất trong tâm nhĩ làm tăng nhịp tim, dẫn đến tăng huyết áp.
- b. Khi máu đến não thiếu, ở trung tâm vận mạch làm co mạch và tăng huyết áp.
- c. **Khi huyết áp giảm, thần kinh phó giao cảm sẽ tăng hoạt động làm co mạch tăng huyết áp.**
- d. Khi huyết áp tăng ức chế trung tâm vận mạch ở hành não làm giãn mạch, hạ huyết áp.

Câu 1476: Điều hòa tuần hoàn ngoại biên, **chọn câu đúng.**

- a. **Thần kinh giao cảm gây co mạch làm tăng huyết áp.**
- b. Thần kinh đối giao cảm gây tăng nhịp tim, giãn mạch, làm giảm huyết áp.
- c. Tất cả đều đúng.
- d. Tất cả đều sai.

Câu 1477: Khi kích thích thần kinh giao cảm làm tăng huyết áp có các tác dụng sau, **ngoại trừ:**

- a. Co các động mạch nhỏ do đó làm tăng sức cản
- b. Co các tiểu động mạch do đó làm tăng sức cản
- c. **Co các mao mạch do đó làm tăng sức cản**
- d. Co các tĩnh mạch lớn do đó dồn máu về tim

Câu 1478: Phản xạ điều hòa huyết áp xuất hiện trong các trường hợp sau, **ngoại trừ:**

- a. Huyết áp tăng tác động receptor áp suất ở quai động mạch chủ, xoang động mạch cảnh
- b. **Máu cung cấp cho trung tâm vận mạch tăng**
- c. Máu cung cấp cho trung tâm vận mạch giảm
- d. Huyết áp tăng, phân áp oxy tăng, CO_2 giảm, pH tăng kích thích thụ cảm hóa học ở xoang động mạch cảnh

Câu 1479: Cơ chế quan trọng nhất làm tăng dòng máu đến cơ vân khi đang vận động :

- a. Tăng huyết áp động mạch
- b. Tăng xung động trên hệ alpha-adrenergic
- c. Tăng xung động trên hệ beta-adrenergic
- d. **Giãn mạch thứ phát do tác động của các sản phẩm chuyển hóa tại chỗ**

B – Cơ chế thể dịch điều hòa huyết áp

Câu 1480: Các chất có tác dụng lên điều hoà huyết áp do có tác dụng lên mạch máu và đồng thời tác dụng lên tái hấp thu ở ống thận là:

- a. Adrenalin và noradrenalin.
- b. Serotonin và Bradykinin.
- c. **Angiotensin II và Vasopressin.**
- d. Prostaglandin và Angiotensin.

Câu 1481: Hormon có tác dụng gây co mạch mạnh nhất là:

- a. **Angiotensin II.**
- b. Adrenalin.
- c. Noradrenalin.
- d. Vasopressin.

Câu 1482: Angiotensin II được hình thành khi :

- a. Máu chảy qua động mạch.
- b. Máu chảy qua gan.

- c. Máu chảy qua mao mạch phổi.
- d. Máu chảy qua mao mạch cầu thận.

Câu 1483: Angiotensin II:

- a. Kích thích thần kinh giao cảm tăng tiết adrenalin.
- b. Kích thích thận tăng tái hấp thu Ca^{++} .
- c. Có tác dụng giảm tái hấp thu adrenalin trở lại cục thận cùng.
- d. Tăng độ nhạy cảm của mạch máu với adrenalin.

Câu 1484: Angiotensin II làm tăng huyết áp do tác dụng sau đây, ngoại trừ:

- a. Co động mạch nhỏ làm tăng sức cản
- b. Co tiểu động mạch làm tăng sức cản
- c. Kích thích hệ giao cảm tăng tiết noradrenalin
- d. Kích thích vỏ thượng thận tăng tiết aldosteron

Câu 1485: Chọn câu sai khi nói về các chất điều hòa vận mạch?

- a. Adrenalin làm co mạch da, giãn mạch vành, mạch não và mạch cơ vân.
- b. Noreadrenalin chỉ tác dụng làm co mạch hầu hết các cơ quan.
- c. Bradykinin trong máu có tác dụng trực tiếp gây giãn mạch và tăng tính thấm mao mạch.
- d. Vasopressin làm tăng huyết áp chỉ do làm co mạch.

Một bệnh nhân có huyết áp = 94/40mmHg. Hãy chọn câu xử lý thích hợp sau trong các trường hợp bên dưới:

- a. Tiêm dopamin
- b. Truyền albumin nồng độ cao
- c. Truyền nước muối sinh lý đẳng trương
- d. Truyền máu

Câu 1486: Một cô gái bị ong đốt

Câu 1487: Một người đàn ông mất máu do vết thương

Câu 1488: Một người phụ nữ bị bỏng trên 35% diện tích cơ thể

Câu 1489: Một bà bị nhồi máu cơ tim đã 24 giờ

CHUYÊN ĐỀ 8 – SINH LÝ HỆ HÔ HẤP

Bài số 27

TRAO ĐỔI KHÍ NGOÀI PHỔI

Nội dung 1. Tổng quan về hoạt động hô hấp

Câu 1490: Quá trình hô hấp gồm các giai đoạn sau, ngoại trừ :

- a. khí phổi
- b. trao đổi khí tại phổi
- c. chuyên chở khí nitơ trong máu
- d. hô hấp nội

Câu 1491: Quá trình hô hấp gồm các giai đoạn sau, ngoại trừ :

- a. Trao đổi khí ngoài phổi
- b. Trao đổi khí tại phổi
- c. Vận chuyển khí trong máu
- d. Tưới máu phổi

Câu 1492: Thông khí phổi là quá trình trao đổi khí giữa :

- a. Khí quyển và phế nang
- b. Phế nang và máu
- c. Máu và dịch gian bào
- d. Dịch gian bào và dịch nội bào

Nội dung 2. Vai trò của lồng ngực và các cơ hô hấp trong các thì hít vào thở ra

Câu 1493: Lồng ngực có đặc tính nào sau đây :

- a. Là một cấu trúc đàn hồi
- b. Kín
- c. Có thể thay đổi kích thước theo 3 chiều : trước sau , trên dưới , ngang
- d. Tất cả đều đúng

Câu 1494: Nhóm cơ hít vào bình thường gồm :

- a. Cơ hoành và cơ liên sườn trong
- b. Cơ hoành và cơ liên sườn ngoài
- c. Cơ hoành, cơ liên sườn trong, cơ ức đòn chũm, cơ răng cưa lớn
- d. Cơ hoành, cơ liên sườn ngoài, cơ ức đòn chũm, cơ răng cưa lớn

Câu 1495: Cơ liên sườn ngoài là:

- a. Cơ thở ra bình thường
- b. Cơ hít vào bình thường
- c. Cơ thở ra gắng sức
- d. Cơ hít vào gắng sức

Câu 1496: Cử động hít vào bình thường có đặc điểm sau :

- a. Mang tính chất thụ động
- b. Được thực hiện chủ yếu bởi cơ hoành và cơ liên sườn trong
- c. Làm thay đổi kích thước lồng ngực theo chiều trên dưới và chiều ngang là chủ yếu
- d. Câu b và c đúng

Câu 1497: Động tác hít vào bình thường :

- a. Là động tác thụ động do cơ hoành và cơ liên sườn ngoài co giãn
- b. Là động tác chủ động do cơ hoành và cơ liên sườn ngoài co giãn
- c. Là động tác thụ động do cơ hoành co giãn

d. Là động tác chủ động do cơ liên sườn ngoài chi phối

Câu 1498: Động tác hít vào tối đa:

- a. Là động tác hít vào cổ sức sau ngừng thở.
- b. Là động tác hít vào cổ sức sau thở ra bình thường.
- c. Là động tác hít vào cổ sức sau thở ra hết sức.
- d. Là động tác hít vào cổ sức sau hít vào bình thường.

Câu 1499: Các cơ tham gia động tác hít vào gắng sức:

- a. Cơ hoành và các cơ thành bụng trước
- b. Cơ hoành và cơ liên sườn trong
- c. Cơ hoành, cơ liên sườn trong, cơ ức đòn chũm, cơ răng cưa lớn
- d. Cơ hoành, cơ liên sườn ngoài, cơ ức đòn chũm, cơ răng cưa lớn, cơ bậc thang, cơ cân mũi, cơ má

Câu 1500: Khi cơ hoành hạ xuống 4cm thì thể tích lồng ngực tăng thêm:

- a. 250cm^3
- b. 500cm^3
- c. 1000cm^3
- d. 1500cm^3

Câu 1501: Khi hít vào gắng sức cơ hoành có thể hạ thấp xuống khoảng:

- a. 5-6 cm
- b. 6-7 cm
- c. 7-8 cm
- d. 8-9 cm

Câu 1502: Cơ hô hấp phụ bao gồm các cơ sau :

- a. Cơ hoành
- b. Cơ liên sườn ngoài
- c. Cơ liên sườn trong
- d. Câu b và c đúng

Câu 1503: Động tác hô hấp sau đây là thụ động:

- a. Hít vào bình thường
- b. Thở ra bình thường
- c. Hít vào gắng sức
- d. Thở ra gắng sức

Câu 1504: Hoạt động hô hấp **không** cần năng lượng cơ cơ :

- a. Thở ra bình thường
- b. Thở ra gắng sức
- c. Hít vào bình thường
- d. Hít vào gắng sức

Câu 1505: Các động tác hô hấp sau sinh công hô hấp, ngoại trừ:

- a. Hít vào bình thường
- b. Hít vào gắng sức
- c. Thở ra bình thường
- d. Thở ra gắng sức

Câu 1506: Liệt cơ hoành dẫn đến giảm thông khí là do ;

- a. Khoảng chết sinh lý tăng.
- b. Áp suất trong khoang màng phổi trở nên dương.
- c. Chiều thẳng đứng không tăng lên khi hít vào.
- d. Chiều trước sau không tăng lên khi hít vào.

Nội dung 3. Vai trò của phổi trong các thì hít vào thở ra

A – Áp suất âm của khoang màng phổi

Câu 1507: Khi áp suất khoang màng phổi là 755mmHg thì qui ra áp suất âm là :

- a. -755mmHg
- b. -5mmHg
- c. -10mmHg
- d. -15mmHg

Câu 1508: Áp suất trong màng phổi :

- a. Là áp suất âm nhưng cao hơn áp suất khí quyển
- b. Giúp phổi di chuyển theo sự cử động của lồng ngực.
- c. Giúp hiệu suất trao đổi khí tại phổi đạt tối đa
- d. **Chỉ có b và c đúng**

Câu 1509: Áp suất âm của khoang màng phổi có đặc điểm :

- a. Là áp suất tồn tại tại các phế nang
- b. Luôn luôn cao hơn áp suất khí quyển
- c. **Được tạo ra do phổi có xu hướng co rút về rốn phổi**
- d. Nhỏ nhất ở thì hít vào gắng sức

Câu 1510: Áp suất trong khoang màng phổi **âm nhất** vào lúc:

- a. **Hít vào gắng sức**
- b. Thở ra bình thường
- c. Hít vào gắng sức
- d. Thở ra gắng sức

Câu 1511: Áp suất trong khoang màng phổi **ít âm nhất** vào lúc:

- a. Hít vào bình thường
- b. Hít vào gắng sức
- c. Thở ra bình thường
- d. **Thở ra gắng sức**

Câu 1512: Áp suất âm trong khoang màng phổi được tạo ra do, **ngoại trừ**

- a. Sức hút liên tục của mạch bạch huyết ở khoang màng phổi
- b. Tính đàn hồi của phổi và cấu trúc kín, cứng của lồng ngực
- c. Khoang màng phổi là khoang kín, lá thành dính chặt vào lồng ngực và tạng dính chặt vào nhu mô phổi
- d. **Sự dàn trải của chất hoạt diện trên lớp dịch màng phổi**

Câu 1513: Áp suất âm của khoang màng phổi có đặc điểm : **CHỌN CÂU SAI**

- a. Là áp suất tồn tại tại khoang màng phổi
- b. Luôn luôn thấp hơn áp suất khí quyển
- c. **Nhỏ nhất ở thì hít vào gắng sức**
- d. Được tạo ra do phổi có xu hướng co rút về rốn phổi

Câu 1514: Ý nghĩa của áp suất âm, **ngoại trừ** :

- a. Làm cho phổi di chuyển theo sự cử động của lồng ngực
- b. Làm cho hiệu suất trao đổi khí tại phổi được tối đa
- c. Làm cho máu về tim và lên phổi dễ dàng
- d. **Làm giảm sức căng bề mặt của lớp dịch lót phế nang**

Câu 1515: Câu nào sau đây **sai** với áp suất âm trong màng phổi :

- a. giúp cho sự xứng hợp giữa thông khí và tưới máu
- b. **hạn chế máu về tim**
- c. lồng ngực phải kín để duy trì áp suất âm này
- d. cần thiết cho phổi di chuyển theo sự cử động của lồng ngực trong các thì hô hấp

Câu 1516: Chọn câu sai: Ý nghĩa của áp suất âm trong khoang màng phổi

- a. Giúp phổi cử động theo sự cử động của lồng ngực trong thì hô hấp
- b. Giúp hiệu suất trao đổi khí đạt tối đa
- c. **Giúp máu từ tim trái lên phổi dễ dàng**
- d. Tạo áp suất trong lồng ngực thấp nên máu về tim dễ dàng

Câu 1517: Khoang màng phổi :

- a. Là khoảng hở giữa phổi và thành ngực.
- b. Do lá thành và lá tạng dính vào nhau tạo nên.
- c. Luôn có áp suất nhỏ hơn áp suất trong phế nang.
- d. **Có áp suất rất cao ở bệnh nhân viêm thanh quản.**

Câu 1518: Áp suất âm khoang màng phổi :

- a. Ít âm nhất ở thì hít vào.
- b. Tạo ra tính đàn hồi của lồng ngực.
- c. **Mất đi ở bệnh nhân viêm thanh quản.**
- d. Giúp cho tim trái làm việc dễ dàng hơn.

Câu 1519: Xét thí nghiệm về vai trò của cơ hoành

Tạo cử động của màng cao su đẩy bình theo hai chiều lên xuống và quan sát sự giãn nở của phổi.

- Kéo màng cao su xuống ứng với sự chuyển động phẳng ra của cơ hoành trong thì hít vào, áp suất trong bình càng âm thêm. Quan sát phổi.

Chọn nhận xét đúng

- a. **Kéo màng cao su xuống, phổi nở ra, áp suất khoang màng phổi giảm**
- b. Kéo màng cao su xuống, phổi xẹp xuống, áp suất khoang màng phổi giảm
- c. Kéo màng cao su xuống, phổi nở ra, áp suất khoang màng phổi tăng
- d. Kéo màng cao su xuống, phổi xẹp xuống, áp suất khoang màng phổi tăng

B – Tính đàn hồi của phổi

Câu 1520: Chọn câu đúng

- a. Áp suất phế nang luôn âm
- b. Áp suất khoang màng phổi dao động quanh 0mmHg
- c. **Áp suất xuyên phổi luôn dương**
- d. Áp suất phế nang luôn dương

Câu 1521: Phế nang lớn so với phế nang nhỏ thì có

- a. **Áp suất bằng nhau nhưng sức căng bề mặt lớn hơn.**
- b. Áp suất lớn hơn nhưng sức căng bề mặt bằng nhau.
- c. Áp suất bằng nhau nhưng sức căng bề mặt nhỏ hơn.
- d. Áp suất và sức căng bề mặt đều lớn hơn.

Câu 1522: Bình thường phổi luôn có xu hướng nở ra do:

- a. Áp suất khoang màng phổi âm
- b. Áp suất phế nang không đổi
- c. Áp suất xuyên phổi âm
- d. **Áp suất xuyên phổi dương**

Câu 1523: Bình thường phổi không bị co nhỏ về rốn phổi có tính tính đàn hồi là nhờ vai trò chính của:

- a. Áp suất âm trong khoang màng phổi
- b. **Sức căng bề mặt của lớp dịch lót phế nang**
- c. Chất surfactant
- d. Các sợi elastin và collagen trong nhu mô phổi

Câu 1524: Lực đàn hồi của phổi được tạo nên bởi:

- a. Các sợi đàn hồi chiếm 1/3, sức căng bề mặt của lớp dịch lót phế nang chiếm 2/3
- b. Các sợi đàn hồi chiếm 2/3, sức căng bề mặt của lớp dịch lót phế nang chiếm 1/3
- c. Các sợi đàn hồi chiếm 1/3, chất surfactant chiếm 2/3
- d. Sức căng bề mặt của lớp dịch lót phế nang chiếm 1/3, chất surfactant chiếm 2/3

C – Vai trò của chất hoạt diện

Câu 1525: Chất surfactant (chất hoạt diện), chọn câu sai

- a. Thành phần quan trọng là dipalmitol phosphatidyl cholin
- b. Làm giảm sức căng bề mặt của lớp dịch lót phế nang
- c. Bài tiết vào khoảng tháng thứ 6-7 của bào thai
- d. Do tế bào biểu mô phế nang type 1 bài tiết

Câu 1526: Chất Surfactant có đặc điểm

- a. Làm gia tăng sức căng của bề mặt lớp dịch lót phế nang
- b. Do tế bào biểu mô phế nang type 2 bài tiết
- c. Ảnh hưởng đến lớp dịch bên trong đường dẫn khí
- d. Chủ yếu được bài tiết vào 3 tháng đầu của thời kỳ phôi thai

Câu 1527: Vai trò của chất surfactant, ngoại trừ

- a. Ảnh hưởng lên tính đàn hồi của phổi
- b. Ảnh hưởng lên sự ổn định của phế nang
- c. Ảnh hưởng lên việc ngăn ngừa sự tích tụ dịch phù trong phế nang
- d. Tạo ra áp suất âm trong khoang màng phổi

Câu 1528: Chất hoạt diện làm giảm sức căng bề mặt của lớp dịch lót phế nang vì :

- a. Không bị lực hút xuống của các phân tử nước trong lớp dịch lót phế nang
- b. Làm giảm sức căng bề mặt từ 2 đến 14 lần
- c. Trải trên mặt thoáng của lớp dịch lót phế nang
- d. Tất cả đều đúng

Câu 1529: Chất Surfactant :

- a. Do tế bào biểu mô phế nang type 2 bài tiết vào khoảng tháng 4-5 của thai kỳ .
- b. Chất Surfactant làm tăng sức căng bề mặt của lớp dịch lót phế nang , giúp ổn định phế nang .
- c. Theo định luật Laplace , lực căng thành càng tăng thì áp suất khí trong phế nang càng tăng lên
- d. Chất Surfactant giúp điều chỉnh bán kính phế nang theo lực căng thành

Câu 1530: So với phế nang lớn , phế nang nhỏ có :

- a. Lực căng thành và tỷ lệ chất Surfactant lớn hơn
- b. Lực căng thành lớn hơn và tỷ lệ chất surfactant nhỏ hơn
- c. Lực căng thành nhỏ hơn và tỷ lệ chất surfactant lớn hơn
- d. Lực căng thành và tỷ lệ chất surfactant nhỏ hơn

Câu 1531: Phù phổi xảy ra khi lượng dịch lót phế nang vượt quá :

- a. 10ml
- b. 20ml
- c. 30ml
- d. 40ml

Câu 1532: Thiếu chất surfactant, các phế nang sẽ:

- a. Co xẹp
- b. Phồng to và vỡ
- c. Tích tụ dịch phù
- d. Tất cả đều đúng

Câu 1533: Ở những trẻ sinh thiếu tháng thường mắc hội chứng suy hô hấp do xẹp phổi, nguyên nhân liên quan đến

- a. Áp suất khoang màng phổi
- b. Suất đàn (hệ số nở phổi)
- c. **Chất surfactant**
- d. Đường dẫn khí

Câu 1534: Bệnh nhân xẹp phổi bị suy hô hấp là do :

- a. **Màng hô hấp dày lên.**
- b. Tăng khoảng chết sinh lý.
- c. Diện tích trao đổi giảm xuống.
- d. Tràn dịch phế nang

Câu 1535: Bệnh màng trong do thiếu chất surfactant thường gặp ở trẻ sơ sinh

- a. Già tháng
- b. Đủ tháng
- c. Đẻ non > 8 tháng
- d. **Đẻ non < 8 tháng**

Câu 1536: Chọn câu đúng. Bệnh màng trong :

- a. Là bệnh không có chất surfactant trong đường dẫn khí.
- b. Thường gặp ở trẻ sơ sinh đẻ non dưới 42 tuần.
- c. Gây suy hô hấp nặng ở trẻ đẻ non do xẹp các phế quản nhỏ.
- d. Do tế bào phế nang loại I chưa bài tiết chất surfactant.

D – Vai trò của đường dẫn khí

Câu 1537: Đường dẫn khí, **chọn câu sai.**

- a. Khí quản là thế hệ thứ 0
- b. **Bắt đầu từ thế hệ thứ 8 có tiểu phế quản**
- c. Thế hệ thứ 16 là tiểu phế quản tận cùng
- d. Bắt đầu từ thế hệ thứ 17, trên đường dẫn khí có các phế nang

Câu 1538: Cấu trúc nào sau đây không thuộc “ Vùng hô hấp “ ?

- a. ống phế nang
- b. Phế nang
- c. **Tiểu phế quản tận cùng**
- d. Tiểu phế quản hô hấp

Câu 1539: Đường dẫn khí chỉ có nhiệm vụ dẫn khí chấm dứt ở cuối cấu trúc :

- a. Ống phế nang
- b. Tiểu phế quản hô hấp
- c. Tiểu phế quản
- d. **Tiểu phế quản tận cùng**

Câu 1540: Đường dẫn khí có các vai trò sau, **ngoại trừ:**

- a. Làm ẩm và ấm không khí vào phổi
- b. Ngăn cản các vật lạ xâm nhập cơ thể
- c. **Sản sinh chất surfactant**
- d. Điều hoà lưu lượng khí ra vào phổi

Câu 1541: Đường dẫn khí luôn mở vì

- a. Thành có các vòng sụn
- b. Thành có cơ trơn
- c. Luôn chứa khí
- d. **Có các vòng sụn và áp suất âm màng phổi**

Câu 1542: Vai trò của cơ Reissessen trong đường dẫn khí:

- a. Thanh lọc khí
- b. Làm ẩm khí

- c. Làm ẩm khí
- d. Điều hòa lưu lượng khí

Câu 1543: Hormon nào sau đây có tác động điều hòa lưu lượng khí vào phổi ?

- a. Cortisol
- b. Catecholamin
- c. Aldosterol
- d. Serotonin

Câu 1544: Kích thích thần kinh X :

- a. Co cơ Reissessen, giảm lưu lượng khí vào phổi
- b. Co cơ Reissessen, tăng lưu lượng khí vào phổi
- c. Dẫn cơ Reissessen, giảm lưu lượng khí vào phổi
- d. Dẫn cơ Reissessen, tăng lưu lượng khí vào phổi

Câu 1545: Tác nhân sau có thể gây co thắt phế quản, ngoại trừ:

- a. Catecholamin
- b. Acetylcholin
- c. Khí độc, bụi, khói thuốc
- d. Các chất gây dị ứng

Câu 1546: Kích thích muscarinic receptor sẽ gây ra :

- a. Giãn cơ Reissessen.
- b. Co các phế quản nhỏ.
- c. Giãn phế nang.
- d. Giãn các phế quản nhỏ.

Câu 1547: Atrophin là thuốc đối phó giao cảm có tác dụng làm giãn phế quản tác dụng bằng cách ngăn chặn

- a. Receptor β_2
- b. Thụ thể Muscarinic
- c. AMP vòng
- d. Hệ enzyme hoạt hóa

Câu 1548: Các tác nhân xâm nhập qua đường hô hấp sẽ được ngăn chặn nhờ các cơ chế sau, NGOẠI TRỪ

- a. Cơ chế xoáy lảng của mũi và hệ thống lông mũi
- b. Phản xạ ho, hắt hơi và hoạt động của vi nhung mao cùng hệ thống tiết chất nhầy
- c. Tiết ra chất nhầy chứa các enzyme phân hủy các chất lạ
- d. Đại thực bào và các phản ứng miễn dịch

Câu 1549: Cấu trúc nào của bộ máy hô hấp không tham gia vào cơ chế chống bụi?

- a. Lông mũi
- b. Tuyến tiết nhầy
- c. Hệ thống lông rung
- d. Tế bào phế nang loại II

Câu 1550: Tế bào phế nang loại II:

- a. Bài tiết surfactant.
- b. Chống bụi.
- c. Thực bào.
- d. Sưởi ẩm không khí đi vào.

Câu 1551: Trong quá trình thanh lọc khí thì những vật thể có kích thước 5 μ m sẽ vào đến được

- a. Khí phế quản
- b. Phế nang
- c. Màng phế nang mao mạch
- d. Các mô xung quanh

Nội dung 4. Đánh giá hoạt động thông khí phổi

Câu 1552: Ưu điểm của hô hấp ký :

- a. Thực hiện được rất ít cho các đối tượng
- b. **Đề chuẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở bệnh viện**
- c. Có thể sử dụng chung bộ lọc ống thở cho các đối tượng
- d. Là tiêu chuẩn vàng góp phần chuẩn đoán và theo dõi bệnh

Câu 1553: Vt là thể tích khí:

- a. Hít vào hết sức và thở ra hết sức
- b. Hít vào hết sức sau khi hít vào bình thường
- c. **Hít vào hoặc thở ra bình thường**
- d. Thở ra hết sức sau khi thở ra bình thường

Câu 1554: IRV là thể tích khí:

- a. Hít vào hoặc thở ra bình thường
- b. Hít vào hết sức và thở ra hết sức
- c. **Hít vào hết sức sau khi hít vào bình thường**
- d. Thở ra hết sức sau khi thở ra bình thường

Câu 1555: ERV là thể tích khí:

- a. Hít vào hoặc thở ra bình thường
- b. Hít vào hết sức và thở ra hết sức
- c. Hít vào hết sức sau khi hít vào bình thường
- d. **Thở ra hết sức sau khi thở ra bình thường**

Câu 1556: RV là thể tích khí:

- a. Còn lại trong phổi sau khi thở ra bình thường
- b. **Còn lại trong phổi sau khi thở ra hết sức**
- c. Hít vào hết sức sau khi hít vào bình thường
- d. Thở ra hết sức sau khi thở ra bình thường

Câu 1557: FRC là thể tích khí :

- a. **Còn lại trong phổi sau khi thở ra bình thường**
- b. Còn lại trong phổi sau khi thở ra hết sức
- c. Hít vào hết sức sau khi hít vào bình thường
- d. Thở ra hết sức sau khi thở ra bình thường

Câu 1558: IC là thể tích khí:

- a. Còn lại trong phổi sau khi thở ra bình thường
- b. **Hít vào hết sức**
- c. Hít vào hết sức sau khi hít vào bình thường
- d. Thở ra hết sức sau khi thở ra bình thường

Câu 1559: VC là thể tích khí

- a. Hít vào hoặc thở ra bình thường
- b. **Hít vào hết sức và thở ra hết sức**
- c. Thở ra hết sức sau khi hít vào bình thường
- d. Thở ra hết sức sau khi thở ra bình thường

Câu 1560: Chọn câu đúng :

- a. VC : là thể tích sống chậm
- b. **FEV1: là thể tích khí thở ra tối đa trong 1 giây đầu tiên**
- c. FEF : là chỉ số đánh giá tình trạng cơ học hô hấp
- d. FVC : là thể tích sống gắng sức

Câu 1561: Dung tích hít vào là:

- a. Là số lít khí hít vào tối đa sau khi hít vào bình thường.

- b. Là số lít khí hít vào tối đa sau thở ra bình thường.
- c. Là số lít khí thở ra tối đa sau khi hít vào bình thường.
- d. Là số lít khí thở ra tối đa sau hít vào tối đa.

Câu 1562: Dung tích sống:

- a. Là số lít khí hít vào tối đa sau khi hít vào bình thường.
- b. Là số lít khí thở ra tối đa sau thở ra bình thường.
- c. Là số lít khí thở ra tối đa sau khi hít vào bình thường.
- d. Là số lít khí thở ra tối đa sau hít vào tối đa.

Câu 1563: Chọn câu đúng về các thể tích và dung tích hô hấp :

- a. $VT + ERV = IC$
- b. $VC + RV = TLC$
- c. $IRV + RV = FRC$
- d. $ERV + IRV = VC$

Câu 1564: Chọn câu sai

- a. $IC = VT + IRV$
- b. $VC = VT = IC + ERV$
- c. $TLC = VT = IRV + ERV + RV$
- d. $FRC = ERV + RV$

Câu 1565: Chọn câu đúng :

- a. $VT + ERV = IC$
- b. $VC + RV = TLC$
- c. $ERV + RV = FRC$
- d. $ERV + IRV = VC$

Câu 1566: Các thông số đánh giá hạn chế hô hấp là:

- a. TLC, RV, FRC.
- b. VC, TLC.
- c. VC, FRC, MMEF.
- d. TLC, FEV₁, FRC.

Câu 1567: Các thông số đánh giá tắc nghẽn đường dẫn khí là:

- a. VC, TV, Tiffeneau.
- b. FEV₁, TLC, MMEF.
- c. MEF 25, RV, IRV.
- d. FEV₁, Tiffeneau.

Câu 1568: Tính TLC, biết FRC = 2 lít, VC = 3,2 lít, ERV = 1,5 lít

- a. 5,2 lít
- b. 3,7 lít
- c. 2,7 lít
- d. 6,7 lít

Câu 1569: Tính TLC, biết: FRC = 2,3 lít, V_C = 3,5 lít, ERV = 1,5 lít

- a. 1,75 lít
- b. 2,70 lít
- c. 4,30 lít
- d. 7,30 lít

Câu 1570: Tính chỉ số Tiffeneau, biết FEV₁ = 2,97 lít, V_t = 0,5 lít, IRV = 1,8 lít, ERV = 1,3 lít

- a. 77,5%
- b. 82,5 %
- c. 87,5 %
- d. 92,5 %

Nội dung 5. Điều hòa thông khí phổi

Câu 1571: Các trung tâm hô hấp tham gia vào điều hòa nhịp cơ bản, ngoại trừ:

- a. Trung tâm hít vào
- b. Trung tâm thở ra
- c. Trung tâm điều chỉnh thở
- d. Trung tâm cảm nhận hóa học

Câu 1572: Điền vào chỗ trống: Trung tâm nhận cảm hoá học sẽ kích thích trung tâm hít vào làm nhịp hô hấp.

- a. Hưng phấn/ giảm.
- b. Hưng phấn/ tăng.
- c. Ức chế/ tăng ,
- d. Ức chế/ giảm.

Ghép ý đúng cho mỗi câu hỏi bên dưới :

Câu 1573: Trung tâm hít vào nằm ở:

a. Mặt lưng trên cầu não

Câu 1574: Trung tâm thở ra nằm ở:

b. Mặt lưng của hành não

Câu 1575: Trung tâm điều chỉnh nhịp thở nằm ở:

c. Phần bụng bên của hành não
d. Phần bụng của hành não

Câu 1576: Trung tâm cảm nhận hóa học nằm ở:

(b-c-a-b)

Câu 1577: Các yếu tố hóa học giúp điều hòa trung tâm hô hấp, ngoại trừ:

- a. CO_2
- b. H^+
- c. O_2
- d. N_2

Câu 1578: Chất kích thích hô hấp mạnh nhất là chất nào sau đây :

- a. Oxygen
- b. H_2
- c. CO_2
- d. Bicarbonate

Câu 1579: Hiệu lực điều hòa hô hấp của các yếu tố hóa học theo thứ tự giảm dần :

- a. $\text{CO}_2 > \text{H}^+ > \text{O}_2$
- b. $\text{H}^+ > \text{CO}_2 > \text{O}_2$
- c. $\text{H}^+ > \text{O}_2 > \text{CO}_2$
- d. $\text{O}_2 > \text{CO}_2 > \text{H}^+$

Câu 1580: Chất khí chỉ tác động lên vùng cảm ứng hóa học ngoại biên:

- a. CO_2
- b. O_2
- c. H^+
- d. CO_2 và H^+

Câu 1581: Vai trò điều hòa thăng bằng toan kiềm thông qua hoạt động hô hấp được điều hòa bởi:

- a. Trung tâm cảm nhận hóa học
- b. Trung tâm điều chỉnh nhịp thở
- c. Trung tâm thở ra
- d. Trung tâm hít vào

Câu 1582: Vùng cảm ứng hóa học trung ương bị kích thích nhanh và nhiều khi nồng độ H^+ tăng lên trong:

- a. Máu vì nồng độ CO_2 tăng.
- b. **Mô não vì nồng độ CO_2 tăng.**
- c. Máu vì nồng độ CO_2 giảm.
- d. Mô não vì nồng độ CO_2 giảm.

Câu 1583: Vai trò của CO_2 trong điều hòa hoạt động hô hấp

- a. **tác dụng lên vùng cảm ứng hóa học trung ương và ngoại biên**
- b. ở nồng độ thấp không ảnh hưởng đến hô hấp
- c. Nồng độ thấp gây kích thích và duy trì hô hấp
- d. Khí CO_2 làm giảm thông khí phế nang

Câu 1584: Hoạt động của cơ quan cảm ứng hóa học trung ương tăng khi:

- a. **PCO_2 máu não tăng**
- b. PCO_2 máu não giảm
- c. HCO_3^- máu não tăng
- d. Lượng oxy máu não giảm

Câu 1585: Vai trò của CO_2 đối với thể dịch điều hòa hô hấp, chọn câu sai.

- a. Nồng độ thấp gây ngưng thở
- b. **CO_2 tăng gây giảm thông khí phế nang**
- c. Nồng độ bình thường CO_2 đóng vai trò duy trì hô hấp
- d. CO_2 tăng rất cao gây ngưng thở

Câu 1586: PCO_2 trong máu nuôi chỉ còn 95% là do:

- a. Máu từ động mạch phế quản sau khi nuôi nhu mô phổi đổ thẳng vào tâm thất trái
- b. Máu từ động mạch vành sau khi nuôi cơ tim đổ thẳng vào tâm thất trái
- c. **Tất cả đều đúng**
- d. Tất cả đều sai

Câu 1587: Máu nhận CO_2 từ tổ chức để vận chuyển lên phổi do:

- a. **phân áp CO_2 ở tổ chức cao hơn phân áp CO_2 trong máu.**
- b. phân áp CO_2 ở tổ chức thấp hơn phân áp CO_2 trong máu.
- c. pH máu tăng
- d. pH máu giảm thấp.

Câu 1588: Chọn câu đúng. Khi lao động nặng :

- a. Giảm PCO_2 trong máu.
- b. **Tăng phân ly O_2 với Hb.**
- c. Tăng vận chuyển O_2 trong hồng cầu.
- d. pH máu tăng.

Câu 1589: Thiếu oxy máu kích thích hô hấp chủ yếu qua trung gian:

- a. **Cảm thụ hóa học trung ương**
- b. Thở cảnh và thể đại động mạch
- c. Trung tâm kích thích hô hấp
- d. Trung tâm hít vào

Câu 1590: Phân áp O_2 gây kích thích hô hấp:

- a. $< 100\text{mmHg}$
- b. **$< 60\text{ mmHg}$**
- c. $> 60\text{ mmHg}$
- d. $> 100\text{ mmHg}$

Câu 1591: Bệnh nhân bị suy hô hấp, việc duy trì hô hấp phụ thuộc chủ yếu vào phân áp khí:

- a. CO_2

- b. N_2
- c. H^+
- d. O_2

Câu 1592: Tế bào vỏ não có những tổn thương không hồi phục sau :

- a. Ngừng thở 30 giây.
- b. **Ngừng thở 3 phút.**
- c. Thiếu oxy 6 phút.
- d. Thiếu oxy 15 phút.

Câu 1593: Oxy liệu pháp là biện pháp dùng để điều trị :

- a. **Ngạt khí than khô.**
- b. Suy hô hấp.
- c. Hen suyễn.
- d. Lao phổi.

CHUYÊN ĐỀ 8 – SINH LÝ HỆ HÔ HẤP

Bài số 28

TRAO ĐỔI KHÍ TẠI PHỔI VÀ SỰ CHUYỂN CHỖ KHÍ TRONG MÁU

Nội dung 1. Hoạt động trao đổi khí tại phổi

Câu 1594: Quá trình thông khí tại phổi :

- a. Trao đổi khí giữa phế nang với khí quyển
- b. **Trao đổi khí giữa phế nang và mạch máu**
- c. Trao đổi khí giữa máu và tế bào
- d. Trao đổi khí giữa dịch gian bào và dịch nội bào

Câu 1595: Quá trình thông khí tại phổi :

- a. **Là quá trình trao đổi khí giữa phế nang và khí trong mao mạch**
- b. Khí di chuyển từ nơi có áp suất thấp đến nơi có áp suất cao
- c. Muốn đem khí từ khí quyển vào phế nang
- d. Muốn đưa khí từ phế nang ra ngoài khí quyển

Câu 1596: Phân áp khí O_2 ở phế nang có giá trị :

- a. 40mmHg
- b. **100mmHg**
- c. 45mmHg
- d. 60mmHg

Câu 1597: Phân áp khí CO_2 ở mao mạch có giá trị :

- a. 40mmHg
- b. 100mmHg
- c. **45mmHg**
- d. 60mmHg

Câu 1598: Giá trị chênh lệch phân áp giúp khí O_2 trao đổi khí tại phổi được là :

- a. 40 mmHg
- b. 50 mmHg
- c. **60 mmHg**
- d. 6 mmHg

Câu 1599: Chọn câu sai

- a. PO_2 trong phế nang $>$ PO_2 trong mao mạch.
- b. **PO_2 trong mao mạch $>$ PO_2 trong mô.**
- c. Máu từ động mạch đi qua mao mạch sẽ lấy CO_2 từ mô.

d. Máu từ động mạch đi qua mao mạch sẽ nhả O_2 từ mô.

Câu 1600: Màng hô hấp có mấy lớp :

- a. 5 lớp
- b. 6 lớp
- c. 7 lớp
- d. 8 lớp

Câu 1601: Áp suất trong đường dẫn khí :

- a. Luôn bằng áp suất khí quyển
- b. Bằng áp suất khí quyển trước khi hít vào
- c. Lớn hơn áp suất khí quyển khi hít vào
- d. Nhỏ hơn áp suất khí quyển khi thở ra

Câu 1602: Hỗn hợp khí đi từ ngoài khí quyển vào đến phế nang có:

- a. Phân áp O_2 tăng và phân áp khí CO_2 tăng
- b. Phân áp O_2 tăng và phân áp khí CO_2 giảm
- c. Phân áp O_2 giảm và phân áp khí CO_2 tăng
- d. Phân áp O_2 giảm và phân áp khí CO_2 giảm

Câu 1603: Hỗn hợp khí đi từ ngoài khí quyển vào đến phế nang có phân áp O_2 giảm và CO_2 tăng do:

- a. Khí mới hít vào bị hòa lẫn bởi khí cũ
- b. Khí hít vào được làm ẩm bởi hơi nước
- c. Cả a và b đúng
- d. Cả a và b sai

Câu 1604: Cơ chế giúp quá trình trao đổi khí tại phổi xảy ra là do :

- a. Sự khuếch tán chủ động từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp
- b. Sự khuếch tán thụ động từ nơi có áp suất cao đến áp suất thấp
- c. Sự khuếch tán thụ động từ nơi có áp suất thấp đến nơi có áp suất cao
- d. Sự khuếch tán chủ động từ nơi có áp suất thấp đến nơi có áp suất cao

Câu 1605: Các yếu tố sau đây ảnh hưởng đến trao đổi khí ở màng hô hấp, trừ:

- a. Chênh lệch phân áp O_2 , CO_2 .
- b. Năng lượng cung cấp cho trao đổi khí ở màng hô hấp.
- c. Diện tích màng hô hấp.
- d. Độ dày của màng hô hấp.

Câu 1606: Tốc độ khuếch tán khí qua màng hô hấp tỷ lệ nghịch với

- a. Khuynh áp hai bên màng
- b. Diện tích màng trao đổi
- c. Chiều dày màng trao đổi
- d. Độ hòa tan của khí trong nước

Câu 1607: Sự trao đổi khí tại phổi :

- a. Là khuếch tán khí hoàn toàn thụ động từ nơi có áp suất thấp đến nơi có áp suất cao theo khuynh áp
- b. Vận tốc khuếch tán tỷ lệ thuận với diện tích tiếp xúc trao đổi
- c. Vận tốc khuếch tán tỷ lệ thuận với chiều dày màng trao đổi
- d. Vận tốc khuếch tán tỷ lệ thuận với trọng lượng phân tử khí

Câu 1608: Ở người bình thường

- a. Vận tốc khuếch tán O_2 qua màng phế nang mao mạch $> CO_2$
- b. Vận tốc khuếch tán O_2 qua màng phế nang mao mạch $< CO_2$
- c. Vận tốc khuếch tán O_2 qua màng phế nang mao mạch $= CO_2$
- d. Vận tốc khuếch tán O_2 qua màng phế nang mao mạch $\leq CO_2$

Câu 1609: Trong cùng một điều kiện chênh lệch áp suất, độ hòa tan, diện tích tiếp xúc và chiều dày của màng phế nang mao mạch:

- a. Vận tốc khuếch tán O_2 qua màng phế nang mao mạch $< CO_2$

- b. Vận tốc khuếch tán O_2 qua màng phế nang mao mạch $> CO_2$
- c. Vận tốc khuếch tán O_2 qua màng phế nang mao mạch $= CO_2$
- d. Vận tốc khuếch tán O_2 qua màng phế nang mao mạch $\leq CO_2$

Nội dung 2. Đánh giá chức năng trao đổi khí tại phổi

Câu 1610: Đánh giá khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mao mạch thực tế chủ yếu dựa vào

- a. $D_L O_2$
- b. $D_L CO_2$
- c. $D_L CO$
- d. $D_L NO$

Câu 1611: Khả năng khuếch tán của CO (giả định) qua màng phế nang mao mạch :

- a. 12ml/phút/mmHg
- b. 400ml/phút/mmHg
- c. 21ml/phút/mmHg
- d. 17ml/phút/mmHg

Câu 1612: Hệ số khuếch tán của O_2 và CO có quan hệ với nhau thế nào?

- a. $D_L CO = 1,23 D_L O_2$
- b. $D_L CO = 1,32 D_L O_2$
- c. $D_L O_2 = 1,23 D_L CO$
- d. $D_L O_2 = 1,32 D_L CO$

Câu 1613: Khả năng khuếch tán của oxy qua màng phế nang mao mạch :

- a. 0,21ml/phút/mmHg
- b. 0,12ml/phút/mmHg
- c. 2,1ml/phút/mmHg
- d. 21ml/phút/mmHg

Câu 1614: Khả năng khuếch tán của oxy qua màng phế nang mao mạch khi vận động :

- a. 21ml/phút/mmHg
- b. 17ml/phút/mmHg
- c. 65ml/phút/mmHg
- d. 56ml/phút/mmHg

Câu 1615: Khả năng khuếch tán của CO_2 qua màng phế nang mao mạch :

- a. 4ml/phút/mmHg
- b. 40ml/phút/mmHg
- c. 400ml/phút/mmHg
- d. 4000ml/phút/mmHg

Nội dung 3. Sự cân xứng giữa hô hấp và tuần hoàn

Câu 1616: Chọn câu **đúng** khi nói về shunt máu

- a. Là lượng khí chảy qua mao mạch phổi không được oxy hóa
- b. Bao gồm khoảng chết giải phẫu và lượng máu có sẵn tại phổi
- c. Là lượng máu trao đổi tại màng phế nang mao mạch
- d. Tổng lượng shunt máu trong 1 phút gọi là shunt sinh lý

Câu 1617: Shunt sinh lý là:

- a. Lượng máu chảy qua mao mạch phổi ở một thời điểm không được oxy hóa
- b. Lượng máu chảy qua mao mạch phổi trong một phút không được oxy hóa
- c. Lượng khí trong phế nang không dùng để trao đổi với máu
- d. Lượng khí trong phế nang không dùng để trao đổi với nhau và khoảng chết giải phẫu

Câu 1618: Chọn câu đúng

- a. Khoảng chết giải phẫu gồm khoảng chết sinh lý cộng các phế nang không trao đổi khí
- b. Khoảng chết sinh lý gồm khoảng chết giải phẫu cộng các phế nang không trao đổi khí
- c. Khoảng chết giải phẫu lớn hơn khoảng chết sinh lý
- d. Khoảng chết giải phẫu gồm các phế nang trao đổi khí với máu

Câu 1619: Cho nhịp thở 20 lần/phút, khoảng chết 120ml, thể tích khí lưu thông là 370ml

Chọn câu đúng

- a. Thông khí phế nang : 9400ml
- b. Thông khí phổi/phút 5000ml
- c. Thông khí phế nang : 5000ml
- d. Thông khí phổi/phút : 9400ml

Câu 1620: Một bệnh nhân dùng máy thở có nhịp thở 25 lần/phút, khoảng chết 250ml và thể tích khí lưu thông là 300ml. Thông khí phế nang của bệnh nhân này :

- a. 6250ml
- b. 5000ml
- c. 7500ml
- d. 1250ml

Câu 1621: Tính V_A biết: tần số thở 16 lần/ phút, $V_t = 500\text{mL}$, $V_D = 150\text{mL}$

- a. 1,20 lít/ phút
- b. 5,60 lít/ phút
- c. 7,85 lít/ phút
- d. 10,40 lít/ phút

Nội dung 4. Vấn đề chuyên chở khí trong máu

Câu 1622: Chuyên chở khí oxy trong máu :

- a. Dưới 2 dạng : hòa tan và kết hợp
- b. Dạng hòa tan chiếm số lượng nhiều và là dạng sử dụng
- c. Dạng kết hợp chiếm số lượng ít và là dạng dự trữ
- d. Cả a và c đúng

Câu 1623: Nguyên nhân nào sau đây làm đường cong Barcroft lệch phải ?

- a. Thân nhiệt thấp
- b. pH thấp
- c. 2,3-DPG thấp
- d. CO_2 thấp

Câu 1624: Đường cong Barcroft, chọn câu sai.

- a. Khi PO_2 thấp, đường cong Barcroft rất dốc
- b. Khi PO_2 cao, đường cong Barcroft rất tà
- c. $\text{PO}_2 = 90\text{mmHg}$, độ bão hòa Hb của O_2 90%
- d. P_{50} giảm, Hb tăng ái lực với O_2 và ngược lại

Câu 1625: Chọn câu sai khi nói đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân ly HbO_2

- a. Phân áp CO_2 tăng làm tăng khả năng phân ly của HbO_2 .
- b. Phân áp O_2 giảm làm tăng khả năng phân ly của HbO_2 .
- c. pH máu giảm làm tăng phân ly HbO_2 .
- d. Nhiệt độ máu giảm làm tăng phân ly HbO_2 .

Câu 1626: Dạng CO_2 chuyên chở trong máu chiếm tỷ lệ cao nhất:

- a. Dạng hòa tan
- b. Dạng carbamin do kết hợp protein
- c. Dạng carbamin do kết hợp Hb
- d. Dạng HCO_3^-

Câu 1627: Chọn câu đúng khi nói đến các dạng O_2 và CO_2 trong máu:

- a. Dạng hoà tan O_2 và CO_2 là dạng vận chuyển chủ yếu.
- b. Dạng kết hợp là dạng tạo ra phân áp khí trong máu.
- c. **Dạng kết hợp là dạng vận chuyển của khí.**
- d. Dạng hoà tan và kết hợp không có liên quan với nhau.

CHUYÊN ĐỀ 9 – SINH LÝ HỆ TIÊU HÓA

Bài số 29

ĐẠI CƯƠNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ TIÊU HÓA

Nội dung 1. Các hoạt động cơ bản của hệ tiêu hóa

Câu 1628: Cấu trúc thành ống tiêu hóa gồm có :

- a. 6 lớp
- b. 5 lớp
- c. 4 lớp
- d. 3 lớp

Câu 1629: Lớp cơ trơn được chia thành 3 lớp cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo:

- a. ở toàn bộ ống tiêu hóa
- b. chỉ ở dạ dày
- c. chỉ ở thực quản
- d. chỉ ở tá tràng

Câu 1630: Cấu trúc cơ làm nhiệm vụ tiết thanh dịch bôi trơn ống cơ để giảm sự ma sát trong ổ bụng:

- a. Thanh mạc
- b. Niêm mạc
- c. Dưới niêm mạc
- d. Cơ trơn gồm cơ dọc và cơ vòng

Câu 1631: Vị trí của đám rối Meissner trong cấu trúc cơ:

- a. Giữa lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc
- b. Giữa lớp dưới niêm mạc và lớp cơ dọc
- c. Giữa lớp dưới niêm mạc và lớp cơ vòng
- d. Giữa lớp cơ dọc và lớp cơ vòng

Câu 1632: Vị trí của đám rối Auerbach trong cấu trúc cơ:

- a. Giữa lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc
- b. Giữa lớp dưới niêm mạc và lớp cơ dọc
- c. Giữa lớp dưới niêm mạc và lớp cơ vòng
- d. Giữa lớp cơ dọc và lớp cơ vòng

Câu 1633: Câu nào sau đây **đúng nhất** với cơ tiêu hóa ?

- a. Toàn bộ là cơ trơn.
- b. Xung động lan truyền từ tế bào cơ này sang tế bào cơ khác qua liên kết khe.
- c. Hoạt động điện biểu hiện chủ yếu bằng những sóng nhọn.
- d. Hoạt động nhào trộn thức ăn do cơ vòng dẫn cơ dọc phụ trách.

Câu 1634: Điện thế màng tế bào cơ trơn ống tiêu hóa lúc nghỉ:

- a. - 40 đến - 50 mV
- b. - 50 đến - 60 mV
- c. - 90 mV
- d. - 95mV

Câu 1635: Tần số của sóng chậm của ống tiêu hóa là :

- a. 3 lần/phút
- b. 12 lần/phút
- c. 3 – 12 lần/phút
- d. 1 – 10 lần/phút

Câu 1636: Tần số của sóng chậm của ống tiêu hóa là :

- a. 3 lần/phút

- b. 12 lần/phút
- c. 3 – 12 lần/phút
- d. 1 – 10 lần/phút

Câu 1637: Câu nào sau đây đúng với sóng chậm?

- a. Khởi sự trong phần trên thực quản khi nuốt.
- b. Là những dao động của điện thế màng tế bào cơ trơn.
- c. Là những co thắt có tác dụng đẩy thức ăn dọc theo thành ruột.
- d. Là do acetylcholine kích thích trực tiếp lên tế bào cơ trơn.

Câu 1638: Đặc điểm của sóng chậm, ngoại trừ:

- a. Diễn ra liên tục và nhịp nhàng trên màng tế bào cơ trơn.
- b. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân kích thích bên ngoài.
- c. Cường độ vào khoảng 40 millivolts.
- d. Tần số khoảng 3 – 12 lần một phút.

Câu 1639: Tác dụng chủ yếu của sóng chậm :

- a. Trực tiếp tạo nên sự co thắt cơ trơn ở ruột.
- b. Nền tảng cho sự xuất hiện điện thế hoạt động.
- c. Tạo ra các nhu động và phản nhu động.
- d. Tạo ra cử động quả lắc trên ruột.

Câu 1640: Các sóng chậm không trực tiếp gây co cơ trong những phần ống tiêu hóa, ngoại trừ:

- a. Dạ dày
- b. Thực quản
- c. Ruột non
- d. Tá tràng

Câu 1641: Đặc điểm của sóng nhọn, ngoại trừ:

- a. Là sóng điện thế hoạt động của màng tế bào cơ trơn.
- b. Xuất hiện trên đỉnh sóng chậm của cơ trơn.
- c. Xuất hiện khi điện thế màng vượt ngưỡng điện học khoảng -40mV.
- d. Điện thế động cơ trơn ruột ngắn hơn điện thế động các dây thần kinh.

Câu 1642: Cơ chế điện học trong sự tạo thành sóng nhọn của tế bào cơ trơn chủ yếu do ion:

- a. K^+
- b. Na^+
- c. Ca^{++}
- d. Cl^-

Câu 1643: Các yếu tố gây khử cực màng tế bào cơ trơn ống tiêu hóa, ngoại trừ:

- a. Căng thành ống tiêu hóa
- b. Acetyl cholin
- c. Kích thích hệ giao cảm
- d. Hormon tiêu hóa

Câu 1644: Các yếu tố gây tăng cực (ưu phân cực) màng tế bào cơ trơn ống tiêu hóa :

- a. Căng thành ống tiêu hóa
- b. Acetyl cholin
- c. Norepinephrine
- d. Hormon tiêu hóa

Câu 1645: Sóng co thắt dạ dày do đối xảy ra khi ;

- a. Dạ dày trống
- b. Có tín hiệu liên quan đến ăn uống
- c. Đường huyết giảm
- d. Kích thích dây thần kinh X

Câu 1646: Đặc điểm của cử động nhu động của ống tiêu hóa, chọn câu sai.

- a. Nhu động là cử động nhằm vận chuyển thức ăn dọc theo ống tiêu hóa.
- b. Nhu động xuất hiện ở bất cứ vị trí nào của ruột khi bị kích thích.
- c. Kích thích thông thường nhất là căng thành ruột.
- d. **Kích thích hệ phó giao cảm làm giảm hoạt động nhu động.**

Câu 1647: Câu nào sau đây đúng với nhu động của hệ tiêu hóa?

- a. **Cơ dọc và cơ vòng đều co thắt**
- b. Cơ dọc co thắt còn cơ vòng giãn
- c. Cơ vòng co thắt còn cơ dọc giãn
- d. Cơ dọc luân phiên co thắt nhiều vị trí

Câu 1648: Vai trò tạo các co thắt ngắt quãng :

- a. Chủ yếu là của cơ dọc
- b. **Chủ yếu là của cơ vòng**
- c. Do cả cơ dọc và cơ vòng
- d. Do phần cơ vân chiếm tỉ lệ nhỏ

Câu 1649: Cơ co thắt nào sau đây **không** có nhiệm vụ ngăn ngừa sự trào ngược từ phần dưới lên phần trên của ống cơ tiêu hóa?

- a. Cơ thắt thực quản dưới.
- b. Cơ thắt môn vị.
- c. Cơ thắt hồi manh tràng.
- d. **Cơ thắt hậu môn.**

Câu 1650: Sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa carbohydrat trong ống tiêu hóa?

- a. Fructose.
- b. Galactose.
- c. **Glucose.**
- d. Sucrose.

Câu 1651: Các men được bài tiết trong ống tiêu hóa không phân giải được :

- a. Tinh bột
- b. Collagen
- c. Triglyceride
- d. **Cellulose**

Câu 1652: Cellulose có thể bị phân giải ở vị trí nào trong ống tiêu hóa?

- a. Thực quản
- b. Dạ dày
- c. Ruột non
- d. **Ruột già**

Câu 1653: Câu nào sau đây **không đúng** với chất nhầy?

- a. **Chỉ được bài tiết ở dạ dày và ruột non.**
- b. Giúp bôi trơn thức ăn.
- c. Bảo vệ niêm mạc của ống tiêu hóa.
- d. Bản chất là một protein.

Câu 1654: Câu nào sau đây đúng với tiêu hóa hóa học ?

- a. Ảnh hưởng của pH không kháng thể.
- b. Không có sự tham gia của các phân tử nước.
- c. Sản phẩm cuối cùng của sự tiêu hóa polysaccharide và disaccharide.
- d. **Enzyme tiêu hóa làm tăng vận tốc các phản ứng tiêu hóa.**

Câu 1655: Câu nào sau đây **đúng** với sự tiêu hóa thức ăn?

- a. **Enzyme tiêu hóa carbohydrate do tuyến nước bọt ,tuyến tụy và tuyến ruột bài tiết.**
- b. Enzyme tiêu hóa protein do tuyến tụy và tuyến dạ dày bài tiết.

- c. Enzyme tiêu hóa mỡ do tuyến tụy và tuyến ruột bài tiết.
- d. Tất cả protein phải được tiêu hóa thành acid amin trước khi được hấp thu.

Câu 1656: Thời gian tiêu hóa nhanh nhất đối với :

- a. Glucid
- b. Protid
- c. Lipid
- d. Cả ba như nhau

Câu 1657: Thời gian tiêu hóa lâu nhất đối với :

- a. Glucid
- b. Protid
- c. Lipid
- d. Cả ba như nhau

Câu 1658: Dạng đường nào được hấp thu nhanh nhất trong quá trình tiêu hóa?

- a. Fructose
- b. Arabinose
- c. Galactose
- d. Glucose

Câu 1659: Dạng đường nào sau đây **không phải** là dạng vận chuyển trong máu?

- a. Glucose
- b. Fructose
- c. Galactose
- d. Lactose

Câu 1660: Lipid trước khi hấp thu ở dạ dày cần được nhũ tương hóa bởi:

- a. Nước bọt
- b. Dịch vị
- c. Dịch tụy
- d. Muối mật

Câu 1661: Sự thành lập micelle cần thiết cho sự hấp thu của chất nào sau đây?

- a. Muối mật.
- b. Sắt.
- c. Cholesterol.
- d. Rượu.

Câu 1662: Các vi nhung mao ở niêm mạc ruột non làm tăng diện tích tiếp thu thức ăn lên :

- a. 20 lần
- b. 10 lần
- c. 15 lần
- d. 5 lần

Câu 1663: Niêm mạc hấp thu của ruột non có những đặc tính sau đây **ngoại trừ**:

- a. Có những nếp gấp
- b. Có những vi nhung mao
- c. Diện tích tăng lên gấp 20 lần do bờ bàn chải
- d. Có diện tích vào khoảng 100 mét vuông

Nội dung 2. Điều hòa hoạt động hệ tiêu hóa

Câu 1664: Vai trò của đám rối Auerbach trong hoạt động tiêu hóa chủ yếu là:

- a. Điều hòa lưu lượng máu đến ruột
- b. Điều hòa hoạt động bài tiết
- c. Điều hòa hoạt động hấp thu

d. Điều hòa hoạt động cơ học

Câu 1665: Hệ thần kinh ruột có tất cả các đặc tính sau đây, **ngoại trừ:**

- a. Có cùng số lượng noron với tủy sống.
- b. Hoạt động theo kiểu phản xạ.
- c. Có những noron cảm giác nhận cảm thay đổi hóa học, cơ học và áp suất thẩm thấu của hệ tiêu hóa
- d. **Chứa các dây thần kinh phó giao cảm phân phối cho thực quản, dạ dày và tuyến tụy.**

Câu 1666: Thần kinh phó giao cảm chi phối hoạt động tiêu hóa có trung tâm nằm ở đốt tủy:

- a. **C2-C4**
- b. T5-L2
- c. C5-T2
- d. L2-L4

Câu 1667: Câu nào sau đây **đúng nhất** khi nói về hệ thần kinh phó giao cảm chi phối hệ tiêu hóa?

- a. Norepinephrine là chất trung gian thần kinh có tác dụng kích thích.
- b. **Làm tăng hoạt động co thắt của cơ tiêu hóa.**
- c. Làm giảm bài tiết dịch tiêu hóa.
- d. Chỉ gồm các dây thần kinh vận động.

Câu 1668: Chọn câu **sai** khi nói về thần kinh phó giao cảm chi phối hệ tiêu hóa?

- a. Trung tâm là nhân vận động thần kinh X.
- b. Kích thích phó giao cảm làm tăng lưu lượng máu đến.
- c. Tạo thành những cung phản xạ vòng dài.
- d. **Kích thích phó giao cảm làm giảm hoạt động bài tiết và hấp thu.**

Câu 1669: Trung tâm điều khiển cảm giác đói và cảm giác ngon miệng nằm ở:

- a. Cầu não.
- b. Hành não.
- c. **Vùng hạ đồi .**
- d. Vỏ não.

Câu 1670: Hoạt động của hệ tiêu hóa chịu ảnh hưởng của các hormon địa phương, **ngoại trừ:**

- a. **Adrenalin**
- b. Gastrin
- c. Somatostatin
- d. Cholecystokinin

Câu 1671: Hormon địa phương do dạ dày tiết ra, **ngoại trừ:**

- a. Gastrin
- b. Histamin
- c. Somatostatin
- d. **Cholecystokinin**

CHUYÊN ĐỀ 9 – SINH LÝ HỆ TIÊU HÓA

Bài số 30

TIÊU HÓA TẠI MIỆNG – THỰC QUẢN – DẠ DÀY

Nội dung 1. Hoạt động cơ học tại miệng và thực quản

Câu 1672: Ở giai đoạn nuốt, chọn câu sai.

- a. Nắp thanh quản đóng lại.
- b. Cơ thành họng co.
- c. Là hoạt động hoàn toàn có ý thức.
- d. Tại thực quản được kích thích bởi dây X.

Câu 1673: Nuốt:

- a. Là một động tác hoàn toàn tự động
- b. Có tác dụng đẩy thức ăn từ miệng vào dạ dày
- c. Là động tác cơ học hoàn toàn thuộc về thực quản
- d. Động tác nuốt luôn bị rối loạn ở bệnh nhân hôn mê

Câu 1674: Hoạt động nào sau đây **không** tham gia vào cử động nuốt?

- a. Cơ cơ thắt thực quản trên.
- b. Điều hòa cử động nuốt bởi trung tâm nuốt ở hành não.
- c. Vòm khẩu mềm được kéo lên để bít đường thông với mũi
- d. Thanh quản được kéo xuống để tiêu thiệt đẩy lên lỗ thanh quản.

Câu 1675: Khi không có hoạt động nuốt, **áp suất cao nhất** trong lòng cấu trúc nào sau đây

- a. Hầu
- b. Thanh quản
- c. Thân thực quản
- d. Cơ thắt thực quản dưới

Câu 1676: Câu nào sau đây đúng với nhu động nguyên phát ở thực quản?

- a. Là sự tiếp tục của nhu động hầu
- b. Không xảy ra nếu cắt dây X
- c. Khởi sinh do căng thành thực quản
- d. Không làm giãn cơ thực quản dưới

Câu 1677: Cơ thắt thực quản dưới chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau, **ngoại trừ**:

- a. Áp suất trong ổ bụng
- b. Thần kinh phó giao cảm
- c. Thần kinh giao cảm
- d. Cholecystokinin

Câu 1678: Hội chứng trào ngược dạ dày thực quản liên quan đến sự tổn thương niêm mạc :

- a. Cơ thắt thực quản dưới
- b. Cơ thắt thực quản trên
- c. Cơ chéo dạ dày
- d. Cơ dọc dạ dày

Câu 1679: Hội chứng trào ngược dạ dày thực quản chủ yếu do giảm trương lực cơ thắt thực quản dưới gây ra bởi hormon, **ngoại trừ**:

- a. Secretin
- b. Beta-adrenergic
- c. Alpha-adrenergic
- d. Progesteron

Câu 1680: Trung tâm nuốt nằm ở

- a. Thân não
- b. Hành não
- c. Hành não và cầu não
- d. Gần trung tâm hít vào

Câu 1681: Thành phần thuộc cung phản xạ nuốt ?

- a. Dây vận động : V, IX, X, XII
- b. Dây cảm giác hướng tâm : dây IX và X
- c. Trung khu ở não
- d. Do kích thích vị giác

Câu 1682: Thành phần thuộc cung phản xạ nuốt, **chọn câu sai**

- a. Trung khu : vùng cầu
- b. Dây vận động : V, IX, X, XII
- c. Dây cảm giác : dây IX, thừng nhĩ
- d. Bộ phận nhãn cảm là lưỡi

Nội dung 2. Hoạt động bài tiết và hóa học tại miệng và thực quản

Câu 1683: Nước bọt:

- a. Amylase nước bọt phân giải tất cả tinh bột thành maltose
- b. Chất nhầy làm tăng tác dụng của amylase nước bọt
- c. Kháng thể nhóm máu A, B, O được bài tiết trong nước bọt
- d. Nước bọt có tác dụng diệt khuẩn

Câu 1684: Vai trò của nước bọt, **ngoại trừ:**

- a. Rửa trôi các vi khuẩn gây bệnh
- b. Làm ẩm ướt, bôi trơn miệng
- c. Trung hòa acid do vi khuẩn tiết ra
- d. Phân giải tinh bột thành monosaccharic

Câu 1685: Câu nào sau đây **không đúng** khi nói về vai trò của nước bọt?

- a. Diệt khuẩn.
- b. Ngừa sâu răng.
- c. Tiêu hóa peptid.
- d. Bôi trơn thức ăn.

Câu 1686: Nước bọt có những thành phần sau, **ngoại trừ:**

- a. HCO_3^-
- b. K^+
- c. Cl^-
- d. Glucose

Câu 1687: Một người **không nuốt được nước bọt** lâu ngày, cơ thể sẽ mất một lượng đáng kể :

- a. Na^+ và Cl^- .
- b. K^+ và HCO_3^- .
- c. Ca^{++} và phosphat.
- d. Nước và men tiêu hóa tinh bột chính.

Câu 1688: Thành phần và tác dụng của nước bọt. **Chọn câu sai.**

- a. Nồng độ K^+ kém 7 lần so với huyết tương
- b. Nồng độ HCO_3^- nhiều gấp 3 lần so với huyết tương
- c. Thanh dịch được bài tiết từ 3 cặp tuyến mang tai, dưới hàm và dưới lưỡi
- d. Men Ptyalin bắt hoạt khi $\text{pH} < 0.4$

Câu 1689: Nói về cơ chế bài tiết nước bọt, chọn câu SAI:

- a. Na^+ được hấp thu chủ động
- b. K^+ được bài tiết thụ động
- c. Lượng Na^+ được tái hấp thu nhiều hơn lượng K^+ bài tiết
- d. Na^+ tái hấp thu và K^+ bài tiết kéo theo sự tái hấp thu thụ động Cl^-

Câu 1690: Các câu sau đây đúng về sự bài tiết các chất điện giải của nước bọt, ngoại trừ:

- a. Các ion chỉ do tế bào ống dẫn tuyến nước bọt bài tiết.
- b. Na^+ được tái hấp thu chủ động khi đi qua ống dẫn.
- c. K^+ được tế bào ống dẫn bài tiết chủ động
- d. Cl^- được tái hấp thu thụ động khi đi qua ống dẫn.

Câu 1691: Enzyme có hoạt tính ngay khi tiết ra:

- a. Amylase
- b. Gastrin
- c. Pepsin
- d. Trypsin

Câu 1692: Liên quan đến Ptyalin, chọn câu sai:

- a. Chỉ tiêu hóa khoảng 5% tinh bột chín trong miệng.
- b. Tạo sản phẩm tiêu hóa là Oligosaccharides.
- c. Bất hoạt ở pH < 4.
- d. Chỉ do tuyến mang tai tiết ra.

Câu 1693: Câu nào sau đây đúng với amylase nước bọt ?

- a. Được bài tiết trong một dung dịch có thành phần ion giống dịch ngoại bào.
- b. Hoạt động mạnh nhất trong khoảng pH từ 1,3 – 4,0.
- c. Cắt nối peptide trong chuỗi polypeptide.
- d. Khởi đầu của sự tiêu hóa của acid béo trong miệng.

Câu 1694: Dây cảm giác hướng tâm của bài tiết nước bọt là ;

- a. Dây X và thừng nhĩ.
- b. Dây IX và thừng nhĩ.
- c. Dây IX và dây X.
- d. Dây VII và dây X.

Câu 1695: Nhân nước bọt không bị kích thích bởi :

- a. Hormon tiêu hóa.
- b. Trung tâm thèm ăn ở vùng hạ đồi.
- c. Kích thích thị giác.
- d. Hệ thần kinh tự do .

Câu 1696: Liệt dây thần kinh VII sẽ làm mất tác dụng bài tiết nước bọt của

- a. Tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi.
- b. Tuyến dưới hàm và tuyến mang tai.
- c. Tuyến mang tai .
- d. Tuyến dưới lưỡi, tuyến dưới hàm và tuyến mang tai .

Câu 1697: Điều hòa bài tiết nước bọt, chọn câu sai

- a. Kích thích phó GC làm tăng bài tiết nước bọt.
- b. Trung tâm bài tiết nước bọt chịu ảnh hưởng bởi trung tâm thèm ăn ở vùng hạ đồi.
- c. Liệt thần kinh mặt sẽ làm giảm đáng kể lượng nước bọt từ tuyến dưới hàm và dưới lưỡi.
- d. Nước bọt tăng tiết khi kích thích beta – adrenergic.

Nội dung 3. Hoạt động cơ học tại dạ dày

Câu 1698: Hoạt động cơ học của dạ dày

- a. Kích thích dây X làm giảm hoạt động cơ học

- b. Được chi phối bởi đám rối Auerbach và Meissner
- c. Atropin làm giảm hoạt động cơ học của dạ dày.
- d. Kích thích thần kinh giao cảm làm tăng hoạt động cơ học của dạ dày

Câu 1699: Phản xạ ruột dạ dày:

- a. Tác dụng kích thích nhu động hang vị.
- b. Qua dây thần kinh phó giao cảm.
- c. Do sự căng thành tá tràng.
- d. Làm giảm trương lực cơ môn vị.

Câu 1700: Phản xạ ruột-dạ dày, ngoại trừ

- a. Xuất phát từ tá tràng.
- b. Tác dụng thông qua dây thần kinh giao cảm.
- c. Làm giảm lượng thức ăn xuống tá tràng.
- d. Kích thích nhu động ruột.

Câu 1701: Phản xạ ruột-dạ dày, chọn câu sai.

- a. Thúc đẩy quá trình đưa thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng.
- b. Do sự căng khi có thức ăn xuống tá tràng.
- c. Thông qua dây thần kinh giao cảm làm giảm co thắt dạ dày.
- d. Làm tăng trương lực cơ môn vị.

Câu 1702: Cơ thắt môn vị đóng và mở dựa trên cơ chế chủ yếu:

- a. Sự chênh lệch pH giữa dạ dày và tá tràng
- b. Sự chênh lệch về mức độ căng thành tá tràng và dạ dày
- c. Các sóng phản nhu động từ ruột non
- d. Lượng chất dinh dưỡng có trong dạ dày và tá tràng

Câu 1703: Ở người bình thường, phản xạ ruột – dạ dày xảy ra trong tất cả các trường hợp sau đây, ngoại trừ:

- a. Tăng áp suất tá tràng
- b. Dưỡng trấp ưu trương trong tá tràng
- c. Dư thừa sản phẩm tiêu hóa của protein trong tá tràng
- d. Dịch tụy kiềm trong tá tràng

Câu 1704: Trương lực cơ môn vị giảm (giãn môn vị) do :

- a. Gastrin.
- b. Acid amin tự do trong dạ dày.
- c. CCK, GIP, Secretin.
- d. Motilin.

Câu 1705: Các chất có tác dụng ức chế cơ học dạ dày, ngoại trừ:

- a. Secretin.
- b. Cholecystokinin.
- c. Motilin.
- d. GIP (Gastric inhibitory peptid).

Câu 1706: Chất nào sau đây ức chế co bóp dạ dày :

- a. Acetyl cholin
- b. Gastrin
- c. Secretin
- d. Histamin

Câu 1707: Chất nào vừa có tác dụng kích thích nhu động dạ dày vừa giảm trương lực cơ vòng môn vị?

- a. Cholecystokinin
- b. GIP
- c. Secretin
- d. Motilin

Câu 1708: Chọn câu sai. Molitin :

- a. Gây co thắt cơ trơn dạ dày và ruột.
- b. Do tế bào G tiết ra.
- c. Làm giãn cơ thắt môn vị.
- d. Giúp thức ăn từ dạ dày xuống ruột.

Nội dung 4. Hoạt động bài tiết và hóa học tại dạ dày

Câu 1709: Dịch tiêu hóa nào có pH nhỏ nhất ?

- a. Nước bọt
- b. Dịch mật
- c. Dịch tụy
- d. Dịch vị

Câu 1710: Tế bào nào sau đây bài tiết HCl?

- a. Tế bào cổ tuyến
- b. Tế bào thành
- c. Tế bào ECL
- d. Tế bào chính

Câu 1711: Tế bào thành tiết ra chất nào sau đây ?

- a. Gastrin.
- b. Cholecystokinin.
- c. Yếu tố nội tại.
- d. Secretin.

Câu 1712: HCl được tạo ra ở giai đoạn :

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

Câu 1713: Các câu sau đều đúng với sự bài tiết HCl trong dạ dày, ngoại trừ:

- a. Có sử dụng CO_2
- b. Bị ức chế bởi các thuốc kháng histamin
- c. Cần có sự chuyển chở chủ động của H^+
- d. Xảy ra tại tế bào chính

Câu 1714: Liên quan đến cơ chế bài tiết HCl tại dạ dày, ngoại trừ:

- a. pH máu tăng lên.
- b. cần có vai trò quan trọng của men CA.
- c. cần có sự hiện diện của CO_2 .
- d. Nước tiểu toan hóa.

Câu 1715: Khi nói về cơ chế bài tiết HCl ở dạ dày , chọn câu sai:

- a. H^+ được bài tiết chủ động vào tiểu quản theo bậc thang thẩm thấu
- b. Sau khi bài tiết HCl ở dạ dày thì có sự kiềm hóa máu và nước tiểu
- c. Nước đi qua lòng tiểu quản theo bậc thang thẩm thấu
- d. HCO_3^- khuếch tán ra khỏi tế bào vào dịch ngoại bào để trao đổi với Cl^-

Câu 1716: Khi nói về cơ chế bài tiết HCl tại dạ dày, chọn câu sai.

- a. Nước đi qua lòng tiểu quản theo bậc thang thẩm thấu.
- b. H^+ được bài tiết chủ động vào tiểu quản để trao đổi với Na^+ .
- c. HCO_3^- khuếch tán ra khỏi tế bào vào dịch ngoại bào để trao đổi với Cl^-
- d. Sau khi bài tiết HCl ở dạ dày thì có sự kiềm hòa hóa máu và nước tiểu.

Câu 1717: Yếu tố làm tăng tiết dịch vị thông qua Ca^{++} :

- a. Gastrin

- b. Histamin
- c. Adrenalin
- d. PG E₂

Câu 1718: Các chất sau đây có tác dụng kích thích bài tiết HCl, **ngoại trừ**:

- a. Gastrin.
- b. Histamin.
- c. **Somatostatin.**
- d. Acetyl cholin.

Câu 1719: Các yếu tố sau có tác dụng tăng tiết HCl của dạ dày, **ngoại trừ**:

- a. Histamin.
- b. Acetylcholin.
- c. Gastrin.
- d. **Secretin.**

Câu 1720: Các yếu tố kích thích sự bài tiết HCl, **ngoại trừ**:

- a. Cafein
- b. Rượu, bia
- c. Chất truyền đạt thần kinh phó giao cảm
- d. **PGE₂**

Câu 1721: Yếu tố nào sau đây **không tham gia** điều hòa bài tiết dịch vị bằng đường thể dịch?

- a. Gastrin
- b. Glucocorticoid
- c. **Dây X**
- d. Histamin

Câu 1722: Đặc điểm của sự bài tiết gastrin :

- a. Được bài tiết bởi các tế bào tuyến môn vị.
- b. Sự bài tiết gastrin do tác dụng trực tiếp của sản phẩm tiêu hóa protein lên tế bào G.
- c. Bị ức chế bởi pH cao trong lòng dạ dày và bởi somatostatin.
- d. **a và b đúng .**

Câu 1723: Tác dụng của Gastrin. **Chọn câu sai:**

- a. sự bài tiết gastrin tăng khi thức ăn chứa nhiều protein và calcium.
- b. gastrin làm tăng sự bài tiết HCl ở dạ dày.
- c. gastrin kích thích sự co thắt của dạ dày.
- d. **sự bài tiết gastrin bị ức chế bởi atropin.**

Câu 1724: Bài tiết gastrin tăng lên bởi

- a. Acid trong dạ dày tăng lên
- b. **Sự căng của thành dạ dày do thức ăn**
- c. Do tăng nồng độ secretin trong máu
- d. Tăng nồng độ cholecystokinin trong máu

Câu 1725: Hormon glucocorticoid (cortisol) của vỏ thượng thận có tác dụng

- a. Kích thích bài tiết HCl
- b. Kích thích bài tiết pepsin
- c. **Ức chế bài tiết nhầy, tăng tiết HCl và pepsin**
- d. Ức chế bài tiết Prostaglandin E₂

Câu 1726: Những yếu tố sau đây đều có cùng một hướng tác dụng lên cơ chế bài tiết dịch vị, **ngoại trừ**

- a. Gastrin
- b. Glucocorticoid
- c. **Prostaglandin E₂**
- d. Histamin

Câu 1727: Prostaglandin E_2 (PGE_2) có tác dụng nào sau đây?

- a. Ức chế tiết chất nhầy giàu mucin bicarbonat.
- b. Kích thích bài tiết yếu tố nội tại.
- c. Ức chế bài tiết HCl của tế bào thành.
- d. Kích thích bài tiết pepsinogen.

Câu 1728: Tác dụng của Prostaglandine (PG) E_2 :

- a. Kích thích bài tiết chất nhầy làm giàu mucin
- b. Ức chế adenylcyclase ở tế bào thành
- c. Kích thích tế bào G
- d. Ức chế sự bài tiết H^+ của tế bào thành

Câu 1729: Prostaglandin E_2 là hormon của tế bào niêm mạc dạ dày có tác dụng

- a. Tăng bài tiết pepsin và giảm tiết nhầy
- b. Ức chế bài tiết pepsin và tăng tiết nhầy
- c. Tăng tiết nhầy và ức chế bài tiết HCl và pepsin
- d. Giảm tiết nhầy và tăng tiết acid HCl

Câu 1730: Trong hoạt động bài tiết của dạ dày Somatostatin có tác dụng nào sau đây?

- a. Kích thích tế bào thành bài tiết HCl.
- b. Kích thích tế bào ECL bài tiết Histamin.
- c. Kích thích tế bào G bài tiết Gastrin.
- d. Ức chế men adenyl cyclase làm giảm bài tiết HCl.

Câu 1731: Tác dụng của các yếu tố gây tăng tiết dịch vị, **chọn câu sai**

- a. Acetylcholin gắn lên thụ thể M_3 làm tăng Ca^{++} nội bào
- b. Histamin gắn lên thụ thể H_2 làm kích hoạt Adenylcyclase
- c. Gastrin gắn lên thụ thể G (CCK – B) làm tăng Ca^{++} nội bào
- d. Secretin kích thích niêm mạc dạ dày tiết HCl

Dùng các ý sau để trả lời các câu hỏi bên dưới

Câu 1732: Histamin

- a. Ức chế tế bào thành tiết HCl

Câu 1733: Prostaglandin

- b. Tác dụng thông qua thụ thể Muscarinic

Câu 1734: Somatostatin

- c. Tác dụng thông qua thụ thể H_2

Câu 1735: Acetylcholin

- d. Kích thích bài tiết HCO_3^-

Câu 1736: Hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày được cấu tạo bởi

- a. HCO_3^- và yếu tố nội tại.
- b. HCO_3^- và chất nhầy.
- c. Chất nhầy và yếu tố nội tại.
- d. HCO_3^- và Prostaglandin E_2 .

Câu 1737: Yếu tố gây loét dạ dày của aspirin :

- a. Ức chế hoạt động của men COX (Cyclo-oxygenase).
- b. Giảm tổng hợp PGE_2 .
- c. Giảm tổng hợp PGI_2 .
- d. Tất cả đều đúng.

Câu 1738: Cơ chế gây loét dạ dày của Corticoide, **ngoại trừ**

- a. Kích thích tế bào chính tăng tiết pepsinogen
- b. Kích thích tế bào thành tăng tiết HCl
- c. Gây tổn thương trực tiếp tế bào niêm mạc dạ dày
- d. Ức chế sự tiết dịch nhầy của tế bào trụ đơn

Câu 1739: Yếu tố nguy cơ làm loét tá tràng tăng lên là :

- a. Lượng HCl từ dạ dày xuống tá tràng tăng

- b. Ức chế hệ thống thần kinh giao cảm
- c. Ức chế thần kinh X
- d. a và b đúng

Câu 1740: Cơ chế điều trị loét dạ dày, tá tràng :

- a. Dùng thuốc kháng histamin H_2 .
- b. Dùng thuốc kháng Muscarinic.
- c. Tốt nhất là dùng thuốc ức chế bơm $H^+-K^+-ATPase$
- d. Giảm yếu tố phá hủy, tăng yếu tố bảo vệ

Câu 1741: Trong điều trị loét dạ dày, **cimetidine** được sử dụng để

- a. Tăng tiết chất nhầy.
- b. Giảm tiết HCl.
- c. Tăng tiết Prostaglandin E_2 .
- d. Ức chế thụ thể H_2 của tế bào viêm.

Câu 1742: Yếu tố kích thích bài tiết HCO_3^- ở dạ dày :

- a. Prostaglandin I_2 .
- b. Acetyl cholin.
- c. Histamin.
- d. Gastrin.

Câu 1743: Các yếu tố sau đây gây ức chế bài tiết HCO_3^- ở dạ dày, ngoại trừ:

- a. Chất α -adrenergic
- b. Non-steroid
- c. Aspirin
- d. Prostaglandin I_2

Câu 1744: Các yếu tố sau đây có tác dụng kích thích bài tiết HCO_3^- tại dạ dày, ngoại trừ:

- a. Prostaglandin I_2
- b. Chất có tác dụng cholinergic
- c. Chất có tác dụng α -adrenergic
- d. pH dịch vị ≤ 2

Câu 1745: Các yếu tố sau đây đều ức chế tiết chất nhầy kiềm tính của tế bào biểu mô dạ dày, ngoại trừ

- a. Chất alpha – adrenergic
- b. Aspirin
- c. Tính acid của dịch vị
- d. Non - aceroid

Câu 1746: Các yếu tố sau đều kích thích tiết chất nhầy kiềm tính của tế bào biểu mô dạ dày, ngoại trừ:

- a. Prostaglandin I_2 .
- b. Xung động đối giao cảm.
- c. Tính acid của dịch vị.
- d. Chất non-steroid.

Câu 1747: Yếu tố nội tại dạ dày (giúp hấp thu vitamin B12) được bài tiết bởi

- a. Tế bào cổ tuyến
- b. Tế bào thành
- c. Tế bào tuyến
- d. Tế bào G

Câu 1748: Biểu hiện nào sau đây trong bệnh viêm xơ teo niêm mạc dạ dày mãn tính

- a. Toan hóa huyết tương
- b. Thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ
- c. Liệt cơ
- d. Tiêu chảy

Câu 1749: Các enzym tiêu hóa của dịch vị là

- a. Lipase, lactase, sucrase
- b. Pepsin, trypsin, lactase
- c. Gelatinase, pepsin, lipase
- d. Sucrase, pepsin, lipase

Câu 1750: Chất nào sau đây được thủy phân ở dạ dày

- a. Protid và lipid
- b. Lipid và glucid
- c. Glucid và protid
- d. Protid và triglycerid đã được nhũ tương hóa sẵn

Câu 1751: Nếu dạ dày hoàn toàn không bài tiết HCl thì

- a. Chỉ có protid trong dạ dày không được thủy phân
- b. Chỉ có protid trong dạ dày giảm thủy phân
- c. Cả protid và lipid trong dạ dày đều giảm thủy phân
- d. Cả protid và lipid trong dạ dày đều không được thủy phân

Câu 1752: Chọn câu sai khi nói về giữa pepsinogen và pepsin :

- a. Pepsinogen có nguồn gốc từ tế bào thành
- b. Pepsinogen được bài tiết chủ yếu nhất ở giai đoạn tâm linh
- c. Pepsin có khả năng thủy phân collagen
- d. Pepsin mất hoạt tính khi $\text{pH} \geq 5$

Câu 1753: Enzyme nào sau đây có khả năng thủy phân collagen?

- a. Tributyrase
- b. Pepsin
- c. Ptyalin
- d. Trypsin

Câu 1754: Chọn câu không đúng.

- a. Pepsin được bài tiết dưới dạng tiền men nên được gọi là pepsinogen.
- b. Tế bào thành bài tiết HCl lẫn yếu tố nội tại.
- c. Sự bài tiết gastrin bị ức chế bởi somatostatin.
- d. Giữa các bữa ăn dạ dày không tiết dịch vị

Câu 1755: Tác dụng của các thành phần trong dịch vị, ngoại trừ

- a. Pepsin thủy phân protein thành acid amin
- b. Men sữa thủy phân các thành phần của sữa
- c. HCl có tác dụng hoạt hóa pepsin
- d. Chất nhầy có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày

Câu 1756: Bài tiết dịch vị giai đoạn tâm linh, chọn câu sai:

- a. Xung thần kinh bắt nguồn từ trung khu ăn ngon miệng
- b. Qua trung gian dây thần kinh X
- c. Có sự tham gia của Gastrin
- d. Cung cấp khoảng 50% tổng lượng dịch vị trong bữa ăn

Câu 1757: Pepsinogen được bài tiết nhiều nhất ở các giai đoạn sau :

- a. Tâm linh
- b. Dạ dày
- c. Tâm linh và dạ dày
- d. Ruột

Câu 1758: Bài tiết dịch vị giai đoạn dạ dày, chọn câu sai.

- a. Khi dạ dày bị căng sẽ làm tăng tiết dịch vị
- b. Do tác động của sản phẩm tiêu hoá protein
- c. Khi $\text{pH} < 2$ sẽ ức chế tiết Gastrin

d. Qua trung gian của dây X

Câu 1759: Hiện tượng nào sau đây xảy ra trong giai đoạn dạ dày của sự bài tiết HCl?

- a. Máu đi khỏi dạ dày có pH kiềm.
- b. Căng thành dạ dày ức chế bài tiết gastrin.
- c. Acid ức chế sự bài tiết acetyl cholin.
- d. Sản phẩm tiêu hóa của protein kích thích sự bài tiết histamin.

Câu 1760: Khi cắt dây X sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến giai đoạn nào của sự bài tiết HCl của dạ dày?

- a. Tâm linh
- b. Dạ dày
- c. Ruột
- d. Giữa các bữa ăn

Câu 1761: Sự tổng thoát thức ăn ra khỏi dạ dày chịu ảnh hưởng của tất cả các yếu tố sau, ngoại trừ:

- a. Carbonhydrat trong dạ dày
- b. Bài tiết gastrin trong dạ dày
- c. Căng thành tá tràng
- d. Nồng độ thẩm thấu của chất chứa trong tá tràng

Câu 1762: Câu nào sau đây **đúng** với tốc độ thoát thức ăn ra khỏi dạ dày

- a. Nhanh hơn khi đường thấp làm căng tá tràng càng nhiều hơn
- b. Tăng khi pH của đường thấp ra khỏi dạ dày giảm
- c. Giảm khi đường thấp ra khỏi dạ dày chứa nhiều lipid
- d. Tăng khi có sự bài tiết của cholecystokinin

Câu 1763: Yếu tố làm trống dạ dày :

- a. Thể tích tá tràng
- b. Thể tích dung dịch
- c. Lượng muối mật ở dạ dày
- d. Bài tiết dịch vị dạ dày

Câu 1764: Câu nào sau đây đúng với hậu quả của sự acid hóa tá tràng?

- a. Giảm bài tiết bicarbonat của tuyến tụy.
- b. Tăng bài tiết HCl của dạ dày.
- c. Tăng co thắt túi mật
- d. Giảm tổng thoát thức ăn khỏi dạ dày

Câu 1765: Chất nào sau đây được hấp thu chủ yếu ở dạ dày

- a. Acid amin
- b. Glucose
- c. Nước
- d. Rượu

CHUYÊN ĐỀ 9 – SINH LÝ HỆ TIÊU HÓA

Bài số 31

TIÊU HÓA TẠI RUỘT NON VÀ RUỘT GIÀ

Nội dung 1. Hoạt động cơ học tại ruột non

Câu 1766: Nhu động ruột non đẩy dưỡng trấp với vận tốc khoảng :

- a. 0,1 cm/phút.
- b. 1 cm/phút.
- c. 10 cm/phút.
- d. 1 cm/s.

Câu 1767: Thời gian dưỡng trấp đi từ đầu tá non đến đầu manh tràng nhờ sóng nhu động :

- a. 3 – 5 giờ.
- b. 60 – 90 phút .
- c. 8 – 12 phút.
- d. 20 – 30 phút.

Câu 1768: Nhu động ruột non có đặc tính :

- a. Tăng khi kích thích hệ giao cảm.
- b. Không bị ảnh hưởng bởi hệ thần kinh ruột.
- c. Xảy ra khi thành ruột bị căng.
- d. Niêm mạc ruột non tăng bài tiết dịch trước khi nhu động xảy ra.

Câu 1769: Các nhu động mạnh ở ruột non xảy ra :

- a. 3 – 5 giờ / lần.
- b. 60 – 90 phút / lần.
- c. 8 – 12 phút / lần.
- d. Liên tục.

Câu 1770: Vai trò của sóng nhu động mạnh ở ruột non xuất hiện khi đói, ngoại trừ:

- a. Đẩy hết thức ăn dọc theo chiều dài ruột non.
- b. Ngăn thức ăn trào ngược từ tá tràng lên dạ dày.
- c. Loại các tế bào ruột non bị bong.
- d. Ngăn vi khuẩn trào ngược từ ruột già xuống ruột non.

Câu 1771: Hoạt động cơ học của ruột non bị kích thích bởi tất cả các chất sau, ngoại trừ:

- a. Cholecystokinin.
- b. Insulin.
- c. Secretin.
- d. Gastrin.

Câu 1772: Hormon góp phần làm tăng nhu động ở hồi tràng và giãn cơ thắt hồi manh tràng :

- a. Cholecystokinin.
- b. Secretin.
- c. Motilin.
- d. Gastrin.

Nội dung 2. Hoạt động bài tiết – hóa học tại ruột non

A – Dịch tụy

Câu 1773: Dịch tiêu hóa nào sau đây có hệ enzym phong phú nhất

- a. Dịch vị.
- b. Nước bọt.
- c. Dịch mật.

d. Dịch tụy.

Câu 1774: Enzym tiêu hóa protid của dịch tụy là

- a. Trypsin, pepsin, procarboxypeptidase.
- b. Chymotrypsin, carboxypeptidase, trypsin.
- c. Carboxypeptidase, pepsin, lactase.
- d. Pepsin, chymosin, trypsin.

Câu 1775: Chất nào sau đây vừa là men tiêu hóa vừa là tác nhân xúc tác phản ứng ?

- a. Enteropeptidase.
- b. Trypsin.
- c. Chymotrysin.
- d. Carboxypeptidase.

Câu 1776: Enzym nào sau đây có thể phân hủy các polypeptid thành các acid amin riêng lẻ

- a. Chymotrypsin
- b. Pepsin
- c. Carboxypeptidase
- d. Trypsin

Câu 1777: Procarboxypeptidase chuyển thành carboxypeptidase nhờ

- a. Enteropeptidase.
- b. Carboxypeptidase.
- c. Trypsin.
- d. Pepsin.

Câu 1778: Trypsinogen chuyển thành trypsin nhờ

- a. Enteropeptidase
- b. Trypsinogen
- c. Pepsin
- d. Chymotrypsin

Câu 1779: Chọn câu đúng nhất. Bình thường dịch tụy không tiêu hóa được tuyến tụy vì

- a. Tụy không bài tiết enteropeptidase.
- b. Trypsinogen không được hoạt hóa ở trong tụy.
- c. pH dịch tụy kiềm.
- d. Tụy không bài tiết enzym tiêu hóa protid.

Câu 1780: Cơ sở sinh lý giải thích viêm tụy cấp sau bữa ăn thịnh soạn

- a. Do vị đắng quá acid tràn vào ống dẫn tụy phá hủy mô tụy
- b. Do uống kèm nhiều rượu mạnh trong bữa ăn
- c. Do dịch tụy bài tiết quá nhiều vào tá tràng và trào ngược vào ống dẫn tụy phá hủy mô tụy
- d. Do men tiêu hóa được tiết quá nhiều và tự hoạt hóa trong ống tụy phá hủy mô tụy

Câu 1781: Enzym nào sau đây không được bài tiết bởi tuyến tụy ngoại tiết

- a. Chymotrypsinogen.
- b. Amylase.
- c. Aminopeptidase.
- d. Lipase.

Câu 1782: Yếu tố nào sau đây kích thích bài tiết kiềm loãng trong dịch tụy?

- a. Secretin
- b. Gastrin
- c. Pancreozymin
- d. Cholecystokinin

Câu 1783: Chất nào sau đây tham gia điều hòa bài tiết enzym tụy:

- a. Acetylcholin.
- b. Gastrin.

- c. Secretin.
- d. Histamin

Câu 1784: Yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng lên sự bài tiết của dịch tụy?

- a. Gastrin.
- b. Cholestokinin.
- c. **Molitin.**
- d. Acetylcholin.

Câu 1785: Thần kinh phó giao cảm kích thích bài tiết enzyme vào dịch tụy bắt đầu từ:

- a. **Giai đoạn tâm linh.**
- b. Giai đoạn ruột.
- c. Giai đoạn dạ dày.
- d. Giữa các bữa ăn.

Câu 1786: Secretin và CCK tác động lên sự bài tiết dịch tiêu hóa ở giai đoạn:

- a. Giai đoạn tâm linh.
- b. **Giai đoạn ruột.**
- c. Giai đoạn dạ dày.
- d. Giữa các bữa ăn.

Câu 1787: Sau khi cắt tụy ngoại tiết hoàn toàn thì

- a. Tiêu hóa glucid xảy ra bình thường.
- b. **Tiêu hóa lipid xảy ra bình thường.**
- c. Tiêu hóa protid xảy ra bình thường.
- d. Hấp thu các acid amin tan trong dầu giảm.

Câu 1788: Dịch tiêu hóa nào sau đây có pH kiềm nhất?

- a. Nước bọt.
- b. **Dịch tụy.**
- c. Dịch vị.
- d. Dịch mật.

Câu 1789: Hormon nào sau đây kích thích tuyến tụy bài tiết lượng lớn bicarbonat?

- a. Acetyl cholin.
- b. Cholecystokinin.
- c. **Secretin.**
- d. Somatostatin.

Câu 1790: Nhóm yếu tố sau đây có liên quan trong điều hòa bài tiết bicarbonat của tụy :

- a. Tính acid cao, cholecystokinin, nang tuyến.
- b. **Tính acid cao, secretin, tế bào ống tuyến.**
- c. Mỡ - sản phẩm tiêu hóa protein – cholesterokin, nang tuyến.
- d. Mỡ- sản phẩm tiêu hóa protein – secretin, nang tuyến.

Câu 1791: Câu nào sau đây đúng với secretin ?

- a. Là một enzyme của tá tràng.
- b. Làm tăng sự bài tiết của tế bào thành.
- c. **Kích thích tụy bài tiết ion bicarbonat.**
- d. Là hormon của tuyến tụy.

Câu 1792: Tất cả các câu sau đây đều đúng với cholecystokinin, ngoại trừ:

- a. Được phóng thích khi mỡ kích thích niêm mạc ruột non.
- b. Tăng sự bài tiết men của tụy.
- c. Gây co cơ trơn túi mật.
- d. **Làm co cơ vòng Oddi.**

Câu 1793: Yếu tố nào sau đây kích thích bài tiết men từ nang tụy ?

- a. Tính acid cao.

- b. Ăn nhiều lipid.
- c. Vị trấp chứa nhiều lipid, sản phẩm tiêu hóa protein.
- d. Tất cả đúng.

Câu 1794: Điều hòa bài tiết của tụy, **chọn câu sai**.

- a. Cholecystokinin (CCK) kích thích tế bào nang tuyến tiết men tiêu hóa.
- b. Secretin kích thích tế bào ống tuyến bài tiết bicarbonat.
- c. Thành phần của dịch tụy được quyết định bởi thành phần vị trấp xuống tá tràng
- d. **Tất cả câu sai.**

Câu 1795: Khi nói về cơ chế bài tiết HCO_3^- ở tụy, **chọn câu sai**.

- a. HCO_3^- và H^+ được tạo ra do sự phân ly H_2CO_3 .
- b. HCO_3^- được chuyên chở thụ động vào lòng ống bài xuất.
- c. H^+ được trao đổi với Na^+ ở mặt tiếp xúc với mạch máu.
- d. Na^+ đi vào tế bào, khuếch tán vào lòng ống.

Câu 1796: Các câu sau đây đều đúng với sự bài tiết của tuyến tụy ngoại tiết, **ngoại trừ:**

- a. Dịch giàu bicarbonate được bài tiết bởi tế bào biểu mô ống dẫn dưới tác dụng của secretin.
- b. **Epinephrine kích thích sự bài tiết bicarbonate.**
- c. Men được bài tiết bởi tế bào nang tuyến dưới tác dụng của cholecystokinin.
- d. Dịch tụy đã được bài tiết trước khi thức ăn vào đến ruột.

Câu 1797: Dịch tụy : **Chọn câu sai**

- a. Cholekystokinin làm tăng men tiêu hoá trong dịch tụy
- b. Đặc điểm của dịch tụy được quyết định bởi thành phần thức ăn trong vị trấp từ dạ dày xuống
- c. Có tác dụng tạo môi trường kiềm ở ruột
- d. **Chứa nhiều men tiêu hóa khi kích thích do secretin**

B – Dịch mật

Câu 1798: Câu nào sau đây **không đúng** với mật?

- a. Chứa muối mật và sắc tố mật.
- b. Có tác dụng nhũ tương hóa lipid.
- c. Được dự trữ tại túi mật.
- d. **Muối mật được tạo ra từ hemoglobin.**

Câu 1799: Câu nào sau đây **không đúng** với mật?

- a. Tạo ra tại gan.
- b. Chứa muối mật và sắc tố mật .
- c. **Được thải hoàn toàn ra ngoài.**
- d. Có tác dụng nhũ tương hóa lipid.

Câu 1800: Muối mật có tác dụng quan trọng trong việc hấp thu :

- a. Protid
- b. Glucid
- c. **Lipid**
- d. Tất cả đều đúng

Câu 1801: Tác dụng của muối mật

- a. **Nhũ tương hóa để làm tăng tác dụng của lipase dịch vị**
- b. Giúp hấp thu glyceron
- c. Giúp hấp thu các vitamin nhóm B
- d. Giúp hấp thu triglycerid

Câu 1802: Tác dụng của muối mật, **ngoại trừ:**

- a. Làm giảm sức căng bề mặt của hạt mỡ
- b. Nhũ tương hóa lipid
- c. Giúp vận chuyển và hấp thu lipid trong ruột

d. Phân giải các chất có thành phần lipid

Câu 1803: Chất nào sau đây kích thích tế bào gan sản xuất muối mật :

- a. Acetylcholin
- b. Gastrin
- c. Prostaglandin E₂
- d. Secretin

Câu 1804: Thành phần trong dịch mật có tác dụng tiêu hóa :

- a. Sắc tố mật
- b. Muối mật
- c. Acid mật
- d. Acid taurocholic

Câu 1805: Thành phần trong mật tạo nên triệu chứng vàng da khi tắt mật:

- a. Muối mật
- b. Điện giải
- c. Bilirubin
- d. Nước

Câu 1806: Tắt ống mật chủ hoàn toàn, chọn câu sai

- a. Tiêu hóa lipid giảm
- b. Hấp thu lipid giảm
- c. Hấp thu các vitamin A, D, E, K giảm
- d. Hấp thu vitamin B12 giảm

Câu 1807: Quá trình bài tiết mật được điều hòa bởi

- a. Secretin
- b. Gastrin
- c. Pancreozymin
- d. Cholecystokinin

Câu 1808: Điều hòa dịch tụy và mật, chọn câu sai.

- a. Secretin kích thích tế bào ống tuyến tụy bài tiết bicarbonat
- b. CCK kích thích tế bào nang tuyến tụy bài tiết men tiêu hóa
- c. CCK kích thích túi mật co bóp và bài tiết mật
- d. Tất cả đều sai.

Câu 1809: Yếu tố nào sau đây không làm tăng lượng mật xuống tá tràng?

- a. Dây thần kinh X.
- b. Cholestokinin.
- c. Secretin.
- d. Tùy thuộc lượng mật được hấp thu.

Câu 1810: Chất nào sau đây kích thích co bóp túi mật để tổng mật xuống ruột

- a. Secretin
- b. Gastrin
- c. Pancreozymin
- d. Thần kinh giao cảm

C – Dịch ruột

Câu 1811: Dịch tiêu hóa nào sau đây có hệ enzym tiêu hóa glucid phong phú nhất ?

- a. Nước bọt
- b. Dịch tụy
- c. Dịch mật
- d. Dịch ruột non

- Câu 1812:** Dịch tiêu hóa nào sau đây có khả năng thủy phân tất cả tinh bột trong thức ăn
- Nước bọt
 - Dịch tụy
 - Dịch ruột non**
 - Cả b và c
- Câu 1813:** Các enzyme tiêu hóa đường có trong thành phần dịch ruột, **ngoại trừ:**
- Sucrase
 - Maltase
 - Amylase**
 - Lactase
- Câu 1814:** Một số bệnh nhân tiêu chảy do uống các loại sữa thông thường do thiếu men:
- Maltase
 - Amylase
 - Sucrase
 - Lactase**
- Câu 1815:** Chất nhầy của dịch ruột được bài tiết từ, **ngoại trừ**
- Các tuyến Brunner
 - Các tế bào nhầy
 - Các hang Lieberkuhn
 - Tế bào biểu mô nhung mao**
- Câu 1816:** Yếu tố kích thích bài tiết chất nhầy từ tuyến Brunner, **ngoại trừ:**
- Kích thích dây X.
 - Secretin.
 - Kích thích giao cảm.**
 - Có kích thích đụng chạm hay kích thích khó chịu phía trên.
- Câu 1817:** Yếu tố quan trọng nhất trong điều hòa bài tiết ở dịch ruột?
- Thần kinh ruột**
 - Thần kinh phó giao cảm
 - Secretin
 - Cholecystokinin (CCK)
- Nội dung 3. Hoạt động hấp thu tại ruột non**
- Câu 1818:** Phần ống tiêu hóa hấp thu nhiều nước nhất
- Thực quản
 - Dạ dày
 - Tá tràng
 - Ruột non**
- Câu 1819:** Hấp thu nước ở ruột non theo cơ chế
- Vận chuyển tích cực
 - Vận chuyển tích cực thứ cấp
 - Khuếch tán dễ dàng**
 - Kéo theo chất hòa tan
- Câu 1820:** Quá trình hấp thu ở ruột non xảy ra rất mạnh, vì những lý do sau đây, **ngoại trừ:**
- Ruột non dài, diện tích tiếp xúc lớn
 - Niêm mạc ruột non có nhiều nhung mao và vi nhung mao
 - Tế bào niêm mạc ruột non cho chất khuếch tán qua dễ dàng
 - Tất cả thức ăn ở ruột non đều được phân giải thành dạng có thể hấp thu**
- Câu 1821:** Hấp thu ion ở ruột non theo cơ chế
- Cl⁻ được hấp thu tích cực ở hồi tràng**

- b. Ca^{++} được hấp thu nhờ sự hỗ trợ của Na^+
- c. Fe^{3+} được hấp thu tích cực ở tá tràng
- d. Acid chlohydric làm tăng hấp thu sắt

Câu 1822: Các yếu tố sau có tác dụng kích thích sự hấp thu Ca^{++} , ngoại trừ:

- a. Hormon tuyến cận giáp
- b. Citric acid
- c. Phosphat
- d. 1,25 – dihydroxycholecalciferol

Câu 1823: Chọn câu sai về sự hỗ trợ trong hấp thu các chất ở ruột non:

- a. Hấp thu Ca^{++} cần vitamin D
- b. Hấp thu sắt cần vitamin C
- c. Hấp thu B12 cần yếu tố nội tại
- d. Hấp thu tất cả các dưỡng chất cần Na^+

Câu 1824: Khi thiếu vitamin D hoặc suy tuyến cận giáp

- a. Hấp thu lipid tăng
- b. Hấp thu Ca^{++} tăng
- c. Hấp thu Ca^{++} giảm
- b. Hấp thu glucid tăng

Câu 1825: Hấp thu sắt ở ruột non theo cơ chế

- a. Vận chuyển tích cực
- b. Vận chuyển tích cực thứ cấp
- c. Khuếch tán thụ động
- d. Ẩm bào

Câu 1826: Sắt có trong thức ăn chủ yếu dạng Fe^{3+} được chuyển thành Fe^{2+} nhờ:

- a. Vitamin A.
- b. Vitamin C.
- c. Vitamin K.
- d. Vitamin D.

Câu 1827: Các yếu tố sau có tác dụng kích thích hấp thu Fe^{++} , ngoại trừ:

- a. Trữ lượng sắt cơ thể giảm .
- b. Ascorbic acid.
- c. Phytic acid.
- d. Tăng sản xuất hồng cầu.

Câu 1828: Hấp thu sắt. chọn câu sai:

- a. Dạng sắt được hấp thu ở ruột là ferrous (Fe^{++})
- b. Phytic acid trong một số ngũ cốc làm tăng hấp thu sắt
- c. Ascorbic acid (Vitamin C) làm tăng hấp thụ sắt
- d. Khi trữ lượng sắt trong cơ thể giảm, hấp thu sắt ở ruột tăng

Câu 1829: Yếu tố làm giảm hấp thu sắt, ngoại trừ:

- a. Vitamin C trong các trái cây có vị chua cam, quýt, ổi
- b. Trà, cà phê, nước có gas
- c. Chất oxalat
- d. Phosphat

Câu 1830: Đường đơn được hấp thu nhanh nhất qua niêm mạc ruột :

- a. Galactose.
- b. Glucose.
- c. Arabinose.
- d. Fructose.

Câu 1831: Hấp thu fructose ở ruột non theo cơ chế

- a. Vận chuyển tích cực
- b. Vận chuyển tích cực thứ cấp
- c. Khuếch tán dễ dàng
- d. Khuếch tán được gia tốc

Câu 1832: Chất nào sau đây làm tăng hấp thu glucose ?

- a. Nước muối đẳng trương
- b. Fructose
- c. Pentose
- d. Thuốc ức chế Na^+/K^+ -ATPase

Câu 1833: Hấp thu nước ở ống tiêu hóa

- a. Lượng nước được hấp thu chủ yếu là từ nguồn ăn uống
- b. Hấp thu tăng lên nhờ muối mật
- c. Glucose làm tăng hấp thu nước ở ruột non
- d. Hấp thu các vitamin kéo theo nước

Câu 1834: Đặc điểm hấp thu carbohydrat ở ruột non, chọn câu sai.

- a. Chủ yếu hấp thu ở hồi tràng và hỗng tràng.
- b. Tất cả hấp thu theo cơ chế vận chuyển chủ động thứ phát.
- c. Giảm Na^+ dịch ngoại bào làm giảm hấp thu glucose
- d. Glucose và galactose cạnh tranh trong sự hấp thu

Câu 1835: Hấp thu lipid, chọn câu sai.

- a. Có hiệu quả nhờ tạo micelles muối mật.
- b. Phần lớn lipid trong thức ăn được hấp thu thẳng vào tuần hoàn máu tĩnh mạch cửa.
- c. Chủ yếu là monoglycerid, acid béo.
- d. 80 – 90% ở dạng Chylomicron.

Câu 1836: Hấp thu acid béo có chuỗi cacbon < 10 từ ruột vào theo đường

- a. Vào tế bào niêm mạc ruột => tĩnh mạch cửa => ống bạch huyết => tĩnh mạch.
- b. Vào tế bào niêm mạc ruột => tĩnh mạch cửa => gan => tĩnh mạch chủ.
- c. Vào khoảng kẽ giữa các tế bào niêm mạc ruột => ống bạch huyết => tĩnh mạch cửa.
- d. Vào khoảng kẽ => chylomicron => ống bạch huyết => tĩnh mạch cửa.

Câu 1837: Hấp thu acid amin ở ruột non theo cơ chế

- a. Vận chuyển tích cực.
- b. Ẩm bào.
- c. Khuếch tán dễ dàng.
- d. Kéo theo chất hòa tan.

Câu 1838: Sự hấp thu các acid amin ở ruột non, chọn câu sai.

- a. Cần Na^+ .
- b. Cần chất vận chuyển.
- c. Cần năng lượng.
- d. Cần có sự hòa màng.

Câu 1839: Hấp thu vitamin ở ruột non theo cơ chế

- a. Khuếch tán thụ động.
- b. Vận chuyển tích cực.
- c. Vận chuyển tích cực thứ cấp.
- d. Kéo theo chất hòa tan.

Nội dung 4. Tiêu hóa tại ruột già

Câu 1840: Sản phẩm bài tiết chính của ruột già

- a. Na^+ và HCO_3^- .

- b. HCO_3^- và chất nhầy.
- c. Các khí.
- d. K^+ và chất nhầy.

Câu 1841: Chất nào sau đây bài tiết tại ruột già?

- a. Na^+ .
- b. K^+ .
- c. Ca^{++} .
- d. Muối mật.

Câu 1842: Chất được hấp thu ở dạ dày, ngoại trừ:

- a. K^+
- b. Na^+
- c. Cl^-
- d. Nước

Câu 1843: Các câu sau đây đều đúng với ruột già, ngoại trừ:

- a. Bài tiết K^+ .
- b. Tái hấp thu Na^+ .
- c. Bài tiết HCO_3^- .
- d. Hấp thu sắt.

Câu 1844: Câu nào sau đây đúng với ruột già?

- a. Bài tiết Na^+ và tái hấp thu K^+ .
- b. Nồng độ K^+ ở ruột già giảm 10 lần so với hồi tràng.
- c. Hấp thu nước nhiều hơn cả ruột non.
- d. Không hấp thu hơi.

Câu 1845: Thuốc chống mất nước, điện giải Oresol trong tiêu chảy dựa trên cơ chế:

- a. Đồng vận chuyển nghịch $\text{Na}^+/\text{HCO}_3^-$
- b. Đồng vận chuyển nghịch Na^+/H^+
- c. Đồng vận chuyển thuận $\text{Na}^+/\text{Glucose}$ hoặc Amino acid
- d. Bơm $\text{Na}^+\text{K}^+\text{ATPase}$

Câu 1846: Các câu sau đây đều đúng với hơi trong ruột già, ngoại trừ:

- a. Được hít vào
- b. Do vi khuẩn tạo ra
- c. Khuếch tán từ máu vào
- d. Được thải hoàn toàn ra ngoài

Câu 1847: Lượng hơi đại tràng (trung tiện) thoát ra trung bình mỗi ngày:

- a. 400ml
- b. 500ml
- c. 600ml
- d. 700ml

Câu 1848: Câu nào sau đây đúng với hơi của ruột già, ngoại trừ:

- a. Chỉ có N_2 được hấp thu.
- b. CO_2 phóng thích do sự tương tác giữa H^+ và HCO_3^-
- c. Do nuốt khí trời vào
- d. O_2 lên men các oligosaccharide bởi vi khuẩn

Câu 1849: Câu nào sau đây không đúng với vi khuẩn trong ruột ruột già?

- a. Bình thường không gây bệnh.
- b. Chủ yếu là vi khuẩn yếm khí.
- c. Tham gia vào chuyển hóa acid mật.
- d. Xác vi khuẩn chiếm khoảng 50% trọng lượng phân.

Câu 1850: Câu nào sau đây đúng với ruột già?

- a. Na^+ được tái hấp thu bằng cơ chế đồng vận chuyển với glucose
- b. Tổng hợp các chuỗi acid béo ngắn.
- c. Có các vi nhung mao.
- d. Tất cả các hơi sinh ra trong ruột già đều thoát ra ngoài.

Câu 1851: Câu nào sau đây đúng với sự tổng thoát phân ?

- a. Căng thành trực tràng làm giãn cơ thắt hậu môn ngoài.
- b. Giãn cơ vòng hậu môn trong và ngoài là do sự điều khiển tự động.
- c. Căng thành trực tràng kích thích thần kinh giao cảm gây phản xạ tổng thoát phân.
- d. Dạ dày ức chế phản xạ tổng thoát phân.

Câu 1852: Câu nào sau đây đúng với sự tổng thoát phân ?

- a. Không thể trì hoãn do co thắt cơ thắt hậu môn ngoài.
- b. Cần tính nguyên vẹn của các dây thần kinh giao cảm phân phối cho trực tràng.
- c. Tùy thuộc vào tín hiệu thần kinh từ các thụ thể cao ở thành tá tràng.
- d. Là một phản xạ làm chậm dứt tính tự chủ của hậu môn.

Câu 1853: Bón có thể do các nguyên nhân sau đây, ngoại trừ:

- a. Ít vận động.
- b. Chấn thương cột sống.
- c. Ăn ít chất xơ.
- d. Nhiễm khuẩn ruột

Câu 1854: Chất nào sau đây cung cấp cho cơ thể được tạo ra chủ yếu ở ruột già?

- a. Vitamin B12.
- b. Vitamin K.
- c. Thiamin.
- d. Riboflavin.

Câu 1855: Câu nào sau đây đúng với ruột già, ngoại trừ:

- a. Hấp thu nước
- b. Hấp thu sắt
- c. Bài tiết K^+
- d. Tái hấp thu Na^+

CHUYÊN ĐỀ 10 – SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

Bài số 32

ĐỘ LỌC CẦU THẬN – SỰ TÁI HẤP THU VÀ BÀI TIẾT QUẢ ỚNG THẬN

Nội dung 1. Đặc điểm cấu trúc chức năng nephron

Câu 1856: Màng lọc cầu thận gồm có mấy lớp?

- a. 1 lớp
- b. 2 lớp
- c. 3 lớp
- d. 4 lớp

Câu 1857: Các lỗ lọc trên các tế bào nội mô mao mạch cầu thận có kích thước:

- a. 60 Å
- b. 70 Å
- c. 160 Å
- d. 170 Å

Câu 1858: Màng lọc cầu thận gồm các cấu trúc sau đây, ngoại trừ:

- a. Tế bào nội mô của mao mạch cầu thận
- b. Màng đáy
- c. Macula densa
- d. Tế bào biểu mô của cầu thận

Câu 1859: Các câu sau đều đúng đối với màng lọc cầu thận và sự thấm qua màng, ngoại trừ:

- a. Sự thấm qua màng phụ thuộc vào kích thước phân tử vật chất
- b. Tế bào nội mô mao mạch cầu thận có những khe hở với đường kính khoảng 160 Å
- c. Toàn bộ albumin đều không được lọc qua màng lọc cầu thận
- d. Các phân tử điện tích âm lọc qua màng lọc cầu thận kém các phân tử điện dương, trung tính

Câu 1860: Chọn tập hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng

- c. Nếu 2 và 4 đúng
- d. Nếu chỉ 4 đúng

Lọc cầu thận:

- 1. Màng đáy chứa proteoglycan, tích điện tích âm rất mạnh
- 2. Tế bào biểu mô của nang Bowman có những lỗ nhỏ kích thước 70Å
- 3. Chỉ có 0,5% albumin được lọc qua màng lọc
- 4. Tế bào nội mô của mao mạch có những tế bào có chân tạo lỗ lọc.

Câu 1861: Cấu trúc tế bào nào sau đây không đúng đối với nephron?

- a. Tế bào biểu mô của cầu thận là những tế bào có chân bám vào màng đáy
- b. Tế bào biểu mô ống lượn gần có bờ bàn chải tạo bởi các vi nhung mao
- c. Tế bào biểu mô đoạn dày của quai Henle có bờ bàn chải thô sơ, có chỗ nối chặt giữa các tế bào
- d. Tế bào biểu mô ở ống xa có bờ bàn chải và nhiều ty lạp thể như ống lượn gần

Câu 1862: Để phân biệt tế bào biểu mô ống lượn gần và tế bào biểu mô ống lượn xa, người ta dựa vào

- a. Ống lượn xa có màng đáy dày lên
- b. Ống lượn gần có màng đáy dày hơn
- c. Ống lượn gần có bờ bàn chải rộng hơn
- d. Ống lượn gần tạo thành phức hợp cạnh cầu thận

Câu 1863: Cấu nào sau đây không đúng với vị trí của nephron?

- a. Cầu thận, ống lượn gần và ống lượn xa nằm vùng vỏ thận.
- b. Đa số nephron nằm hoàn toàn trong vùng vỏ.

- c. Một số ít nephron nằm ở vùng tủy.
d. Một số quai Henle thọc sâu vào vùng tủy .
- Câu 1864:** Quai mạch thẳng (Vasa recta) và quai Henle, **chọn câu sai** :
- a. Chạy ngược chiều với quai Henle
b. Hoạt động như một hệ thống trao đổi ngược dòng
c. Phần đỉnh quai Henle tính thấm cao
d. Phần cuối nhánh lên quai Henle có tính thấm cao nhất
- Câu 1865:** Phức hợp cận tiểu cầu :
- a. Giúp điều hòa để điều hòa dòng máu thận
b. Kích thích tủy xương tạo hồng cầu
c. **Tất cả đều đúng**
d. Tất cả đều sai
- Câu 1866:** Vết đặc là cấu trúc của :
- a. ống lượn gần
b. **quai Henle**
c. ống lượn xa
d. ống góp
- Câu 1867:** Quá trình lọc xảy ra ở :
- a. **Mao mạch cầu thận**
b. Mao mạch quanh ống thận
c. Mao mạch cầu thận và mao mạch quanh ống thận
d. Toàn bộ các phần của ống thận
- Câu 1868:** Mao mạch cầu thận :
- a. **Mao mạch duy nhất nối giữa hai động mạch**
b. Thuộc tổ chức cận tiểu cầu
c. Mang máu đến nuôi tiểu cầu thận
d. Cả ba đều đúng
- Câu 1869:** Hệ mạch máu của nephron bao gồm các phần sau đây, **ngoại trừ**:
- a. Tiểu động mạch vào cầu thận
b. **Lưới mao mạch dinh dưỡng trong cầu thận**
c. Tiểu động mạch ra
d. Lưới mao mạch quanh ống
- Câu 1870:** Chọn câu đúng.
- a. **Dịch nằm trong nang Bowman gọi là dịch lọc**
b. Toàn bộ hệ thống ống dẫn nằm trong vùng vỏ thận
c. Quai mạch thẳng chạy cùng chiều với quai Henle
d. Bao Bowman tạo áp suất keo đẩy nước trở lại mao mạch
- Câu 1871:** Dịch lọc cầu thận
- a. Có thành phần như huyết tương trong máu động mạch
b. Có thành phần protein như huyết tương
c. Có thành phần giống dịch bạch huyết thu nhận từ ống ngược
d. **Có cùng áp suất thẩm thấu với huyết tương**
- Câu 1872:** Dịch lọc của cầu thận
- a. Có thành phần như huyết tương trong máu động mạch
b. Nồng độ ion giống trong máu động mạch
c. Thành phần protein giống huyết tương
d. **Có pH bằng pH huyết tương**
- Câu 1873:** Thành phần dịch lọc cầu thận, **chọn câu đúng**
- a. **Giống thành phần của huyết tương**

- b. Có một lượng ít tế bào máu
- c. Cl^- và HCO_3^- thấp hơn trong huyết tương khoảng 5%
- d. Na^+ và K^+ cao hơn trong huyết tương khoảng 5%

Câu 1874: Thành phần dịch lọc cầu thận, **chọn câu sai**

- a. Giống thành phần của huyết tương
- b. **Không có tế bào máu và lượng protein cho phép nhỏ hơn 0,5g/24h**
- c. Cl^- và HCO_3^- cao hơn trong huyết tương khoảng 5%
- d. Na^+ và K^+ thấp hơn trong huyết tương khoảng 5%

Câu 1875: Có một lượng rất ít protein trong dịch lọc cầu thận vì :

- a. Các phân tử protein huyết tương đều quá lớn so với kích thước lỗ lọc
- b. Điện tích âm của lỗ lọc đã đẩy lùi protein huyết tương
- c. **Do kích thước của lỗ lọc và điện tích âm của lỗ lọc**
- d. Do điện tích dương của lỗ lọc đã hút và giữ lại các phân tử protein

Câu 1876: Bệnh nhân bị viêm cầu thận cấp có albumin trong nước tiểu do :

- a. Trọng lượng phân tử albumin bị giảm đi.
- b. Mức lọc cầu thận tăng lên đẩy albumin đi qua màng lọc.
- c. Khả năng tái hấp thu albumin của ống lượn gần giảm xuống.
- d. **Màng đáy cầu thận bị tổn thương nên bị mất điện tích âm.**

Nội dung 2. Động học quá trình lọc tại cầu thận

Câu 1877: Các áp suất có tác dụng đẩy nước và các chất hoà tan từ mao mạch cầu thận vào bao Bowman:

- a. **Áp suất keo trong bao Bowman và áp suất thủy tĩnh trong mao mạch cầu thận.**
- b. Áp suất thủy tĩnh trong bao Bowman và áp suất keo trong mao mạch cầu thận.
- c. Áp suất keo trong mao mạch cầu thận và áp suất keo trong bao Bowman.
- d. Áp suất thủy tĩnh trong mao mạch cầu thận và áp suất thủy tĩnh trong bao Bowman.

Câu 1878: Cấu tạo mao mạch và áp suất mao mạch ở thận rất phù hợp với chức năng tạo nước tiểu được thể hiện ở đặc điểm :

- a. Mạng lưới mao mạch dày đặc quanh cầu thận và ống thận .
- b. Mao mạch cầu thận có áp suất thấp, mao mạch quanh ống thận có áp suất cao.
- c. **Mao mạch cầu thận có áp suất cao, mao mạch quanh ống thận có áp suất thấp .**
- d. Mạch máu vùng tủy thận là những mạch thẳng.

Câu 1879: Áp suất máu trong mao mạch cầu thận cao, thuận lợi cho sự lọc là do các yếu tố sau đây, ngoại trừ:

- a. Tiểu động mạch vào cầu thận là ngành thẳng và ngắn của tiểu động mạch gian thùy.
- b. Lưới mao mạch cầu thận gần động mạch chủ bụng.
- c. Tiểu động mạch ra có đường kính nhỏ hơn tiểu động mạch vào.
- d. **Tiểu động mạch vào có sức cản tương đối lớn.**

Câu 1880: Áp suất có tác dụng ngăn cản quá trình lọc cầu thận :

- a. Áp suất thủy tĩnh trong mao mạch cầu thận và áp suất thủy tĩnh trong bao Bowman.
- b. Áp suất thủy tĩnh trong mao mạch cầu thận và áp suất keo trong mao mạch cầu thận.
- c. Áp suất thủy tĩnh trong mao mạch cầu thận và áp suất keo trong bao Bowman.
- d. **Áp suất thủy tĩnh trong bao Bowman và áp suất keo trong mao mạch cầu thận.**

Câu 1881: Cơ chế lọc ở cầu thận :

- a. Áp suất thủy tĩnh bao Bowman giữ nước và chất hòa tan ở lại trong bao Bowman.
- b. Áp suất keo đẩy nước và chất hòa tan ra khỏi mao mạch máu.
- c. Áp suất thủy tĩnh và áp suất keo của mao mạch đẩy nước và chất hòa tan ra khỏi mao mạch.
- d. **Áp suất thủy tĩnh của mao mạch đẩy nước và chất hòa tan ra khỏi mao mạch.**

Câu 1882: Chọn tập hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng
c. Nếu 2 và 4 đúng d. Nếu chỉ 4 đúng

Cơ chế lọc:

1. Áp suất thủy tĩnh của máu đẩy nước và các chất hòa tan từ lòng mao mạch vào nang Bowman
2. Áp suất thủy tĩnh trong nang Bowman đẩy nước và các chất hoà tan trở lại lòng mao mạch
3. Áp suất keo trong huyết tương giữ nước lại trong lòng mao mạch cầu thận
4. Để có áp suất lọc, thì tổng áp suất thủy tĩnh phải lớn hơn áp suất keo.

Câu 1883: Chọn tập hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng
c. Nếu 2 và 4 đúng d. Nếu chỉ 4 đúng

Lực Starling quyết định độ lọc cầu thận:

1. Áp suất thủy tĩnh của máu trong mao mạch cầu thận.
2. Áp suất thủy tĩnh trong nang Bowman
3. Áp suất keo
4. Áp suất thẩm thấu của máu trong mao mạch cầu thận.

Câu 1884: Trong tiêu chảy mất nước, lượng nước tiểu giảm là do các nguyên nhân sau, ngoại trừ:

- Huyết áp giảm xuống
- Áp suất keo của máu tăng
- Áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận giảm
- Áp suất bao Bowman tăng**

Câu 1885: Áp suất lọc trung bình tại cầu thận :

- a. 8 mmHg
b. 10 mmHg
c. 12 mmHg
d. 14 mmHg

Câu 1886: Số lượng dịch được lọc qua vi cầu thận của hai thận mỗi ngày:

- a. 180lít/24 giờ
b. 180ml/24 giờ
c. 180lít/giờ
d. 125lít/24 giờ

Câu 1887: Chọn câu đúng. Cơ chế tự điều hòa lưu lượng lọc cầu thận :

- Sự kết hợp giữa hai cơ chế feedback (-) làm giãn tiểu động mạch đến và co tiểu động mạch đi
- Sự kết hợp giữa hai cơ chế feedback (+) làm giãn tiểu động mạch đến và co tiểu động mạch đi
- Sự kết hợp giữa hai cơ chế feedback (-) và feedback (+) làm giãn tiểu động mạch đến và co tiểu động mạch đi
- Do các tế bào cận cầu thận bài tiết renin vào máu để tổng hợp angiotensin

Câu 1888: Lưu lượng lọc cầu thận tăng lên khi, ngoại trừ:

- a. Kích thích thần kinh giao cảm
- b. Tiểu động mạch đi co mạnh
- c. Tiểu động mạch đến giãn ra
- d. Tiểu động mạch đi giãn ra

Câu 1889: Các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng lọc tại cầu thận :

- Giãn tiểu động mạch đến, giãn tiểu động mạch đi làm tăng lưu lượng lọc
- Giãn tiểu động mạch đến, co tiểu động mạch đi làm tăng lưu lượng lọc**
- Kích thích thần kinh giao cảm làm tăng lưu lượng lọc
- Co cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi làm tăng lưu lượng lọc

Câu 1890: Để điều hòa mức lọc cầu thận qua cơ chế điều hòa ngược giảm tiểu động mạch vào thông qua các quá trình sau:

- a. Do khi mức lọc cầu thận giảm gây tăng tái hấp thu Na^+ , Cl^- ở quai Henle

- b. Giảm nồng độ Na^+ , Cl^- ở vết đặc
- c. Hai quá trình trên kích thích vết đặc gây giãn tiểu động mạch vào làm tăng lượng máu vào tiểu cầu và tăng lọc tiểu cầu
- d. Cả ba đều đúng

Câu 1891: Điều hòa ngược ống - cầu trong cơ chế điều hòa mức lọc cầu thận:

- a. Khi huyết áp thấp, TĐM vào dẫn, qua trung gian Angiotensin II TĐM ra co lại
- b. Khi huyết áp thấp, tiểu động mạch (TĐM) vào và ra co lại.
- c. Khi huyết áp tăng, TĐM vào dẫn ra.
- d. Tất cả đúng.

Câu 1892: Bình thường hoạt động – vị trí của nephron ngăn ngừa tình trạng quá tải các phần sau của ống mỗi khi lưu lượng lọc tăng. Đó là hoạt động tái hấp thu :

- a. Na^+ và nước ở quai Henle
- b. Na^+ và nước ở ống lượn gần
- c. 50% ure và nước ở ống lượn gần
- d. Na^+ và nước ở ống lượn xa và ống góp

Câu 1893: Nếu mức lọc cầu thận tăng, sự tái hấp thu muối và nước của ống gần sẽ tăng bởi sự thăng bằng cầu - ống; các yếu tố sau đây đều tham gia trong quá trình này, ngoại trừ:

- a. Tăng áp suất thủy tĩnh mao mạch quanh ống.
- b. Giảm nồng độ Na^+ quanh ống.
- c. Tăng áp suất keo quanh ống.
- d. Tăng dòng dịch ở ống gần.

Câu 1894: Chọn câu đúng.

- a. Dịch lọc cầu thận có thành phần như huyết tương động mạch.
- b. Máu trong tiểu động mạch đi có độ quán nhớt cao hơn máu tiểu động mạch đến.
- c. Lưu lượng lọc cầu thận bình thường là 125ml/phút.
- d. Phân số lọc tại cầu thận quyết định lượng nước tiểu tạo thành.

Câu 1895: Chọn phát biểu đúng về mức lọc cầu thận (GFR):

- a. Là thể tích dịch lọc được lọc qua tiểu cầu thận của từng thận trong 1 phút
- b. Chỉ số GFR bình thường là 125 ml/phút
- c. GFR không phụ thuộc vào áp suất máu, áp suất keo mà chỉ phụ thuộc vào áp suất bao Bowman
- d. Kích thích giao cảm mạch có thể gây tăng lọc kéo dài

Câu 1896: Mức lọc cầu thận, chọn câu sai

- a. Chỉ số GFR bình thường là 125ml/phút
- b. Là thể tích dịch lọc được lọc qua quản cầu thận của từng thận trong một phút
- c. GFR phụ thuộc vào áp suất máu, áp suất keo và áp suất bao Bowman
- d. Kích thích giao cảm có thể gây ngừng lọc tạm thời

Câu 1897: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ lọc cầu thận (GFR), chọn câu sai

- a. Áp suất keo tăng làm giảm độ lọc cầu thận
- b. Co tiểu động mạch vào làm tăng độ lọc cầu thận
- c. Co mạnh và lâu tiểu động mạch ra làm giảm độ lọc cầu thận
- d. Huyết áp tăng làm độ lọc cầu thận (tăng không tương xứng)

Câu 1898: Hormon làm tăng độ lọc cầu thận :

- a. ANP
- b. ADH
- c. Aldosteron
- d. Adrenalin

Câu 1899: Thận có khả năng tự điều hòa (autoregulation) để duy trì GFR trong giới hạn áp suất động mạch khoảng:

- a. Được lọc tự do qua cầu thận
- b. Không được tái hấp thu tại ống thận
- c. Được bài tiết ở ống thận

d. Không gắn với protein trong huyết tương

Câu 1908: So sánh với inulin, creatinin không phải là tiêu chuẩn vàng để đo mức cầu thận vì:

- a. Creatinin gắn kết với protein trong huyết tương
- b. Creatinin được tái hấp thu một phần tại ống thận
- c. Creatinin được bài tiết thêm một phần tại ống thận
- d. Creatinin là một chất ngoại sinh, rất độc đối với cơ thể

Câu 1909: Nếu một chất có độ thanh thải nhỏ hơn độ thanh thải của inulin thì :

- a. Chất đó được bài tiết ở ống lượn gần nhiều hơn ở ống lượn xa
- b. Chất đó được tái hấp thu ở ống thận
- c. Chất đó được bài tiết ở ống thận
- d. Chất đó vừa được bài tiết, vừa được tái hấp thu ở ống thận

Câu 1910: Chất dùng làm thăm dò chức năng tái hấp thu ống thận : **Chọn câu sai**

- a. Được tái hấp thu ở ống thận
- b. Không được bài tiết ở ống thận
- c. Sự hấp thu Ure phụ thuộc vào thể tích dịch lọc
- d. Độ thanh thải Ure tối đa bình thường là 54 mL/phút

Câu 1911: Chất nào sau đây Clearance cao nhất?

- a. Glucose
- b. Insulin
- c. PAU
- d. Ure

Nội dung 3. Sự bài tiết và hấp thu các chất tại hệ thống ống thận

Câu 1912: Sự tái hấp thu Na^+ và nước xảy ra chủ yếu tại :

- a. Ống lượn gần
- b. Quai Henle
- c. Ống lượn xa
- d. Ống góp

Câu 1913: Na^+ được tái hấp thu ở :

- a. ống lượn gần, ngành lên của quai Henle, ống lượn xa và ống góp
- b. ống lượn gần, ngành xuống của quai Henle, ống lượn xa và ống góp
- c. ống lượn gần, quai Henle, ống lượn xa và ống góp
- d. ống lượn gần, ống lượn xa và ống góp

Câu 1914: Tái hấp thu Na^+ ở ống lượn gần theo cơ chế :

- a. Vận chuyển tích cực nguyên phát từ lòng ống vào tế bào, khuếch tán có gia tốc từ tế bào vào dịch kẽ
- b. Khuếch tán đơn giản từ lòng ống vào tế bào, vận chuyển tích cực thứ phát từ tế bào vào dịch kẽ
- c. Khuếch tán có gia tốc từ lòng ống vào tế bào, vận chuyển tích cực nguyên phát từ tế bào vào dịch kẽ
- d. Vận chuyển tích cực nguyên phát từ lòng ống vào tế bào, vận chuyển tích cực thứ phát từ tế bào vào dịch kẽ

Câu 1915: Tại ống lượn xa và ống góp :

- a. Phần lớn Na^+ được hấp thu kèm với Cl^-
- b. Một số Na^+ có thể được tái hấp thu bằng cách trao đổi với K^+ và H^+
- c. Dưới ảnh hưởng của ADH, tế bào ống thận sẽ tăng khả năng thấm đối với nước
- d. Tất cả đều đúng

Câu 1916: Trong ống lượn xa, sự tái hấp thu Na^+ tăng lên do nguyên nhân nào sau đây?

- a. Kích thích thần kinh giao cảm thận

- b. Bài tiết hormon lợi niệu natri của tâm nhĩ
- c. Bài tiết ADH
- d. Bài tiết Aldosteron

Câu 1917: Tái hấp thu Na^+ , chọn câu đúng.

- a. Tái hấp thu Na^+ ở tất cả các phần của ống thận.
- b. Vận chuyển qua bờ bàn chải ống lượn gần theo cơ chế vận chuyển tích cực thứ phát.
- c. Ngành xuống của quai Henle chỉ tái hấp thu Na^+ .
- d. Aldosteron làm tăng tái hấp thu Na^+ ở ống lượn xa và ống góp.

Câu 1918: Chọn tập hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng
c. Nếu 2 và 4 đúng d. Nếu chỉ 4 đúng

Khi bệnh nhân ăn nhạt liên tục trong nhiều tháng, kết quả là:

- 1. Ống lượn gần vẫn tái hấp thu 65% lượng Na^+ được lọc.
- 2. K^+ máu tăng.
- 3. Ống lượn xa và ống góp tăng tái hấp thu Na^+
- 4. Bệnh nhân bị nhiễm toan.

Câu 1919: Ống lượn gần tái hấp thu nước :

- a. 45%
- b. 55%
- c. 65%
- d. 75%

Câu 1920: Câu nào sau đây không đúng khi nói về tái hấp thu nước?

- a. Ống gần tái hấp thu 65% nước
- b. Quai Henle tái hấp thu 15% nước
- c. Ống xa tái hấp thu nước 27 lít/24h
- d. Ống góp tái hấp thu 9,3% nước

Câu 1921: Nước được tái hấp thu chủ yếu ở :

- a. ống lượn gần theo cơ chế thụ động
- b. ngành xuống của quai Henle theo cơ chế thụ động
- c. ngành lên của quai Henle theo cơ chế thụ động
- d. ống lượn xa dưới tác động của ADH

Câu 1922: Chọn câu đúng.

- a. Ngành lên của quai Henle chỉ cho nước thẩm qua
- b. Nước được tái hấp thu chủ yếu ở ống lượn gần
- c. Nước được tái hấp thu ở tất cả các đoạn của ống thận
- d. ADH và aldosteron làm tăng tái hấp thu nước tại ống thận

Câu 1923: ADH tăng tái hấp thu nước ở :

- a. ống lượn gần và ống lượn xa
- b. ống lượn gần và quai Henle
- c. ống lượn xa và ống góp
- d. ống góp vùng vỏ và ống lượn xa

Câu 1924: Khả năng cô đặc nước tiểu. Chọn câu sai

- a. tổn thương ống thận, kẽ thận làm tỷ trọng nước tiểu giảm
- b. trong suy thận tỷ trọng ít thay đổi và thấp
- c. trong suy thận tỷ trọng ít thay đổi và cao
- d. Lượng nước tiểu phụ thuộc vào ADH, lượng nước uống vào, thời gian trong ngày

Câu 1925: Tái hấp thu ở quai Henle :

- a. Ngành xuống tái hấp thu Na^+ , ngành lên tái hấp thu nước và ure
- b. Ngành xuống tái hấp thu nước và ure, ngành lên tái hấp thu Na^+

- c. Ngành xuống tái hấp thu Na^+ và ure, ngành lên tái hấp thu nước
d. Ngành xuống tái hấp thu nước, ngành lên tái hấp thu Na^+ và ure

Câu 1926: Bình thường, K^+ tái hấp thu gần như hoàn toàn tại:

- a. ống lượn gần
- b. ống lượn xa
- c. ngành xuống quai Henle
- d. ngành lên quai Henle

Câu 1927: Sự bài tiết của K^+ chịu ảnh hưởng bởi, ngoại trừ:

- Trạng thái toan kiềm
- Aldosteron
- Hoạt động của bơm $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$
- Sự tái hấp thu glucose, acid amin

Câu 1928: K^+ bài xuất bởi thận giảm trong điều kiện :

- a. Tăng dòng dịch trong ống xa
- b. Tăng mức aldosteron máu tuần hoàn
- c. Tăng chế độ ăn có K^+
- d. Giảm tái hấp thu Na^+ bởi ống lượn xa

Câu 1929: Chọn câu sai. Sự bài tiết K^+ :

- Khi tăng K^+ , K^+ sẽ được bài tiết chủ động ở quai Henle và ống lượn xa
- Tốc độ bài tiết K^+ phụ thuộc vào tốc độ hấp thu Na^+ ở ống lượn xa và ống góp
- Khi nồng độ K^+ tăng ở ngoại bào thì aldosteron sẽ kích thích bài tiết K^+ nhiều hơn
- Sự bài tiết K^+ ảnh hưởng bởi trạng thái toan kiềm

Câu 1930: Các yếu tố ảnh hưởng đến hấp thu HCO_3^- :

- a. PaCO_2 trong máu
b. Tổng lượng K^+ trong cơ thể
c. Nồng độ Cl^- trong huyết tương
d. Tất cả đều đúng

Câu 1931: Tái hấp thu HCO_3^- tăng trong các trường hợp sau, ngoại trừ:

- Cường aldosteron (mineralcorticoid)
- Tăng K^+ máu.
- Tăng CO_2 máu.
- Giảm lượng Cl^- huyết tương

Câu 1932: Men carbonic anhydrase có vai trò quan trọng trong tất cả các khâu sau đây, ngoại trừ:

- Tạo HCO_3^- trong tế bào ống lượn gần.
- Tạo CO_2 trong ống lượn gần.
- Tạo HCO_3^- trong tế bào ống lượn xa.
- Tạo ion H^+ trong tế bào ống.

Câu 1933: Để tránh tình trạng toan nước tiểu nghịch lý do thận điều chỉnh trạng thái kiềm chuyển hóa, ion nào sau đây có vai trò quan trọng?

- K^+, Cl^-
- HCO_3^-
- Cl^-
- Na^+

Câu 1934: Chọn tập hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng
c. Nếu 2 và 4 đúng d. Nếu chỉ 4 đúng

Bài tiết H^+ tăng trong các trường hợp sau:

1. Uống nhiều thuốc lợi tiểu (trừ nhóm ức chế men CA).

- c. Ở đoạn ống lượng gần S1, 1 Na⁺ đồng vận chuyển với 1 phân tử glucose
- d. Ở đoạn ống lượng gần S3, 1 Na⁺ đồng vận chuyển với 2 phân tử glucose

Câu 1943: Tái hấp thu glucose ở ống thận:

- a. Glucose được tái hấp thu ở tất cả các giai đoạn ở ống thận
- b. Glucose được tái hấp thu ở ống lượng gần theo cơ chế vận chuyển tích cực thứ phát
- c. Không phụ thuộc vào nồng độ glucose trong máu
- d. Ngưỡng đường của thận là 160 mg%

Câu 1944: Chọn câu sai.

- a. Glucose được tái hấp thu bằng cách vận chuyển tích cực thứ phát đồng vận chuyển với Na⁺
- b. Lượng glucose tăng thêm trên ngưỡng bao nhiêu thì bị loại bấy nhiêu
- c. Dưới nồng độ ngưỡng, glucose được tái hấp thu hoàn toàn
- d. Trên nồng độ ngưỡng, glucose không được tái hấp thu hết

Câu 1945: Lượng dịch lọc được tái hấp thu nhiều nhất ở :

- a. ống lượng gần
- b. quai Henle
- c. ống lượng xa
- d. ống góp

Câu 1946: Dịch từ quai Henle ra là dịch :

- a. Nhược trương.
- b. Đẳng trương.
- c. Ưu trương.
- d. Đã được pha loãng .

Câu 1947: Câu nào sau đây **không đúng** đối với các chất được tái hấp thu và bài tiết bởi ống thận ?

- a. Có những chất được tái hấp thu hoàn toàn như glucose, protein, lipid
- b. Có những chất được tái hấp thu theo yêu cầu như vitamin và ure
- c. Có những chất được bài tiết hoàn toàn như H⁺, CO₂, NH₃
- d. Có những chất được bài tiết theo yêu cầu như các chất điện giải thừa

Câu 1948: Câu nào sau đây **không đúng** đối với sự tái hấp thu một số chất ở ống gần?

- a. Các cation được tái hấp thu theo cơ chế tích cực
- b. Phần lớn các anion được tái hấp thu theo cơ chế khuếch tán thụ động theo các ion
- c. Ion bicarbonat được tái hấp thu từ lòng ống vào tế bào theo cơ chế khuếch tán
- d. Một số anion được tái hấp thu bằng cơ chế tích cực như Cl⁻, phosphat, sulfat, nitrat...

Câu 1949: Câu nào sau đây **sai** khi so sánh giữa ống lượng xa với ống lượng gần của nephron?

- a. Ống xa chịu tác động của aldosteron nhiều hơn ống gần
- b. Ống xa thấm H⁺ ít hơn ống gần
- c. Ống xa bài tiết K⁺ nhiều hơn ống gần
- d. Ống xa chịu tác dụng của ADH nhiều hơn ống gần

CHUYÊN ĐỀ 10 – SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

Bài số 33

CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU HÒA CHỨC NĂNG THẬN HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG TIẾT NIỆU

Nội dung 1. Các chức năng của thận

Câu 1950: Thận có các chức năng sau đây, ngoại trừ:

- a. Tham gia điều hòa các thành phần nội môi
- b. Tham gia điều hòa huyết áp
- c. Tham gia điều hòa thăng bằng acid-base
- d. Tham gia điều hòa chức năng nội tiết

Câu 1951: Chức năng của nephron trong quá trình bài tiết nước tiểu :

- a. Lọc và bài tiết các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể.
- b. Lọc các chất không cần thiết khỏi máu và tái hấp thu các chất cần thiết vào máu.
- c. Lọc và bài tiết các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể, tái hấp thu các chất cần thiết vào máu.
- d. Lọc và bài tiết các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể, tái hấp thu nước trở vào máu.

Câu 1952: Vai trò của thận trong điều hòa thăng bằng acid-base là:

- a. Duy trì nồng độ ion bicarbonat trong dịch ngoại bào ở mức hằng định
- b. Duy trì nồng độ ion H^+ trong dịch nội bào ở mức hằng định
- c. Duy trì nồng độ phosphat trong máu ở mức hằng định
- d. Duy trì nồng độ ion OH^- trong dịch ngoại bào ở mức hằng định

Câu 1953: Khi có rối loạn thăng bằng acid-base:

- a. Thận sẽ đưa pH trở lại hoàn toàn bình thường sau vài giây.
- b. Thận sẽ đào thải tới 1000 mmol acid hoặc base mỗi ngày.
- c. Thận sẽ đưa pH trở lại bình thường sau vài ngày.
- d. Thận sẽ điều chỉnh pH nhanh nhưng không hoàn toàn về bình thường.

Câu 1954: Thận có chức năng điều hòa pH vì:

- a. Thận bài tiết ion H^+ khi nhiễm toan
- b. Thận bài tiết bicarbonat khi nhiễm toan
- c. Thận bài tiết Na^+ khi nó tái hấp thu bicarbonat
- d. Ở trong ống thận có hệ đệm bicarbonat rất mạnh

Câu 1955: Hormon nào sau đây do thận bài tiết ?

- a. Angiotensin, renin
- b. Cortison, ADH
- c. Aldosterol, erythropoietin
- d. Renin, erythropoietin

Câu 1956: Yếu tố nào sau đây thể hiện vai trò của thận trong tạo hồng cầu?

- a. Thận tái hấp thu các chất tham gia tạo hồng cầu.
- b. Bản chất thận là một cơ quan sinh hồng cầu từ tế bào gốc.
- c. Thận bài tiết erythropoietin kích thích tạo hồng cầu ở tủy xương.
- d. Thận cung cấp các nguyên liệu cần thiết để tạo nên hồng cầu.

Nội dung 2. Điều hòa chức năng thận. Sự tác dụng của các hormon và một số thuốc trên thận

Câu 1957: Mức vận chuyển tối đa của một chất (T_m) là :

- a. Mức tối đa chất đó có thể được lọc.
- b. Mức tối đa có thể được tái hấp thu hoặc được bài tiết.
- c. Mức tối đa chất có thể được pha loãng trong nước tiểu.

d. Mức tối đa chất đó có thể được cô đặc trong nước tiểu.

Câu 1958: Khi nồng độ glucose huyết tương cao hơn ngưỡng đường của thận

- a. Bắt đầu xuất hiện glucose trong nước tiểu và đây là tiêu chuẩn chính để chẩn đoán đái tháo đường.
- b. Mức tái hấp glucose của ống lượn gần đạt trị số cao nhất.
- c. Vẫn chưa xuất hiện glucose trong dịch lọc cầu thận nếu chỉ với mức tăng nhẹ.
- d. Ống lượn gần không còn khả năng tái hấp thu hết glucose trong dịch lọc cầu thận.

Câu 1959: Ở một phụ nữ khả năng thải của thận đối với glucose là 350mg/phút thì lượng glucose thải ra qua nước tiểu là :

- a. 0 mg/phút
- b. 50 mg/phút
- c. 220 mg/phút
- d. 225 mg/phút

Câu 1960: Câu nào sau đây **đúng** với tác dụng của ADH trên thận ?

- a. Tăng mức lọc cầu thận.
- b. Tăng bài xuất Na^+ .
- c. Tăng tính thấm của quai Henle đối với nước
- d. Tăng sự bài xuất nước.

Câu 1961: Khi có ADH, phần nước lọc được tái hấp thu nhiều nhất tại nơi nào sau đây của ống thận?

- a. Ống gần
- b. Ống góp vỏ
- c. Quai Henle
- d. Ống xa

Câu 1962: Khi thiếu ADH, phần nước lọc được tái hấp thu nhiều nhất tại nơi nào sau đây của ống thận?

- a. Ống xa
- b. Ống gần
- c. Quai Henle
- d. Ống góp vỏ

Câu 1963: Khi ADH được bài tiết quá mức sẽ có tác dụng sau đây, **ngoại trừ**:

- a. Lượng nước toàn phần của cơ thể tăng
- b. Lượng nước tiểu giảm
- c. Nồng độ Na^+ huyết tương tăng
- d. Độ thấm thấu của nước tiểu tăng

Câu 1964: ANP (Atrial Natriuretic peptid), **chọn câu sai**

- a. Tăng lên khi tăng thể tích dịch ngoại bào
- b. Làm tăng GFR
- c. Làm ức chế bài tiết ADH và Aldosteron
- d. Tất cả sai

Câu 1965: Chọn tập hợp đúng a. Nếu 1, 2 và 3 đúng b. Nếu 1 và 3 đúng

 c. Nếu 2 và 4 đúng d. Nếu chỉ 4 đúng

Đáp ứng của thận khi tăng ANP:

- 1. Thận tăng lọc và bài tiết muối nước.
- 2. Kích thích tăng tiết Aldosteron
- 3. Ức chế ADH
- 4. Thận giảm bài tiết muối nước.

Câu 1966: Tác dụng của aldosteron, **ngoại trừ**

- a. Tái hấp thu muối

- b. Tái hấp thu nước
- c. Làm tăng độ lọc cầu thận (GFR)
- d. Giảm mạch, giảm huyết áp

Câu 1967: Aldosteron trong máu tăng dẫn đến :

- a. Tăng tái hấp thu HCO_3^- trong ống thận
- b. Tăng thể tích nước tiểu
- c. Tăng bài tiết nước và ion Na^+ ở ống thận
- d. Tăng tái hấp thu Na^+ và bài tiết K^+ ở ống thận

Câu 1968: Aldosteron gây tăng tái hấp thu Na^+ ở:

- a. Ngành lên quai Henle
- b. Ngành xuống quai Henle
- c. Ống lượn gần
- d. Ống lượn xa

Câu 1969: Aldosteron gây ảnh hưởng lớn nhất trên :

- a. Tái hấp thu Na^+ ở ống lượn gần
- b. Tái hấp thu Na^+ ở phần mỏng quai Henle
- c. Tái hấp thu Na^+ ở phần dày quai Henle
- d. Tái hấp thu Na^+ ở ống lượn xa

Câu 1970: Chọn câu sai.

- a. Aldosteron làm tăng tái hấp thu Na^+ ở ống lượn xa và ống góp.
- b. Aldosteron làm tăng bài tiết K^+ ở ống lượn xa và ống góp.
- c. Parathyroid hormone làm tăng tái hấp thu Ca^{++} ở ống lượn gần.
- d. Parathyroid hormone làm giảm tái hấp thu PO_4^{3-} ở ống lượn gần.

Câu 1971: Đáp ứng nào sau đây của cơ thể khi giảm thể tích dịch ngoại bào:

- a. Ưc chế trung khu khát.
- b. Giảm lượng ADH trong máu.
- c. Tăng lượng nước tiểu bài xuất.
- d. Tăng bài tiết Aldosteron.

Câu 1972: Một bệnh nhân bị mất máu nặng :

- a. Tăng bài tiết aldosteron tại vỏ thượng thận
- b. Tăng bài tiết renin tại thận
- c. Giảm bài tiết ADH tại vùng hạ đồi
- d. Tăng huyết áp, nhịp tim tăng

Câu 1973: Chọn câu đúng.

- a. Aldosteron tăng tiết khi tăng áp suất thẩm thấu dịch ngoại bào
- b. Khi cơ thể mất máu nặng thì giảm bài tiết aldosteron.
- c. Aldosteron trong máu tăng dẫn đến tăng tái hấp thu Na^+ và bài tiết K^+ vào ống thận
- d. Aldosteron do lớp lưới của vỏ thượng thận bài tiết ra.

Câu 1974: Renin được tiết ra bởi :

- a. Các tế bào biểu mô ống thận
- b. Các tế bào có chân
- c. Các tế bào tổ chức cận tiểu cầu
- d. Các tế bào nội mô mao mạch

Câu 1975: Tổ chức cận cầu thận tham gia điều hòa huyết áp thông qua:

- a. Angiotensinogen.
- b. Renin.
- c. Aldosteron.
- d. Angiotensin II.

- b. Tính trương lực
- c. Tính động lực
- d. Tính co thắt

Câu 1985: Áp lực cơ bản của niệu quản :

- a. Có trị số cao do cơ cơ tạo ra
- b. Thay đổi theo từng đoạn ống
- c. Có tác dụng đẩy nước tiểu
- d. Giúp chứa đựng nước tiểu

Câu 1986: Áp lực cơ bản thể hiện tính chất nào của đường tiết niệu trên ?

- a. Tính động lực
- b. Tính co thắt
- c. Tính hấp thu
- d. Tính trương lực

Câu 1987: Chọn câu sai. Áp lực cơ cơ

- a. Do sóng nhu động đường tiết niệu gây ra
- b. Thay đổi theo từng đoạn
- c. Thể hiện tính trương lực
- d. Giúp nước tiểu đi từ trên niệu quản xuống bàng quang

Câu 1988: Chọn câu sai.

- a. Tính động lực thể hiện trong quá trình di chuyển nước tiểu xuống bàng quang.
- b. Sóng nhu động là nguyên nhân gây ra áp lực cơ bản.
- c. Áp lực cơ thể hiện tính động lực của đường tiết niệu trên.
- d. Áp lực cơ bản hầu như không thay đổi trong suốt dọc ống tiết niệu.

Câu 1989: Sóng nhu động đẩy giọt nước tiểu đi trong niệu quản xuống bàng quang với tốc độ

- a. 1cm/s
- b. 2cm/s
- c. 3cm/s
- d. 4cm/s

Câu 1990: Nước tiểu không trào ngược lên niệu quản nhờ yếu tố sau, ngoại trừ

- a. Đặc điểm hẹp niệu quản trước khi đổ vào thành bàng quang
- b. Trương lực cơ detrusor trong thành bàng quang
- c. Áp lực bàng quang khi tiểu tiện
- d. Sóng nhu động của niệu quản

Câu 1991: Chọn câu đúng về đặc điểm cơ thắt bàng quang?

- a. Cơ thắt trong hoạt động không ý thức, cơ thắt ngoài hoạt động có ý thức
- b. Cơ thắt trong hoạt động có ý thức, cơ thắt ngoài hoạt động có không ý thức
- c. Cơ thắt trong hoạt động không ý thức, cơ thắt ngoài có ý thức
- d. Cơ thắt trong hoạt động có ý thức, cơ thắt ngoài hoạt động có ý thức

Câu 1992: Câu nào sau đây không đúng đối với bàng quang?

- a. Hai niệu quản đổ vào bàng quang ở hai góc cao nhất của tam giác bàng quang
- b. Khi cơ bàng quang co, các cơ thành bàng quang áp chặt vào lỗ niệu đạo, làm nước tiểu không trào ngược lên bề thận
- c. Trương lực tự nhiên của cơ thắt trong thuận lợi cho nước tiểu từ bàng quang thoát ra từ niệu đạo
- d. Cơ thắt ngoài của bàng quang là cơ vân chịu ảnh hưởng chi phối của vỏ não

Câu 1993: Thần kinh chi phối bàng quang có trung tâm nằm ở :

- a. Tủy sống đoạn S_1-S_2
- b. Tủy sống đoạn S_2-S_3
- c. Tủy sống đoạn L_1-L_2

d. Tùy sống đoạn L_3 - L_4

Câu 1994: Trong phản xạ thực vật :

- a. Xung động ức chế thần kinh giao cảm dẫn đến giãn cơ thắt trong bàng quang
- b. Xung động ức chế thần kinh giao cảm dẫn đến giãn cơ thắt ngoài bàng quang
- c. Xung động kích thích thần kinh giao cảm dẫn đến giãn cơ thắt trong bàng quang
- d. Xung động kích thích thần kinh giao cảm dẫn đến giãn cơ thắt ngoài bàng quang

Câu 1995: Trung tâm ức chế tiểu tiện thông qua cơ thắt ngoài nằm ở:

- a. Tiểu não
- b. Cầu não
- c. Hành não
- d. Vỏ não

Câu 1996: Vai trò của vỏ não trong hoạt động tiểu tiện :

- a. Ức chế cơ thắt ngoài bàng quang.
- b. Ức chế cơ thắt trong bàng quang.
- c. Kích thích cơ thắt ngoài bàng quang.
- d. Kích thích cơ thắt trong bàng quang.

Câu 1997: Chọn câu **sai** về tính chất sinh lý của niệu đạo.

- a. Tính cảm ứng.
- b. Tính co thắt.
- c. Tính trương lực.
- d. Tính hấp thu.

Câu 1998: Quá trình bài xuất nước tiểu qua niệu đạo, **chọn câu sai**.

- a. Giảm trương lực cơ ở niệu đạo.
- b. Tăng áp lực trong niệu đạo.
- c. Tăng áp lực cơ detrusor bàng quang.
- d. Sóng co thắt bàng quang – niệu đạo tiếp nối nhau.

Câu 1999: Khi kết thúc bài xuất nước tiểu :

- a. Áp lực cơ detrusor giảm.
- b. Cơ thắt trong và ngoài bàng quang co thắt trở lại.
- c. Tăng trương lực cơ niệu đạo.
- d. Giảm áp lực niệu đạo.

Câu 2000: Các yếu tố thúc đẩy nhu động niệu đạo, **ngoại trừ**:

- a. Dòng nước tiểu bên trong.
- b. Vi khuẩn trong niệu đạo.
- c. Ống thông trong niệu đạo.
- d. Áp lực ổ bụng.

