Carte 01

Que désigne une étiologie ?

Carte 02

Que désigne l'incubation d'une infection ?

Carte 03

Que désigne l'inoculum ?

Carte 04

Quelles données décrivent directement une diarrhée ?

Carte 05

Quelle différence distingue fréquence d'une maladie et gravité ?

Carte 06

Que signifie une transmission féco-orale ?

Carte 02

L’intervalle entre la contamination et l’apparition des manifestations.

Carte 01

L’étiologie est la cause d’une maladie ou d’un symptôme.

Carte 04

La fréquence, la consistance et l’évolution des selles servent à décrire le trouble.

Carte 03

La quantité d’agents infectieux impliquée dans une exposition.

Carte 06

Un agent provenant des selles atteint une autre personne par ingestion, directement ou par un intermédiaire.

Carte 05

Une maladie fréquente n’est pas nécessairement celle dont le retentissement est le plus grave.

Carte 07

Quels intermédiaires peuvent participer à une transmission féco-orale indirecte ?

Carte 08

Dans une transmission croisée, que se passe-t-il ?

Carte 09

Pourquoi un téléphone manipulé auprès du patient peut-il intervenir dans la transmission ?

Carte 10

Comment une eau souillée peut-elle participer à une infection digestive ?

Carte 11

Comment un manipulateur infecté peut-il contaminer un aliment ?

Carte 12

Quelle idée résume le péril fécal ?

Carte 08

Un agent passe entre personnes, notamment par les mains ou un intermédiaire contaminé.

Carte 07

Eau, aliments et surfaces contaminés peuvent relayer l'agent.

Carte 10

Elle peut être bue ou contaminer les aliments avant leur ingestion.

Carte 09

Il peut être contaminé puis échanger des agents avec les mains et l'environnement de soin.

Carte 12

Les matières fécales peuvent contaminer eau, aliments ou environnement et entretenir des transmissions.

Carte 11

La préparation d'un aliment peut y transférer un agent et créer un intermédiaire de transmission.

Carte 13

Quel contexte clinique associe-t-on au rotavirus ?

Carte 14

Dans quels contextes rencontre-t-on les gastro-entérites à norovirus ?

Carte 15

Comment comparer la saisonnalité des adénovirus entériques à celle du rotavirus ?

Carte 16

Quels publics peuvent être concernés par les gastro-entérites à astrovirus ?

Carte 17

Pourquoi les vomissements peuvent-ils intervenir dans une chaîne de transmission digestive ?

Carte 18

Quel problème la réhydratation vise-t-elle à corriger lors d'une diarrhée ?

Carte 14

Il est associé aux gastro-entérites chez l'adulte et aux épisodes collectifs, notamment alimentaires ou hydriques.

Carte 13

Le rotavirus est un repère de gastro-entérite du jeune enfant, avec des épidémies de saison froide.

Carte 16

Les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées peuvent être concernés.

Carte 15

Un caractère saisonnier moins marqué que celui décrit pour les épidémies hivernales à rotavirus.

Carte 18

Les pertes d'eau et d'électrolytes liées aux émissions digestives.

Carte 17

Les vomissements peuvent disperser l'agent dans l'environnement.

Carte 19

Quel couplage est utilisé par les solutés de réhydratation orale ?

Carte 20

Pourquoi ne faut-il pas confondre antidiarrhéique et réhydratation ?

Carte 21

Quels groupes faut-il distinguer parmi les salmonelles ?

Carte 22

Quel est le réservoir des salmonelles typhiques ?

Carte 23

Pourquoi la typhoïde peut-elle donner des manifestations générales ?

Carte 24

Quelle place les macrophages ont-ils dans la physiopathologie de la typhoïde ?

Carte 20

La correction des pertes d'eau et d'électrolytes constitue un objectif distinct de la modification des selles.

Carte 19

Le couplage de l'absorption du sodium et du glucose.

Carte 22

Le réservoir des salmonelles typhiques est strictement humain.

Carte 21

Les salmonelles majeures, Typhi et Paratyphi, et les salmonelles mineures ou non typhiques.

Carte 24

La bactérie peut survivre et se multiplier dans les macrophages.

Carte 23

La bactérie franchit la barrière intestinale et se dissémine dans l'organisme.

Carte 25

Pourquoi une constipation n'écarte-t-elle pas un tableau de typhoïde ?

Carte 26

Que signifie un pouls dissocié dans un tableau de typhoïde ?

Carte 27

Quel prélèvement recherche une bactériémie dans la typhoïde ?

Carte 28

Quels éléments peuvent caractériser une salmonellose non typhique ?

Carte 29

Quelles complications intestinales peuvent survenir dans la typhoïde ?

Carte 30

Que signifie le sigle TIAC ?

Carte 26

L’accélération attendue du pouls avec la fièvre n’est pas retrouvée de la même manière.

Carte 25

La constipation peut être observée alors que les signes généraux dominent.

Carte 28

Une gastro-entérite fébrile, avec douleurs ou vomissements, peut suivre une exposition alimentaire.

Carte 27

Des hémocultures peuvent être contributives pour rechercher des bactéries dans le sang.

Carte 30

Toxi-infection alimentaire collective.

Carte 29

Des hémorragies et des perforations intestinales peuvent survenir.

Carte 31

Quel objectif guide l’enquête devant plusieurs malades après un repas commun ?

Carte 32

Quels éléments participent à la prévention de la contamination alimentaire ?

Carte 33

Pourquoi l’élimination d’excrétas dans un évier pose-t-elle problème ?

Carte 34

Quel mécanisme intestinal est associé à Shigella ?

Carte 35

Que décrit le terme muco-sanglant ?

Carte 36

Quels éléments appartiennent au syndrome dysentérique ?

Carte 32

L’hygiène des mains, le contrôle de l’eau et le respect de la chaîne du froid participent à la prévention.

Carte 31

Rechercher une exposition commune suspectée : aliment, repas ou circuit de préparation.

Carte 34

Une invasion des cellules intestinales avec inflammation et lésions de la barrière.

Carte 33

Elle peut contaminer un point d’eau et l’environnement puis favoriser une transmission.

Carte 36

Des selles glairo-sanglantes ou purulentes, des douleurs, des épreintes et un ténesme peuvent être associés.

Carte 35

La présence de mucus et de sang dans les selles.

Carte 37

Quel rôle les polynucléaires neutrophiles jouent-ils lors d'une atteinte intestinale inflammatoire ?

Carte 38

Quelle voie de contamination peut transmettre Shigella ?

Carte 39

Quelles espèces de Yersinia sont associées aux diarrhées ?

Carte 40

Quelle forme digestive de yersiniose peut survenir chez le petit enfant ?

Carte 41

Quels mécanismes peuvent expliquer une douleur de la fosse iliaque droite dans une yersiniose ?

Carte 42

Pourquoi le seul nom Escherichia coli ne résume-t-il pas le pouvoir pathogène ?

Carte 38

L’ingestion d’eau ou d’aliments souillés, en lien avec le péril fécal.

Carte 37

Ils participent à la réponse inflammatoire recrutée au niveau des lésions.

Carte 40

Une forme entéritique, parfois traînante.

Carte 39

Yersinia enterocolitica et Yersinia pseudotuberculosis.

Carte 42

Des souches appartiennent à la flore habituelle ; d’autres possèdent des facteurs de virulence particuliers.

Carte 41

Une adénite et une inflammation de l’iléon terminal peuvent être en cause.

Carte 43

À quel mécanisme le groupe EIEC est-il associé ?

Carte 44

Quel tableau digestif peut être associé aux Escherichia coli entéro-invasifs ?

Carte 45

Que désigne le groupe des Escherichia coli uropathogènes ?

Carte 46

Quel réservoir est particulièrement associé à Campylobacter ?

Carte 47

Comment une carcasse de volaille peut-elle être contaminée par son contenu digestif ?

Carte 48

Quelles expositions peuvent transmettre Campylobacter ?

Carte 44

Une diarrhée muco-sanglante avec syndrome dysentérique.

Carte 43

E. coli entéro-invasif : invasion intestinale avec un tableau proche de Shigella.

Carte 46

Le réservoir animal, avec la volaille comme repère principal.

Carte 45

Ce sont les Escherichia coli associés aux infections urinaires.

Carte 48

La volaille insuffisamment cuite, le lait non pasteurisé et les eaux souillées sont des expositions possibles.

Carte 47

Le contenu du tube digestif peut contaminer la carcasse lors de la transformation.

Carte 49

Que signifie une zoonose ?

Carte 50

Pourquoi une volaille insuffisamment cuite au barbecue peut-elle exposer à Campylobacter ?

Carte 51

Quels signes peuvent accompagner une entérite à Campylobacter ?

Carte 52

Quel ancien nom correspond à Clostridioides difficile ?

Carte 53

Que signifie un portage asymptomatique ?

Carte 54

Quel échantillon est au centre de l'exploration microbiologique d'une diarrhée ?

Carte 50

Une cuisson insuffisante de la volaille peut permettre une contamination alimentaire.

Carte 49

Une infection transmise depuis un réservoir animal, illustrée ici par Campylobacter.

Carte 52

Clostridioides difficile est l'appellation actuelle utilisée ; Clostridium difficile est l'ancien nom rencontré.

Carte 51

Une diarrhée, de la fièvre et des vomissements peuvent être associés.

Carte 54

Un prélèvement de selles, avec des recherches adaptées à la demande.

Carte 53

La présence d'un micro-organisme sans maladie clinique attribuable à ce portage.

Carte 55

Que désigne une coproculture ?

Carte 56

Pourquoi rechercher des agents spécifiques au sein des selles ?

Carte 57

Que recherche une analyse par PCR ?

Carte 58

Que signifie multiplex pour une analyse PCR ?

Carte 59

À quoi sert un milieu sélectif en coproculture ?

Carte 60

À quoi sert le MALDI-TOF pour des colonies bactériennes ?

Carte 56

La flore digestive contient de nombreux micro-organismes ; le laboratoire doit distinguer l'agent recherché.

Carte 55

La mise en culture d'un prélèvement de selles pour rechercher des bactéries.

Carte 58

Plusieurs cibles sont recherchées dans une même analyse.

Carte 57

Une cible génétique spécifique ; un test multiplex peut rechercher plusieurs cibles.

Carte 60

Le MALDI-TOF contribue à l'identification de colonies bactériennes.

Carte 59

À favoriser l'isolement des agents recherchés au sein de la flore abondante.

Carte 61

À quoi sert le sérotypage des salmonelles ?

Carte 62

Quelle information apporte un antibiogramme ?

Carte 63

Pourquoi une première détection ne fournit-elle pas toujours toutes les informations biologiques ?

Carte 62

La sensibilité d'une souche bactérienne aux antibiotiques testés.

Carte 61

Il permet de préciser le groupe et notamment de distinguer les salmonelles majeures des mineures.

Carte 63

Détection, culture, identification et étude de sensibilité apportent des informations distinctes.