UE B1 · SEMESTRE 1

Prévention du risque infectieux - QCM

Cochez les bonnes propositions parmi A à E. Une à trois réponses sont attendues.
Leur nombre est annoncé pour chaque question. Tous les corrigés sont regroupés à la fin.

128 questions | 12 thèmes | Corrigés à la fin

Agents, IAS et transmission

Q01 **Quelles caractéristiques distinguent bactéries et virus ? (2 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. Une bactérie est un organisme cellulaire.
- ☐ B. Tout micro-organisme est une bactérie.
- ☐ C. Un virus dépend de cellules hôtes pour se multiplier.
- ☐ D. La forme d'une bactérie suffit à identifier son espèce.
- ☐ E. Tout virus possède une enveloppe lipidique.

Q02 **Quelles associations entre agents et familles sont exactes ? (3 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. Escherichia coli est une bactérie.
- ☐ B. Aspergillus est une moisissure.
- ☐ C. Candida est une levure.
- ☐ D. Le virus de la grippe est un champignon.
- ☐ E. Un prion est un virus enveloppé.

Q03 **Quel raisonnement décrit un agent opportuniste ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Son pouvoir pathogène dépend notamment du terrain.
- ☐ B. Il est toujours inoffensif chez tout patient.
- ☐ C. Une rupture de barrière peut favoriser son action.
- ☐ D. Il appartient obligatoirement aux virus.
- ☐ E. Il infecte nécessairement toute personne exposée.

Q04 **Quelles affirmations décrivent un microbiote ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Le microbiote intestinal et le sang sont des milieux équivalents.
- ☐ B. Un commensal ne peut jamais participer à une infection.
- ☐ C. Il regroupe les micro-organismes d'un milieu donné.
- ☐ D. Il doit être supprimé entièrement avant chaque soin.
- ☐ E. Il ne contient que des agents responsables d'infections.

Q05 **Quels éléments participent à la définition d'une IAS ? (2 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Un germe nécessairement résistant aux antibiotiques.
- [ ] B. Un lien avec une prise en charge.
- [ ] C. Une acquisition exclusivement à l'hôpital.
- [ ] D. L'absence d'infection présente ou incubée au début.
- [ ] E. Une apparition obligatoirement avant la sortie.

Q06 **Une infection apparaît après 48 heures d'hospitalisation. Que peut-on conclure ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. L'incubation et le contexte doivent être examinés.
- [ ] B. Une infection révélée après la sortie exclut une IAS.
- [ ] C. L'infection ne peut plus être communautaire.
- [ ] D. Une IAS est prouvée par ce seul délai.
- [ ] E. Un lien plausible avec les soins reste à rechercher.

Q07 **Quelle proposition définit une infection nosocomiale ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Toute infection apparue au domicile.
- [ ] B. Toute colonisation par une bactérie résistante.
- [ ] C. Une IAS acquise dans un établissement de santé.
- [ ] D. Toute infection d'un professionnel, même sans lien aux soins.
- [ ] E. Une infection obligatoirement mortelle.

Q08 **Comment distinguer incidence et prévalence ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. La prévalence décrit une présence à un moment donné.
- [ ] B. Une proportion sans dénominateur permet toute comparaison.
- [ ] C. L'incidence étudie les nouveaux événements sur une période.
- [ ] D. Un rapport de prévalence est la probabilité individuelle d'infection.
- [ ] E. Ces deux mesures sont directement interchangeables.

Q09 **Quel exemple illustre une origine endogène ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Un dispositif partagé transmet un agent d'un autre patient.
- [ ] B. Une origine endogène exclut toute mesure préventive.
- [ ] C. Le patient inhale un aérosol d'eau contaminée.
- [ ] D. La flore cutanée du patient contamine son accès vasculaire.
- [ ] E. Des poussières de chantier exposent le patient à des spores.

Q10 **Quels maillons relient un réservoir à une infection possible ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. La porte d'entrée est toujours digestive.
- [ ] B. Un hôte dont les défenses et barrières comptent.
- [ ] C. La seule présence d'un micro-organisme garantit une infection.
- [ ] D. Le réservoir est nécessairement un patient symptomatique.
- [ ] E. Une voie de transmission et une porte d'entrée.

Q11 **Un brassard non entretenu est utilisé chez deux patients. Quel risque est décrit ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Un risque persiste sans contact entre les patients.
- [ ] B. La FHA du soignant désinfecte aussi le brassard.
- [ ] C. Seules les transmissions respiratoires sont possibles à l'hôpital.
- [ ] D. Un lavage du brassard est inutile si le soignant porte des gants.
- [ ] E. Une transmission indirecte par un matériel partagé.

Q12 **Comment interpréter une bactérie retrouvée dans les urines ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Comme une preuve d'origine exogène.
- [ ] B. Comme une absence certaine de risque infectieux.
- [ ] C. Avec les signes cliniques et le contexte du prélèvement.
- [ ] D. Comme une indication automatique d'antibiothérapie.
- [ ] E. Comme une preuve de résistance à la FHA.

Prévention coordonnée et dispositifs invasifs

Q13 **Quelles actions concourent à prévenir les IAS ? (3 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Réévaluer l'utilité des dispositifs invasifs.
- [ ] B. Appliquer les précautions standard.
- [ ] C. Associer vaccination et bon usage des antibiotiques.
- [ ] D. Remplacer toutes les mesures par le port de gants.
- [ ] E. Attendre un germe identifié avant toute prévention.

Q14 **Pourquoi réévaluer quotidiennement une VVP inutilisée ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Sa nécessité et les alternatives se discutent avec l'équipe.
- [ ] B. Une VVP inutilisée ne peut pas se contaminer.
- [ ] C. La garder est toujours préférable à envisager un retrait.
- [ ] D. Elle constitue une exposition invasive sans bénéfice assuré.
- [ ] E. Deux VVP sont systématiquement nécessaires à tout patient.

Q15 **Quels signes sur une VVP doivent être évalués et transmis ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une douleur doit être ignorée en l'absence de fièvre.
- [ ] B. L'absence d'alarme de perfusion exclut toute complication.
- [ ] C. Une rougeur ou un gonflement.
- [ ] D. Une douleur nouvellement rapportée.
- [ ] E. Une fuite ou une anomalie de fonctionnement.

Q16 **Une VVP douloureuse résiste à l'injection. Quelles décisions sont justifiées ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Augmenter systématiquement la pression d'injection.
- [ ] B. Conclure à une infection certaine sans évaluation.
- [ ] C. Poursuivre pour finir le traitement avant d'alerter.
- [ ] D. Transmettre des observations précises à l'équipe.
- [ ] E. Ne pas forcer et évaluer la voie.

Q17 **Quelle évolution peut compliquer un foyer infectieux sur cathéter ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une diffusion bactérienne sanguine.
- [ ] B. Une évolution toujours bénigne en l'absence de douleur.
- [ ] C. Une impossibilité d'aggravation si le cathéter est périphérique.
- [ ] D. Des localisations infectieuses à distance.
- [ ] E. Une protection immunitaire immédiate contre toutes les IAS.

Q18 **Quelles actions favorisent une séquence de soin aseptique ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Anticiper le circuit d'élimination.
- [ ] B. Considérer la première FHA comme valable malgré tous les contacts.
- [ ] C. Ouvrir le matériel stérile très longtemps à l'avance.
- [ ] D. Préparer le matériel nécessaire avant le geste.
- [ ] E. Continuer après une contamination sans réévaluer le matériel.

Q19 **Que peut-on attendre de la vaccination dans la prévention ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Un calendrier identique pour tout produit et toute personne.
- [ ] B. Une protection contre tous les micro-organismes.
- [ ] C. La suppression des précautions standard chez le vacciné.
- [ ] D. La possibilité d'utiliser sans vérification un ancien calendrier.
- [ ] E. Une contribution à la protection des personnes exposées.

Q20 **Quelles associations sont exactes ? (2 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Tout résultat positif impose le même antibiotique.
- [ ] B. Bactéricide : tue des bactéries dans les conditions considérées.
- [ ] C. Un antibiotique traite tous les virus.
- [ ] D. Une antibiothérapie inutile n'influence jamais l'écologie bactérienne.
- [ ] E. Bactériostatique : inhibe leur multiplication.

Q21 **Quelle transmission sur une anomalie de cathéter est la plus utile ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Attendre systématiquement l'équipe suivante.
- [ ] B. Écrire uniquement « à surveiller ».
- [ ] C. Décrire signes, moment et actions déjà réalisées.
- [ ] D. Omettre la douleur parce qu'elle est subjective.
- [ ] E. Remplacer les faits observés par un diagnostic certain inventé.

Q22 **Un délai de renouvellement de VVP est cité sans contexte. Comment l'utiliser ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Conserver la surveillance clinique entre les échéances.
- [ ] B. Attendre l'échéance malgré douleur et gonflement.
- [ ] C. Le transformer en règle universelle pour toutes les voies.
- [ ] D. Supprimer toute trace du contexte pour mieux mémoriser.
- [ ] E. Vérifier le dispositif, le patient et le protocole applicable.

Précautions standard et sécurité des gestes

Q23 **À qui les précautions standard s'appliquent-elles ? (2 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Uniquement aux personnes porteuses d'une BMR.
- [ ] B. Seulement après un résultat microbiologique positif.
- [ ] C. À tout patient, quel que soit le statut infectieux connu.
- [ ] D. Aux seuls soins invasifs.
- [ ] E. Dans les différents lieux de soins.

Q24 **Quelles questions guident le choix d'un EPI ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Quels contacts ou projections sont prévisibles ?
- [ ] B. Quel équipement est le plus nombreux dans le chariot ?
- [ ] C. Quel circuit évite de contaminer le propre ?
- [ ] D. Le patient a-t-il forcément un germe identifié ?
- [ ] E. Quel soin sera réalisé ?

Q25 **Quelles situations sont des indications d'hygiène des mains ? (3 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Avant de toucher le patient.
- [ ] B. Une seule fois pour toute la journée.
- [ ] C. Après un risque d'exposition biologique.
- [ ] D. Avant un geste aseptique.
- [ ] E. Uniquement lorsque les mains paraissent sales.

Q26 **Après quels contacts faut-il aussi réaliser une hygiène des mains ? (2 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Uniquement si le patient est contagieux selon le dossier.
- [ ] B. Seulement après un contact avec du sang visible.
- [ ] C. Après avoir touché son environnement.
- [ ] D. Jamais après retrait des gants.
- [ ] E. Après avoir touché le patient.

Q27 **Quels prérequis favorisent une bonne hygiène des mains ? (3 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. Couvrir des mains humides par des gants.
- [ ] B. Absence de bijoux aux mains et poignets.
- [ ] C. Ongles sans vernis ni résine.
- [ ] D. Conserver l'alliance parce qu'elle est lisse.
- [ ] E. Avant-bras dégagés et ongles courts.

Q28 **Quand la FHA est-elle adaptée dans son indication habituelle ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Sur une souillure visible sans lavage préalable.
- [ ] B. Avec la même efficacité garantie contre tous les agents.
- [ ] C. Avec couverture complète et durée prévue par le produit.
- [ ] D. Sur des mains visiblement propres et sèches.
- [ ] E. En interrompant avant le séchage pour gagner du temps.

Q29 **Quelles zones sont facilement oubliées pendant une friction ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Les espaces entre les doigts.
- [ ] B. Aucune zone si la quantité paraît abondante.
- [ ] C. Les gants rendent inutile la couverture des doigts.
- [ ] D. Les pulpes et le pourtour des ongles.
- [ ] E. Les pouces.

Q30 Difficile

Après une FHA, le soignant saisit son téléphone puis prépare un accès vasculaire. Que retenir ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Une recontamination des mains est possible.
- ☐ B. L'indication avant geste aseptique doit être respectée à nouveau.
- ☐ C. Le téléphone devient stérile au contact des mains frictionnées.
- ☐ D. Mettre des gants suffit à corriger cette séquence.
- ☐ E. La première friction protège pour toute la séquence.

Q31 Facile

Quand des gants non stériles sont-ils indiqués ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Si les mains du professionnel présentent une lésion.
- ☐ B. En cas de contact prévisible avec le sang.
- ☐ C. Pour toute prise de tension sur peau saine.
- ☐ D. Pour toute entrée dans une chambre sans autre analyse.
- ☐ E. Pour un contact avec une muqueuse ou une peau lésée.

Q32 Moyen

Quelles règles concernent une paire de gants de soin ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. La retirer immédiatement après la tâche exposante.
- ☐ B. La garder pour toucher les réserves propres.
- ☐ C. La changer du temps sale vers le temps propre.
- ☐ D. La désinfecter pour la conserver plusieurs soins.
- ☐ E. La changer entre deux patients.

Q33 Moyen

Que signifie le caractère stérile d'une paire de gants ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Il dispense de l'hygiène des mains.
- ☐ B. Il permet de toucher toute surface sans conséquence.
- ☐ C. Il doit être conservé pendant la technique aseptique.
- ☐ D. Il remplace la préparation du matériel.
- ☐ E. Il reste acquis après contact avec le téléphone.

Q34 Facile

Quelles protections correspondent au risque de souillure de la tenue ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Une surblouse adaptée si l'exposition est plus étendue.
- ☐ B. Un gant protège à lui seul toute la tenue.
- ☐ C. Multiplier les couches remplace un retrait maîtrisé.
- ☐ D. Une surblouse souillée peut devenir une tenue permanente.
- ☐ E. Un tablier adapté pour un soin mouillant ou souillant.

Q35 Moyen

Un soin expose à une projection biologique au visage. Quelles affirmations sont correctes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Un masque peut être manipulé continuellement sans risque.
- ☐ B. Le port de gants suffit pour protéger les yeux.
- ☐ C. Prévoir un masque et une protection oculaire adaptés.
- ☐ D. Une visière seule ne remplace pas tout masque requis.
- ☐ E. Des lunettes de vue constituent toujours une protection de soin suffisante.

Q36 Facile

Quels gestes participent à l'hygiène respiratoire ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Conserver un mouchoir souillé pour tous les soins.
- ☐ B. Utiliser un mouchoir ou le haut du bras pour tousser.
- ☐ C. Attendre la confirmation microbiologique avant toute mesure.
- ☐ D. Proposer un masque adapté à une personne qui tousse.
- ☐ E. Réaliser l'hygiène des mains après les sécrétions.

Q37 Facile

Quelles pratiques réduisent le risque d'AES ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. L'utilisation correcte des dispositifs sécurisés.
- ☐ B. Le transport d'aiguilles usagées sur un plateau ouvert.
- ☐ C. Le respect de sa limite de remplissage.
- ☐ D. Le recapuchonnage soigneux de l'aiguille usagée.
- ☐ E. Un collecteur OPCT à proximité du soin.

Q38 Moyen

Quelles réactions initiales sont adaptées après un AES ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Attendre la fin du service pour demander un avis.
- ☐ B. Appliquer un antiseptique cutané dans l'œil.
- ☐ C. Faire saigner volontairement une plaie.
- ☐ D. Effectuer les premiers soins selon la voie d'exposition.
- ☐ E. Contacter sans délai le circuit médical d'urgence prévu.

Q39 Moyen

Quelles règles limitent la contamination pendant le transport de linge ou prélèvements ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Transporter un prélèvement fermé avec extérieur propre.
- ☐ B. Placer les documents au contact d'un échantillon souillé.
- ☐ C. Porter le linge sale contre la tenue.
- ☐ D. Glisser un tube souillé dans une poche.
- ☐ E. Conditionner le linge sale sans le secouer.

Q40 **Quelles propositions sur le tri des déchets sont exactes ? (3 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Tous les déchets médicamenteux suivent systématiquement les DASRI.
- [ ] B. Les perforants nécessitent un collecteur adapté.
- [ ] C. Les déchets chimiques ou médicamenteux peuvent avoir des filières spécifiques.
- [ ] D. Tout déchet issu d'un soin n'est pas automatiquement un DASRI.
- [ ] E. Le port de gants rend inutile le tri.

Q41 **Pourquoi éviter de rincer un bassin à la douchette ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Le jet peut disperser les souillures.
- [ ] B. Un circuit d'excreta adapté est nécessaire.
- [ ] C. Le jet désinfecte automatiquement le bassin.
- [ ] D. Une panne autorise toute méthode manuelle improvisée.
- [ ] E. Les urines et selles ne transmettent qu'en présence d'une BMR connue.

Q42 **Le laveur-désinfecteur est en panne. Que faut-il organiser ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Supprimer les protections parce que le soin sera plus rapide.
- [ ] B. Vider et brosser les bassins au lavabo des mains.
- [ ] C. Reporter toute élimination sans sécuriser les excreta.
- [ ] D. Signaler l'indisponibilité du matériel.
- [ ] E. Employer l'alternative validée pour les excreta.

Précautions complémentaires et résistances

Q43 **Comment articuler précautions standard et complémentaires ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Une mesure contact impose automatiquement un FFP2.
- [ ] B. Les mesures ne doivent jamais être expliquées au patient.
- [ ] C. Le mot isolement indique à lui seul tous les EPI.
- [ ] D. Les mesures complémentaires dispensent des cinq indications des mains.
- [ ] E. Les mesures complémentaires s'ajoutent au socle standard.

Q44 **Quelles dispositions peuvent limiter une transmission contact ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une organisation adaptée de la chambre et des sanitaires.
- [ ] B. Des stocks importants exposés dans la chambre.
- [ ] C. Du matériel dédié ou entretenu entre utilisateurs.
- [ ] D. Des gants conservés jusque dans le couloir.
- [ ] E. Une information des équipes lors des transferts.

Q45 Difficile

Un patient en précautions contact doit se rendre à un examen. Quelles mesures sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Interdire tout examen parce que le patient est en contact.
- [ ] B. Organiser mains, tenue et protection des lésions si nécessaire.
- [ ] C. Préparer le déplacement avec l'équipe d'accueil.
- [ ] D. Considérer que le déplacement supprime les précautions standard.
- [ ] E. Ne pas transmettre les mesures pour éviter toute contrainte.

Q46 Facile

Que signifie une multirésistance bactérienne ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Une infection systématiquement symptomatique.
- [ ] B. Une virulence obligatoirement supérieure.
- [ ] C. Une résistance prouvée à toute hygiène des mains.
- [ ] D. Une transmission exclusivement aérienne.
- [ ] E. Une résistance à plusieurs familles d'antibiotiques.

Q47 Moyen

Quels raisonnements distinguent portage et infection ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Un dépistage peut révéler un portage sans infection.
- [ ] B. Le traitement antibiotique ne découle pas du portage seul.
- [ ] C. Un portage ne nécessite jamais d'information lors d'un transfert.
- [ ] D. Un prélèvement diagnostique et un dépistage ont toujours le même objectif.
- [ ] E. Toute infection exige une longue colonisation asymptomatique préalable.

Q48 Facile

Quelles associations de sigles sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. SARM : staphylocoque doré résistant à la méticilline.
- [ ] B. EPC : entérobactérie productrice de carbapénémase.
- [ ] C. BLSE : mesure de renouvellement de l'air.
- [ ] D. ERG : entérocoque résistant aux glycopeptides.
- [ ] E. BHRe : synonyme de toute bactérie cutanée.

Q49 Moyen

Quel mécanisme explique la pression de sélection antibiotique ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Les bactéries sensibles sont défavorisées par l'exposition.
- [ ] B. L'antibiotique apprend volontairement à la bactérie à réfléchir.
- [ ] C. Le bon usage des antibiotiques complète la prévention des transmissions.
- [ ] D. La sélection remplace la nécessité de transmission croisée.
- [ ] E. Une prescription inutile est sans conséquence sur cette sélection.

Q50 **Que fournit un antibiogramme ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Une prescription directement lisible à l'œil sur une photographie.
- [ ] B. Une preuve que tous les antibiotiques sont équivalents.
- [ ] C. Le diagnostic certain d'infection indépendamment de la clinique.
- [ ] D. Une mesure de l'efficacité de la FHA.
- [ ] E. Une étude standardisée de sensibilité aux antibiotiques.

Q51 **Une hospitalisation récente à l'étranger et une alerte ancienne sont signalées. Que faire ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Supposer qu'une absence d'alerte informatique exclut tout risque.
- [ ] B. Lire germe, site, date et consignes de l'alerte.
- [ ] C. Solliciter le circuit local d'hygiène et de dépistage.
- [ ] D. Ignorer l'information si le patient n'a pas de fièvre.
- [ ] E. Appliquer sans lecture n'importe quelle précaution respiratoire.

Q52 **Quelles distinctions sont correctes entre protection respiratoire et masque médical ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une visière seule est équivalente à un FFP2.
- [ ] B. Un FFP2 mal ajusté garantit la même protection.
- [ ] C. Le type de protection dépend uniquement du nom du germe.
- [ ] D. Le masque médical participe au contrôle des émissions.
- [ ] E. Un FFP2 vise la protection contre l'inhalation de particules.

Q53 **Quel est l'objectif d'un environnement protecteur ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Rendre toute paire de gants obligatoire dès l'entrée.
- [ ] B. Limiter l'exposition d'un patient très vulnérable.
- [ ] C. Autoriser du matériel non entretenu si le soignant porte une surblouse.
- [ ] D. Signifier automatiquement que le patient est une source contagieuse.
- [ ] E. Maîtriser mains, matériel, air et eau selon l'unité.

Q54 **Klebsiella pneumoniae BLSE est identifiée chez un patient. Quelles déductions sont justifiées ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Le nom prouve une transmission aérienne dans toute situation.
- [ ] B. Les précautions standard deviennent inutiles.
- [ ] C. Le mot pneumoniae ne décide pas d'une précaution air.
- [ ] D. La résistance et le site doivent être lus avec le contexte.
- [ ] E. Le portage impose toujours une antibiothérapie immédiate.

Asepsie et antisepsie

Q55 — **Que recouvre l'asepsie lors d'un soin ? (2 bonnes réponses)** — Facile

- [ ] A. Le nettoyage des locaux sans lien avec le soin.
- [ ] B. Les mesures empêchant l'introduction de micro-organismes dans un site à protéger.
- [ ] C. La stérilisation de tous les tissus du patient.
- [ ] D. Le seul badigeon cutané, quel que soit le reste du geste.
- [ ] E. La préparation des mains, du matériel et des parties critiques.

Q56 — **Comment distinguer antisepsie et désinfection ? (2 bonnes réponses)** — Facile

- [ ] A. Un désinfectant de surface convient automatiquement à une muqueuse.
- [ ] B. La désinfection concerne un milieu inerte.
- [ ] C. La FHA peut remplacer tout produit d'entretien des DM.
- [ ] D. Ces deux opérations garantissent une stérilité définitive.
- [ ] E. L'antisepsie s'applique à des tissus vivants.

Q57 — **Quelles associations de familles sont correctes ? (3 bonnes réponses)** — Facile

- [ ] A. Dakin : exemple d'antiseptique chloré.
- [ ] B. Chlorhexidine : biguanide.
- [ ] C. Povidone iodée : halogéné iodé.
- [ ] D. Un nom de famille rend toutes les concentrations équivalentes.
- [ ] E. Toutes les solutions chlorées sont adaptées aux tissus.

Q58 — **Un flacon lavant et un flacon alcoolique portent un nom proche. Que faut-il vérifier ? (2 bonnes réponses)** — Moyen

- [ ] A. Les mélanger améliore nécessairement l'activité.
- [ ] B. La nécessité de rinçage ou de maintien selon la notice.
- [ ] C. La présentation exacte et son indication.
- [ ] D. La même marque garantit une interchangeabilité complète.
- [ ] E. Seule la couleur de l'étiquette importe.

Q59 — **Une antisepsie est nécessaire chez un nouveau-né. Quel raisonnement est adapté ? (2 bonnes réponses)** — Difficile

- [ ] A. Utiliser la procédure spécifique avec l'équipe compétente.
- [ ] B. Vérifier âge, maturité cutanée, site et présentation.
- [ ] C. Appliquer sans vérification le protocole de l'adulte.
- [ ] D. Choisir uniquement l'antiseptique jugé le plus fort.
- [ ] E. Déduire une autorisation générale du seul nom de famille.

Q60 Difficile

Une personne déclare une allergie « à l'iode ». Quelles actions sont adaptées ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une réaction à un contraste rend tous les antiseptiques identiques.
- [ ] B. Une allergie aux fruits de mer prouve toute allergie à la povidone iodée.
- [ ] C. Faire évaluer le choix avec l'équipe et le protocole.
- [ ] D. Préciser le produit en cause et la réaction.
- [ ] E. Ignorer toute allergie déclarée parce que le terme est vague.

Q61 Moyen

Sur une peau visiblement propre avant un geste invasif, quelles règles retenir ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une antisepsie adaptée peut rester nécessaire.
- [ ] B. Un antiseptique de surface suffit quel que soit le site.
- [ ] C. Le nombre d'applications suit le produit et le geste.
- [ ] D. Une détersion en quatre temps est toujours obligatoire.
- [ ] E. L'absence de souillure signifie une peau stérile.

Q62 Moyen

La zone cutanée est visiblement souillée. Quelle séquence est cohérente ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Conserver la même compresse souillée pour toute l'application.
- [ ] B. Nettoyer avant l'antisepsie adaptée.
- [ ] C. Ajouter davantage d'antiseptique sans retirer la souillure.
- [ ] D. Rincer si nécessaire puis sécher selon la méthode.
- [ ] E. Souffler sur la zone pour la rendre propre.

Q63 Facile

Quelles conduites respectent le séchage antiseptique ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Essuyer pour accélérer systématiquement le soin.
- [ ] B. Souffler sur la zone préparée.
- [ ] C. Attendre le séchage spontané complet.
- [ ] D. Réaliser le geste dès que la peau est couverte.
- [ ] E. Retoucher la zone sans précaution pendant le séchage.

Q64 Moyen

Quelles règles concernent un flacon d'antiseptique ouvert ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Toucher l'embout pour vérifier qu'il est propre.
- [ ] B. Le compléter si le produit ajouté vient du même lot.
- [ ] C. Le refermer et le stocker comme prévu.
- [ ] D. Mélanger deux antiseptiques pour élargir sans contrôle le spectre.
- [ ] E. Respecter sa durée d'emploi après ouverture.

Q65 **Avant de manipuler la valve d'une perfusion, quelles actions sont pertinentes ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Réaliser l'hygiène des mains indiquée.
- ☐ B. Manipuler avec une compresse ayant touché le lit.
- ☐ C. Appliquer la même durée à tous les connecteurs sans notice.
- ☐ D. Considérer qu'un connecteur est propre parce qu'il paraît transparent.
- ☐ E. Désinfecter l'accès avec la méthode compatible prévue.

Q66 **Après préparation cutanée, le site est touché par un élément non préparé. Que retenir ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- ☐ A. Les conditions d'asepsie doivent être rétablies avant de poursuivre.
- ☐ B. L'absence de trace visible garantit l'innocuité du contact.
- ☐ C. Le port ultérieur de gants corrige automatiquement la zone.
- ☐ D. L'antiseptique rend toute recontamination impossible.
- ☐ E. Une recontamination est possible.

Dispositifs médicaux, retraitement et stérilisation

Q67 **Que signifie la mention « usage unique » sur un DM ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Une seule utilisation pour un patient.
- ☐ B. Une réutilisation permise si le dispositif paraît propre.
- ☐ C. Un statut dépendant seulement du nombre de soignants.
- ☐ D. Une réutilisation possible après toute désinfection.
- ☐ E. Un usage toujours non stérile.

Q68 **Quel contact correspond à un dispositif non critique ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Un contact non critique n'impose jamais d'entretien.
- ☐ B. Un tissu normalement stérile.
- ☐ C. La peau intacte.
- ☐ D. Une muqueuse dans tous les cas.
- ☐ E. Le système vasculaire.

Q69 **Quels éléments caractérisent un dispositif critique ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Un procédé validé dans le circuit adapté.
- ☐ B. Un contact avec un site normalement stérile ou le système vasculaire.
- ☐ C. L'apparence métallique suffit à déterminer son classement.
- ☐ D. Une désinfection de surface choisie librement suffit toujours.
- ☐ E. Le contact exclusif avec une peau intacte.

Q70 **Comment raisonner devant un dispositif semi-critique thermosensible ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- ☐ A. Appliquer obligatoirement n'importe quel cycle d'autoclave.
- ☐ B. Vérifier aussi le statut de ses accessoires.
- ☐ C. Le ranger sale en attendant de connaître le produit.
- ☐ D. Identifier destination, notice et circuit de traitement validé.
- ☐ E. Choisir librement entre tous les niveaux de désinfection.

Q71 **Quelles propositions décrivent la résistance aux procédés microbiocides ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Les prions se traitent sans précaution particulière par tout procédé.
- ☐ B. La résistance aux antibiotiques prouve la résistance à tout désinfectant.
- ☐ C. Tous les virus ont une sensibilité identique.
- ☐ D. Le spectre et les conditions revendiqués du produit comptent.
- ☐ E. Les spores bactériennes sont particulièrement résistantes.

Q72 **Quels objectifs justifient un prétraitement immédiat ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Autoriser l'immersion de tout équipement électrique.
- ☐ B. Réduire la charge et protéger les personnes.
- ☐ C. Rendre automatiquement le matériel prêt à l'emploi.
- ☐ D. Éviter le séchage des souillures.
- ☐ E. Faciliter les étapes ultérieures.

Q73 **Pourquoi nettoyer avant désinfection ou stérilisation ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Le nettoyage et la stérilisation ont exactement le même résultat.
- ☐ B. Le nettoyage élimine les matières organiques et salissures.
- ☐ C. Un produit plus concentré rend le nettoyage inutile.
- ☐ D. L'autoclave compense tout défaut de préparation du matériel.
- ☐ E. Les dépôts peuvent empêcher un contact efficace.

Q74 **Un dispositif non immersible doit être entretenu. Quelles conduites sont adaptées ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- ☐ A. Éviter la pulvérisation directe improvisée sur l'électronique.
- ☐ B. Un essuyage humide avec produit compatible, selon sa notice.
- ☐ C. Ne traiter que la zone portant une tache visible.
- ☐ D. L'immerger pour garantir une action plus forte.
- ☐ E. Utiliser une SHA pour les mains comme solution universelle.

Q75 Moyen

Quelles règles s'appliquent à une solution de traitement préparée ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Mélanger les restes de deux bains facilite la traçabilité.
- [ ] B. La renouveler selon la notice et si elle est souillée.
- [ ] C. Respecter la dilution, la température et la durée d'emploi prévues.
- [ ] D. Doubler la dose améliore toujours efficacité et tolérance.
- [ ] E. Toutes les solutions se conservent le même nombre d'heures.

Q76 Difficile

Quelles interprétations sont correctes concernant les procédés ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une réduction de cinq log divise la population par cent mille.
- [ ] B. Tout dispositif supporte le même cycle de vapeur.
- [ ] C. Dix puissance moins six signifie ce nombre de germes sur chaque objet.
- [ ] D. Une désinfection maintient nécessairement la stérilité sans emballage.
- [ ] E. L'assurance de stérilité exprime une probabilité après procédé validé.

Q77 Moyen

Quels contrôles concernent un sachet de matériel stérile ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une date dépassée peut être ignorée si l'emballage paraît intact.
- [ ] B. Un sachet ouvert reste utilisable comme stérile indéfiniment.
- [ ] C. Absence de compression ou de microperforation suspectée.
- [ ] D. Un élastique fortement serré améliore toujours la conservation.
- [ ] E. Intégrité, état sec et date limite.

Q78 Moyen

Quel est l'intérêt de la traçabilité d'un dispositif traité ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Autoriser un sachet humide si le numéro de lot est lisible.
- [ ] B. Relier traitement, dispositif et patient lorsque requis.
- [ ] C. Permettre de rechercher un cycle et ses contrôles.
- [ ] D. Conserver uniquement la marque du matériel sans autre donnée.
- [ ] E. Remplacer le traitement lorsqu'une étiquette est présente.

Bionettoyage, air, travaux et eau

Q79 Facile

Quels principes organisent un bionettoyage cohérent ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Considérer tous les locaux comme équivalents.
- [ ] B. Adapter méthode et fréquence au risque du secteur.
- [ ] C. Utiliser partout la même lavette sans changement.
- [ ] D. Traiter seulement les surfaces visiblement tachées.
- [ ] E. Éviter de revenir du sale vers le propre.

Q80 Moyen

Que signifie la marche en avant ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Une dispense de traiter le matériel entre patients.
- [ ] B. Le seul ordre des chambres en fin de journée.
- [ ] C. L'autorisation de conserver les mêmes gants partout.
- [ ] D. Une organisation limitant le retour ou croisement du sale vers le propre.
- [ ] E. Une obligation de commencer par le plus contaminé.

Q81 Difficile

Une méthode d'entretien des sols fonctionne dans un secteur. Comment la transposer ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Omettre les surfaces de contact proches du patient.
- [ ] B. Choisir systématiquement la solution la plus concentrée.
- [ ] C. Maintenir compatibilité et conditions d'application des produits.
- [ ] D. L'appliquer sans analyse à tout local de soins.
- [ ] E. Vérifier le risque, l'activité et le protocole du nouveau secteur.

Q82 Moyen

Quelles interventions peuvent produire un risque d'empoussièrement ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Une démolition ou un terrassement.
- [ ] B. Seuls les chantiers de plusieurs mois sont concernés.
- [ ] C. L'ouverture d'un faux plafond.
- [ ] D. Une maintenance générant des poussières près des patients.
- [ ] E. La brièveté garantit l'absence de spores.

Q83 Moyen

Quelles propositions décrivent le risque lié à Aspergillus ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Toute exposition provoque la même maladie chez tous.
- [ ] B. Des surchaussures suffisent à filtrer l'air inhalé.
- [ ] C. L'immunodépression peut favoriser une forme invasive grave.
- [ ] D. Les spores environnementales peuvent être inhalées.
- [ ] E. Aspergillus est une bactérie digestive par définition.

Q84 Difficile

Une barrière de chantier gêne un passage. Quelles conduites sont adaptées ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Signaler une rupture ou des poussières inhabituelles.
- [ ] B. Compenser l'ouverture par des surchaussures.
- [ ] C. Ouvrir la barrière pour un raccourci rapide.
- [ ] D. Respecter le confinement et le circuit fléché.
- [ ] E. Décider seul de modifier la ventilation du secteur.

Q85 Facile

Quelles associations entre eau et voie d'exposition sont cohérentes ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Ingestion : certaines infections digestives.
- ☐ B. Aérosol inhalé : légionelles.
- ☐ C. Plaie en contact avec une eau contaminée : risque cutané.
- ☐ D. Toute qualité d'eau convient à toute utilisation.
- ☐ E. Une eau claire est nécessairement conforme.

Q86 Moyen

Quelle exposition correspond à la transmission environnementale de la légionellose ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Inhaler un aérosol d'eau contaminée.
- ☐ B. Le seul fait de voir un point d'eau.
- ☐ C. L'absence de transmission interhumaine autorise toute eau contaminée à boire.
- ☐ D. Une transmission interhumaine habituelle définissant toute légionellose.
- ☐ E. Une injection vaccinale contre toutes les pneumonies.

Q87 Moyen

Quels facteurs du réseau favorisent un développement microbien ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Tartre et portions de réseau peu circulantes.
- ☐ B. Températures favorables au développement de l'agent.
- ☐ C. Stagnation et faible renouvellement de l'eau.
- ☐ D. Un écoulement bref prouve l'absence de contamination.
- ☐ E. Le seul aspect propre du robinet exclut le risque.

Q88 Difficile

Une purge de point d'eau est prévue. Quelles règles sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Suivre la méthode, la périodicité et la traçabilité prévues.
- ☐ B. Déclarer l'eau conforme après toute purge.
- ☐ C. Choisir une durée unique valable dans tout établissement.
- ☐ D. Éviter d'exposer le visage et le patient au premier jet.
- ☐ E. Utiliser la purge pour lever seul une restriction.

Q89 Moyen

Une eau colorée et une température inhabituelle sont constatées. Quelles actions sont pertinentes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Supposer que l'eau est sûre si la couleur disparaît.
- ☐ B. Modifier sans concertation tous les réglages du réseau.
- ☐ C. Respecter les mesures d'usage décidées.
- ☐ D. Signaler des observations précises au circuit technique et d'hygiène.
- ☐ E. Ignorer l'anomalie si aucun patient n'a de symptôme.

Q90 Difficile

Un traitement thermique du réseau est organisé. Quels risques faut-il aussi prévenir ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Le défaut d'information des équipes exposées.
- [ ] B. Une valeur unique garantit la sécurité de tous les patients.
- [ ] C. Les brûlures lors d'un usage intempestif.
- [ ] D. Le traitement peut être improvisé par chaque soignant.
- [ ] E. Une reprise non autorisée avant les contrôles prévus.

Cas et décisions intégrées

Q91 Difficile

Après une toilette exposante, le soignant garde les gants pour ouvrir les tiroirs. Quelles corrections sont adaptées ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Désinfecter les gants puis les garder pour le patient suivant.
- [ ] B. Ne traiter que les mains en ignorant les surfaces souillées.
- [ ] C. Réaliser l'hygiène des mains avant le matériel propre.
- [ ] D. Retirer les gants à la fin de la tâche.
- [ ] E. Ajouter une deuxième paire sans retirer la première règle tout le problème.

Q92 Difficile

Avant un médicament sur une VVP déjà posée, quels éléments restent nécessaires ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. La désinfection de l'accès.
- [ ] B. L'hygiène des mains avant le geste aseptique.
- [ ] C. Appliquer un volume de rinçage universel sans contexte.
- [ ] D. L'évaluation de la voie et le rinçage selon le protocole.
- [ ] E. Injecter directement parce que la voie appartient au même patient.

Q93 Moyen

Une fibroscopie se termine. Quelle première étape concerne l'endoscope réutilisable ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Un autoclave imposé à tous les modèles sans notice.
- [ ] B. L'absence de traitement si le patient n'a pas d'infection connue.
- [ ] C. Le stockage sale jusqu'au lendemain.
- [ ] D. Le prétraitement immédiat selon la procédure.
- [ ] E. La remise en service après un simple essuyage extérieur.

Q94 Difficile

Un accessoire d'endoscope traverse une muqueuse pour prélever un tissu. Comment décider de son circuit ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Examiner sa destination propre et sa notice.
- [ ] B. Le classer automatiquement comme l'appareil auquel il se raccorde.
- [ ] C. Décider que tout accessoire est non critique.
- [ ] D. Vérifier s'il est à usage unique.
- [ ] E. Choisir le bain disponible sans regarder le matériel.

Q95 Difficile

Un patient tousse mais aucune alerte n'apparaît au dossier. Que faire ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Conclure à une absence de risque respiratoire.
- [ ] B. Choisir définitivement les mesures sans contexte ni réévaluation.
- [ ] C. Ignorer les sécrétions lors de l'hygiène des mains.
- [ ] D. Évaluer la suspicion et les précautions nécessaires avec l'équipe.
- [ ] E. Mettre en œuvre l'hygiène respiratoire initiale adaptée.

Q96 Difficile

Un brassard partagé doit entrer chez un patient en aplasie. Quelles actions sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Respecter les consignes de l'unité pour l'entrée.
- [ ] B. L'entretenir par une méthode compatible avant utilisation.
- [ ] C. Confondre aplasie et contagiosité obligatoire.
- [ ] D. Compter uniquement sur la surblouse pour traiter le brassard.
- [ ] E. Considérer les gants comme une compensation du matériel contaminé.

Q97 Difficile

Le sachet stérile préparé pour un soin tombe au sol. Quelle décision respecte le raisonnement de sécurité ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Passer une SHA sur le sachet pour restaurer sa stérilité.
- [ ] B. L'écarter du soin et prendre un matériel conforme selon la procédure.
- [ ] C. Utiliser le contenu si le sachet paraît seulement poussiéreux.
- [ ] D. Omettre l'écart puisqu'il n'y a pas encore eu d'infection.
- [ ] E. Raccourcir l'antisepsie pour compenser le temps perdu.

Q98 Difficile

Avant un soin invasif, quels axes doivent être croisés ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Le patient, son terrain et le site concerné.
- [ ] B. Le dispositif, son statut et son circuit.
- [ ] C. Le geste, le produit et leurs conditions d'emploi.
- [ ] D. Le seul aspect visuellement propre du matériel.
- [ ] E. Le seul nombre de protections portées.

Distinctions et situations complémentaires

Q99 — Moyen

Pourquoi distinguer virus nus et enveloppés pour un procédé de traitement ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Leur structure peut modifier leur sensibilité.
- [ ] B. Tous les produits agissent de façon identique sur tous les virus.
- [ ] C. Le spectre revendiqué doit être vérifié.
- [ ] D. Un virus nu est toujours plus fragile qu'un virus enveloppé.
- [ ] E. L'aspect clair de la solution prouve son activité virucide.

Q100 — Difficile

Une situation de gale ou d'infection à C. difficile est signalée. Quel raisonnement est adapté ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Maintenir le socle des précautions standard.
- [ ] B. Vérifier les consignes propres à l'agent pour les mains et l'environnement.
- [ ] C. Considérer la FHA seule comme réponse universelle.
- [ ] D. Supposer que tout protocole contact est identique.
- [ ] E. Choisir la filière des déchets sans tenir compte du protocole.

Q101 — Moyen

Avant d'entrer dans une chambre en précautions air, quelles actions sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Vérifier son ajustement et respecter les consignes de porte.
- [ ] B. Laisser la porte ouverte pour compenser un masque mal ajusté.
- [ ] C. Choisir seul le réglage technique de renouvellement d'air.
- [ ] D. Mettre le FFP2 seulement après avoir commencé le soin.
- [ ] E. Mettre la protection respiratoire requise avant l'entrée.

Q102 — Moyen

Quel raisonnement correspond au contact d'une muqueuse par un DM ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Il devient non critique dès qu'il est thermosensible.
- [ ] B. Le traitement exact doit être validé pour ce dispositif.
- [ ] C. Il relève du niveau semi-critique dans cette classification.
- [ ] D. Il peut être remis en service après tout nettoyage superficiel.
- [ ] E. Le caractère semi-critique autorise une décision libre de produit.

Q103 **Quelles distinctions entre formes liées aux légionelles sont correctes ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. La fièvre de Pontiac est décrite comme non pneumonique et bénigne.
- [ ] B. L'immunodépression rend toute pneumonie sans gravité.
- [ ] C. La maladie des légionnaires peut comporter une pneumonie fébrile.
- [ ] D. Le seul nom de la forme remplace l'évaluation du patient.
- [ ] E. Ces deux formes impliquent toujours la même gravité.

Q104 **Un filtre terminal est installé sur un point d'eau. Quelles règles restent nécessaires ? (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Lever toutes les restrictions sans décision du circuit compétent.
- [ ] B. Autoriser par principe toute eau filtrée à tout usage.
- [ ] C. Respecter les usages autorisés et le circuit de surveillance.
- [ ] D. Vérifier adaptation, installation et échéance du filtre.
- [ ] E. Considérer tout filtre comme permanent et sans entretien.

IAS : clinique et dispositifs

Q105 **Un prélèvement nasal retrouve un SARM sans signe infectieux. Que retenir ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Il peut s'agir d'une colonisation.
- [ ] B. La personne ne peut transmettre aucune bactérie.
- [ ] C. Les précautions standard restent nécessaires.
- [ ] D. Le prélèvement suffit à prouver une infection générale.
- [ ] E. Une antibiothérapie est toujours obligatoire.

Q106 **Une infection est liée à un sondage urinaire effectué à domicile. Comment la classer ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Elle est communautaire par le seul fait du domicile.
- [ ] B. Elle peut être associée aux soins.
- [ ] C. Elle est forcément nosocomiale.
- [ ] D. Le lien avec le sondage doit être évalué.
- [ ] E. Le lieu suffit à exclure tout rôle des soins.

Q107 **Chez un patient sondé, quelles conclusions sont justes ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une bactériurie prouve toujours une infection symptomatique.
- [ ] B. La durée de sondage ne modifie pas le risque.
- [ ] C. Le système clos élimine tout risque infectieux.
- [ ] D. Une indication doit être réévaluée chaque jour.
- [ ] E. La clinique compte pour interpréter l'ECBU.

Q108 **Quels mécanismes peuvent contaminer une sonde urinaire ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Migration le long de sa surface externe.
- [ ] B. Remontée dans sa lumière en cas de circuit contaminé.
- [ ] C. Contamination hématogène, plus rarement.
- [ ] D. La valve antireflux stérilise définitivement le méat.
- [ ] E. Le ballonnet détruit les bactéries.

Q109 **Quelles mesures protègent le drainage urinaire ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Remonter systématiquement le collecteur au-dessus de la vessie.
- [ ] B. Maintenir la poche en position déclive.
- [ ] C. Ouvrir le circuit à chaque contrôle.
- [ ] D. Éviter les coudes et les tractions.
- [ ] E. Prélever uniquement dans la poche pour tout ECBU.

Q110 **Quels facteurs favorisent les micro-inhalations ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Troubles de déglutition.
- [ ] B. Altération de la conscience.
- [ ] C. Sédation profonde.
- [ ] D. Une protection garantie par le simple port de gants.
- [ ] E. Un risque nul dès qu'une sonde d'intubation est présente.

Q111 **Concernant la prévention des pneumopathies du patient ventilé : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Les soins de bouche participent à la prévention.
- [ ] B. Toute texture convient à toute personne dysphagique.
- [ ] C. Une demi-assise à 30–45° peut être utile en l'absence de contre-indication.
- [ ] D. 20–30 mmHg est strictement identique à 20–30 cmH2O.
- [ ] E. L'hygiène des mains devient inutile sur matériel initialement stérile.

Q112 **Quelles catégories décrivent la profondeur d'une ISO ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Infection communautaire et infection vaccinale.
- ☐ B. Infection superficielle de l'incision.
- ☐ C. Infection profonde de l'incision.
- ☐ D. Infection d'organe ou d'espace.
- ☐ E. Infection obligatoirement limitée à la peau.

Q113 **Quelle lecture des délais d'ISO est correcte ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Une fenêtre de surveillance exclut toute infection clinique ultérieure.
- ☐ B. Le lien avec l'intervention reste à rechercher après la sortie.
- ☐ C. Le délai d'un an avec implant est une règle universelle de tout programme actuel.
- ☐ D. Les programmes actuels peuvent utiliser 30 ou 90 jours selon l'intervention.
- ☐ E. Une douleur et de la fièvre tardives doivent toujours être ignorées.

Q114 **Comment prévenir une infection du site opératoire ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Respecter la préparation cutanée.
- ☐ B. Raser à la lame tout patient sans indication.
- ☐ C. Surveiller la plaie après la sortie.
- ☐ D. Transformer toute rougeur en diagnostic certain.
- ☐ E. Rechercher aussi un foyer infectieux à distance.

Q115 **Quels énoncés décrivent le PICC et la CCI ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Un PICC possède une extrémité centrale.
- ☐ B. Un PICC est forcément un CVP court.
- ☐ C. Une CCI est une chambre sous-cutanée reliée à un cathéter central.
- ☐ D. Une CCI se ponctionne avec n'importe quelle aiguille.
- ☐ E. La position périphérique de la ponction prouve une extrémité périphérique.

Q116 **Concernant une suspicion d'infection de cathéter : (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. La fièvre prouve toujours que le cathéter est responsable.
- ☐ B. Les hémocultures appariées se prélèvent dans des conditions comparables.
- ☐ C. Une positivité centrale au moins deux heures avant la périphérie est un argument.
- ☐ D. Un écart inférieur exclut formellement le cathéter.
- ☐ E. La décision de retrait relève du contexte et de l'évaluation médicale.

Vaccination : mécanismes

Q117 **Quelles propositions décrivent la mémoire vaccinale ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Elle rend la protection immédiate après toute injection.
- ☐ B. Elle prépare une réponse ultérieure plus rapide.
- ☐ C. Elle supprime tout besoin de rappel, quel que soit le vaccin.
- ☐ D. Elle implique des lymphocytes spécifiques mémoire.
- ☐ E. Elle confère une protection identique contre tous les microbes.

Q118 **Quelles associations sont exactes ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Lymphocyte B différencié en plasmocyte : anticorps.
- ☐ B. Tous les lymphocytes T sécrètent des anticorps.
- ☐ C. Réponse humorale : anticorps.
- ☐ D. Cellule mémoire : bactérie atténuée persistante.
- ☐ E. Immunogénicité : capacité à produire une réponse immune.

Q119 **Quelles caractéristiques distinguent vaccins inertes et vivants ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Un vaccin inactivé se multiplie pour provoquer l'infection ciblée.
- ☐ B. Le ROR est un vaccin vivant atténué.
- ☐ C. Tous les vaccins inactivés possèdent obligatoirement un adjuvant.
- ☐ D. Les vivants demandent des précautions en cas d'immunodépression.
- ☐ E. La grossesse autorise indistinctement tous les vaccins vivants.

Q120 **À propos de l'ARNm vaccinal : (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Il fournit une instruction temporaire de production d'antigène.
- ☐ B. Il est traduit dans le cytoplasme.
- ☐ C. Il modifie obligatoirement les chromosomes du patient.
- ☐ D. Il constitue nécessairement un virus vivant complet.
- ☐ E. Sa dégradation est impossible.

Q121 **Quel rôle ont les composants d'un vaccin ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Le diluant et l'antigène sont toujours la même chose.
- ☐ B. Un adjuvant renforce la réponse à l'antigène.
- ☐ C. Un stabilisant protège la formulation.
- ☐ D. Tous les composants ont pour rôle de provoquer une allergie.
- ☐ E. La composition doit être vérifiée pour un antécédent de réaction sévère.

Vaccination : stratégies et pratique

Q122 **Protection directe et indirecte : que retenir ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Le vaccin antitétanique repose surtout sur l'immunité collective.
- [ ] B. La protection directe concerne la personne vaccinée.
- [ ] C. Une protection indirecte peut réduire la transmission vers des personnes fragiles.
- [ ] D. Tout vaccin supprime toute transmission.
- [ ] E. Le réservoir environnemental du tétanos persiste.

Q123 **Dans le modèle simple du seuil 1 − 1/R0 : (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. R0 décrit les cas secondaires en population entièrement susceptible.
- [ ] B. Un R0 plus élevé demande un seuil théorique plus élevé.
- [ ] C. Le seuil garantit l'absence de toute épidémie réelle.
- [ ] D. Couverture vaccinale et immunisation réelle sont toujours identiques.
- [ ] E. Les hypothèses du modèle doivent être précisées.

Q124 **Quelle lecture du calendrier vaccinal est juste ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une dose manquée impose toujours de tout recommencer.
- [ ] B. Il faut consulter sa version actualisée.
- [ ] C. Les vaccins du nourrisson ne concernent pas le tétanos.
- [ ] D. Le rattrapage tient compte des doses déjà reçues.
- [ ] E. Un projet d'obligation orale est un texte déjà applicable.

Q125 **Pour les compétences vaccinales infirmières élargies : (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Prescription et administration désignent exactement le même acte.
- [ ] B. Le cadre concerne notamment les personnes de 11 ans et plus.
- [ ] C. Les conditions de formation et de déclaration doivent être respectées.
- [ ] D. Tout IDE peut prescrire sans restriction un vivant à un immunodéprimé.
- [ ] E. Il faut vérifier l'indication et les contre-indications avant l'acte.

Q126 **Quelles situations sont des contre-indications à distinguer ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Un rhume des foins interdit tout vaccin.
- [ ] B. Une maladie bénigne impose toujours un report.
- [ ] C. Une réaction sévère à un composant justifie une évaluation ciblée.
- [ ] D. Un vaccin vivant peut être contre-indiqué chez un immunodéprimé.
- [ ] E. Toute personne immunodéprimée ne peut recevoir aucun vaccin inerte.

Q127 **Après une injection vaccinale : (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une douleur locale peut être une réaction mineure.
- [ ] B. L'absence de fièvre prouve l'échec vaccinal.
- [ ] C. Une réaction respiratoire et circulatoire peut évoquer une anaphylaxie.
- [ ] D. Une rougeur locale isolée est toujours une anaphylaxie.
- [ ] E. L'anaphylaxie exige une prise en charge urgente.

Q128 **Quels principes gouvernent la pharmacovigilance vaccinale ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Elle s'arrête lors de l'autorisation de commercialisation.
- [ ] B. Un signal suffit toujours à prouver la causalité.
- [ ] C. Elle recherche notamment des événements rares après commercialisation.
- [ ] D. Les autorités peuvent réévaluer les recommandations.
- [ ] E. La fréquence d'un effet ne demande aucun dénominateur.

Corrigés argumentés

Agents, IAS et transmission

Q01 — Réponses : A, C. A - Vrai. La structure cellulaire caractérise la bactérie. B - Faux. Virus et champignons constituent d'autres familles. C - Vrai. Il utilise les fonctions de la cellule infectée. D - Faux. Cocci et bacilles décrivent seulement des formes. E - Faux. Il existe aussi des virus nus, sans enveloppe.

Q02 — Réponses : A, B, C. A - Vrai. Elle peut notamment appartenir au microbiote intestinal. B - Vrai. Ses spores peuvent être dispersées dans l'air. C - Vrai. Il appartient à la famille des champignons. D - Faux. La grippe est une infection virale. E - Faux. C'est un agent transmissible non conventionnel protéique.

Q03 — Réponses : A, C. A - Vrai. Une diminution des défenses peut favoriser l'infection. B - Faux. Le caractère opportuniste exclut cette garantie. C - Vrai. L'accès à un site protégé change la situation. D - Faux. Des bactéries ou champignons peuvent être opportunistes. E - Faux. Exposition et infection ne sont pas équivalentes.

Q04 — Réponses : C. A - Faux. L'accès au sang constitue un changement majeur de site. B - Faux. Un changement de site peut le rendre pathogène. C - Vrai. Le milieu peut être cutané, intestinal ou oropharyngé. D - Faux. L'asepsie ne consiste pas à éradiquer tous les microbiotes. E - Faux. La présence habituelle ne signifie pas maladie.

Q05 — Réponses : B, D. A - Faux. La résistance ne définit pas une IAS. B - Vrai. L'association aux soins est un élément essentiel. C - Faux. D'autres lieux de soins sont concernés. D - Vrai. Une infection déjà incubée n'est pas attribuée automatiquement aux soins. E - Faux. Elle peut être révélée après la prise en charge.

Q06 — Réponses : A, E. A - Vrai. Le repère temporel ne remplace pas l'analyse clinique. B - Faux. Une révélation tardive peut rester liée aux soins. C - Faux. Son origine ne se décide pas uniquement à 48 heures. D - Faux. Une infection peut avoir incubé avant l'admission. E - Vrai. La chronologie seule ne prouve pas l'origine.

Q07 — Réponses : C. A - Faux. Le lieu de révélation ne définit pas son acquisition. B - Faux. Colonisation, résistance et infection sont distinctes. C - Vrai. Nosocomiale précise le cadre d'acquisition. D - Faux. Le contexte et le lien doivent être établis. E - Faux. La gravité ne fait pas partie de cette définition.

Corrigés argumentés — suite

Q08 — Réponses : A, C. A - Vrai. Il faut préciser le dénominateur utilisé. B - Faux. Le dénominateur conditionne l'interprétation. C - Vrai. Elle nécessite une population ou un temps d'exposition défini. D - Faux. Une association populationnelle n'est pas une prédiction personnelle. E - Faux. Elles ne portent pas sur le même objet temporel.

Q09 — Réponses : D. A - Faux. Cette source est extérieure au patient exposé. B - Faux. Asepsie et maîtrise des dispositifs peuvent interrompre cette chaîne. C - Faux. La source décrite est le réseau d'eau. D - Vrai. L'agent provient du propre microbiote du patient. E - Faux. Le réservoir est environnemental, donc exogène.

Q10 — Réponses : B, E. A - Faux. Des voies respiratoires, cutanées ou invasives existent. B - Vrai. La réceptivité influence le risque. C - Faux. Présence, exposition et infection sont distinctes. D - Faux. Environnement et portage asymptomatique peuvent être impliqués. E - Vrai. L'agent doit pouvoir atteindre un site accessible.

Q11 — Réponses : A, E. A - Vrai. L'intermédiaire relie deux personnes séparées. B - Faux. Le dispositif nécessite son propre entretien compatible. C - Faux. Les contacts indirects font aussi partie des voies. D - Faux. Les gants ne traitent pas le matériel. E - Vrai. Le matériel peut servir d'intermédiaire contaminé.

Q12 — Réponses : C. A - Faux. Le résultat ne désigne pas à lui seul le réservoir. B - Faux. Une infection est possible selon le contexte. C - Vrai. Le résultat isolé ne suffit pas à affirmer une infection. D - Faux. Le portage ou une contamination doivent être distingués. E - Faux. La culture urinaire ne mesure pas cette sensibilité.

Prévention coordonnée et dispositifs invasifs

Q13 — Réponses : A, B, C. A - Vrai. Éviter une exposition inutile réduit des occasions de contamination. B - Vrai. Elles constituent le socle commun des soins. C - Vrai. Ces actions complètent les mesures de transmission. D - Faux. Une protection isolée ne couvre pas tous les risques. E - Faux. Les PS s'appliquent indépendamment du statut connu.

Q14 — Réponses : A, D. A - Vrai. L'indication relève d'un raisonnement collectif adapté. B - Faux. La rupture de barrière persiste malgré son inutilisation. C - Faux. La balance bénéfice-risque doit être réévaluée. D - Vrai. Le maintien doit rester justifié par le besoin. E - Faux. La multiplication des voies doit avoir une indication.

Corrigés argumentés — suite

Q15 — Réponses : C, D, E. A - Faux. Une anomalie locale mérite une évaluation précoce. B - Faux. L'observation clinique reste nécessaire. C - Vrai. Ils peuvent témoigner d'une complication locale. D - Vrai. Le ressenti du patient participe à la surveillance. E - Vrai. La sécurité de la voie doit être réévaluée.

Q16 — Réponses : D, E. A - Faux. Forcer peut poursuivre un geste non sûr. B - Faux. Plusieurs complications peuvent expliquer ces signes. C - Faux. La sécurité immédiate doit être réévaluée. D - Vrai. Une information située aide à décider de la conduite. E - Vrai. Une résistance associée à une douleur est une anomalie.

Q17 — Réponses : A, D. A - Vrai. Un foyer local peut s'accompagner d'une bactériémie. B - Faux. L'absence d'un signe n'exclut pas une complication. C - Faux. Le caractère périphérique n'annule pas le risque systémique. D - Vrai. La diffusion peut entraîner des complications graves. E - Faux. Une infection ne confère pas cette protection.

Q18 — Réponses : A, D. A - Vrai. On évite de manipuler du sale au milieu du propre. B - Faux. De nouvelles indications peuvent survenir pendant le soin. C - Faux. L'exposition inutile fragilise la maîtrise du champ. D - Vrai. Cela limite les interruptions et contacts imprévus. E - Faux. Une rupture nécessite de rétablir la sécurité.

Q19 — Réponses : E. A - Faux. Le statut et le cadre applicable doivent être vérifiés. B - Faux. La protection vaccinale est spécifique. C - Faux. La vaccination ne couvre pas tous les risques. D - Faux. Les repères datés ne valent pas actualisation générale. E - Vrai. Elle participe à une stratégie coordonnée.

Q20 — Réponses : B, E. A - Faux. Agent, contexte et sensibilité doivent être interprétés. B - Vrai. Cette action dépend du produit et des conditions. C - Faux. Les cibles bactériennes ne sont pas celles des virus. D - Faux. Elle peut exercer une pression de sélection. E - Vrai. L'inhibition ne signifie pas nécessairement destruction immédiate.

Q21 — Réponses : C. A - Faux. Un retard peut laisser persister un risque. B - Faux. La formule ne décrit ni anomalie ni décision. C - Vrai. Ces éléments rendent le message exploitable. D - Faux. Le ressenti du patient est une donnée pertinente. E - Faux. Les observations doivent rester distinctes de l'interprétation.

Corrigés argumentés — suite

Q22 — Réponses : A, E. A - Vrai. Un calendrier n'exclut pas une complication plus précoce. B - Faux. Les anomalies imposent une évaluation immédiate adaptée. C - Faux. La destination et les conditions d'emploi diffèrent. D - Faux. Retirer les conditions change le sens de la règle. E - Vrai. Un repère local ne se transpose pas automatiquement.

Précautions standard et sécurité des gestes

Q23 — Réponses : C, E. A - Faux. La résistance connue n'est pas une condition. B - Faux. La prévention doit précéder cette information. C - Vrai. Le socle ne dépend pas d'un diagnostic préalable. D - Faux. D'autres contacts exposent aussi à une transmission. E - Vrai. Le principe dépasse le seul hôpital.

Q24 — Réponses : A, C, E. A - Vrai. L'équipement doit répondre à ce risque. B - Faux. La disponibilité ne constitue pas une indication. C - Vrai. La protection inclut aussi l'organisation. D - Faux. L'absence de diagnostic n'exclut pas l'exposition. E - Vrai. Le type de geste détermine l'exposition.

Q25 — Réponses : A, C, D. A - Vrai. On limite l'apport d'une contamination au patient. B - Faux. Les indications se répètent selon les contacts. C - Vrai. La protection du soignant et de l'environnement compte. D - Vrai. Le site à protéger impose cette indication. E - Faux. Des contaminations ne sont pas visibles.

Q26 — Réponses : C, E. A - Faux. L'information connue ne couvre pas toutes les situations. B - Faux. D'autres contaminations sont possibles. C - Vrai. L'environnement peut porter des micro-organismes. D - Faux. Le retrait ne garantit pas des mains propres. E - Vrai. Le contact peut contaminer les mains.

Q27 — Réponses : B, C, E. A - Faux. Les mains doivent être préparées et sèches. B - Vrai. Les bijoux gênent une technique complète. C - Vrai. Ces éléments compromettent les prérequis enseignés. D - Faux. L'absence de bijoux inclut l'alliance. E - Vrai. Ils facilitent l'accès aux surfaces à traiter.

Q28 — Réponses : C, D. A - Faux. Une souillure impose un nettoyage adapté. B - Faux. Des situations particulières nécessitent des consignes adaptées. C - Vrai. Quantité, technique et temps conditionnent l'efficacité. D - Vrai. Les conditions de surface permettent une friction correcte. E - Faux. La durée et le séchage font partie de la technique.

Corrigés argumentés — suite

Q29 — Réponses : A, D, E. A - Vrai. Une simple friction paume contre paume ne suffit pas. B - Faux. La quantité ne remplace pas les mouvements adaptés. C - Faux. Ils ne remplacent pas la préparation des mains. D - Vrai. Le contact avec le produit doit être complet. E - Vrai. Ils doivent être frictionnés comme les autres surfaces.

Q30 — Réponses : A, B. A - Vrai. Le téléphone constitue un contact intermédiaire. B - Vrai. La première friction ne couvre pas tous les contacts suivants. C - Faux. La FHA des mains ne traite pas l'objet. D - Faux. Les gants ne remplacent pas l'hygiène requise. E - Faux. Son bénéfice peut être perdu après recontamination.

Q31 — Réponses : A, B, E. A - Vrai. Cette situation nécessite une protection adaptée. B - Vrai. La protection répond à une exposition biologique. C - Faux. Ce geste n'impose pas des gants par principe. D - Faux. L'entrée seule ne définit pas l'exposition. E - Vrai. Ces contacts font partie des indications.

Q32 — Réponses : A, C, E. A - Vrai. Le maintien favorise les contacts contaminants. B - Faux. Les surfaces et stocks pourraient être contaminés. C - Vrai. La progression doit éviter de recontaminer un site. D - Faux. Elle n'est pas retraitée pour être réutilisée. E - Vrai. Une paire peut transmettre des agents au suivant.

Q33 — Réponses : C. A - Faux. Les indications des mains restent applicables. B - Faux. Un gant stérile peut être contaminé. C - Vrai. Un contact non stérile compromet cette propriété. D - Faux. L'asepsie concerne toute la séquence. E - Faux. Le téléphone n'est pas un élément stérile.

Q34 — Réponses : A, E. A - Vrai. Son choix dépend de l'importance du risque. B - Faux. La protection des mains ne couvre pas le vêtement. C - Faux. Un empilement peut compliquer le retrait. D - Faux. Elle doit être retirée après la séquence prévue. E - Vrai. Il protège la zone antérieure exposée.

Q35 — Réponses : C, D. A - Faux. Les contacts avec sa face exposée doivent être évités. B - Faux. Les gants ne couvrent pas cette exposition. C - Vrai. Le visage et les yeux sont exposés. D - Vrai. Les fonctions des protections restent distinctes. E - Faux. Elles ne remplacent pas une protection oculaire adaptée.

Q36 — Réponses : B, D, E. A - Faux. Le mouchoir usagé doit être éliminé. B - Vrai. Éviter la paume limite le manuportage. C - Faux. Les mesures initiales répondent aux symptômes. D - Vrai. Limiter l'émission fait partie de la prévention. E - Vrai. Le risque de contact complète le risque respiratoire.

Corrigés argumentés — suite

Q37 — Réponses : A, C, E. A - Vrai. La sécurité dépend aussi de leur activation prévue. B - Faux. La sécurisation et l'élimination ne doivent pas être différées. C - Vrai. Un collecteur surchargé expose à des accidents. D - Faux. Le recapuchonnage ajoute une manipulation exposante. E - Vrai. L'élimination immédiate devient réalisable.

Q38 — Réponses : D, E. A - Faux. Le délai peut compromettre la prise en charge. B - Faux. Une projection oculaire impose un rinçage adapté. C - Faux. Ce geste n'est pas recommandé dans la conduite enseignée. D - Vrai. Peau lésée et muqueuse ne se traitent pas identiquement. E - Vrai. L'évaluation et un éventuel traitement sont urgents.

Q39 — Réponses : A, E. A - Vrai. Le contenant ne doit pas exposer les personnes. B - Faux. Ils doivent rester protégés de la contamination. C - Faux. Cette manipulation peut contaminer le vêtement. D - Faux. La poche n'est pas un conditionnement de transport. E - Vrai. Cela limite la dispersion et les contacts souillants.

Q40 — Réponses : B, C, D. A - Faux. Le type de produit et le circuit doivent être distingués. B - Vrai. Ils exposent les personnes qui manipulent les déchets. C - Vrai. Ils ne se résument pas au seul risque infectieux. D - Vrai. Le risque et la nature déterminent la filière. E - Faux. Le tri protège l'ensemble de la chaîne.

Q41 — Réponses : A, B. A - Vrai. Projections et dispersion contaminent l'environnement. B - Vrai. Le traitement ne s'improvise pas au lavabo. C - Faux. La force du jet n'est pas un procédé validé. D - Faux. Elle impose de signaler et d'utiliser l'alternative validée. E - Faux. Un statut inconnu n'exclut pas les agents.

Q42 — Réponses : D, E. A - Faux. L'exposition biologique reste présente. B - Faux. Ce lieu et cette méthode créent une contamination. C - Faux. La panne ne supprime pas les besoins de gestion. D - Vrai. Le circuit doit pouvoir être sécurisé et rétabli. E - Vrai. Un système à usage unique peut être prévu localement.

Précautions complémentaires et résistances

Q43 — Réponses : E. A - Faux. La protection respiratoire dépend du risque concerné. B - Faux. L'information permet leur compréhension et application. C - Faux. Il faut connaître l'objectif et les consignes concrètes. D - Faux. Le socle reste applicable. E - Vrai. Elles répondent à une situation ou transmission particulière.

Corrigés argumentés — suite

Q44 — Réponses : A, C, E. A - Vrai. Les contacts environnementaux participent à la chaîne. B - Faux. Limiter les stocks facilite leur maîtrise. C - Vrai. Il faut maîtriser les intermédiaires partagés. D - Faux. Ils peuvent diffuser la contamination à l'extérieur. E - Vrai. Les mesures doivent se poursuivre dans le circuit.

Q45 — Réponses : B, C. A - Faux. Les besoins de soins restent à organiser. B - Vrai. Les points de contamination potentiels sont maîtrisés. C - Vrai. La continuité de prévention doit être anticipée. D - Faux. Le socle suit le patient dans les différents lieux. E - Faux. L'équipe suivante doit connaître les précautions utiles.

Q46 — Réponses : E. A - Faux. Un portage peut être asymptomatique. B - Faux. Résistance thérapeutique et virulence sont distinctes. C - Faux. La définition porte sur les antibiotiques. D - Faux. La résistance ne définit pas la voie de transmission. E - Vrai. Les possibilités de traitement peuvent être réduites.

Q47 — Réponses : A, B. A - Vrai. La recherche de colonisation a cet objectif. B - Vrai. La clinique et l'indication doivent être interprétées. C - Faux. La prévention de transmission peut rester nécessaire. D - Faux. Ils répondent à des questions différentes. E - Faux. Cette succession prolongée n'est pas universelle.

Q48 — Réponses : A, B, D. A - Vrai. Il s'agit d'un exemple de BMR. B - Vrai. La carbapénémase est un mécanisme de résistance. C - Faux. Le sigle désigne une bêta-lactamase à spectre étendu. D - Vrai. Le sigle décrit cette résistance particulière. E - Faux. La définition concerne des résistances émergentes particulières.

Q49 — Réponses : A, C. A - Vrai. Des bactéries résistantes peuvent alors persister. B - Faux. La sélection n'est pas un mécanisme intentionnel. C - Vrai. Il agit sur un autre maillon du problème. D - Faux. Sélection et diffusion sont des phénomènes distincts. E - Faux. Une exposition injustifiée peut exercer cette pression.

Q50 — Réponses : E. A - Faux. L'interprétation nécessite des critères et un contexte. B - Faux. Le résultat distingue des sensibilités. C - Faux. La sensibilité ne remplace pas le diagnostic. D - Faux. Les produits et objectifs évalués sont différents. E - Vrai. Le laboratoire interprète le résultat selon ses critères.

Q51 — Réponses : B, C. A - Faux. Le dossier ne remplace pas l'évaluation actuelle. B - Vrai. Une alerte doit être contextualisée. C - Vrai. Le risque doit être évalué avec les personnes compétentes. D - Faux. Un portage peut être asymptomatique. E - Faux. Le mode de transmission doit être identifié.

Corrigés argumentés — suite

Q52 — Réponses : D, E. A - Faux. Elle ne possède pas sa fonction de filtration ajustée. B - Faux. Les fuites compromettent l'efficacité attendue. C - Faux. Geste et contexte d'exposition comptent aussi. D - Vrai. Il a aussi un rôle contre certaines projections. E - Vrai. Son ajustement au visage est déterminant.

Q53 — Réponses : B, E. A - Faux. Le geste et le protocole déterminent les EPI. B - Vrai. L'immunodépression peut augmenter la gravité d'une exposition. C - Faux. La tenue ne désinfecte pas les dispositifs. D - Faux. L'objectif principal est ici de protéger le patient. E - Vrai. La protection dépend de plusieurs voies.

Q54 — Réponses : C, D. A - Faux. Un nom d'espèce ne détermine pas les EPI. B - Faux. Elles constituent toujours le socle. C - Vrai. La transmission évaluée guide les mesures. D - Vrai. Le nom seul ne résume pas la situation. E - Faux. La présence ne suffit pas à affirmer une infection à traiter.

Asepsie et antisepsie

Q55 — Réponses : B, E. A - Faux. Cette définition ne couvre pas l'ensemble de l'asepsie. B - Vrai. Le raisonnement concerne toute la séquence. C - Faux. Le vivant n'est pas traité comme un instrument. D - Faux. L'antisepsie est une composante possible de l'asepsie. E - Vrai. Ces éléments peuvent introduire une contamination.

Q56 — Réponses : B, E. A - Faux. Destination et tolérance sont différentes. B - Vrai. Objet ou surface suivent des conditions adaptées. C - Faux. La solution pour les mains n'est pas universelle. D - Faux. Le résultat dépend de conditions et peut être momentané. E - Vrai. Le produit doit respecter la tolérance du tissu.

Q57 — Réponses : A, B, C. A - Vrai. La présentation et l'indication restent à vérifier. B - Vrai. La famille ne suffit pas à déterminer le site. C - Vrai. La formulation doit ensuite être précisée. D - Faux. Formulation et concentration influencent l'emploi. E - Faux. Un antiseptique n'est pas tout produit chloré.

Q58 — Réponses : B, C. A - Faux. Le mélange de produits n'est pas une optimisation autorisée. B - Vrai. Une forme lavante ne s'utilise pas comme tout badigeon. C - Vrai. Les fonctions et modalités d'application peuvent différer. D - Faux. Un nom commun ne remplace pas les conditions d'emploi. E - Faux. Le choix doit porter sur le produit réel.

Corrigés argumentés — suite

Q59 — Réponses : A, B. A - Vrai. La situation ne se transpose pas depuis l'adulte. B - Vrai. La tolérance dépend de ces conditions. C - Faux. Le terrain néonatal impose des conditions particulières. D - Faux. L'activité seule ne définit pas un choix toléré. E - Faux. La présentation et les restrictions doivent être vérifiées.

Q60 — Réponses : C, D. A - Faux. Produits et mécanismes ne se confondent pas. B - Faux. Cette équivalence n'est pas justifiée. C - Vrai. Une réaction rapportée ne doit pas être ignorée. D - Vrai. L'évaluation doit partir d'informations concrètes. E - Faux. L'imprécision impose de clarifier, pas d'écarter.

Q61 — Réponses : A, C. A - Vrai. Propreté visible et préparation antiseptique sont distinctes. B - Faux. Le produit doit convenir aux tissus et au geste. C - Vrai. Il ne faut pas imposer une procédure universelle. D - Faux. Le nettoyage systématique n'est pas requis sur une peau visiblement propre. E - Faux. La peau possède une flore même lorsqu'elle paraît propre.

Q62 — Réponses : B, D. A - Faux. La technique doit éviter le retour du sale vers le propre. B - Vrai. La souillure doit être éliminée. C - Faux. Une quantité accrue ne remplace pas le nettoyage. D - Vrai. Les étapes préparent les conditions du produit suivant. E - Faux. Le souffle ne nettoie pas et peut contaminer.

Q63 — Réponses : C. A - Faux. Cela peut retirer prématurément le produit. B - Faux. Ce geste peut réintroduire une contamination. C - Vrai. Il participe aux conditions d'efficacité et de sécurité. D - Faux. Le contact et le séchage doivent être respectés. E - Faux. Une recontamination peut annuler la préparation.

Q64 — Réponses : C, E. A - Faux. Le contact peut contaminer l'embout. B - Faux. Le remplissage d'un flacon ouvert n'est pas sûr. C - Vrai. Le conditionnement doit rester protégé. D - Faux. L'association improvisée ne garantit ni efficacité ni tolérance. E - Vrai. Elle dépend de la présentation et de la notice.

Q65 — Réponses : A, E. A - Vrai. Un accès critique doit être protégé de l'apport manuel. B - Faux. Ce contact peut contaminer l'élément utilisé. C - Faux. Le repère local ne s'universalise pas. D - Faux. La contamination peut être invisible. E - Vrai. Friction, contact et séchage dépendent du connecteur.

Q66 — Réponses : A, E. A - Vrai. La rupture doit être identifiée et corrigée. B - Faux. La contamination ne se voit pas nécessairement. C - Faux. Les gants ne retraitent pas le site. D - Faux. Son résultat n'est pas une protection définitive. E - Vrai. L'antisepsie ne protège pas de tous les contacts ultérieurs.

Corrigés argumentés — suite

Dispositifs médicaux, retraitement et stérilisation

Q67 — Réponses : A. A - Vrai. Le dispositif ne rejoint pas le retraitement ordinaire pour réutilisation. B - Faux. La propreté visible n'autorise pas sa remise en circulation. C - Faux. C'est l'utilisation du dispositif qui est visée. D - Faux. Une désinfection ne change pas son statut. E - Faux. Usage unique et stérilité sont deux caractéristiques distinctes.

Q68 — Réponses : C. A - Faux. Le niveau de risque ne supprime pas l'entretien adapté. B - Faux. Ce contact appartient au niveau critique. C - Vrai. Ce contact définit la catégorie non critique. D - Faux. Le contact muqueux relève du raisonnement semi-critique. E - Faux. L'accès vasculaire est critique.

Q69 — Réponses : A, B. A - Vrai. Les exceptions éventuelles relèvent de procédures spécialisées. B - Vrai. Le risque impose un niveau de traitement élevé. C - Faux. La destination prime sur le matériau seul. D - Faux. Le procédé ne se décide pas à convenance au lit. E - Faux. Il s'agit alors d'un autre niveau de risque.

Q70 — Réponses : B, D. A - Faux. La compatibilité thermique doit être respectée. B - Vrai. Leur destination ou usage unique peut différer. C - Faux. Le circuit doit être anticipé et démarrer sans retard évitable. D - Vrai. La seule thermosensibilité ne détermine pas le procédé. E - Faux. Le niveau requis ne dépend pas de la préférence individuelle.

Q71 — Réponses : D, E. A - Faux. Ils relèvent de procédures spécifiques. B - Faux. Ces résistances ne sont pas équivalentes. C - Faux. La présence d'une enveloppe peut modifier leur sensibilité. D - Vrai. Une famille de produit ne garantit pas toutes les activités. E - Vrai. Elles ne s'éliminent pas comme toutes les formes végétatives.

Q72 — Réponses : B, D, E. A - Faux. La compatibilité doit être vérifiée. B - Vrai. Le matériel souillé expose les manipulateurs. C - Faux. Le traitement final reste nécessaire. D - Vrai. Des dépôts secs compliquent le nettoyage ultérieur. E - Vrai. Le prétraitement prépare la suite sans la remplacer.

Q73 — Réponses : B, E. A - Faux. Leurs objectifs et niveaux de traitement diffèrent. B - Vrai. L'action mécanique et le produit adapté participent à cette étape. C - Faux. La concentration ne remplace pas l'élimination des souillures. D - Faux. Un procédé validé dépend de la chaîne préalable. E - Vrai. Le traitement doit atteindre les surfaces concernées.

Corrigés argumentés — suite

Q74 — Réponses : A, B. A - Vrai. Le mode d'application dépend de la compatibilité. B - Vrai. La méthode doit traiter les surfaces sans dégrader le DM. C - Faux. Les surfaces de contact peuvent être contaminées sans trace. D - Faux. La non-immersion doit être respectée. E - Faux. Ce produit n'est pas destiné à tous les matériels.

Q75 — Réponses : B, C. A - Faux. Cette pratique ne garantit pas les caractéristiques attendues. B - Vrai. L'état du bain conditionne son utilisation. C - Vrai. L'efficacité dépend de ces paramètres. D - Faux. Une surconcentration peut être inadaptée ou dangereuse. E - Faux. La stabilité dépend du produit et des conditions.

Q76 — Réponses : A, E. A - Vrai. Chaque log correspond à un facteur dix. B - Faux. Cycle et compatibilité doivent être validés. C - Faux. Un niveau probabiliste n'est pas un comptage individuel. D - Faux. Son résultat peut être suivi d'une recontamination. E - Vrai. Elle ne correspond pas à une fraction littérale de germe.

Q77 — Réponses : C, E. A - Faux. L'intégrité n'est pas le seul critère. B - Faux. L'ouverture compromet la protection du contenu. C - Vrai. La barrière doit rester intacte. D - Faux. La compression peut endommager le conditionnement. E - Vrai. Ces critères participent au maintien de l'état obtenu.

Q78 — Réponses : B, C. A - Faux. La traçabilité ne supprime pas les critères d'intégrité. B - Vrai. Les opérations doivent pouvoir être retrouvées. C - Vrai. Les identifiants rendent le circuit vérifiable. D - Faux. Les informations nécessaires dépendent du circuit de suivi. E - Faux. Une étiquette ne produit pas de désinfection.

Bionettoyage, air, travaux et eau

Q79 — Réponses : B, E. A - Faux. Vulnérabilité et activités diffèrent. B - Vrai. L'activité et les contacts déterminent les besoins. C - Faux. Elle peut déplacer une contamination. D - Faux. Les points fréquemment touchés peuvent être contaminés sans trace. E - Vrai. La progression ne doit pas recontaminer les zones traitées.

Corrigés argumentés — suite

Q80 — Réponses : D. A - Faux. La progression ne désinfecte pas le matériel. B - Faux. Le principe est plus large qu'un classement des chambres. C - Faux. Les contacts doivent rester maîtrisés à chaque étape. D - Vrai. Elle concerne personnes, matériel et circuits. E - Faux. On évite au contraire le retour contaminant vers le propre.

Q81 — Réponses : C, E. A - Faux. Elles sont des points de transmission importants. B - Faux. La surconcentration n'est pas une validation. C - Vrai. Le support et le produit doivent convenir. D - Faux. Le contexte peut modifier les exigences. E - Vrai. Une méthode locale ne couvre pas tous les usages.

Q82 — Réponses : A, C, D. A - Vrai. Ces travaux remettent des poussières en suspension. B - Faux. Une intervention brève peut aussi exposer. C - Vrai. Une intervention limitée peut exposer le secteur. D - Vrai. La taille apparente du chantier ne suffit pas. E - Faux. Le risque dépend de la production et du terrain.

Q83 — Réponses : C, D. A - Faux. Terrain et forme clinique doivent être distingués. B - Faux. Elles ne contrôlent pas l'exposition respiratoire. C - Vrai. Le terrain modifie l'expression de l'exposition. D - Vrai. La voie respiratoire est une porte d'entrée importante. E - Faux. C'est une moisissure environnementale.

Q84 — Réponses : A, D. A - Vrai. Les équipes compétentes doivent pouvoir intervenir. B - Faux. Elles n'empêchent pas la dispersion aérienne. C - Faux. Un passage peut compromettre le confinement. D - Vrai. Ils limitent l'exposition des secteurs de soins. E - Faux. La maîtrise de l'air relève d'une organisation compétente.

Q85 — Réponses : A, B, C. A - Vrai. L'eau peut véhiculer des agents entériques. B - Vrai. La voie décrite est respiratoire. C - Vrai. La barrière cutanée lésée permet une exposition. D - Faux. Boisson, soin et retraitement ont des exigences distinctes. E - Faux. La contamination peut être invisible.

Q86 — Réponses : A. A - Vrai. Les particules peuvent atteindre les alvéoles. B - Faux. Il faut une exposition pertinente. C - Faux. Une voie différente ne vaut pas autorisation d'usage. D - Faux. La source décrite est principalement environnementale. E - Faux. Cela ne décrit pas la transmission.

Q87 — Réponses : A, B, C. A - Vrai. Dépôts et bras morts favorisent la persistance. B - Vrai. La température fait partie de la maîtrise du réseau. C - Vrai. Les zones peu utilisées peuvent poser problème. D - Faux. La qualité demande les contrôles adaptés. E - Faux. L'état du réseau ne se résume pas à son apparence.

Corrigés argumentés — suite

Q88 — Réponses : A, D. A - Vrai. La purge appartient au plan du réseau. B - Faux. La purge ne constitue pas à elle seule un contrôle. C - Faux. Les modalités dépendent du plan applicable. D - Vrai. Il faut limiter projections et aérosols exposants. E - Faux. La remise en service suit le circuit compétent.

Q89 — Réponses : C, D. A - Faux. L'apparence ne prouve pas la conformité. B - Faux. Les interventions demandent une maîtrise technique. C - Vrai. Le soignant ne lève pas seul une restriction. D - Vrai. L'anomalie doit être évaluée par les équipes compétentes. E - Faux. Le signalement permet une prévention avant l'infection.

Q90 — Réponses : A, C, E. A - Vrai. L'organisation doit empêcher un usage dangereux. B - Faux. Terrain et conditions d'exposition doivent être considérés. C - Vrai. L'eau très chaude peut léser rapidement. D - Faux. Il relève d'une procédure technique coordonnée. E - Vrai. La remise en service doit rester maîtrisée.

Cas et décisions intégrées

Q91 — Réponses : C, D. A - Faux. Les gants de soin ne sont pas réutilisés ainsi. B - Faux. L'environnement contaminé doit aussi être pris en compte. C - Vrai. Le retrait ne garantit pas à lui seul des mains propres. D - Vrai. Leur maintien transporte la contamination. E - Faux. L'empilement ne corrige pas les surfaces déjà contaminées.

Q92 — Réponses : A, B, D. A - Vrai. Le point de manipulation peut être contaminé. B - Vrai. La présence préalable de la voie ne dispense pas de préparation. C - Faux. Le dispositif et la situation déterminent les modalités. D - Vrai. L'accès doit permettre une administration sûre. E - Faux. Le risque existe aussi entre manipulations.

Q93 — Réponses : D. A - Faux. La thermosensibilité et le procédé validé comptent. B - Faux. Le retraitement ne dépend pas seulement du statut connu. C - Faux. Le retard compromet la chaîne de traitement. D - Vrai. Il évite le séchage et facilite le nettoyage. E - Faux. Les surfaces et canaux demandent un traitement complet.

Q94 — Réponses : A, D. A - Vrai. L'accessoire peut avoir un niveau de risque différent. B - Faux. L'usage de l'accessoire doit être évalué séparément. C - Faux. Le contact peut atteindre un site ou tissu critique. D - Vrai. Le statut interdit un retraitement ordinaire pour réutilisation. E - Faux. Compatibilité et niveau requis sont déterminants.

Corrigés argumentés — suite

Q95 — Réponses : D, E. A - Faux. Une alerte absente ne prouve rien à elle seule. B - Faux. Le risque peut évoluer avec les informations cliniques. C - Faux. Le manuportage peut compléter la transmission respiratoire. D - Vrai. Les signes présents guident l'analyse. E - Vrai. La prévention ne doit pas attendre le logiciel.

Q96 — Réponses : A, B. A - Vrai. Les mesures protectrices sont organisées selon le terrain. B - Vrai. Le patient vulnérable doit être protégé des intermédiaires. C - Faux. L'objectif protecteur est distinct de l'isolement septique. D - Faux. Une tenue ne désinfecte pas le matériel. E - Faux. Les gants n'éliminent pas ce réservoir.

Q97 — Réponses : B. A - Faux. Cette action ne revalide pas le conditionnement. B - Vrai. La maîtrise du conditionnement n'est plus assurée. C - Faux. L'apparence seule ne garantit pas la conservation de stérilité. D - Faux. Le circuit doit être corrigé avant l'exposition. E - Faux. Une autre étape ne doit pas être sacrifiée.

Q98 — Réponses : A, B, C. A - Vrai. Ils conditionnent exposition et tolérance. B - Vrai. La destination détermine le niveau de traitement. C - Vrai. Une préparation correcte dépend de ces conditions. D - Faux. La propreté visible n'établit pas le niveau requis. E - Faux. Accumuler des EPI ne prouve pas la sécurité.

Distinctions et situations complémentaires

Q99 — Réponses : A, C. A - Vrai. L'enveloppe influence la réponse à certains produits. B - Faux. Le spectre et les conditions d'emploi diffèrent. C - Vrai. On ne déduit pas une activité universelle du seul nom du produit. D - Faux. La hiérarchie enseignée ne permet pas cette conclusion. E - Faux. L'apparence ne mesure pas l'efficacité.

Q100 — Réponses : A, B. A - Vrai. Les consignes spécifiques s'ajoutent au socle. B - Vrai. Des caractéristiques particulières modifient les mesures utiles. C - Faux. Certaines situations nécessitent des mesures adaptées supplémentaires. D - Faux. Spore, parasite et bactérie résistante ne sont pas équivalents. E - Faux. L'agent et l'organisation peuvent imposer des règles spécifiques.

Q101 — Réponses : A, E. A - Vrai. L'équipement et l'environnement agissent ensemble. B - Faux. Cela ne corrige ni les fuites ni la maîtrise du secteur. C - Faux. Ces paramètres relèvent du circuit technique compétent. D - Faux. L'exposition aurait déjà eu lieu. E - Vrai. La protection doit précéder l'exposition.

Corrigés argumentés — suite

Q102 — Réponses : B, C. A - Faux. La compatibilité thermique ne change pas sa destination. B - Vrai. La notice et le circuit déterminent les conditions. C - Vrai. La destination diffère du simple contact avec peau intacte. D - Faux. Le niveau de traitement requis doit être respecté. E - Faux. Le procédé n'est pas choisi à convenance.

Q103 — Réponses : A, C. A - Vrai. Elle se distingue de la maladie des légionnaires. B - Faux. Le terrain peut augmenter le risque de forme sévère. C - Vrai. Des signes digestifs ou neurologiques peuvent l'accompagner. D - Faux. La prise en charge dépend de la situation clinique. E - Faux. Leur expression clinique est différente.

Q104 — Réponses : C, D. A - Faux. Le filtre ne remplace pas cette autorisation. B - Faux. Qualité requise et terrain doivent être distingués. C - Vrai. La filtration s'intègre à une organisation de maîtrise. D - Vrai. Un dispositif de filtration a ses conditions d'emploi. E - Faux. Les conditions et changements prévus restent nécessaires.

IAS : clinique et dispositifs

Q105 — Réponses : A, C. A - Vrai. Le portage sans maladie attribuable correspond à une colonisation. B - Faux. Une personne colonisée peut transmettre le germe. C - Vrai. La prévention s'applique aussi sans symptôme. D - Faux. Un résultat nasal ne prouve pas une infection systémique. E - Faux. Le traitement dépend de l'évaluation et n'est pas automatique.

Q106 — Réponses : B, D. A - Faux. Des soins à domicile peuvent causer une IAS. B - Vrai. Le lien avec la prise en charge est déterminant. C - Faux. Nosocomiale renvoie à l'acquisition en établissement de santé. D - Vrai. Le diagnostic nécessite un lien plausible. E - Faux. La géographie ne remplace pas le raisonnement causal.

Q107 — Réponses : D, E. A - Faux. Une colonisation urinaire est possible. B - Faux. Le risque augmente avec la durée. C - Faux. La voie extraluminale persiste notamment. D - Vrai. Un dispositif inutile expose sans bénéfice. E - Vrai. Le résultat microbiologique se confronte aux symptômes.

Q108 — Réponses : A, B, C. A - Vrai. C'est la voie extraluminale ou périurétrale. B - Vrai. C'est un mécanisme endoluminal. C - Vrai. Une voie sanguine est possible mais rare. D - Faux. La valve limite le reflux, sans stériliser. E - Faux. Le ballonnet stabilise la sonde.

Corrigés argumentés — suite

Q109 — Réponses : B, D. A - Faux. Cela favorise le reflux. B - Vrai. Le collecteur reste sous le niveau de la vessie. C - Faux. Les déconnexions inutiles favorisent la contamination. D - Vrai. Le drainage doit rester fonctionnel. E - Faux. Utiliser le site de prélèvement dédié et la technique adaptée.

Q110 — Réponses : A, B, C. A - Vrai. Ils perturbent la protection des voies aériennes. B - Vrai. Les réflexes peuvent être diminués. C - Vrai. Elle peut altérer les mécanismes protecteurs. D - Faux. Les gants n'empêchent pas les inhalations. E - Faux. Des sécrétions peuvent passer autour du ballonnet.

Q111 — Réponses : A, C. A - Vrai. Ils réduisent notamment la charge microbienne buccale. B - Faux. Les textures se décident après évaluation. C - Vrai. Cette position aide à limiter les inhalations. D - Faux. Les unités ne sont pas interchangeables ; le repère usuel est en cmH2O. E - Faux. La stérilité initiale ne dispense pas d'asepsie.

Q112 — Réponses : B, C, D. A - Faux. Ces mots ne classent pas la profondeur d'une ISO. B - Vrai. Elle touche peau et tissu sous-cutané. C - Vrai. Elle atteint les tissus profonds de l'incision. D - Vrai. Elle touche un site au-delà de l'incision. E - Faux. Les atteintes profondes et d'organe existent.

Q113 — Réponses : B, D. A - Faux. Un critère de surveillance ne supprime pas la possibilité clinique. B - Vrai. La sortie ne coupe pas le lien possible avec l'acte. C - Faux. Ce repère ancien ne s'applique pas uniformément. D - Vrai. Le programme et les actes concernés précisent la fenêtre. E - Faux. Une évaluation est nécessaire.

Q114 — Réponses : A, C, E. A - Vrai. Elle réduit une source de contamination. B - Faux. Éviter la dépilation inutile ; si indiquée, préférer la tonte. C - Vrai. Des ISO se révèlent au domicile. D - Faux. Une rougeur est un signe à interpréter. E - Vrai. Une diffusion sanguine peut atteindre un implant.

Q115 — Réponses : A, C. A - Vrai. PICC signifie central inséré par voie périphérique. B - Faux. Il se distingue du CVP par son extrémité centrale. C - Vrai. Le dispositif permet un accès prolongé. D - Faux. Une aiguille adaptée est nécessaire. E - Faux. Le trajet du PICC atteint une veine centrale.

Q116 — Réponses : B, C, E. A - Faux. D'autres foyers sont possibles. B - Vrai. Temps, sites et volumes doivent être correctement documentés. C - Vrai. Pour le même germe, cet écart soutient l'imputabilité. D - Faux. Ce seul critère ne suffit pas à l'exclure. E - Vrai. Gravité, germe et dispositif influencent la décision.

Corrigés argumentés — suite

Vaccination : mécanismes

Q117 — Réponses : B, D. A - Faux. Une mise en place de la réponse est nécessaire. B - Vrai. La réponse secondaire est facilitée par la mémoire. C - Faux. Les schémas varient selon vaccin et terrain. D - Vrai. Des cellules mémoire persistent après stimulation. E - Faux. La réponse est spécifique des antigènes.

Q118 — Réponses : A, C, E. A - Vrai. Le plasmocyte est une cellule productrice d'anticorps. B - Faux. Cette production relève de la lignée B. C - Vrai. Les anticorps caractérisent cette composante. D - Faux. Il s'agit d'un lymphocyte. E - Vrai. Elle décrit cette propriété, distincte de la seule sécurité.

Q119 — Réponses : B, D. A - Faux. L'agent inactivé ne se réplique pas. B - Vrai. Il contient des virus vivants atténués. C - Faux. La composition dépend du produit. D - Vrai. La réplication expose à un risque particulier. E - Faux. Ils sont généralement contre-indiqués pendant la grossesse.

Q120 — Réponses : A, B. A - Vrai. Il fait produire l'antigène par les cellules. B - Vrai. La traduction a lieu dans ce compartiment. C - Faux. Il n'a pas cette fonction d'intégration au génome. D - Faux. Une instruction d'antigène n'est pas un virus entier vivant. E - Faux. L'ARNm est ensuite dégradé.

Q121 — Réponses : B, C, E. A - Faux. Le diluant sert à la formulation ; l'antigène est la cible immunitaire. B - Vrai. C'est sa fonction recherchée. C - Vrai. Il participe à la stabilité du produit. D - Faux. Leur rôle est technologique ou immunologique ; une allergie est un risque distinct. E - Vrai. Il faut identifier le composant en cause et le produit exact.

Vaccination : stratégies et pratique

Q122 — Réponses : B, C, E. A - Faux. La protection contre le tétanos est individuelle. B - Vrai. C'est sa définition. C - Vrai. Elle dépend de l'effet sur la circulation de l'agent. D - Faux. Les effets diffèrent selon les vaccins. E - Vrai. Il n'est pas supprimé par la vaccination humaine.

Q123 — Réponses : A, B, E. A - Vrai. C'est la définition du nombre de reproduction de base. B - Vrai. La formule augmente avec R0. C - Faux. Le modèle simplifie contacts, efficacité et hétérogénéité. D - Faux. Efficacité et schéma peuvent les faire différer. E - Vrai. Elles conditionnent l'interprétation.

Corrigés argumentés — suite

Q124 — Réponses : B, D. A - Faux. Un rattrapage permet souvent de poursuivre. B - Vrai. Les recommandations évoluent. C - Faux. La vaccination antitétanique commence dans l'enfance. D - Vrai. Les doses antérieures valides restent pertinentes. E - Faux. Un projet ne constitue pas à lui seul une obligation.

Q125 — Réponses : B, C, E. A - Faux. Ces compétences sont distinctes et encadrées. B - Vrai. C'est le seuil du cadre élargi décrit. C - Vrai. Elles font partie du cadre professionnel. D - Faux. Cette prescription est exclue du cadre autonome cité. E - Vrai. L'habilitation ne dispense pas du raisonnement clinique.

Q126 — Réponses : C, D. A - Faux. Ce n'est pas une interdiction globale. B - Faux. La gravité de l'épisode intervient. C - Vrai. Il faut identifier composant et vaccin. D - Vrai. Le risque dépend notamment de la réplication. E - Faux. Les vaccins inertes ont souvent des indications spécifiques.

Q127 — Réponses : A, C, E. A - Vrai. Sa fréquence varie selon le produit. B - Faux. L'efficacité ne se mesure pas à la fièvre. C - Vrai. Il s'agit de signes systémiques préoccupants. D - Faux. Le diagnostic est distinct d'une simple réaction locale. E - Vrai. Elle peut menacer le pronostic vital.

Q128 — Réponses : C, D. A - Faux. La surveillance continue après mise à disposition. B - Faux. Un signal doit être analysé. C - Vrai. Les essais n'identifient pas tous les événements très rares. D - Vrai. De nouvelles données peuvent modifier les mesures. E - Faux. Dose, population et période rendent le risque interprétable.