

Projet séries temporelles linéaires

Contents

Partie I : Les données	1
Partie II : Modèles ARMA	2
Partie III : Prévision	2

Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.

Partie I : Les données


1. La série étudiée représente la production mensuelle de biens manufacturés en France métropolitaine entre janvier 1985 et janvier 2000. C'est une série agrégée corrigée des variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS-CJO) contenant 181 observations. L'unité de mesure est un indice de base 100 en 1990. La série est de la forme suivante :
- 2.
- 3.

```
summary(cars)
```

```
##      speed      dist
##  Min.   : 4.0    Min.   : 2.00
##  1st Qu.:12.0    1st Qu.: 26.00
##  Median :15.0    Median : 36.00
##  Mean   :15.4    Mean   : 42.98
##  3rd Qu.:19.0    3rd Qu.: 56.00
##  Max.   :25.0    Max.   :120.00
```

Partie II : Modèles ARMA

- 4.
- 5.



Partie III : Pr vision

6. Comme nous avons r alis  une diff rentiation d'un mois   l'autre dans la question 2, nous prenons ici le mod le de la forme ARIMA(1,1,0) :

$$Y_t = X_t - X_{t-1} = a + bY_{t-1} + \epsilon_t$$

Avec $(\epsilon_t)_t \sim \text{Norm}(0, 1)$. Avec une probabilit  de $\alpha\%$, $|\epsilon_t| \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}}$. Ce qui donne :

$$\begin{aligned}
q_{\frac{\alpha}{2}} + a + bY_T &\leq Y_{T+1} \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}} + a + bY_T \\
q_{\frac{\alpha}{2}} + a + b(X_T - X_{T-1}) + X_T &\leq X_{T+1} \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}} + a + b(X_T - X_{T-1}) + X_T \\
q_{\frac{\alpha}{2}} + a + (b+1)X_T - bX_{T-1} &\leq X_{T+1} \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}} + a + (b+1)X_T - bX_{T-1} \\
\text{Et : } q_{\frac{\alpha}{2}} + a + bY_{T+1} &\leq Y_{T+2} \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}} + a + bY_{T+1} \\
q_{\frac{\alpha}{2}} + a + (b+1)X_{T+1} - bX_T &\leq X_{T+2} \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}} + a + (b+1)X_{T+1} - bX_T \\
q_{\frac{\alpha}{2}} + a + (b+1)(q_{\frac{\alpha}{2}} + a + (b+1)X_T - bX_{T-1}) - bX_T &\leq X_{T+2} \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}} + a + (b+1)(q_{1-\frac{\alpha}{2}} + a + (b+1)X_T - bX_{T-1}) - bX_T \\
(b+2)q_{\frac{\alpha}{2}} + (b+2)a + (b^2 + b + 1)X_T - b(b+1)X_{T-1} &\leq X_{T+2} \leq (b+2)q_{1-\frac{\alpha}{2}} + (b+2)a + (b^2 + b + 1)X_T - b(b+1)X_{T-1}
\end{aligned}$$

D'après la partie II, $a = ..etb =$ Donc on a comme région de confiance de niveau α :

$$X_{T+1} \in [q_{\frac{\alpha}{2}} + a + (b+1)X_T - bX_{T-1}, q_{1-\frac{\alpha}{2}} + a + (b+1)X_T - bX_{T-1}]$$

$$X_{T+2} \in [..q_{\frac{\alpha}{2}} + .. + ..X_T - ..X_{T-1}, ..q_{1-\frac{\alpha}{2}} + .. + ..X_T - ..X_{T-1}]$$

7. Pour obtenir cette région de confiance, nous utilisons les hypothèses que les résidus suivent une loi normale centrée réduite et que la série temporelle peut être modélisée par un modèle ARIMA de paramètres (1,1,0)
- 8.
- 9.