



Relatório da Bancada

Ácido forte × base forte

Módulo Medir · 1.0.0-rc.5

1. Identificação

Nome

Turma

Data

Professor

Grupo

2. Proposta experimental

Encontrar o ponto de equivalência de HCl com NaOH.

Dados da bancada virtual. Leituras instrumentais simuladas e previsões do modelo são identificadas separadamente.

3. Condições iniciais

Preparo inicial

Recipiente	Vidraria	Solução	Concentração	Volume inicial	Indicador	Temperatura
HCl + NaOH	Tubo de ensaio	Ácido clorídrico	0,0100 mol/L	1,00 mL	Azul de bromotimol	25,0 °C

HCl + NaOH: Preparo associado ao primeiro registro

Reagente e adição

Recipiente	Substância adicionada	Concentração	Incremento	Técnica
HCl + NaOH	Hidróxido de sódio	0,0100 mol/L	0,05 mL	Conta-gotas simulado

4. Dados experimentais

Recipiente	Volume	T	pH	Técnica	Cor
HCl + NaOH	1,00 mL	25,0 °C	pH estimado ≈ 2	fita	amarelo

HCL + NAOH · TABELA EXPERIMENTAL

Técnicas efetivamente registradas: Indicador, Fita de pH.

Volume adicionado (mL)	Leitura	Unidade	Temperatura (°C)	Técnica	Horário
0,00	amarelo	cor	25,0	Indicador	2026-10-03T09:06:59.552Z
0,00	≈ 2	pH	25,0	Fita de pH	2026-10-03T09:07:04.656Z

5. Representações

HCL + NAOH

Nenhum gráfico produzido com os recursos disponíveis.

6. Condições finais

Estado final

Recipiente	Volume final	pH (leitura)	Temperatura	Cor	Estado
HCl + NaOH	1,00 mL	pH estimado ≈ 2	25,0 °C	amarelo	Ácida · solução mecanística

As seções seguintes são autorais.

7. Observações

OBSERVAÇÕES

Não preenchido.

8. Análise / interpretação

ANÁLISE

Não preenchido.

INTERPRETAÇÃO

Não preenchido.

9. Resposta à investigação

RESPOSTA

Não preenchido.

10. Conclusão

CONCLUSÃO

Não preenchido.

Nota sobre o modelo

Equilíbrio aquoso ideal. pK_w varia com a temperatura; demais constantes e mobilidades usam referências a 25 °C. Amostras representativas têm composição parcial. CO_2 usa sistema fechado simplificado; bolhas são ilustrativas. Solubilidade modelada apenas quando há dados. Leituras instrumentais e cálculos estão identificados separadamente.