

Práctica 3. Imagen de una función de dos variables

Ejercicios resueltos

1. Calcular la imagen de la función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, donde

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq 2y - y^2\} \quad \text{y} \quad f(x, y) = x^2 + y(y^3 - 4) \quad \forall (x, y) \in A$$

Solución

(a). Para $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se tiene claramente

$$x^2 \leq 2y - y^2 \iff x^2 + y^2 - 2y \leq 0 \iff x^2 + (y - 1)^2 \leq 1$$

luego A es la bola cerrada de centro $(0, 1)$ y radio 1 para la norma euclídea en \mathbb{R}^2 . En particular A es un conjunto cerrado y acotado, luego compacto, y es también un conjunto convexo, luego conexo. Como f es continua, por ser una función polinómica, deducimos que $f(A)$ es un subconjunto compacto y conexo de \mathbb{R} , es decir, un intervalo cerrado y acotado.

(b). Es obvio que f es parcialmente derivable en A° , de nuevo por ser una función polinómica. Veamos los puntos críticos de f . Para $(x, y) \in A^\circ$, se tiene $\nabla f(x, y) = 0$ si y sólo si,

$$0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \quad \text{y} \quad 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y^3 - 4$$

Vemos que $(0, 1)$ es el único punto crítico, con $f(0, 1) = -3$.

(c). Estudiemos ahora f en la frontera de A , que es la circunferencia de centro $(0, 1)$ y radio 1, un arco paramétrico, pero no necesitaremos ninguna parametrización. Para $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se tiene claramente

$$(x, y) \in \text{Fr } A \iff x^2 + (y - 1)^2 = 1 \iff y \in [0, 2], \quad x^2 = 2y - y^2$$

Por tanto, para $(x, y) \in \text{Fr } A$ obtenemos

$$f(x, y) = x^2 + y(y^3 - 4) = 2y - y^2 + y^4 - 4y = y^4 - y^2 - 2y$$

de donde se deduce que el conjunto $f(\text{Fr } A)$ coincide con la imagen de la función $h : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$h(y) = y^4 - y^2 - 2y \quad \forall y \in [0, 2]$$

Esta función es derivable en $[0, 2]$ con

$$h'(y) = 4y^3 - 2y - 2 = 2(y - 1)(2y^2 + 2y + 1) \quad \forall y \in [0, 2]$$

Como, para $y \in [0, 2]$ se tiene $2y^2 + 2y + 1 \geq 1 > 0$, vemos que $h'(y) = 0$ solamente para $y = 1$. Los posibles extremos absolutos de h son, por tanto, 0, 1 y 2. Puesto que $h(0) = 0$, $h(1) = -2$ y $h(2) = 8$, la imagen de h es el intervalo $[-2, 8]$. Así pues, el máximo valor de f en $\text{Fr } A$ es 8, que se alcanza en el punto $(0, 2)$. El mínimo valor es -2 que se alcanza en los puntos $(1, 1)$ y $(-1, 1)$.

Finalmente, puesto que $f(0, 1) = -3$, concluimos que $\max f(A) = \max\{-3, 8\} = 8$ y $\min f(A) = \min\{-3, -2\} = -3$ luego $f(A) = [-3, 8]$. ■

Ejercicio 1

Calcular la imagen de $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ donde $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq 2y - y^2\}$ y $f(x, y) = x^2 + y(y^3 - 4) \quad \forall (x, y) \in A$

Comprobamos en primer lugar si A es compacto y convexo: $x^2 \leq 2y - y^2 \Leftrightarrow x^2 - 2y + y^2 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \leq 1 \Rightarrow A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y-1)^2 \leq 1\}$
 $\Rightarrow A$ es la bola cerrada de centro $(0, 1)$ y radio 1. \Rightarrow cerrado y acotado.
 A es un conjunto convexo, luego también es convexo.

Estudiamos ahora la continuidad de f : Como f es una función polinómica, es continua en \mathbb{R}^2 , luego, al ser A compacto y f continua $\Rightarrow f(A)$ es compacto; un intervalo cerrado y acotado.

Calculamos derivabilidad parcial en A° . Por ser una función polinómica es derivable parcialmente en A° . Calculamos puntos críticos. $\nabla f(x, y) = 0$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

\Rightarrow El único punto crítico es el $(0, 1)$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y^3 - 4 = 0 \Leftrightarrow y = 1 \Rightarrow f(0, 1) = -3$$

Estudiamos a continuación la frontera del conjunto A : la circunferencia de centro $(0, 1)$ y radio 1 $\Rightarrow x^2 + (y-1)^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1 \Leftrightarrow x^2 = 2y - y^2$

$$\text{Para cualquier } (x, y) \in \text{Fr}(A) \text{ tenemos } f(x, y) = 2y - y^2 + y(y^3 - 4) = 2y - y^2 + y^4 - 4y = y^4 - y^2 - 2y \Rightarrow f(\text{Fr}(A)) = \text{Im}(h) ; h: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} : h(y) = y^4 - y^2 - 2y$$

$$h \text{ es derivable en } [0, 2] \Rightarrow h'(y) = 4y^3 - 2y - 2 = 2(y-1)(2y^2 + 2y + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{array}{c|ccc} & 4 & 0 & -2 & -2 \\ & 4 & 4 & 2 & 2 \\ \hline & 4 & 4 & 2 & 0 \end{array}$$

$\Leftrightarrow y = 1 \Rightarrow$ Posibles extremos absolutos

$$\text{en } 0, 1, 2 \Rightarrow h(0) = 0, h(1) = -2, h(2) = 8$$

luego, la imagen de h es $[-2, 8]$.

$$f(0,1) = -3 \Rightarrow f(A) = [\min\{-3, -2\}, \max\{-3, 8\}] = [-3, 8]$$

Ejercicio 2.

Sea $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$ y la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}; f(x,y) = (x-2)^2 + 2y^2$

$\forall (x,y) \in A$. Calcular la imagen de f .

En primer lugar, comprobemos que A es compacto y conexo. A es la bola cerrada de centro $(1,0)$ y radio 2 \Rightarrow cerrado y acotado, luego compacto. Además es conexo luego conexo.

f es una función polinómica y por lo tanto continua en $A \subset \mathbb{R}^2$. Luego, A compacto, f continua $\Rightarrow f(A)$ intervalo cerrado y acotado.

Es derivable en todo A° por ser también polinómica (calculamos puntos críticos)

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= 2(x-2) = 0 \Leftrightarrow x=2 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) &= 4y = 0 \Leftrightarrow y=0 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \text{El único punto crítico es el } (2,0) \end{array} \right.$$

Calculamos la frontera F_A : la frontera de A es la circunferencia de centro $(1,0)$ y radio 2 $\Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 4 \Leftrightarrow y^2 = 4 - (x-1)^2$. Cualquier punto de la frontera

$$\begin{aligned} \text{verifica: si } (x,y) \in F_A \Rightarrow f(x,y) &= (x-2)^2 + 2(4 - (x-1)^2) = (x-2)^2 + 8 - 2(x-1)^2 \\ &= x^2 - 4x + 4 + 8 - 2x^2 + 4x - 2 = -x^2 + 10 \end{aligned}$$

$$\text{Sea } h: [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}^2; h(x) = (-x^2 + 10, x); f(F_A) = \text{Im}(h)$$

$$h \text{ derivable en } [-1, 3]; h'(x) = -2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

luego, los posibles extremos absolutos son $-1, 0, 3$; $h(-1) = 9, h(0) = 10, h(3) = 1$

$$\text{Im}(h) = [1, 10]$$

$$f(2,0) = 0 \Rightarrow f(A) = [\min\{0, 1\}, \max\{0, 10\}] = [0, 10]$$

2. Se considera el conjunto $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$ y la función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = (x-2)^2 + 2y^2$ para todo $(x, y) \in A$. Calcular la imagen de f .

Solución.

(a). Es claro que $A = B \cap H$ donde B es la bola cerrada de centro $(1, 0)$ y radio 2, y $H = \{(x, y) : x \geq 0\}$ el semiplano de la derecha cerrado. Entonces A es cerrado por ser intersección de cerrados, y acotado, por estar contenido en una bola, luego A es compacto. Por otra parte, es claro que B y H son conjuntos convexos, luego A también es convexo y, en particular, A es conexo. Puesto que f es continua, por ser una función polinómica, deducimos que $f(A)$ es un intervalo cerrado y acotado.

(b) Tenemos claramente

$$A^\circ = B^\circ \cap H^\circ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 < 4, x > 0\}$$

y f es diferenciable en A° , de nuevo por ser una función polinómica. Para $(x, y) \in A^\circ$, tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \iff 2(x-2) = 4y = 0 \iff (x, y) = (2, 0)$$

Como $f(2, 0) = 0$ y $f(x, y) \geq 0$ para todo $(x, y) \in A$, está claro que $(2, 0)$ es un mínimo absoluto de f , es decir, $\min f(A) = 0$. A partir de ahora sólo buscamos máximos absolutos de f .

(c). Tenemos claramente $\text{Fr } A = A \setminus A^\circ = C_1 \cup C_2$ donde

$$\begin{aligned} C_1 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 \leq 4, x = 0\} = \{(0, y) : y^2 \leq 3\} \quad \text{y} \\ C_2 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 = 4, x \geq 0\} \end{aligned}$$

Para $(0, y) \in C_1$ tenemos claramente $f(0, y) = 4 + 2y^2$ con $y^2 \leq 3$, luego

$$\max f(C_1) = 10 = f(0, \pm\sqrt{3})$$

Para $(x, y) \in C_2$ tenemos $y^2 = 4 - (x-1)^2$ luego

$$f(x, y) = (x-2)^2 + 2(4 - (x-1)^2) = 10 - x^2$$

y el máximo de f en C_2 se obtiene igualmente tomando $x = 0$ e $y = \pm\sqrt{3}$:

$$\max f(C_2) = 10 = f(0, \pm\sqrt{3})$$

Concluimos que $\max f(A) = \max f(\text{Fr } A) = 10$, luego $f(A) = [0, 10]$. ■