

Лабораторная работа №1
по курсу ПГП: 8 факультет, 4 курс, 8 семестр 2015/16 уч. года
Работа с матрицам. Метод Гаусса.

Цель работы. Ознакомление и установка программного обеспечения для работы с программноаппаратной архитектурой параллельных вычислений(CUDA). Реализация метода Гаусса с выбором главного элемента по столбцу.

В качестве вещественного типа данных необходимо использовать тип данных double. В вариантах(1,5,6,7), где необходимо сравнение по модулю с нулем, в качестве нулевого значения использовать 10^{-7} .

Вариант 1. Вычисление детерминанта матрицы.

Входные данные. На первой строке задано число n -- размер матрицы. В следующих n строках, записано по n вещественных чисел -- элементы матрицы. $n \leq 10^4$.

Выходные данные. Необходимо вывести одно число -- детерминант матрицы.

Пример:

Входной файл	Выходной файл
3 1 2 3 4 5 6 7 8 7	6.0000000000e+00

Вариант 2. Вычисление обратной матрицы.

Входные данные. На первой строке задано число n -- размер матрицы. В следующих n строках, записано по n вещественных чисел -- элементы матрицы. $n \leq 10^4$.

Выходные данные. Необходимо вывести на n строках, по n чисел -- элементы обратной матрицы.

Пример:

Входной файл	Выходной файл
2 1 2 3 4	-2.0000000000e+00 1.0000000000e+00 1.5000000000e+00 -5.0000000000e-01

Вариант 3. Решение квадратной СЛАУ.

Необходимо решить систему уравнений $Ax = b$, где A -- квадратная матрица $n \times n$, b --

вектор-столбец свободных коэффициентов длиной n , x -- вектор неизвестных.

Входные данные. На первой строке задано число n -- размер матрицы. В следующих n строках, записано по n вещественных чисел -- элементы матрицы. Далее записываются n элементов вектора свободных коэффициентов. $n \leq 10^4$.

Выходные данные. Необходимо вывести n значений, являющиеся элементами вектора неизвестных x .

Пример:

Входной файл	Выходной файл
2 1 2 3 4 5 6	-4.0000000000e+00 4.5000000000e+00

Вариант 4. LU-разложение матрицы.

Необходимо вычислить LU-разложение квадратной матрицы: $A = LU$, где A -- матрица $n \times n$, L -- нижняя треугольная матрица, с единичными элементами на диагонали, U -- верхняя треугольная матрица. Так же нужно получить вектор перестановок строк p , где $p[i]$ содержит номер строки которой будет i -ая.

Входные данные. На первой строке задано число n -- размер матрицы. В следующих n строках, записано по n вещественных чисел -- элементы матрицы. $n \leq 8 \cdot 10^3$.

Выходные данные. Необходимо вывести на n строках, по n чисел -- элементы матриц L и U объединенные в одну матрицу. Далее записываются n элементов вектора перестановок p .

Пример:

Входной файл	Выходной файл
2 1 2 3 4	3.0000000000e+00 4.0000000000e+00 3.3333333333e-01 6.6666666667e-01 1 0
3 1 2 3 4 5 6 7 8 7	7.0000000000e+00 8.0000000000e+00 7.0000000000e+00 1.4285714286e-01 8.5714285714e-01 2.0000000000e+00 5.7142857143e-01 5.0000000000e-01 1.0000000000e+00 1 2 0

Вариант 5. Решение произвольной СЛАУ.

Необходимо найти *любое* решение системы уравнений $Ax = b$, где A -- матрица $n \times m$, b -- вектор-столбец свободных коэффициентов длиной n , x -- вектор неизвестных длиной m .

Входные данные. На первой строке заданы числа n и m -- размеры матрицы.

В следующих n строках, записано по m вещественных чисел -- элементы матрицы. Далее записываются n элементов вектора свободных коэффициентов. $n * m \leq 10^8$.

Выходные данные. Необходимо вывести m значений, являющиеся элементами вектора неизвестных x .

Пример:

Входной файл	Выходной файл
<pre>2 3 1 2 3 4 5 6 5 14</pre>	<pre>1.0000000000e+00 2.0000000000e+00 0.0000000000e+00</pre>
<pre>3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9</pre>	<pre>-6.0000000000e+00 6.5000000000e+00</pre>

Вариант 6. Нахождение ранга матрицы.

Входные данные. На первой строке заданы числа n и m -- размеры матрицы. В следующих n строках, записано по m вещественных чисел -- элементы матрицы. $n * m \leq 10^8$.

Выходные данные. Необходимо вывести одно число -- ранг матрицы.

Пример:

Входной файл	Выходной файл
<pre>2 3 1 2 3 2 4 6</pre>	<pre>1</pre>
<pre>3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9</pre>	<pre>2</pre>

Вариант 7. Решение матричного уравнения.

Необходимо найти *любое* решение матричного уравнения $AX = B$, где A -- матрица $n \times m$, B -- матрица $n \times k$, X -- неизвестная матрица $m \times k$.

Входные данные. На первой строке заданы числа n , m и k -- размеры матриц. В следующих n строках, записано по m вещественных чисел -- элементы матрицы A . Далее записываются m строк, по k чисел -- элементы матрицы B .

$$n * m + m * k + n * k \leq 1.2 * 10^8.$$

Выходные данные. Необходимо вывести на m строках, по k чисел -- элементы неизвестной матрицы X .

Пример:

Входной файл	Выходной файл
1 2 1 1 2 5	5.0000000000e+00 0.0000000000e+00
2 2 2 1 2 3 4 1 0 0 1	-2.0000000000e+00 1.0000000000e+00 1.5000000000e+00 -5.0000000000e-01
2 3 2 1 2 3 4 8 6 3 4 7 1	5.0000000000e-01 -3.5000000000e+00 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 8.3333333333e-01 2.5000000000e+00