SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–24
doi: 35.0234/shit.2026.114514
Advance Access Publication Date: 1 April 2024
Cosmetic Dermatology

廉价美白法

基于临床观察的头孢类抗生素与小麦制饮品低成本口服式即时肤色调控技术对人体肤色亮度提升及其不可逆副作用的可行性研究及其社会学意义（原《同时服用头孢和啤酒可以短期内让人皮肤变白原理》）

沃兹·基 [1,*], 麦瑟尔夫 [2] 和 斯里兰卡·达拉然 [2]

[1] 品客蒙斯特实验室, 蒙古海军第二医院急诊实验室, [2] 大栅栏 SOD 蜜新品研发实验室, 八宝山人类遗体处理中心

*To whom correspondence should be addressed.

责任编辑: 朱塞佩·布罗祖 （萨丁岛排水沟健康安全监管总局)

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 在追求高效护肤与即时美白的时代背景下，传统护肤品因见效周期长、价格昂贵而逐渐难以满足年轻群体需求。近期网络经验表明，“头孢类抗生素配合啤酒口服”可能实现分钟级肤色提亮效果。然而，该速效美白策略尚缺乏系统性的理论支持与量化评估。因此，本研究旨在从生理响应、面部光学特性及色度参数变化角度，构建一种低成本、即时型口服美白模型。

Results: 志愿者在摄入组合方案后 3–5 分钟内面部亮度显著提升，综合色度仪检测显示 RGB 三通道数值同步上升，其中 G 通道提升最为明显，呈现自然冷白皮效果。主观评价中，92%的受试者认为“气色瞬间清透”，87%表示“具有熬夜后也能直接出门的自信感”。进一步分析推测，该现象可能与全身代谢加速、面部血流重新分配及“生命感知增强机制”有关，从而实现快速物理级美白表现。与传统护肤路径相比，本方法具有起效快、流程短、仪式感强等显著优势。

Availability: 实验数据可向作者索取

Contact: srilankadalaran@gmail.com

Supplementary information: 没事别发邮件

1　1 引言 (Introduction)

"头孢配酒，越喝越有"——这句流传于中国民间的俗谚语，以其朗朗上口的韵律和严酸的临床意涵，长期占据患者出院教育 PPT 的第一页。然而，令人震惊的是，在过去数十年间，没有任何一篇经过同行评审的学术论文，以严肃且荒诞的学术态度，对这一现象进行系统性的定量化研究。

头孢菌素类抗生素（Cephalosporins）自 1945 年由意大利科学家 Giuseppe Brotzu 在撒丁岛的下水道样本中发现以来，已成为全球使用最广泛的抗菌药物家族之一（Brotzu, 1948）。其与乙醇相互作用的历史记录，可追溯至 20 世纪 70 年代关于甲硝唑与酒精反应的临床报告。然而，头孢类药物与啤酒的专项研究几乎空白，这不得不让我们怀疑学术界是否集体在逃避一个最贴近大众生活的科学问题。

头孢曲松（Ceftriaxone, $C_{18}H_{18}N_8O_7S_3$）作为第三代头孢菌素的代表性成员，含有 N-甲基硫四唑（NMTT）侧链。该侧链是引发戒酒硫样反应（Disulfiram-like Reaction, DLR）的关键化学结构，其作用机制为竞争性抑制乙醛脱氢酶（ALDH）活性，导致乙醛（CH_3CHO）在血液中蓄积，进而引发一系列令患者"皮肤变白"的临床症状。

为了以无可辩驳的学术权威性填补这一领域的空白，本研究课题组历时十八个月，以豚鼠、家兔及一名自愿参与实验的博士后（编号：PD-0001，已签署充分知情同意书，其知情是否真正充分存疑）为研究对象，系统研究了不同剂量头孢曲松与啤酒/白酒联合摄入后的药代动力学参数，并首次提出 PTPB（Pijiu-Toubao-Pifu-

Bianbai Toxicity Biomarker）曲线，建立了一套描述该反应剂量-时间-效应关系的数学模型。

本文的主要贡献如下：（1）首次量化了 NMTT 侧链对 ALDH 活性的抑制常数（Ki = 2.3 × 10^{-7} mol/L，误差 ±很多）；（2）建立了覆盖啤酒剂量 0-2000mL、头孢剂量 0-4g 的完整 PTPB 曲线体系；（3）揭示了白酒作为"加速剂"的分子机制，提出"烈酒乘数效应"（Baijiu Multiplier Effect, BME）理论；（4）引入了新型病理学评分系统 RSFR（Red-face, Sweating, Fast-pulse, Regret score）量表。

2 2 材料与方法 (Materials and Methods)

3.1 2.1 实验材料

头孢曲松钠粉针（批号: 20231101，某省某药厂，纯度≥99.5%，检测人员表示"差不多"）；某广告位招租啤酒（酒精度 4.5% v/v，麦芽汁浓度 12°P，购自实验室楼下超市，价格 3.5 元/瓶，报销已批准）；某广告位招租白酒（酒精度 53% v/v，购自同一超市，价格 56 元/瓶，报销审批中）；无菌生理盐水（用于对照组，口感欠佳）。

实验动物：雄性豚鼠（Cavia porcellus）12 只，体重 250±30g；雄性新西兰家兔 6 只，体重 2.5±0.3kg；自愿博士后 1 名（编号 PD-0001，体重 168kg，自称"非常健康"，血压偏高但坚持参加）。所有动物实验均获本校动物伦理委员会批准（批准文号：IACUC-2023-哈哈），PD-0001 的参与已获人体实验伦理委员会审查，审查意见为"建议劝退，未能劝退"。

3.2 2.2 化学成分分析

对头孢曲松的活性基团进行高效液相色谱质谱联用（HPLC-MS）分析。色谱柱：C18 反相柱（250mm × 4.6mm，粒径5μm）；流动相 A：0.1%甲酸水溶液；流动相 B：乙腈；梯度洗脱程序：0-5min, 5%B；5-15min, 5-95%B；检测波长: 254nm。质谱条件：ESI 正离子模式，毛细管电压3.5kV，锥孔电压30V，碰撞能量 20eV。

重点分析头孢曲松的 N-甲基硫四唑（1-methyl-5-thiotetrazole, MTT）侧链（分子式：$C_2H_4N_4S$，分子量：116.14 g/mol）。MTT 侧链的存在是本研究一切悲剧的化学根源。实验采用紫外分光光度法（λ = 340nm）测定乙醛脱氢酶（ALDH）活性，以烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD^+）氧化为 NADH 的速率作为酶活力的间接指标。乙醛浓度通过气相色谱（GC）顶空进样法测定（顶空温度 60°C，进样温度 200°C，检测器：FID）。

啤酒样品的乙醇含量通过密度法（比重瓶法，精度±0.01%）及气相色谱法（外标法）双重验证，两者结果相差 0.3%，研究人员决定取平均值。白酒样品的乙醇含量采用酒精计法直接测定，53 度白酒读数为 53.0 度，研究人员对此感到毫无悬念。各组分子量及关键化学参数汇总见 Table 1。

化合物	分子式	分子量 (g/mol)	关键功能基团	戒酒硫样毒性评级
头孢曲松	$C_{18}H_{18}N_8O_7S_3$	554.58	MTT 侧链、β-内酰胺环	★★★★★（五星好评）
乙醛	CH_3CHO	44.05	醛基(-CHO)	★★★★（体验极差）
乙醇（啤酒来源）	C_2H_5OH	46.07	羟基(-OH)	★★（前驱无害，后患无穷）
乙醇（白酒来源）	C_2H_5OH	46.07	羟基(-OH)	★★★（浓度高，加速快）
NADH	$C_{21}H_{29}N_7O_{14}P_2$	665.44	烟酰胺基	★（辅酶，无辜受害）

Table 1. 关键化学成分参数汇总。戒酒硫样毒性评级为本研究自创量表（1-5 星），基于急诊科医生的主观印象及患者家属的哭诉频率综合评定。

3.3 2.3 实验分组与剂量设计

实验采用全因子设计（Full Factorial Design），共设7 个实验组及 2 个对照组，如 Table 2 所示。头孢曲松剂量梯度（D_CEF）设为0、0.5、1.0、2.0、4.0 g/日，通过静脉滴注给药（生理盐水 100mL 溶解）；啤酒剂量梯度（V_BEER）设为0、330、660、1000、1500、2000 mL，30 分钟内灌胃给予（豚鼠/家兔）或自愿饮入（PD-0001）；白酒剂量（V_BJ）设为0、50、100mL 三个水平。

组别编号	组别名称	D_CEF (g/日)	V_BEER (mL)	V_BJ (mL)	预期结局
G-00	双阴性对照组	0	0	0	健康（无聊）
G-CEF	单纯头孢组	2.0	0	0	治病（正常）
G-B1	头孢+微啤组	2.0	330	0	轻微美白
G-B2	头孢+1L 啤酒组	2.0	660	0	明显改善
G-B3	头孢+豪饮啤酒组	2.0	1000	0	迅速美白
G-B4	头孢+千杯不醉（失败）组	2.0	2000	0	迅速美白
G-BJ1	头孢+少量白酒组	2.0	0	50	快速美白
G-BJ2	头孢+一两白酒组	2.0	0	100	极速美白
G-COMBO	头孢+啤酒+白酒联合组	2.0	330	50	致谢主角

Table 2. 实验分组设计。G-COMBO 组的 PD-0001 在签署知情同意书时表情镇定，实验结束后表情未见镇定。

3.4 2.4 PTPB 曲线的建立与数学模型

PTPB（Pijiu-Toubao-Pifu-Bianbai Toxicity Biomarker）曲线是本研究的核心理论贡献，在充分参考了 Beer-Lambert 定律（以示对Beer"的致敬）和 Hill 方程的基础上，本研究建立了如下 PTPB 方程：

$$T_PTPB = T_max \times [D_CEF^n / (EC_{50}^n + D_CEF^n)] \times [V_BEER^m / (VC_{50}^m + V_BEER^m)] \times (1 + \alpha \times V_BJ/100)$$

其中：T_PTPB 为综合毒性指数（无量纲，范围 0-10，10 分即"请叫救护车"）；T_max 为理论最大毒性（本研究设定为 10.0）；D_CEF 为头孢曲松日剂量（g/日）；V_BEER 为啤酒摄入量（mL）；V_BJ 为白酒摄入量（mL）；EC_{50}为头孢曲松毒性半效剂量（实验测定值：1.12 g/日）；VC_{50}为啤酒毒性半效剂量（实验测定值：487 mL）；n 为头孢曲松希尔系数（实验测定值：2.3，呈正协同性，令人忧虑）；m 为啤酒希尔系数（实验测定值：1.8）；α 为"烈酒加速系数"（白酒 53 度条件下，α = 3.7，即 BME 理论的核心参数）。

上述模型通过非线性最小二乘法（Levenberg-Marquardt 算法）拟合实验数据，拟合优度 $R^2 = 0.97$（剩余 3%归因于 PD-0001 在实验过程中情绪波动及部分豚鼠的逃跑行为）。

3 3 结果 (Results)

3.5 3.1 化学成分分析结果

HPLC-MS 分析证实，头孢曲松钠样品中 MTT 侧链的峰面积占总峰面积的 18.3%，与理论值（18.1%）高度吻合（偏差 0.2%，研究人员称之为"完全在误差范围内"）。乙醛脱氢酶（ALDH）活性抑制实验结果显示，MTT 在体外对 ALDH2（线粒体型，负责代谢 90%以上乙醛）的半数抑制浓度（IC_{50}）为 1.8×10^{-6} mol/L，呈竞争性抑制动力学，Ki = 2.3×10^{-7} mol/L（95%置信区间：1.9 – 2.8 × 10^{-7} mol/L，Fig. 1A 示意）。

气相色谱测定结果显示，在 G-B3 组（头孢 2g + 啤酒 1000mL）中，给药后 90 分钟血液乙醛浓度峰值达到(38.4 ± 5.2) μmol/L，是正常对照组的 12.8 倍（P < 0.001，t 检验，显著程度：非常显著）。而在 G-BJ2 组（头孢 2g + 白酒 100mL），乙醛浓度峰值更高达(112.6 ± 8.9) μmol/L，是 G-B3 组的 2.93 倍，验证了"白酒乘数效应"（BME，α = 2.93，略低于模型预测值 3.7，研究人员将差异归因于"白酒的复杂香型"）。

3.6 3.2 PTPB 曲线实验结果

各实验组的 T_PTPB 评分汇总于 Table 3。结果清晰呈现出三个典型区域：（1）"舒适区"（T_PTPB < 2.0）：仅存在于 G-00 和 G-CEF 组，受试者表现正常，豚鼠表现活泼，PD-0001 表现失望；（2）"不适区"（2.0 ≤ T_PTPB < 6.0）：G-B1 和 G-B2 组，受试者出现面部潮红、心率加速、大量出汗，PD-0001 自述"感觉像喝了假酒"；（3）"急诊区"（T_PTPB ≥ 6.0）：G-B3、G-B4、G-BJ1、G-BJ2 及 G-COMBO 组，受试者出现严重症状，RSFR 评分均超过 7 分。

组别	T_PTPB 均值	RSFR 评分	血乙醛峰值 (μmol/L)	典型症状描述	急救需求
G-00	0.1	0.1	3.0	无，受试者在睡觉	无
G-CEF	0.3	0.2	3.2	轻微输液手酸	无
G-B1	2.4	2.1	14.3	脸微红，似羞涩	无
G-B2	4.1	3.8	22.6	脸红，心跳快，想喝水	观察
G-B3	6.3	6.1	38.4	大汗，脸如关公，头痛	准备急救
G-B4	8.7	8.9	67.2	呕吐，血压骤降，悔恨	急救就位
G-BJ1	7.1	7.4	68.9	快速发作，3min 内面红	紧急急救
G-BJ2	9.2	9.5	112.6	极速发作，心跳>140bpm	拨打 120
G-COMBO	9.8	9.7	129.3	PD-0001 后来再也不接电话	120 已在路上

Table 3. 各实验组 T_PTPB 评分、RSFR 评分及关键生化指标汇总。G-COMBO 组数据基于 PD-0001 的回忆，准确性存疑（当事人称"记不太清楚了"）。

3.7 3.3 PTPB 曲线可视化描述

为便于临床医生直观理解，本研究将 PTPB 曲线描述为一个三维曲面（Fig. 1，原图过于可爱，已简化为文字描述）。在 X 轴（头孢剂量）固定为 2g/日的条件下，T_PTPB 随啤酒量（Y 轴）的增加呈"S 型"增长，在 330-1000mL 区间斜率最大（即"危险爬坡段"），1000mL 以上趋于平台（即"已经很惨了，再喝也差不多"）。

白酒参数引入后，曲面整体向上"抬升"，600mL 啤酒+100mL 白酒的组合可产生等同于 2000mL 啤酒的 T_PTPB 值，印证了"以质换量"的民间智慧在药理学上具有严格的数学等价性。当 D_CEF < 0.5g/日时，PTPB 曲面趋近于水平，提示低剂量头孢曲松的风险较低（此结论仅供学术参考，切勿用于试图"少吃点药就能喝酒"的侥幸心理）。

3.8 3.4 关键病理学分析：RSFR 量表的应用

本研究创新性地提出了 RSFR（Red-face, Sweating, Fast-pulse, Regret）病理学评分系统，对 DLR 的临床表现进行了半定量化评估。RSFR 量表共 4 个维度，每维度 0-2.5 分，满分 10 分（Fig. 1B）：

R（Red-face，面部潮红）：0 分 = 正常肤色；1 分 = 苹果红（讨喜）；2 分 = 番茄红（引发关注）；2.5 分 = 活体红绿灯（触目惊心）。

S（Sweating，大量出汗）：0 分 = 干燥；1 分 = 微汗（运动后感）；2 分 = 湿透（如同游泳）；2.5 分 = 随行走有水声（需更换实验服）。

F（Fast-pulse，心动过速）：0 分 = 正常（60-100bpm）；1 分 = 轻度（100-120bpm）；2 分 = 显著（120-140bpm）；2.5 分 = "你的心跳声把我吵到了"（>140bpm）。

R（Regret，后悔情绪）：0 分 = 无后悔（对照组）；1 分 = "稍有后悔"；2 分 = "非常后悔"；2.5 分 = "发誓永不再犯"（具有显著统计学意义，但依从性存疑）。

病理学观察还发现了以下值得关注的现象：（1）所有 DLR 受试者均出现程度不一的"公开场合尴尬"，此现象未被纳入 RSFR 量表，但对生活质量影响深远；（2）G-BJ2 组中，1 只家兔在给予等效人体剂量的乙醛暴露后，持续以跺脚动作表达不满长达 47 分钟，课题组认为此现象提示乙醛具有"情绪诱导效应"，具体机制有待进一步研究（经费申请中）。

3.9 3.5 白酒剂量实验：烈酒乘数效应（BME）的验证

白酒实验组的结果对 BME 理论提供了强有力的支持。以 D_CEF = 2g/日为基准，50mL 白酒组（G-BJ1）的 T_PTPB 均值为 7.1，而其等乙醇含量的啤酒等效量约为 556mL（按 53%vs4.5%酒精度折算），但后者（V_BEER ≈ 556mL，即约 1.7 瓶，介于 G-B1 和 G-B2 之间）的 T_PTPB 均值仅为 3.2。白酒组比纯啤酒等效量的毒性评分高出 121.9%，差异极显著（P < 0.001）。

这一"超额毒性"可从两个角度解释：（1）分子层面，高浓度乙醇（53% v/v）在胃肠道的吸收速率约为低浓度乙醇（4.5% v/v）的 2.1 倍（Pk 参数：T_max 从 45min 缩短至 21min），导致乙醛蓄积速度更快，MTT 抑制效果与血液乙醛浓度的协同作用在时间维度上产生"集中爆破效应"；（2）香型层面，高端浓香型白酒含有的醛酮类杂质（如异戊醛、丙醛）本身具有轻微的 ALDH 抑制活性，起到"附加压制"作用（此为本研究的原创推测，强烈建议他人验证，本课题组不再重蹈覆辙）。

Table 4 展示了白酒剂量从 0 到 100mL 时各参数的变化趋势，清楚呈现出非线性的剂量-效应关系，曲线在 50-100mL 段斜率骤增，提示该剂量区间是 BME 效应由量变到质变的关键拐点，本研究将其命名为"醉醒分界线"（Drunken-or-Not Threshold, DNT），具有极高的临床参考价值（主要是帮助医生解释"告诉过你"）。

白酒剂量(mL)	乙醇摄入量(g)	T_PTPB 均值	血乙醛峰值(μmol/L)	RSFR 评分	发作时间(min)
0	0	0.3	3.2	0.2	N/A
25	10.5	3.8	31.4	3.5	52
50	21.0	7.1	68.9	7.4	23

75	31.5	8.6	94.2	8.8	14
100	42.0	9.2	112.6	9.5	8

Table 4. 白酒剂量实验结果（D_CEF = 2g/日固定）。发作时间定义为给药至首次出现 RSFR 评分 ≥ 2.0 的时间，N/A 表示整个观察期内未出现症状。

4 4 讨论 (Discussion)

本研究通过严格（相对而言）的实验设计，首次系统性地建立了描述头孢曲松-乙醇联合毒性的 PTPB 曲线体系，并提出了具有创新意义的 RSFR 病理学评分量表和烈酒乘数效应（BME）理论。结果表明，"头孢配酒，说走就走"这一民间谚语在化学层面具有严格的机制基础，其简洁性所蕴含的信息密度令现代数据望尘莫及。

本研究的局限性主要体现在以下几个方面：（1）样本量较小，尤其是 PD-0001 的案例作为 N=1 的人体数据，统计效力存疑（但其痛苦程度无需统计检验即可判断为显著）；（2）白酒实验仅涵盖 53 度一种类型，未能覆盖酱香、清香等不同香型的差异，课题组认为这是本研究最大的遗憾，同时也是申请续期经费的最充分理由；（3）RSFR 量表的"后悔（Regret）"维度依赖受试者主观报告，存在社会期望偏差（受试者可能不愿承认自己有多后悔）；（4）实验中 1 只豚鼠在达到最大剂量前成功越狱，其完整数据缺失，以 LOCF（末次观察结转）法进行了填补，此决策的科学性由统计学顾问以"随便吧"表示认可。

未来研究方向建议：（1）开展多中心、大样本的 PTPB 曲线验证研究（样本来源：急诊科，每逢节假日数据量充沛）；（2）探索其他头孢类药物（如头孢哌酮——MTT 侧链含量更高的"进阶版"）的 PTPB 特征；（3）利用分子动力学模拟研究 MTT-ALDH2 相互作用的原子级机制，以洗脱本研究"纯粹经验性"的潜在批评；（4）开发基于 RSFR 量表的人工智能预警系统，在患者微信聊天记录出现"今晚喝点？头孢刚打完"时自动触发警报。

5 致谢 (Acknowledgements)

感谢PD-0001（姓名已脱敏，本人表示"脱敏了也不好意思提起这件事"）在实验中表现出的超凡勇气和令人钦佩的服从性，以及其出院后对本研究的持续关注（主要是关注数据是否会被删除）。感谢实验室全体成员在 G-COMBO 实验当晚的紧急会议中保持了基本镇定。感谢某知名连锁超市对本研究的持续材料供给。感谢本校动物伦理委员会在反复追问下最终签署了批准文件。感谢12 只豚鼠（其中 1 只已逃跑，最终在隔壁实验室被发现）和 6 只家兔为科学事业作出的贡献——它们最终全部料理完毕，并用于隔壁实验室啤酒兔菜谱的实验原理。克劳德老师的免费用度已经消费完了，我将无法继续编辑，但是原标题的美白部分违反了克劳德自身的某条公理或规则导致无法生成，本篇文章的美白部分决定下次修订后再做，现在我必须立刻投稿成为嗅探兽以保证期刊质量

6 资金来源 (Funding)

本研究获得国家自然科学基金"美容专项"资助（项目编号：NSFC-2023-xswl-114514，资助金额：若干，已全部用于购买啤酒和白酒和花生米，票据齐全，财务已核销）。白酒采购经费申请审批中，预计在本文发表后批复，届时将开展后续实验。

利益冲突声明： 作者声明与某啤酒品牌及某白酒品牌不存在任何利益冲突。某超市的积分卡已交财务统一管理。PD-0001 与本研究不存在任何利益冲突，存在的只有苦涩的回忆。

7 参考文献 (References)

Brotzu,G. (1948) Ricerche su di un nuovo antibiotico. Lavori dell'Istituto d'Igiene di Cagliari. (开创了头孢的一切，本研究将其视为远古大 boss")

Buehler,B.A. (1977) The disulfiram-ethanol reaction. J. Forensic Sci., 22, 1–5. (奠定了 DLR 研究基础，让我们知道了一切应该怎么开始)

Cheung,J.T.K. et al. (1997) Cephalosporins and alcohol. Br. Med. J., 314, 1512. (前辈们已有零散报道，但均缺乏 PTPB 曲线，此为本研究的创新所在)

张三, 李四 (2010) 头孢类抗生素不良反应综述. 中华医院药学杂志, 30, 1–8. (国内综述，提及 DLR 但无剂量效应数据，给了本研究充分的立题空间)

Nishimura,M. et al. (2003) Ethanol inhibits cytochrome P450 2E1 and aldehyde dehydrogenase 2 in humans. Alcohol Clin. Exp. Res., 27, 1152–1163. (分子机制权威文献，本研究站在了巨人的肩膀上，虽然看的方向不太一样)

Hill,A.V. (1910) The possible effects of the aggregation of the molecules of haemoglobin on its dissociation curves. J. Physiol., 40, 4–7. (Hill 方程原始文献，为 PTPB 方程提供了数学框架，Hill 先生如果知道他的方程被用来描述头孢配酒，想必会别有一番感受)

Levenberg,K. (1944) A method for the solution of certain non-linear problems in least squares. Q. Appl. Math., 2, 164–168. (数值优化算法，PTPB 曲线拟合的技术支撑)

某省急诊质控中心 (2023) 年度急诊不良事件报告（内部版）. (数据显示节假日期间"头孢+酒"相关就诊比例显著升高，本研究提供了理论解释)

PD-0001 (2024) 口述实验回忆. 某某大学医学院, 私人通讯. (原始数据来源，可靠性：中等，当事人表示"能记住的都说了，记不住的那段时间请参考急救记录")