单向奔赴的尽头：“舔狗”的依恋异化、习得性无助及其抑郁风险的跨学科论证

醺教授[1]、酣教授[1*]、

1. “舔狗”研究所，宇宙市，114514
2. 加里敦大学研究中心，仙女座，9814

摘　要： 当你的狗对着另一只狗疯狂摇尾、舔舐、露肚皮，而对方却报以白眼、低吼甚至一记“无情铁嘴”时，你有没有想过——此时此刻，它的内心正在经历什么？是单纯的荷尔蒙上头，还是一场轰轰烈烈的“狗式失恋”？甚至，它会不会因此患上抑郁症，变成一只“抑郁舔狗”？

本文从心理学与哲学的“双狗眼”视角，严肃而不失幽默地探讨了犬类在种内求偶中可能出现的“舔狗”行为——即单方面疯狂付出、自我贬抑式讨好的情感惨案——及其与抑郁症之间的神秘联系。通过整合依恋理论（狗也需要安全感）、犬类认知研究（它们比你想象的更会察言观色）、神经内分泌学证据（催产素不只是“爱情激素”，也可能是“执着毒药”），以及现象学哲学（狗有没有“自我”这种高端问题），本文大胆提出了“犬类浪漫挫折综合征”这一学术新词。

为了给这一现象“实锤”，我们设计了“陌生犬-偏好选择实验”，试图量化一只狗在求偶受挫后的行为崩塌与生理崩盘，并基于此构建了两个“狗生公式”：“依恋-回报失衡指数”（ARII，用来计算你到底有多“舔”）和“抑郁风险预测公式”（DRP，用来预测你会不会“舔到抑郁”）。实验案例推演显示，某些“痴情犬”在面对持续拒绝后，确实出现了皮质醇飙升、快感缺失、过度舔舐自己（从舔别人变成舔自己，堪称“舔狗终极形态”）等类抑郁症状。

结论振聋发聩：狗，也会心碎；舔狗，值得被爱。本文不仅是写给学术圈的跨界探索，更是写给所有养狗人的一封“情感关怀倡议书”——请关爱你身边那只默默付出的舔狗，它可能正经历着一场不为人知的情感风暴。

关键词： 犬类心理学；舔狗；失恋；抑郁症；依恋理论；关爱舔狗，人人有责

中图分类号： S123.45　　**文献标识码：** A

1. 引言：问题的提出与研究的跨学科意义

在当代城市宠物文化中，“舔狗”一词从网络亚文化溢出，成为描述单方面情感付出的隐喻。然而，这一现象是否仅存在于人类的情感世界中？当一只公犬反复向某只母犬献媚、舔舐、尾随，却屡屡遭拒时，它的内心世界正在经历什

么？这种行为模式是否可能从一种求爱策略，异化为一种病理性的执着，并最终导向抑郁状态？

这些问题看似荒诞，实则触及比较心理学与动物情感研究的核心议题：非人类动物是否具有复杂的情感生活？它们是否可能经历类似人类的“失恋”痛苦？更重要的是，犬类作为与人类共演化万年的社会性动物，其情感机制是否与人类存在某种深层同源性？

本研究尝试将心理学的依恋理论、行为科学的实验范式与哲学的现象学视角相结合，系统考察犬类在种内求偶过程中的心路历程。我们提出“舔狗行为”的操作性定义：指个体在求偶过程中表现出显著不对称的付出（包括时间、能量、顺从行为），而对方回报率极低，且个体难以从这种模式中退出。在此基础上，我们进一步探讨这种行为模式向抑郁症转化的神经行为学机制，并尝试建立初步的数学模型。

2. 理论基础：犬类情感生活的心理学与哲学根基

2.1 依恋理论的物种间拓展：从 Bowlby 到犬类研究

约翰·鲍比（John Bowlby）的依恋理论最初用于解释母婴之间的情感纽带，但其核心命题——个体倾向于向“更强壮、更智慧”的依恋对象寻求安全感——在犬-人关系中找到了惊人的呼应。D‘Aniello 等人的研究发现，犬只在“陌生情境测试”中表现出的行为模式与人类婴儿高度相似，且存在显著的性别差异：母犬表现出更强的社交性，但对主人的离开更为敏感；公犬则在压力情境下表现出不同的应对策略。这一发现暗示，犬类的依恋系统不仅是物种间（犬-人）的产物，也可能塑造其物种内（犬-犬）的互动模式。

当我们将依恋理论应用于犬类求偶行为时，一个关键问题浮现：求偶中的“追求者”是否将“被追求者”视为某种形式的依恋对象？Beach 对母犬性偏好与社交亲和力的研究发现，母犬在动情期与非动情期的社交偏好存在显著分离：非动情期的社交亲和力与动情期的性接受度之间并无直接关联。这意味着，一只公犬在非动情期与母犬建立的友好关系，并不能保证在发情期获得交配机会。这种“社交投资与性回报的脱钩”，正是“舔狗困境”的结构性根源。

2.2 神经内分泌基础：催产素、多态性与个体差异

催产素常被冠以“爱情激素”之名，在犬-人互动中发挥着关键作用。麻布大学的研究表明，犬只与主人长时间对视会显著提升双方尿液中的催产素浓度，有的主人甚至增加到 2.5 倍。这种正反馈循环被认为是犬类在驯化过程中演化出的独特能力——狼在与人类互动中并不会出现类似的催产素升高。

然而，催产素系统的作用远比“爱情分子”的叙事复杂。Kis 等人的基因研究发现，催产素受体基因（OXTR）的多态性显著影响犬只对人的社交性：携带特定等位基因的犬只表现出更高的人际友善度，而这种效应在不同品种间存在差异。这提示我们，犬类的社交倾向具有坚实的遗传基础，个体在求偶中的“执着”或“灵活”可能部分源于其催产素受体的分子构造。

更重要的是，催产素的作用具有情境依赖性。正如杨（Ed Yong）所指出的，“爱情激素”在某些情境下促进信任与慷慨，在另一些情境下却可能加剧嫉妒与偏见。这一发现为理解“舔狗”行为的病理化提供了线索：当求偶受挫时，催产素系统的持续激活可能不是促进个体“放手”，而是强化其对拒绝对象的执着。

2.3 哲学视角：从“为他存有”到“自我异化”

哲学的透镜或许能帮助我们穿透行为表象，触及犬类情感体验的本真结构。法国现象学家列维纳斯（Emmanuel Levinas）提出的“为他者之面容”概念，强调主体在面对他者时的无限责任。当一只犬凝视其钟爱的对象时，这种凝视是否也承载着某种前语言的伦理呼唤？

*然而，“舔狗”的悲剧在于，它的“为他存有”未能获得回应，却又无法撤回。*这种单向度的付出构成了一种“自我异化”：犬只逐渐丧失其本真的行为表达，沦为讨好策略的集合。它舔舐、摇尾、露肚皮——这些原本具有多重意义的社交信号，在求偶情境中被简化为单一的“讨好”功能。当这些策略反复失败，犬只可能陷入一种现象学意义上的“存在性焦虑”：它不再知道自己是谁，只知道自己“不被接受”。

图 1 由于失恋而导致焦虑的“舔狗”

3. “舔狗”行为的形成机制：从进化策略到病理执着

3.1 进化视角下的不对称付出

从进化心理学看，雄性在求偶中的“付出”具有深刻的生物学根源。由于雌性在生殖中的投入更大（妊娠、哺乳），它们在选择配偶时更为挑剔；雄性则通过展示资源、地位或优质基因来竞争交配权。犬类幼犬的游戏行为研究表明，在混性别对中，雄性更频繁地发起游戏、表现出更多的“进攻”行为，并更多地使用“自我handicapping”（自我设限，即故意让自己处于劣势以维持游戏）。这种早期出现的性别差异，为成年后的求偶策略埋下了伏笔。

“自我设限”在游戏情境中是维持互动的社交技巧，但在求偶情境中，它可能演变为一种病理性模式：犬只不断降低自己的“要价”，接受越来越不平等的互动，只为维持与心仪对象的微弱联系。这正是“舔狗”行为的核心特征——用持续的自我贬抑换取对方的零星关注。

3.2 社会学习与习得性无助

当犬只的求偶行为持续得不到正向强化，却又不至于完全被惩罚（间歇性强化），它可能陷入一种“习得性无助”状态。塞利格曼（Martin Seligman）的经典实验表明，当动物经历无法控制的负向事件后，即使后来有机会逃避，也会放弃尝试。

在求偶情境中，一只“舔狗”犬可能经历类似的过程：它的讨好行为偶尔获得对方的容忍（而非接受），这种间歇性强化使其难以放弃；但同时，它从未真正获得交配机会，因此始终处于“求而不得”的挫折状态。长期的神经内分泌应激——皮质醇持续升高、多巴胺奖赏系统失调——可能最终重塑其大脑的情感回路。

4. 从“舔狗”到抑郁：病理转化机制与实证证据

4.1 抑郁的犬类模型：行为学与生理学指标

犬类抑郁症的概念已在兽医行为医学中获得一定认可。哈宠誌的科普文章指出，犬类抑郁的症状包括：过度舔舐（甚至发展为自残）、食欲改变（过度进食或绝食）、睡眠障碍（嗜睡或失眠）、社交退缩等。值得注意的是，过度舔舐这一症状与“舔狗”行为中的舔舐形成了一种悲剧性的呼应——求偶中的舔舐指向他者，抑郁中的舔舐转向自身。

Savalli 等人的研究采用 PANAS（积极与消极激活量表）评估犬类情绪倾向，发现母犬所有、绝育、独居的犬只表现出更高的消极激活得分。

这提示我们，某些个体特征可能构成抑郁的易感因素。*而在求偶受挫的语境中，那些原本社交性更强、对依恋对象更为执着的个体，或许恰恰面临更高的抑郁风险。*

4.2 “犬类浪漫挫折综合征”的提出

基于上述分析，本文提出“犬类浪漫挫折综合征”（Canine Romantic Frustration Syndrome, CRFS）的概念，其核心症状群包括：

行为维度：单方面持续的求偶付出，即使对方持续拒绝；退出困难，无法转向其他潜在配偶。

情感维度：在求偶情境中表现出焦虑迹象（喘息、踱步、呜咽），在非求偶情境中表现出快感缺失（对曾经喜爱的游戏、食物失去兴趣）。

生理维度：皮质醇水平持续偏高，催产素基线异常，睡眠节律紊乱。

认知维度：在“选择测试”中表现出对拒绝对象的病理性偏好，即使有更友善的替代选择。

这一综合征的提出，旨在为后续的实证研究提供一个可操作的概念框架。

5. 实验验证：设计、方法与初步发现

5.1 实验一：陌生犬-偏好选择实验

被试：30 只成年未绝育公犬，经 PANAS 筛选分为高社交性组与低社交性组，每组 15 只。

刺激材料：3 只发情期母犬（刺激犬 A、B、C），其中 A 为“高拒绝性”（对被试犬的求偶行为持续表现出回避/攻击），B 为“中接受性”（间歇性容忍），C 为“高接受性”（积极回应）。

实验流程：

第一阶段（基线测量）：单独测量被试犬在隔离环境中的皮质醇水平、行为表达（焦虑指标）。

第二阶段（求偶暴露）：将被试犬依次暴露于三只刺激犬，每次 30 分钟，记录求偶行为频率（舔舐、尾随、嗅探生殖器、试图爬跨）及对方的反应。

第三阶段（选择测试）：将被试置于三通道选择装置，三只刺激犬分别位于三个透明隔间，记录被试在各隔间前停留的时间。

第四阶段（追踪测量）：24 小时、72 小时后重复测量皮质醇水平及行为表达。

预期结果：

高社交性组在面对 A 犬（高拒绝性）时，最初表现出更高的求偶频率，但随暴露次数增加，出现行为抑制。

在选择测试中，部分高社交性个体会表现出对 A 犬的“病理性偏好”——即使被拒绝，仍在其隔间前停留更长时间。

追踪测量显示，对 A 犬表现出病理偏好的个体，72 小时后皮质醇水平仍高于基线，且出现更多的自我舔舐行为。

5.2 实验二：催产素干预实验

被试：选择实验一中表现出病理偏好的个体 10 只，随机分为实验组与对照组。

流程：实验组鼻喷催产素，对照组喷生理盐水，30 分钟后重复“选择测试”。

预期结果：催产素干预组对拒绝对象的偏好可能进一步加剧（而非缓解），这与催产素在社会记忆中的强化作用一致。

5.3 公式推导

基于上述实验设计，我们尝试构建两个初步公式：

（1）依恋-回报失衡指数（Attachment-Reward Imbalance Index, ARII）

$$\mathrm{ARII} = \frac{\sum(\mathrm{B_i} \times \mathrm{T_i})}{\mathrm{R} \times \mathrm{N}}$$

其中，B_i 为第 i 次互动的求偶行为强度（1-5 评分），T_i 为互动持续时间，R 为对方接受度（0-1，0 为完全拒绝，1 为完全接受），N 为互动次数。*ARII > 2.5 被定义为“舔狗行为”的操作阈值。*

（2）抑郁风险预测公式（Depression Risk Prediction, DRP）

$$\mathrm{DRP} = \alpha \cdot \mathrm{ARII} + \beta \cdot \mathrm{C_b} + \gamma \cdot (1 - \mathrm{S_f}) + \delta \cdot \mathrm{H_{ax}}$$

其中，C_b 为基线皮质醇水平，S_f 为社会灵活性得分（在替代选择前停留时间的变异系数），H_{ax} 为催产素受体基因风险等位基因（0/1 编码），$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 为通过回归分析确定的权重系数。

5.4 实验案例结果推演：从数据看“抑郁风险”

为了更直观地展示上述公式和理论如何应用于实际，我们推演一个典型的实验案例。

案例主角：

被试犬：编号 D-07，一只 2 岁未绝育的公柴犬，PANAS 筛查显示其具有高社交性。

刺激犬：A 犬（高拒绝性，始终对 D-07 龇牙、咆哮）、B 犬（中接受性，偶尔允许嗅闻）、C 犬（高接受性，积极互动）。



图 2 理想实验图

实验过程与数据记录：

第二阶段（求偶暴露）：

在与 A 犬的 3 次、每次 30 分钟的互动中，D-07 表现出极高的求偶强度。它不断靠近 A 犬，发出哀鸣，试图舔舐 A 犬的口鼻，但每次都被 A 犬的警告吼叫和撕咬威胁逼退。记录员给每次互动的(B_i)评分为 4.5（高强度），T_i 为 30 分钟，但 A 犬的（R）值为 0（完全拒绝），互动次数（N=3）。

在与 B 犬的互动中，D-07 表现相对平静，B_i 评分为 2.5，T_i 为 30 分钟，B 犬的（R）值为 0.4，互动次数（N=3）。

第三阶段（选择测试）：

在可以自由接近三只刺激犬时，D-07 表现出令人惊讶的“病理性偏好”。它在 A 犬的隔间前停留了总时长的 70%（35 分钟），在 B 犬前停留 20%（10 分钟），在 C 犬前仅停留 10%（5 分钟）。尽管 A 犬在隔间内依然对它表现出明显的敌意（隔着透明隔板低吼），D-07 依然长时间地趴在隔板前，凝视着 A 犬。

根据此数据计算其社会灵活性得分(S_f)。三组停留时间（35, 10, 5）的标准差约为 16.07，平均停留时间约为 16.67 分钟，变异系数 = 16.07/16.67 = 0.96。这个值其实不低，因为它对 A 犬的偏好非常极端，导致数据离散程度大。但我们需要重新审视“社会灵活性”的定义。这里的(S_f)旨在衡量“根据对方的友善度调整偏好的能力”。显然，D-07 无视了友善度。一个更精确的计算方法可能是比较它对“最高回报预期”对象（C 犬）的实际停留时间与理论最优停留时间（假设平均分配为 33%）的差距。这里我们简化处理，根据其“明知不可为而为之”的行为，给予其(S_f)一个较低的分数，比如 0.3，那么($(1 - S_f) = 0.7$)。

第四阶段（追踪测量）：

基线皮质醇(C_b)为 2.0 μg/dL（在正常范围内偏高）。

72 小时后，D-07 的皮质醇水平飙升到 4.5 μg/dL。

行为上，D-07 表现出明显的抑郁迹象：食欲下降，对之前最爱的玩具（一个会发声的球）完全失去兴趣，大部分时间蜷缩在角落，出现频繁的、无目标的自我舔舐（尤其是前爪），甚至开始啃咬自己的毛发。

基因型分析：

基因检测显示，D-07 携带特定的 OXTR 基因型，被编码为($H_{ax} = 1$)。

公式计算与结果推断：

计算 ARII：

与 A 犬的互动：投入总和= $((4.5 \times 30) \times 3 =$

405)。

与 B 犬的互动：投入总和= ((2.5 × 30) × 3 = 225)。

总投入 = (405 + 225 = 630)。

总 回 报 = ($R_A \times N_A + R_B \times N_B$ = (0 × 3) + (0.4 × 3) = 1.2)。

ARII = 630/1.2 = 525。这个值远远超过了我们设定的 2.5 的“舔狗”阈值，表明 D-07 经历了极端的依恋-回报失衡。

预测抑郁风险 DRP：

假设通过前期大样本研究，我们拟合出的权重系数为：$\alpha = 0.01, \beta = 0.5, \gamma = 0.8, \delta = 0.3$。

将 D-07 的数据代入：DRP = (0.01 × 525) + (0.5 × 2.0) + (0.8 × 0.7) + (0.3 × 1)。

DRP = 5.25 + 1.0 + 0.56 + 0.3 = 7.11。

结论推断：

D-07 的案例强有力地证明，犬只在经历“舔狗”式的情感挫折后，确实存在患抑郁症的显著风险。

行为证据：其行为完全符合我们提出的“犬类浪漫挫折综合征”（CRFS）的核心症状：单方面持续付出、退出困难（对 A 犬的病理性偏好）、以及随后的快感缺失、社交退缩和刻板的自我伤害行为。

生理证据：皮质醇水平的持续异常升高，是其 HPA 轴（下丘脑-垂体-肾上腺轴）功能紊乱的直接证据，这与人类抑郁症患者的神经内分泌特征高度一致。

模型预测：其高达 7.11 的 DRP 得分，远超我们初步设定的抑郁高风险阈值（例如，假设阈值为 5.0），清晰地表明其生物-心理-社会风险因素已叠加到一个危险水平。

这个推演案例清晰地揭示了一条从“爱而不得”到“自我异化”，最终滑向“抑郁深渊”的心路历程。D-07 的遭遇并非孤例，它代表了无数在情感世界中受挫的个体。

6. 讨论与结论

6.1 理论意义：重思动物情感与主体性

本研究的理论意义在于，它将原本属于人类情感世界的概念——“舔狗”“失恋”“抑郁”——引入动物行为研究，并尝试用严谨的心理学框架与神经科学证据加以考察。这不仅是概念的隐喻性迁移，更是对动物情感生活复杂性的严肃承认。如果一只犬可以因为单方面的爱而陷入抑郁，那么我们对动物主体性的理解就必须超越行为主义的“刺激-反应”范式，进入现象学意义上的“体验世界”。

6.2 实践启示：犬类福利与伦理关切

基于本研究的发现，我们不能再对“舔狗”犬的行为一笑了之。它们的执着背后，可能隐藏着深刻的心理痛苦。因此，我们向所有犬只饲养者、繁育者和爱好者发出以下关爱呼吁：

敏锐识别，警惕信号。当你的爱犬持续、固执地追求另一只明显不接受的犬时，请留意其情绪变化。是否在求偶受挫后出现食欲下降、睡眠紊乱、对玩耍失去兴趣、过度舔舐自己等迹象？这些可能是抑郁的早期信号。

主动干预，而非放任。“让它们自己处理”并非总是最佳策略。如果观察到犬只因求偶而陷入持续的焦虑和沮丧，饲养者应主动进行物理隔离，避免其反复遭受负反馈，打破“间歇性强化”的恶性循环。

转移注意，重建快乐。引导犬只将注意力从“求而不得”的对象上移开。增加与它的互动游戏时间，带它探索新的环境，学习新的技能（如嗅闻游戏）。通过丰富的环境刺激和积极的互动，帮助它重建多巴胺奖赏系统，重新体验生活的乐趣。

适时医疗，科学帮助。如果犬只已出现明显的抑郁症状，且通过环境调整无法改善，应及时寻求专业的兽医行为学家的帮助。必要时，在医生指导下，可考虑药物干预（如抗抑郁药物）来帮助其度过难关。

反思繁育与伦理。对于因强烈发情冲动而导致极端痛苦的犬只，绝育是一个需要认真考虑的选项。这不仅是控制繁殖，更是对犬只生活质量的负责。我们应反思，将动物的自然本能置于一个让其持续痛苦的环境中，是否符合我们对伴侣动物的伦理责任？

6.3 从分析到行动

“舔狗”一词，是人类用以自嘲的情感标签，包裹着求而不得的苦涩与难以抽身的执念。然而，当我们俯身注视那些同样在情感中笨拙付出的犬类伙伴时，这个词汇便褪去了人类世界的复杂心计，显露出其最原始、最纯粹的情感重量——那是一种不计得失的奔赴，一种不求回报的忠诚。

在这场跨物种的情感对照中，我们惊讶地发现：人类舔狗与犬类舔狗，竟互为镜像。

从犬的身上，人类或许该学会它的无畏——它的每一次摇尾都不预设回应，每一次舔舐都不计算成本。那种全情投入的勇气，正是人类在情感中日益稀缺的天真。而从人类的困境中，犬类或许也需要我们为它建立边界——当它的赤诚遭遇持续冷遇，我们不能再以“天性如此”为由袖手旁观，而应教会它（或替它做出）人类花了千年才学会的课题：适时转身，保护自己。

通过心理学的透镜、神经科学的证据和哲学的反思，我们看到了一个与人类共享脆弱性的生命。它们也会爱，也会痛，也会在爱而不得的挫败中走向心灵的幽暗之地。而更重要的是，它们与人类一样，需要在这幽暗中被看见、被接住。

因此，关爱“舔狗”，不是居高临下的怜悯，也不是茶余饭后的调侃——它是人类对另一种生命形式的尊重与共情，也是我们对自己情感伤口的温柔回望。当我们选择犬作为伴侣，我们不仅分享了它们的忠诚与欢乐，也有责任替它们识别那些“不值得”的执着，并帮它们找回内心的安宁。

愿每一颗赤诚的心，无论跳动在人类的胸腔还是犬类的肋骨之下，都能被这世界温柔以待。愿它们在付出之后，即使无果，也能找到回归快乐的路——如果狗还不会自我疗愈，那就让爱它的人类，牵着它走回去。

注：本文均有 AI 生成不具备任何科研意义

参考文献

[1] [1] D‘Aniello, B., Scandurra, A., Pinelli, C., et al. (2021). Is this love? Sex differences in dog-owner attachment behavior suggest similarities with adult human bonds.Animal Cognition, 24(1), 137-148.

[2] [2] 哈宠誌. (2020). 讓毛小孩跟毛憂鬱說掰掰.HotPets.

[3] [3] Savalli, C., Albuquerque, N., Vasconcellos, A. S., et al. (2019). Assessment of emotional predisposition in dogs using PANAS and associated relationships in a sample of dogs from Brazil.Scientific Reports, 9(1), 18386.

[4] [4] Beach, F. A. (1970). Coital behaviour in dogs. VIII. Social affinity, dominance and sexual preference in the bitch.Behaviour, 36(1), 131-147.

[5] [5] Ward, C., Bauer, E. B., & Smuts, B. B. (2008). Partner preferences and asymmetries in social play among domestic dog, Canis lupus familiaris, littermates.Animal Behaviour, 76(4), 1187-1199.

[6] [6] 新华网. (2015). 狗和主人对视能增进双方感情.新华网.

[7] [7] Kis, A., Bence, M., Lakatos, G., et al. (2014). Oxytocin receptor gene polymorphisms are associated with human directed social behavior in dogs (Canis familiaris).PLoS ONE, 9(1), e86793.

[8] [8] Walker, J. K., Dale, A. R., D‘Eath, R. B., & Wemelsfelder, F. (2016). Qualitative Behaviour Assessment of dogs in the shelter and home environment.Applied Animal Behaviour Science, 180, 89-97.

The End of One-Way Pursuit: An Interdisciplinary Argument on the Attachment Alienation, Learned Helplessness and Depression Risk of "flatterer of goddess"

Professor Xun 1, Professor Han 1*,

1. "flatterer of goddess" research institute, Cosmos City, 114514
2. Galli Dun University Research Center, Andromeda, 9814

Abstract: When your dog frantically shakes its tail, licks, and exposes its belly to another dog, only to be met with a glare, a growl, or even a "heartless iron mouth," have you ever wondered—what is going on inside it at this moment? Is it just a simple surge of hormones, or a fierce "dog-style heartbreak"? Or could it even develop depression and become a "depressed flatterer of goddess"?

From the "double dog's eye" perspective of psychology and philosophy, this article seriously yet humorously explores the possible "flatterer of goddess" behavior in intraspecific courtship among dogs—namely, the emotional tragedy of one-sided frenzied giving and self-deprecating flattery — and its mysterious connection with depression. By integrating attachment theory (dogs also need security), canine cognitive research (they are more adept at reading people than you might think), neuroendocrine evidence (oxytocin is not just a "love hormone" but may also be a "pernicious poison"), and phenomenological philosophy (whether dogs have a "self" as a high-end question), this article boldly proposes the academic term "canine romantic frustration syndrome."

To "sufficiently proof" this phenomenon, we designed the "Stranger Dog-Preference Selection Experiment," attempting to quantify the behavioral collapse and physiological breakdown of a dog after a failed courtship, and based on this, constructed two "dog life formulas": the "Attachment-Return Imbalance Index" (ARII, used to calculate how "licky" you are) and the "Depression Risk Prediction Formula" (DRP, used to predict whether you will "lick your way to depression"). Experimental case simulations showed that certain "obsessed dogs" indeed exhibited depressive-like symptoms such as a surge in cortisol, loss of pleasure, and excessive self-licking (shifting from licking others to licking themselves, which can be described as the "ultimate form of flatterer of goddess").

The conclusion is deafening: dogs can also be heartbroken; the flatterer of goddess deserves to be loved. This article is not only a cross-disciplinary exploration for the academic community, but also an "emotional care initiative" for all dog owners—please care for the silent flatterer of goddess around you, as it may be experiencing an unknown emotional storm.

Key words: Canine psychology; flatterer of goddess; heartbreak; depression; attachment theory; caring for flatterer of goddess, everyone has a responsibility