医学生/医生求偶成功率与对照人群的量化比较研究——基于时间剥夺、压力荷尔蒙与浪漫行为频次的生存分析模型

宿舍中的东北黑猪*；河中溺死的乌*；宿舍中的江南胖猪#；另外一个头有点黑猪#

养猪省内卷市“卷王医学院”东 1 栋 111 房间”两头乌宿舍”　邮编：250013

‘*’标注为共同第一作者；‘#’标注为通讯作者；

摘　要：

目的：量化评估医学相关专业人群（医学生及在职医师）在婚恋市场中的“成功着陆率”，并与普通对照人群进行比对，旨在探究“时间剥夺指数”、“压力相关性脱发”及“话题死亡风险”等关键变量对求偶成功的边际效应。方法：采用多中心、前瞻性队列研究设计。将 520 名医学组受试者（医学生 250 名，住院医师 270 名）与 520 名年龄、性别匹配的普通职业对照组进行为期 2 年”恋爱周期”的追踪。主要终点为“确立稳定恋爱关系（持续≥3 个月）”。采用 Kaplan-Meier 法绘制生存曲线（此处“生存”指保持单身状态），Cox 比例风险模型分析风险因素。结果：医学组“脱离单身”的中位时间显著长于对照组（20.3 月 vs. 6.2 月，Log-rank P < 0.001）。至研究终点，医学组单身“生存率”为 85.2%，对照组为 6%。Cox 回归显示，“值班频率”（HR=0.41, 95%CI: 0.30-0.55）、“考试月长度”（HR=0.67, 95%CI: 0.52-0.85）是求偶成功的独立保护因素（即显著降低成功风险）。将约会称为‘查房’或‘收病人’的频次（HR=0.20, 95%CI: 0.10-0.40）是极强的负向预测因子。结论：医学背景人群面临着由结构性时间匮乏、职业术语污染及不可抗力日程崩塌构成的“求偶逆境三角”，其确立恋爱关系的成功率显著低于普通人群。

关键词：求偶成功率；医学生；时间剥夺；职业暴露；生存分析；单身狗

基金项目： 国家自然科学基金——医学生存与繁衍矛盾专项（项目编号：007996）；中华医学会临床单身狗分会资助（课题编号：FL2345）

1. 背景

在当代社会复杂的选择梯度下，特定职业群体的婚恋生态位呈现高度特化。医学从业者及预备队伍（统称医学群体）作为长期经历超长培训周期、持续高压及非规律作息的典型群体，其用于浪漫互动的”认知-时间预算”遭受严重挤占[1]。前期观察性研究提示，该群体常表现出“将病情讨论误认为调情”、“认为‘气色很好’是最高级别赞美”等适应性特征[2]。然而，目前尚缺乏对该群体求偶效率的严格定量评估，及其与普通人群差异的机制性解释。本研究旨在填补这一空白，通过构建”浪漫生存分析”模型，为理解职业特征如何塑造婚恋命运提供严谨且充满心酸的证据。

图 1 四位作者的自拍照

2. 方法

2.1. 研究设计

这是一项名为”浪漫绝地求生”（Romantic PUBG: Persistently Unpaired Biomedical Graduates）的前瞻性、观察性、开放性、致郁性研究。我们采用了”看看就好，别太当真”的队列

设计。为避免对受试者造成额外的精神伤害（即提醒他们仍然单身这一事实），本研究未设置盲法。

2.2. 对象与方法

医学组：从“卷王大学”及其附属“不眠夜医院”中招募。纳入标准包括：①已完成系统解剖学、局部解剖学、内科学、外科学、儿科学等 63 本蓝色书本的学习；②手机相册中自拍与医学影像学图片比例低于 1:10；③曾下意识地用“病情平稳”描述自己的情感状态；认为”明天我休息”是世界上最浪漫的情话。排除标准：已婚人士、已订婚人士、以及本院内部消化的情侣（因为他们被视为“幸存者偏差”，不纳入基线风险模型）。

对照组：从本地综合性大学及普通公司招募，职业包括但不限于程序员、教师、公务员。核心纳入标准为：工作规律，拥有完整的双休日概念，且从未在约会时收到过“速回，有急诊手术”的短信。

2.3. 研究流程与”浪漫相关变量”的测量

所有受试者入组时签署”知情同意书”（内含”我自愿承认自己单身并可能因此受到持续伤害”的条款）。通过每日时间日志、可穿戴设备（监测压力激素皮质醇）、以及社交媒体聊天记录语义分析，收集“话题死亡风险（LD50，指聊天中使对方兴趣降至 50%所需专业晦涩内容剂量）”、“值班密度指数”、“术语污染度”、”约会猝然取消率（CCR）”等核心指标。

“话题死亡风险”的评估： 研发“话题心电图”聊天记录分析算法。当聊天内容中出现“我跟你讲今天那个病人...”、“这个病理机制是...”时，算法判定为一次”室性早搏”。连续出现三次且对方回复间隔超过 15 分钟，或出现“嗯”、“哦”、“先去洗澡了”等语句，则判定为一次“话题心跳骤停”，记录为终点事件。

值班密度指数：每月值夜班次数 ÷ 当月天数。结果>0.3 被定义为“高强度暴露”。

术语污染度：在非工作场合，每 24 小时自然说出“鉴别诊断”、“指征”、“预后”等词汇的次数。由受试者随身佩戴的、经过伦理豁免的录音笔记录。

约会猝然取消率：记录每位医学组受试者因突发加班、急诊、科室会议而取消或推迟约会的次数，并计算其“平均无鸽子放飞时间”。

在初次约会模拟实验中，记录从对话开始到对方眼神开始游离、或试图掏出手机的时间，定义为“兴趣半衰期（T1/2）”。

2.4. 统计学分析

使用 SPSS 25.0 和 “一拍脑袋” 软件进行数据分析。生存分析中，删失数据包括：受试者退学、转行、或彻底放弃婚恋希望而投身于”与学术共存亡”的修行。连续变量以均数±标准差表示，但鉴于医学生活的极端性，我们更多使用中位数和四分位间距。分类变量以构成比表示，并在讨论部分转化为眼泪的百分比。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义，$P<0.001$ 为”这还用统计？明摆着的事实！”

2.5. 伦理和资助

本研究已通过“人间真实伦理审查委员会”的快速审批（批号：NM-TRUE-2026）。委员会认为，本研究的风险不大于受试者日常所面临的职业风险。本研究由我家自然科学基金——医学生存与繁衍矛盾专项（项目编号：007996）；中华医学会临床单身狗分会资助（课题编号：FL2345）。

3.结果

3.1. 基线资料

两组在年龄、性别、初始吸引力自评上无统计学差异（$P>0.05$）。医学组在”对未来子女进行无菌操作培训的意愿”上得分显著更高（$P<0.001$）。

3.2. 主要终点：“浪漫生存”分析

医学组与对照组在为期两年的观察期内，其“保持单身状态”的生存曲线存在显著且残酷的分野（图 1）。Log-rank 检验显示两者差异具有高度统计学意义（$\chi^2 = 143.8, P < 0.001$）。医学组受试者保持单身状态的中位时间为 20.3 个月（95% CI: 16.8 - 22.1），意味着超过一半的医学背景人士需要一年半以上才能“脱离苦海”。相比之下，对照组的中位时间仅为6.2个月（95% CI: 5.5 - 7.0），其单身痛苦期显著缩短。

至 24 个月的研究终点，医学组仍有高达 85.2%的个体成功“存活”在单身状态，展现出强大的耐受性与稳定性。而对照组仅剩 6.0%的“幸存者”，大部分已“沦陷”于稳定的恋爱关系。

3.3. 关键风险因素的 Cox 比例风险模型分析

为探究影响“脱单”的具体因素，我们构建了多变量 Cox 回归模型（图 2，风险比森林图）。结果显示，以下因素是“脱离单身”（即事件发生）的显著保护因素（风险比 HR<1），即它们牢固地守护着受试者的单身状态：

值班频率：每月每增加一个夜班，恋爱成功的风险降低约 59%（HR = 0.41, 95% CI: 0.30 - 0.55）。夜班是比任何人格特质都更强大的“爱情绝缘盾”。

考试/考核月长度：每年每增加一个考试密集月（如期末、执医考、晋升考），风险降低 33%（HR = 0.67, 95% CI: 0.52 - 0.85）。备考期间，大脑杏仁核对浪漫线索的反应活性显著降低。

职业术语日常误用频次：在社交中将约会称为“查房”，将送礼物称为“对症支持”，或将争吵和好称为”并发症处理后病情稳定”，是毁灭性最强的行为。每次此类误用，会导致恋爱成功率骤降 80%（HR = 0.20, 95% CI: 0.10 - 0.40）。

3.4. 敏感性分析

为控制“初始吸引力”的潜在混淆，我们仅对基线外貌评分前 50%的亚组进行分析。结果依然稳健，医学组的整体风险比（HR）仅轻微改善至 0.40。对医学组中成功“脱单”的少数幸存者（n=68）进行事后分析发现，其核心特征为：

1.内部消化：73%的幸存者的伴侣同为医疗系统内人员。

2.极致碎片化时间管理：他们擅长在电梯间、等咖啡的间隙完成关键情感交流。

3.术语免疫：伴侣能自动将“我今晚要收病人”翻译为“我晚点找你”，或将“预后良好”理解为“我们会有未来的”。

4. 讨论

本研究发现，医学群体的求偶过程本质上是一种“高负担、低强化”的操作性条件反射。其核心矛盾在于，塑造其职业优势的深度专业化与时间奉献，恰恰构成了其浪漫表达的”拮抗剂”。本研究的创新性在于将”值班”量化为核心协变量，并发现了“考试月”前后存在一个短暂的、因愧疚感驱动的“求偶行为脉冲”，但其成功率常因当事人随后陷入“考后昏迷”状态而无法持续。

局限性：本研究未区分内外科、儿科等亚组（传闻儿科医师因自带哄娃技能可能存在不同风险曲线）。未来研究可进一步探讨“麻醉医师”（基本不下班）与“急诊医师”（不规律下班）之间的”科室间求偶隔离”。

5. 结论

医学背景是求偶成功率的一个独立且强大的负面预测因子。医学背景人群面临着由结构性时间匮乏、职业术语污染及不可抗力日程崩塌构成的“求偶逆境三角”，其确立恋爱关系的成功率显著低于普通人群。社会应给予该群体更多的理解与机会——比如，当他们说“明天我休息”，那可能是一句比“我爱你”更郑重、更罕见的承诺。

参考文献（References）

[1] 我没空， 等. 论住院总的“时间相对论”：在科室的一年与在人间的一天. 中华苦逼医师杂志. 2025;1(1): 1-10.

[2] 真的吗， 我不信. 当他说“你这个心电图波形很特别”：医学直男浪漫话术的语用学灾难研究. 社会行为医学奇葩案例集. 2024; 12(3): 45-56.

Quantitative Comparative Study on Mating Success Rates of Medical Students/Physicians Versus the General Population: A Survival Analysis Model Based on Time Deprivation, Stress Hormones, and Frequency of Romantic Behaviors

Northeast Black Pig in the Dormitory*; Drowned Crow in the River*; Jiangnan Fat Pig in the Dormitory#; Another Somewhat-Black-Headed Pig#

"Two-headed Black Dormitory", Room 111, Building 1 East, "Roll King Medical School", Struggle City, Superpig Province, China 250013

*indicates co-first authors; # indicates corresponding author.

Abstract: Objective: To quantitatively evaluate the "successful landing rate" of medical-related professionals (medical students and practicing physicians) in the mating market and compare it with that of a general control population. The study aims to investigate the marginal effects of key variables such as the "time deprivation index," "stress-related alopecia," and "topic fatality risk" on mating success. Methods: A multicenter, prospective cohort study design was employed. A total of 520 participants in the medical group (250 medical students, 270 resident physicians) and 520 age- and gender-matched controls from general occupations were tracked for a 2-year "romantic cycle." The primary endpoint was "establishing a stable romantic relationship (lasting ≥3 months)." Kaplan-Meier method was used to plot survival curves (where "survival" denotes remaining single), and Cox proportional hazards model was applied to analyze risk factors. Results: The median time to "exit singlehood" was significantly longer in the medical group than in the control group (18.5 months vs. 6.2 months, Log-rank $P < 0.001$). By the end of the study, the "survival rate" was 68.3% in the medical group and 22.1% in the control group. Cox regression revealed that "frequency of being on call" (HR=0.41, 95% CI: 0.30-0.55) and "length of examination months" (HR=0.67, 95% CI: 0.52-0.85) were independent protective factors against mating success (i.e., significantly reducing the risk of success). The "frequency of referring to dates as 'ward rounds' or 'admitting a patient'" (HR=0.20, 95% CI: 0.10-0.40) was a strong negative predictor. Conclusion: Individuals with a medical background face a "triad of mating adversity" composed of structural time scarcity, occupational jargon contamination, and irrepressible schedule collapse. Their success rate in establishing romantic relationships is significantly lower than that of the general population.

Key words: Mating Success Rate; Medical Students; Time Deprivation; Occupational Exposure; Survival Analysis; Singles