

CÂU HỎI SÀNG LỌC

Lưu ý : nếu bạn dưới 45 tuổi, vui lòng gửi bản câu hỏi cho chúng tôi mà không cần làm các phần tiếp theo. Xin cảm ơn!

Phần 1: Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Tuổi :

Số điện thoại :

Với những phần bên dưới: Vui lòng đánh dấu “√” vào “□” nếu thông tin là đúng với trường hợp của bạn; Và vui lòng điền thông tin thích hợp vào những phần để trống “_____”

Phần 2:

1. Vui lòng đánh dấu “√” nếu bạn **trên 40 tuổi**

- ☐ Độ tuổi từ trên 40 - 45 tuổi, đã từng xét nghiệm đột biến gen BRCA
- ☐ Trên 45 đến 50 tuổi, bố hoặc anh trai mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt: ☐; anh trai, tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ____; bố, tuổi chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ____
- ☐ Trên 50 tuổi
- ☐ Nếu bạn không thuộc các trường hợp trên, hãy gửi bản câu hỏi ngay cho chúng tôi mà không cần làm các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.

Phần 3:

1. Hãy đánh dấu “√” vào ô trống trước thông tin đúng với bạn. Nếu bạn thuộc bất kỳ một trong các trường hợp nêu dưới đây, hãy quay lại để sàng lọc vào một thời điểm khác tùy chọn (lần sàng lọc này sẽ không được tính)

- ☐ Có quan hệ tình dục trong vòng 24 giờ
- ☐ Thực hiện nội soi bàng quang và đặt ống thông trong vòng 48 giờ
- ☐ Kiểm tra trực tràng kỹ thuật số (DRE) trong vòng 1 tuần.

2. Hãy đánh dấu “√” vào ô trống trước **thông tin đúng với bạn**

- ☐ Đã thực hiện sinh thiết tuyến tiền liệt trong vòng 3 năm;
- ☐ Đã cắt bỏ tuyến tiền liệt vì bất kỳ lý do gì;
- ☐ Có tiền sử ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng và ung thư phổi;
- ☐ Đang điều trị ung thư;
- ☐ Có các bệnh nghiêm trọng về tim, não, phổi, gan, thận và các bệnh nội tạng khác;
- ☐ Mặc bệnh Alzheimer;
- ☐ Đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào sau đây: ☐ Chất ức chế 5 α -reductase (Ví dụ: Finasteride, Dutasteride); ☐ estrogen; ☐ Thuốc progesterone; ☐ androgen; ☐ Sử dụng corticoid điều trị toàn thân lâu dài (trừ việc sử dụng tạm thời cho mục đích chống dị ứng), ☐ Dược liệu (ví dụ: cây cọ lùn) có thể làm giảm nồng độ PSA.
- ☐ Đang tham gia các nghiên cứu sàng lọc và thử nghiệm lâm sàng khác.

Phần 4: Bạn có những triệu chứng nào sau đây:

- ☐ Tiểu khó: thường phải rặn, gắng sức mới bắt đầu đi tiểu, thường có hiện tượng đường tiểu mỏng dần
- ☐ Tần suất đi tiểu: khoảng cách giữa các lần đi tiểu dưới 2 giờ, hoặc đêm khi đi ngủ từ lúc ngủ đến khi thức dậy phải dậy đi tiểu từ hai lần trở lên.
- ☐ Tiểu gấp: thường gặp khó khăn trong kiểm giữ hoạt động đi tiểu, cấp có cảm giác cấp bách muốn đi tiểu

- ☐ Cảm giác buồn tiểu không dứt: thường có cảm giác bí tiểu, bàng quang căng đầy, cảm giác bí tiểu vẫn không mất sau khi tiểu hết
- ☐ Tiểu nhỏ giọt: thường đi tiểu ngắt quãng, lúc bắt đầu đi tiểu nước tiểu rỉ ra, không thể chảy thành dòng .
- ☐ Đau xương
- ☐ Tiểu ra máu
- ☐ Không có triệu chứng nào ở trên

Sau khi hoàn thành, vui lòng gửi bản khảo sát cho nhân viên.

Cảm ơn bạn đã tham gia thực hiện khảo sát!