

# NP-Completeness

나는 그저 **NP-Complete** 이론이 흥미로운 발상이라고만 생각했다.  
그것이 지닌 잠재적 영향력은 제대로 인식하지 못했다.

-- 스티븐 쿡

때로는 어떤 것이 불가능하다는 사실이 유용할 때도 있다.

-- 레오나드 레빈

# 문제의 종류

풀 수 없는 문제들  
(Unsolvables)  
(Undecidable)

정지 문제  
힐버트의 10번째 문제  
...

여기에 속할 것이라고  
강력히 추정!

풀 수 있는 문제들  
(Solvable)  
(Decidable)

Presburger 산술  
...

NP-완비

현실적인 시간내에  
풀 수 없는 문제들

최소 신장 트리 문제  
최단 거리 문제  
...

현실적인 시간내에  
풀 수 있는 문제들

# 현실적인 시간

- 다항식 시간을 의미
  - 입력의 크기  $n$ 의 다항식으로 표시되는 시간
  - 예:  $3n^k + 5n^{k-1} + \dots$
- 비다항식 시간의 예
  - 지수 시간
    - 예:  $2^n$
  - 계승시간
    - 예:  $n!$

# Yes/No 문제와 최적화 문제

- Yes/No 문제 (Decision problem)
  - 예: 그래프  $G$ 에서 길이가  $k$  이하인 해밀토니안 경로가 존재하는가?
- 최적화 문제 (Optimization problem)
  - 예: 그래프  $G$ 에서 길이가 가장 짧은 해밀토니안 경로는 얼마인가?

✓ 두 문제는 동전의 앞뒷면

# NP-Complete 이론


- Yes/No 의 답을 요구하는 문제에 국한
  - 그렇지만 최적화 문제와 밀접한 관계를 갖고 있다
- 문제를 현실적인 시간에 풀 수 있는가에 관한 이론
- 거대한 군을 이름
  - 이 중 한 문제만 현실적인 시간에 풀면 다른 모든 것도 저절로 풀리는 논리적 연결관계를 갖고 있다

# 현재까지의 연구결과

- 어떤 문제가 NP-Complete/NP-Hard임이 확인되면  
⇒ 지금까지의 연구결과로는 이 문제를 현실적인 시간에 풀 수 있는 방법은 아직 없다
- 그렇지만 이 사실이 아직 증명은 되지 않음
- 클레이수학연구소의 21세기 7대 백만불짜리 문제 중의 하나
  - $P=NP$  문제

# NP-Complete에 관한 비유

상사가 아주 어려운 문제를 해결하라고 지시했다



1. 나는 답을 구할 수가 없습니다. 아마 나는 멍청한 모양입니다.



2. 나는 답을 구할 수가 없습니다. 왜냐하면 이 문제는 답이 없어요.



## NP-Complete 이론의 상황을 비유적으로 보여줌



3. 나는 답을 구할 수가 없습니다. 그렇지만 저렇게 수많은 천재들도 이 문제를 해결할 수 없습니다.

# 준비: 논리적 얼개

쉽다 = 현실적인 시간에 풀 수 있다

문제1: 정수  $x=x_1x_2\dots x_n$ 은 3의 배수인가?

문제2:  $x_1+x_2+\dots+x_n$ 은 3의 배수인가?


- ✓ 위 두 문제의 대답은 같다
  - Yes/No 대답이 일치한다
- ✓ 문제 2가 쉬우면, 문제 1도 쉽다

- 상황

- 문제 B는 쉽다

쉽다 = 현실적인 시간에 풀 수 있다


- 문제 A는 Yes/No 대답이 일치하는 문제 B로 쉽게 변형된다



✓ 문제 A도 쉬운가?

# Poly-Time Reduction (다항식 시간 변환)

- 문제 A의 사례  $\alpha$ 를 문제 B의 사례  $\beta$ 로 바꾸되 아래 성질을 만족하면 **polynomial-time reduction**이라 하고, 이를  $\alpha \leq_p \beta$ 로 표기한다
  - ① 변환은 다항식 시간에 이루어진다
  - ② 두 사례의 답은 일치한다



1. 문제 A를 다항식 시간에 문제 B로 변환한다
2. 변환된 문제 B를 푼다
3. 문제 B의 대답이 Yes이면 Yes, No이면 No를 리턴한다

✓ 문제 B가 쉬운 문제라면 문제 A도 쉬운 문제이다

# P와 NP

- P
  - Polynomial
  - 다항식 시간에 Yes 또는 No 대답을 할 수 있으면 P
- NP
  - **Nondeterministic** Polynomial
  - Non-Polynomial의 준말이 아님!
  - Yes 대답이 나오는 해를 제공했을 때, 이것이 Yes 대답을 내는 해라는 사실을 다항식 시간에 **확인**해줄 수 있으면 NP
- 어떤 문제가 NP임을 보이는 것은 대부분 아주 쉽다
  - NP-Complete 증명에서 형식적으로 확인하고 넘어가는 정도

# NP-Complete/Hard

NP : Yes 대답이 나오는 해를 제공하면 이를 다항식 시간에 **확인**할 수 있으면 됨

[정의] 다음 성질을 만족하면 문제  $L$ 은 **NP-Hard**이다

- 모든 NP 문제가  $L$ 로 다항식 시간에 변환가능하다  
(즉 “모든 NP문제  $\leq_p L$ ”)

[정의] 다음의 두 성질을 만족하면 문제  $L$ 은 **NP-Complete**이다


- 1)  $L$ 은 NP이다.
- 2)  $L$ 은 NP-Hard이다.

- ✓ NP-Complete는 NP-Hard의 일부이므로 NP-Complete인 문제를 NP-Hard이라고 불러도 맞다
- ✓ NP-Complete의 성질 1)은 대부분 자명하므로 핵심에 집중하기 위해 NP-Hard에 초점을 맞추자

[정리] 문제  $L$ 이 다음의 성질을 만족해도 NP-hard이다

알려진 임의의 NP-Hard 문제  $A$ 로부터 문제  $L$ 로 다항식 시간에 변환가능하다. (즉  $A \leq_p L$ )

<증명>



이것은  $A \leq_p L$ 임을 뜻한다.

주어진 조건이 “모든 NP문제  $\leq_p A$ ”이므로, 모든 NP문제  $\leq_p L$ 이 된다.

(by transitivity) ■

✓ 만일 문제  $L$ 이 쉬운 문제라면 문제  $A$ 도 쉬운 문제이다


➔ 그러므로 모든 NP 문제도 쉬운 문제이다




# NP-Hard 증명의 예

- 해밀토니안 싸이클 문제는 NP-Hard이다
  - 이를 이용해서 TSP 문제가 NP-Hard임을 보일 수 있다
- 
- 해밀토니안 싸이클 Hamiltonian cycle
    - 그래프의 모든 정점을 단 한번씩 방문하고 돌아오는 경로
  - 해밀토니안 싸이클 문제
    - 주어진 그래프에서 해밀토니안 싸이클이 존재하는가?
  - TSP 문제
    - 주어진 완전 그래프 complete graph에서 길이  $k$  이하인 해밀토니안 싸이클이 존재하는가?

- 해밀토니안 싸이클 문제의 instance(사례)  $\alpha$ 를 아래와 같이 TSP 문제의 instance  $\beta$ 로 다항식 시간에 변환한다



해밀토니안 싸이클 문제의 instance  $\alpha$



TSP 문제의 instance  $\beta$


Instance  $\alpha$ 가 해밀토니안 싸이클을 갖는다

$\Leftrightarrow$  Instance  $\beta$ 가 길이  $n$  이하인 해밀토니안 싸이클을 갖는다  
(이 예에서  $n$ 은 4)

➤ 그러므로 TSP는 NP-Hard이다. ■

Vertex 수와 일치

# NP-Complete 문제의 초기 역사



# 직관과 배치되는 NP-Complete 문제의 예

- Shortest path
    - 그래프의 정점  $s$ 에서  $t$ 로 가는 shortest path는 간단히 구할 수 있다
  - Longest path
    - 그래프의 정점  $s$ 에서  $t$ 로 가는 longest path는 간단히 구할 수 없다
    - NP-Hard
- ✓ 얼핏 비슷해 보이지만 위 두 문제의 난이도는 천지차이다!  
(지금까지의 연구 결과로는)


- Longest Path 문제

- (최적화 버전) 주어진 그래프에서 vertex  $s$ 에서  $t$ 로 가는 가장 긴 simple path의 길이는 얼마인가?
- (Yes/No 버전) 주어진 그래프에서 vertex  $s$ 에서  $t$ 로 가는 길이  $k$  이상인 simple path가 존재하는가?


- 두 점 사이 해밀토니안 경로 문제

- 주어진 그래프에서 정점  $s$ 에서  $t$ 에 이르는 해밀토니안 경로가 존재하는가?
- NP-Complete라고 알려져 있음

- 두 점 사이 해밀토니안 경로 문제의 instance  $\alpha$ 로부터 Longest Path 문제의 instance  $\beta$ 로 다항식 시간 변환



HAM-PATH-2-POINTS 문제의 instance  $\alpha$



LONGEST-PATH 문제의 instance  $\beta$

Instance  $\alpha$ 가 두 점  $s$ 와  $t$  사이에 해밀토니안 경로를 갖는다

$\Leftrightarrow$  Instance  $\beta$ 가 두 점  $s$ 와  $t$  사이에 길이  $n-1$  이상인 (사실은 정확히  $n-1$ ) simple path를 갖는다 (위 예에서  $n-1$ 은 4)

➤ 그러므로 Longest Path 문제는 NP-Hard이다. ■


핵심에 집중하기 위해 성질 1(Longest Path는 NP)은 일부러 누락.  
추가로 성질 1을 증명해서 NP-Complete임을 보이는 것은 매우 간단하다.

# CLIQUE

- 입력
  - 그래프  $G = (V, E)$ , 양의 정수  $K$
- 질문
  - 그래프  $G$ 에 크기  $K$ 인 complete subgraph가 존재하는가?
- CLIQUE은 NP-Complete이다

# 3SAT $\leq_p$ CLIQUE임을 증명하기 위한 그림

예: Boolean formula  $(x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_4)$ 이 true가 되는  $x_i$ 들 값 할당이 존재하는가?






# NP 이론의 유용성


- 어떤 문제가 NP-Complete/Hard임이 확인되면
  - ⇒ 쉬운 알고리즘을 찾으려는 헛된 노력은 일단 중지한다
  - ⇒ 주어진 시간 예산 내에서 최대한 좋은 해를 찾는 알고리즘 (heuristic) 개발에 집중한다

Remind: 때로는 어떤 것이 불가능하다는 사실이 유용할 때도 있다.  
-- 레오나드 레빈

# P와 NP의 포함 관계




(a)



(b)

- ✓ 위 (a)인지 (b)인지는 아직 밝혀지지 않음.  
백만불의 상금이 걸려 있다.

# NP와 NP-Complete, NP-Hard의 관계



✓ P 부분은 추정

# NP-Hard를 최적화 문제로 확장하기

- 정의상 NP-Complete은 decision problem(yes/no problem)에 국한된다
- NP-Hard는 그렇지 않다
- [Reminder] 모든 NP 문제가  $L$ 로 다항식 시간 변환가능하면  $L$ 은 NP-Hard다

# 다항식 시간 변환의 재정의

[def.] (Yes/No 버전에 맞는 정의) 문제 A의 사례  $\alpha$ 를 문제 B의 사례  $\beta$ 로 바꾸되 다음 성질을 만족하면 다항식 시간 변환이라 한다

1. 변환은 다항식 시간에 이루어진다(별 심각하지 않은 조건)
2. 두 사례의 답은 일치한다

[def. 2] (확장) 문제 A의 사례  $\alpha$ 를 문제 B의 사례  $\beta$ 로 바꾸되 다음 성질을 만족하면 다항식 시간 변환이라 한다

1. 변환은 다항식 시간에 이루어진다(별 심각하지 않은 조건)
2.  $\beta$ 의 답을 이용해서  $\alpha$ 의 답을 구할 수 있다

# TSP의 최적화 버전

입력: 양의 가중치를 갖는 undirected complete graph  $G = (V, E)$

질문:  $G$ 에서 길이가 가장 짧은 Hamiltonian cycle의 길이는?

**[Reminder] TSP (Yes/No 버전)**

입력: 양의 가중치를 갖는 undirected complete graph  $G = (V, E)$ ,  
양의 실수  $K$

질문:  $G$ 에서 길이가  $K$  이하인 Hamiltonian cycle이 존재하는가?

# 최적화 TSP는 NP-Hard다

알려진 NP-Hard 문제 하나로부터 최적화 TSP로 변환가능하면 최적화 TSP는 NP-Hard.

알려진 NP-Hard 문제인 Yes/No 버전 TSP로부터 변환.

Yes/No 버전 TSP의 사례를 그대로 최적화 TSP의 사례로 사용  
(변환 시간 제로)

질문 “ $G$ 에서 길이가  $K$  이하인 Hamiltonian cycle이 존재하는가?”는  
최적화 TSP를 해결하고 나면 저절로 풀린다.


도출된 최적해의 길이가  $K$  이하  $\rightarrow$  대답은 Yes

Otherwise, 대답은 No

최적화 TSP의 답을 이용해서 Yes/No 버전 TSP의 답을 구할 수 있다.  
 $\therefore$  최적화 TSP는 NP-Hard

✓ 대체로 이렇다. Yes/No 문제와 최적화 문제는 동전의 앞뒷면 같다.

# NP가 아니면서 NP-Hard일 수 있다



✓ P 부분은 추정



# Approximation: with TSP as an Example

# Approximation

- 어떤 문제가 NP-Complete/Hard임이 확인되면
  - ⇒ 쉬운 알고리즘을 찾으려는 헛된 노력은 일단 중지한다
  - ⇒ 주어진 시간 예산 내에서 최대한 좋은 해를 찾는 알고리즘 (heuristic) 개발에 집중한다
  - ⇒ approximation

- Ratio bound  $\rho(n)$  of an algorithm for a minimization problem:

$$\frac{C}{C^*} \leq \rho(n)$$

where  $n$ : the problem size

$C^*$ : the optimal solution cost

$C$  : the cost of a solution produced by the algorithm

# TSP w/ Triangle Inequality (Metric TSP)

$$w_{ij} \leq w_{ik} + w_{kj}, \forall \text{ vertices } i, j, k$$

## 1. NN (Nearest Neighbor Algorithm)

- Start at a random vertex, keep visiting the nearest unvisited neighbor
- [Thm] The ratio bound  $\rho(n)$  for NN
$$\rho(n) = \frac{1}{2}(\lceil \log_2 n \rceil + 1)$$
 for all instances
$$\frac{C}{C^*} > \frac{1}{3}(\log_2(n+1) + \frac{4}{3})$$
 for some large instances
- Guarantees almost nothing (이론적 흥미. 실용성 낮음.)


## 2. MST (Minimum Spanning Tree Algorithm)

- Construct a min. sp. Tree  $T$  starting at a random vertex
- Return the Ham. Cycle  $H$  that visits the vertices in the order of a preorder traverse of  $T$
- [Thm] The ratio bound  $\rho(n)$  for MST

$$\rho(n) = 2$$


<Proof>

$$C = \text{cost}(H) \leq 2\text{cost}(T) \leq 2C^*$$



### 3. MM (Minimum Matching Algorithm)

- Find a min. sp. Tree  $T$  starting at a random vertex
- Let  $V'$  be the set of odd-degree vertices in  $T$
- Find a matching of  $V'$  which has maximum cardinality and minimum weight, say  $M$
- Add  $M$  to  $T$  (to get an Eulerian graph  $C_1$  of  $T$ )
- Convert  $C_1$  into a TSP tour  $C_2$  (a Ham. Cycle) by using short cuts.



- [Thm] The ratio bound  $\rho(n)$  for MM

$$\rho(n) = \frac{3}{2}$$

<Proof>

Note:  $\text{cost}(T) \leq C^*$

$$\text{cost}(C_1) = \text{cost}(T) + \text{cost}(M)$$

Claim:  $\text{cost}(M) \leq \frac{1}{2} C^*$

<Proof>

An optimal tour  $C_{opt}$  (cost  $C^*$ ) can be changed to a tour  $C'_{opt}$  with only vertices in  $V'$  by using short cuts.

$$\text{cost}(C'_{opt}) \leq C^*.$$

Take alternate edges in  $C'_{opt}$  and then we have two matchings of  $V'$ .

Then the smaller of the two matchings must have cost  $\leq \frac{1}{2} \text{cost}(C'_{opt})$ .

Since  $M$  is the min. weight matching of  $V'$ ,

$$\begin{aligned} \text{cost}(M) &\leq \text{the smaller matching above} \\ &\leq \frac{1}{2} \text{cost}(C'_{opt}) \\ &\leq \frac{1}{2} C^* \end{aligned}$$

Therefore,  $\text{cost}(C_2) = \text{cost}(C_1) = \text{cost}(T) + \text{cost}(M) \leq \frac{3}{2} C^*$

# TSP w/o Triangle Inequality

[Thm]  $P \neq NP$ 라면, 어떠한 상수  $\rho$ 에 대해서도 최적해의  $\rho$ 배를 넘지 않는 해를 보장하는 poly-time 근사 알고리즘은 존재하지 않는다

<Proof>

Show that if there is a poly-time approximation algorithm  $A$  with a ratio bound  $\rho$ , then the Hamiltonian cycle problem is in  $P$ .

Given a HAM instance  $G=(V,E)$ , we construct an instance of TSP  $G'=(V,E')$  as follows:

$$w_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } (i,j) \in E \\ \rho|V| + 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

This is a poly-time transformation.

Run the (poly-time) algorithm  $A$  on  $G'$ ;

if  $A$  returns a tour of length  $\leq \rho|V|$ , then  $\exists$  a Ham cycle in  $G$ ,  
otherwise  $\exists$  no Ham cycle in  $G$ .

Thus HAM can be solved in poly time. Therefore  $NP=P$ .

Conclusion: If  $P \neq NP$ , there is no such poly-time approximation algorithm.

# Co-NP

an instance  $\alpha$

HAM

**NP:**  $x \in L$ 이면 nondeterministic poly-time에 Yes라고 대답할 수 있는  
문제  $L$ 들의 집합

**Co-NP:**  $\bar{L} \in \text{NP}$ 인 문제  $L$ 들의 집합

$\overline{\text{HAM}}$

**P:**  $x \in L$  인지 deterministic poly-time에 Yes 또는 No라고 대답할 수 있는  
문제  $L$ 들의 집합

**Co-P:**  $\bar{L} \in \text{P}$ 인 문제  $L$ 들의 집합

$\rightarrow \therefore \text{P} = \text{Co-P}$  (trivially)



**$NP \neq Co-NP$ 이면  $P \neq NP$ 이다**

**Equally,  $P = NP$ 이면  $NP = Co-NP$ 이다**

If  $P = NP$ , then  $NP = P = Co-P = Co-NP$ .

Hence,  $NP = Co-NP$ .