



ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปีกติ

แบบนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2560

วัคซีนจำเป็นที่ต้องให้กับเด็กทุกคน

วัคซีน	อายุ	แรกเกิด	1 เดือน	2 เดือน	4 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	18 เดือน	2½ ปี	4-6 ปี	11-12 ปี
บีซีจี¹ (BCG)		BCG										
ตับอักเสบเรื้อรัง² (HBV)		HBV1	(HBV2)									
คอตีบ-นาดทะยักษ์-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์³ (DTwP)				DTwP-HB1	DTwP-HB2	DTwP-HB3			DTwP กระตุ้น 1		DTwP กระตุ้น 2	Td และ ทุก 10 ปี
โอลิโอนิดกิน⁴ (OPV)				OPV1	OPV2+IPV	OPV3			OPV กระตุ้น 1		OPV กระตุ้น 2	
หัด-หัดเยื่อรัมณ์-คางทูม⁵ (MMR)							MMR1			MMR2		
ไข้สมองอักเสบเจี๊ย⁶ (Live JE)							JE1			JE2		

วัคซีนอื่นๆ ที่อาจให้เสริม หรือทางแทน

วัคซีน	อายุ	2 เดือน	4 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	18 เดือน	2 ปี	2½ ปี	4 ปี	6 ปี	9 ปี	11-12 ปี
คอตีบ-นาดทะยักษ์-ไอกรนชนิดไดร์เซลล์³ (DTaP, Tdap)		DTaP1	DTaP2	DTaP3			DTaP กระตุ้น 1			Tdap หรือ DTaP กระตุ้น 2			Tdap ต่อไป Td ทุก 10 ปี
โอลิโอนิดเจี๊ย⁴ (IPV)		IPV1	IPV2	IPV3			(IPV4)			IPV5			
Hib⁷ (Hib)		Hib1	Hib2	Hib3			(Hib4)						
ไข้สมองอักเสบเจี๊ย⁶ (Inactivated JE)					JE1, JE2 ห่างกัน 4 ลัปดาห์			JE3					
ตับอักเสบเอ⁸ (HAV)							HAV ให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน						
อีสุกอีสิ⁹ (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด-หัดเยื่อรัมณ์-คางทูม-อีสุกอีสิ (MMRV)							VZV1 (หรือ MMRV1)			VZV2 (หรือ MMRV2)			
ไข้หวัดใหญ่¹⁰ (Influenza)				Influenza ให้ปีละครั้งช่วงอายุ 6 เดือน-18 ปี (เน้นในอายุ 6-24 เดือน) ในปีแรกฉีด 2 เข็มห่างกัน 4 ลัปดาห์									
นิวโนโมคอคคัสชนิดค่อนขุ่นเกต¹¹ (PCV)		PCV1	PCV2	(PCV3)		PCV4							
โรต้า¹² (Rota)		Rota1	Rota2	Rota3 (เฉพาะ pentavalent)									
เօชพีวี¹³ (HPV)										HPV 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน			
ไข้เลือดออก¹⁴ (DEN)										DEN 3 เข็ม 0, 6 และ 12 เดือน			

