


ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA

www.elsevier.es/oftalmologia



Artículo original

Melanoma uveal: características clínicas, tratamiento y supervivencia en una serie de 500 pacientes[☆]

N. Vicente^{a,*}, M.A. Saornil^b, C. García-Álvarez^b, A. Almaraz^c, P. Alonso Martínez^d, J.M. Frutos-Baraja^d y F. López-Lara^d

^a Servicio de Oftalmología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

^b Unidad de Tumores Intraoculares del Adulto, Servicio de Oftalmología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

^c Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid, Valladolid, España

^d Unidad de Tumores Intraoculares del Adulto, Servicio de Radioterapia, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 7 de enero de 2013

Aceptado el 9 de junio de 2013

On-line el 30 de agosto de 2013

Palabras clave:

Tumores intraoculares

Melanoma uveal

Epidemiología

Tratamiento

Supervivencia.

R E S U M E N

Objetivo: Analizar las características clínicas, tratamiento y supervivencia de los pacientes diagnosticados de melanoma uveal en una unidad de referencia de tumores intraoculares en un periodo de 20 años.

Metodología: Se realizó un estudio prospectivo de 500 pacientes entre enero de 1992 y diciembre de 2011. Se recogieron las características clínicas del tumor y el tratamiento recibido en una base de datos en Microsoft® Access®. Las variables numéricas se analizaron con medias de frecuencia y desviación estándar, y las cualitativas con tablas de media de frecuencia.

Resultados: La edad media de la muestra fue de 62,19 años, siendo un 51,2% mujeres. Se diagnosticaron por la presencia de síntomas visuales el 64,2% de los casos. Los tumores eran pequeños en el 31,12% de los casos y grandes en el 23,09% según criterios del COMS. El color de iris fue el verde-avellana en el 44,2% de los ojos. El tratamiento inicial fue la braquiterapia episcleral en el 42,4%. La mortalidad global fue del 17 y 31,3% y la específica por melanoma del 11,6 y 14,8%, a los 5 y 10 años, respectivamente.

Conclusiones: En la serie estudiada los melanomas son más frecuentes en mujeres y en iris más oscuros comparados con estudios previos. Los tumores detectados son sintomáticos y en estadios poco avanzados, lo que permite tratamientos conservadores, siendo la braquiterapia el más importante. Se observa una disminución de la mortalidad específica por melanoma comparada con otras series publicadas. Sin embargo, son necesarios más estudios sobre los factores que influyen en la supervivencia.

© 2013 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

[☆] El presente trabajo ha sido presentado en el Congreso 88 de la Sociedad Española de Oftalmología que tuvo lugar en Barcelona los días 26-29 de septiembre de 2012.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: nelvit@yahoo.es (N. Vicente).

0365-6691/\$ – see front matter © 2013 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.oftal.2013.06.003>