




Disponible en ligne sur
SciVerse ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com



ARTICLE ORIGINAL

Mélanomes choroïdiens traités par protonthérapie : résultats anatomiques et fonctionnels au CHU de Strasbourg

Choroidal melanoma treated by protontherapy: Anatomical and functional results at Strasbourg University Medical Center

M. Saleh^{a,*}, J. Zhang^a, C. Benichou^a,
C. Hermsdorff^a, T. Bourcier^a, A. Sauer^a,
C. Speeg-Schatz^a, D. Gaucher^a

^a Service d'ophtalmologie, nouvel hôpital civil, CHU de Strasbourg, 1, place de l'Hôpital, BP 426, 67091 Strasbourg cedex, France

^b Service d'ophtalmologie, université de Franche-Comté, CHU Jean-Minjoz de Besançon, 3, boulevard Flemming, 25000 Besançon, France

Reçu le 15 février 2012 ; accepté le 16 août 2012
Disponible sur Internet le 25 juin 2013

MOTS CLÉS

Mélanome
choroïdien ;
Protonthérapie ;
Épaisseur tumorale ;
Complications
post-radiques

Résumé

Objectif. — Rapporter les résultats anatomiques et fonctionnels des mélanomes choroïdiens traités par protonthérapie entre 2001 et 2011 et les comparer aux données de la littérature.

Méthodes. — Étude rétrospective. Les dossiers des patients ayant présenté un mélanome choroïdien, pris en charge au CHU de Strasbourg entre 2001 et 2011 et qui ont bénéficié d'un traitement par protonthérapie, ont été analysés. L'acuité visuelle et un examen ophtalmologique complet comprenant mesure de la pression oculaire, examen du fond d'œil après dilatation, de même qu'un examen échographique avec mesure de l'épaisseur et du grand diamètre de la tumeur, ont été réalisés avant le traitement et aux différentes visites de contrôle (tous les six mois pendant cinq ans puis une fois par an jusqu'à dix ans). Les taux et les délais d'apparition des complications locales (cataracte, rubéose, décollement de rétine, glaucome néovasculaire et d'énucléation secondaire) et à distance (métastase), sont également rapportés.

Résultats. — Soixante-dix dossiers ont été retenus. L'âge moyen de la population traitée est de $61,4 \pm 15,2$ ans. Le ratio homme/femme est de 1,06. L'acuité visuelle moyenne qui était de $0,55 \pm 0,6$ (3/10^e) lors du traitement, a progressivement diminué à partir du 42^e mois. L'épaisseur tumorale moyenne lors du traitement était de $5,8 \pm 2,8$ mm et le grand diamètre

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : msaleh@chu-besancon.fr (M. Saleh).