

Article original

Résultats préliminaires de la protonthérapie du mélanome de la choroïde au centre de protonthérapie d'Orsay (CPO) : les 464 premiers cas

L Desjardins, C Levy, F d'Hermies, E Frau, P Schlienger, JL Habrand, H Mammar, L Schwartz, A Mazal, S Delacroix, C Nauraye, R Ferrand, B Asselain

Centre de protonthérapie d'Orsay, BP 65, 91402 Orsay cedex, France

(Reçu le 4 novembre 1996 ; accepté après révisions le 3 mars 1997)

RÉSUMÉ

But de l'étude : Analyse rétrospective des résultats préliminaires du traitement par protons du mélanome de la choroïde au centre de protonthérapie d'Orsay.

Patients et méthodes : Entre septembre 1991 et septembre 1995, 612 patients atteints de mélanome malin de la choroïde ont été traités par protons à Orsay. Les éléments du bilan initial des 464 premiers patients ont été analysés, ainsi que les résultats de 305 patients à 1 an de suivi, de 169 patients à 2 ans de suivi et de 59 patients à trois ans de suivi.

Résultats : L'analyse unifactorielle a montré que le taux actuariel de récurrence locale est de 5 %, le taux de survie à 3 ans de 88 % et le taux brut de métastases de 5 %. Cette analyse a aussi montré que le volume tumoral initial est le facteur qui a le plus influencé le résultat visuel et le risque de métastase. L'analyse multifactorielle a montré une corrélation significative entre le résultat visuel et le volume tumoral initial, la présence initiale d'un décollement de la rétine et la dose totale délivrée au nerf optique et à la macula.

Conclusion : La protonthérapie du mélanome de la choroïde permet, dans la plupart des cas, une conservation oculaire sans modification de la survie. Le résultat visuel dépend avant tout du siège et du volume de la tumeur.

SUMMARY

Preliminary results of protontherapy in choroidal melanoma at the Centre de protonthérapie d'Orsay (CPO): 464 initial cases.

Purpose: Retrospective analysis of the treatment of choroidal melanoma with protontherapy at the Centre de protonthérapie d'Orsay, France.

Patients and methods: Between September 1991 and September 1995, 612 patients presenting with choroidal melanoma were treated by protontherapy in Orsay. Following initial management of the first 464 patients, results were analyzed, as were results after a 1-year follow-up for 305 patients, a 2-year follow-up for 169 patients, and a 3-year follow-up for 59 patients.

Results: Univariate analysis showed that the actuarial local recurrence rate was 5%, the 3-year survival rate 88%, and the overall metastatic rate 5%. The initial tumor volume was the most significant predictive factor for visual results and metastases. Multivariate analysis revealed that visual results were significantly related to the initial tumor volume, initial retinal detachment, and total dose delivered to the optic nerve and macula.

Conclusion: Protontherapy of choroidal melanoma allows in most cases conservation of the eye without modification of survival. Visual results mainly depend on the site and size of the tumor.

choroidal melanoma / visual acuity / metastasis

mélanome choroïdien / protonthérapie / acuité visuelle / métastase

De septembre 1991 à septembre 1995, 612 patients atteints de mélanome de la choroïde ont été traités au centre de protonthérapie d'Orsay. Le fonctionnement de ce centre ainsi que les modalités thérapeutiques que nous rappellerons brièvement ont été décrits dans une