




Disponible en ligne sur
SciVerse ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com



REVUE GÉNÉRALE

Tumeurs conjonctivales bénignes[☆]



Benign conjunctival tumors

C. Maschi^{a,*}, J.-P. Caujolle^a, I. Liolios^b, C. Costet^c

^a Service d'ophtamologie, CHU de Saint-Roch, 5, rue Pierre-Devoluy, 06000 Nice cedex 1, France

^b Laboratoire d'anatomopathologie DIAG, 24, rue, Anatole-de-Monzie, 06300 Nice, France

^c Cabinet d'ophtalmologie pédiatrique, 14, avenue Félix-Faure, 06000 Nice, France

Reçu le 22 mai 2013 ; accepté le 31 mai 2013

Disponible sur Internet le 4 octobre 2013

MOTS CLÉS

Conjunctive ;
Tumeurs mélaniques ;
Tumeurs
épithéliales ;
Tumeurs stromales ;
Tumeurs congénitales

Résumé Les tumeurs bénignes conjonctivales regroupent les lésions congénitales, les lésions mélanocytaires, les lésions épithéliales et les lésions stromales. Leur diagnostic clinique pur est souvent difficile. Pour cette raison au moindre doute clinique ou évolutif, il faut savoir intervenir pour réaliser une biopsie exérèse totale. C'est ainsi que l'on sera dans la meilleure situation pour obtenir un diagnostic histologique correct et que l'on pourra éliminer une lésion précancéreuse ou cancéreuse dont le pronostic impose une prise en charge adaptée rapide. Les lésions mélanocytaires naéviqes peuvent en effet être confondues avec un mélanome chez l'adulte. Les lésions épithéliales et stromales de l'adulte peuvent quant à elle évoquer un carcinome. Il n'y a que pour les lésions de l'enfant et de l'adolescent où la décision d'une sanction chirurgicale dépendra d'une éventuelle évolutivité ou gêne fonctionnelle, d'où l'importance pour les spécialistes en onco-ophtalmologie de bien connaître les différents aspects des tumeurs bénignes de la conjonctive.

© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS

Conjunctiva;
Melanocytic tumors;
Epithelial tumors;
Stromal tumors;
Congenital tumors

Summary Benign conjunctival tumors include congenital, melanocytic, epithelial and stromal lesions. Clinical observation often fails to make the diagnosis, and complete excisional biopsy must be performed as soon as growth is suspected. Histology remains the best way to exclude malignancy or lesions with a risk of transformation, because malignant lesions carry a poor prognosis and require specific therapy and follow-up. Onco-ophtalmologists must have a perfect knowledge of benign conjunctival tumors, since during adulthood, nevi can be confused

[☆] Retrouvez cet article, plus complet, illustré et détaillé, avec des enrichissements électroniques, dans *EMC Ophtalmologie* : Caujolle JP, Maschi C, Liolios I, Costet C. Tumeurs conjonctivales bénignes. *EMC Ophtalmologie* 2012;9(3):1-8 [Article 21-150-A-10]. Publication avec l'autorisation de reproduction.

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : celia.maschi@gmail.com (C. Maschi).