

Assignment 1

Will Crichton (wrichto)

Problem 1

Part 1:

Property $p1 ::= (> 0 \wedge < 5) \vee = 10$

$p2 ::= = ' X' \vee = ' Y'$

$p3 ::= \varepsilon$

Schema $\tau ::= \text{num}\langle p1 \rangle$

| $\{ 'a' : \text{bool}, 'b' : \text{string}\langle p2 \rangle \}$

| $[\{ 'x' : \text{num}\langle p3 \rangle \}]$

Part 2:

$$\begin{array}{c} \frac{}{\text{false} \sim \text{bool}} \text{ (S-BOOL-FALSE)} \qquad \frac{}{\text{true} \sim \text{bool}} \text{ (S-BOOL-TRUE)} \qquad \frac{n \in \mathbb{Z}}{n \sim \text{num}} \text{ (S-NUM)} \\[10pt] \frac{a \in \{ 'a' \dots 'z', 'A' \dots 'Z' \}}{a^+ \sim \text{string}} \text{ (S-STRING)} \qquad \frac{n \sim \text{num} \quad (n > 0 \wedge n < 5) \vee n = 10}{n \sim \tau} \text{ (S-NUM-CORRECT)} \\[10pt] \frac{v1 \sim \text{bool} \quad v2 \sim \text{string} \quad v2 = ' X' \vee v2 = ' Y'}{\{ 'a' : v1, 'b' : v2 \} \sim \tau} \text{ (S-DICT-CORRECT)} \\[10pt] \frac{v1 \sim \text{num}}{[(\{ 'x' : v1 \})^*] \sim \tau} \text{ (S-ARRAY-CORRECT)} \end{array}$$

Problem 2

Part 1:

Part 2:

Accessor safety: for all a, j, τ , if $a \sim \tau$ and $j \sim \tau$, then there exists a j' such that $(a, j) \mapsto^* \varepsilon, j'$.

证明.

□