


# 复分析笔记

## *Notes on Complex Analysis*

作者：数试 82 裴兆辰

2020 年 5 月 9 日



钱学森书院学业辅导中心

QIAN YUAN XUE FU

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

## 作品信息

- 标题：复分析笔记 - *Notes on Complex Analysis*
- 作者：数试 82 裴兆辰
- 校对排版：钱院学辅排版组
- 出品时间：2020 年 5 月 9 日
- 总页数：20

## 许可证说明

 知识共享 (Creative Commons) BY-NC-ND 4.0 协议

本作品采用 **CC 协议** 进行许可。使用者可以在给出作者署名及资料来源的前提下对本作品进行转载，但不得对本作品进行修改，亦不得基于本作品进行二次创作，不得将本作品运用于商业用途。

本作品已发布于 GitHub 之上，发布地址为：

<https://qyxf.site/bookhub>

本作品的版本号为 1.0。

# 前言



复变函数（作为数学专业课常被称为“复分析”，Complex Analysis）是数学系专业课程中的必修课，也是基础课，是我们在后续阶段的学习以及研究中必不可少的一大块内容，具体而言复变函数是复流形、解析数论等学科进行理论研究的必备工具。

本笔记内容以数学专业以及数学试验班（H）培养计划中大二下学期陈红斌老师教授的“复变函数”课程为基础，并连同其他与本科阶段复变函数基本内容有关的书籍整理而成，其中的知识内容安排大体与授课内容详略相当，但部分内容作者根据自身的理解对知识点的详略略作调整亦或是有所补充。作者希望本笔记可以帮助大家从庞杂的定理内容中整理出一个较为清晰的知识体系，以及完善定理在具体问题中的应用以达到更从容的面对考试的目的。

本笔记在许多定理的证明上并不做详细叙述，但会指出该定理的证明在课堂笔记中或是某本参考书中有所体现。定理证明的省略并不意味着定理的证明没有参考价值，反而这是我认为的这门学科中最精髓的部分，这部分充分体现了复分析与实分析的不同，这种对比性有助于更好地理解复分析这门学科。

笔记中某些内容可能难度较高，超出了课程范围内的要求，作者已对相关内容进行（\*）标注，供读者选读。若是具有能力的同学能够从中有所启发、有所收获，作者甚是欣慰与感激。

数试 82 裴兆辰  
2020 年 5 月 9 日

# 目录

第一章 .....	1
第二章 .....	2
第三章 柯西积分公式及应用 .....	3
§3.1 全纯函数的积分表示 .....	3
§3.2 <i>Cauchy</i> 积分定理 .....	4
§3.3 全纯函数的原函数 .....	6
§3.4 <i>Cauchy</i> 积分公式 .....	7
§3.5 <i>Cauchy</i> 积分公式的一些重要推论 .....	10
§3.6 最大模原理 .....	12
§3.7 非齐次 <i>Cauchy</i> 积分公式 * .....	13
第四章 解析函数的 Taylor 展开及其应用 .....	14
§4.1 Weierstrass 定理 .....	14
§4.2 幂函数 .....	16

# 第一章



QIAN YUAN XUE FU

## 第二章



# 第三章 柯西积分公式及应用



## §3.1 全纯函数的积分表示

可求长曲线. 对  $[a, b]$  做分割  $\lambda: a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ , 取  $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i], i = 1, \dots, n$ . 做 Riemann 和:  $\sum_{k=1}^n f(\xi_k)(z_k - z_{k-1})$ . 设  $d = \|\lambda\|$ .  $d \rightarrow 0$  时, Riemann 和有极限 (略去). 记  $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$ . 故

$$\begin{aligned} R(f) &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k \\ &= \sum_{k=1}^n (u(\xi_k) + i v(\xi_k)) (\Delta x_k + i \Delta y_k) \\ &= \sum_{k=1}^n u(\xi_k) \Delta x_k - \sum_{k=1}^n v(\xi_k) \Delta y_k + i \left[ \sum_{k=1}^n u(\xi_k) \Delta y_k + \sum_{k=1}^n v(\xi_k) \Delta x_k \right] \end{aligned}$$

故当  $u$  于  $v$  在  $\gamma$  上连续时, 令  $d \rightarrow 0$ , 则  $f$  的 Riemann 和趋于曲线积分:  $\int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy)$ , 即:

定理 3.1.1.  $f = u + iv$  在可求长曲线  $\gamma$  上连续, 则有:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy).$$

定理 3.1.2. 若  $z = \gamma(t)$  为光滑的曲线,  $f$  在  $\gamma$  上连续, 则:  $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$

证明. 由于  $z = \gamma(t)$  故  $\gamma'(t) = x'(t) + i y'(t)$ .

而  $dx = x'(t) dt, dy = y'(t) dt$ , 代入 3.1.1 即可得证. □

定理 3.1.3. 若  $f, g$  在可求长曲线  $\gamma$  上连续, 则:

i)  $\int_{\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz$

ii)  $\int_{\gamma} (\alpha f(z) + \beta g(z)) dz = \alpha \int_{\gamma} f(z) dz + \beta \int_{\gamma} g(z) dz, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

iii)  $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$ . 其中  $\gamma_1 \cup \gamma_2 = \gamma, \gamma_1 \cap \gamma_2 = \emptyset$

定理 3.1.4 (长大不等式). 若曲线  $\gamma$  的长度为  $L, M = \max_{z \in \gamma} |f(z)|$ , 则  $|\int_{\gamma} f(z) dz| \leq ML$

证明. 直接利用 Riemann 和验证即可. □



### §3.2 Cauchy 积分定理

**定理 3.2.1 (Cauchy).** 设  $D$  为  $\mathbb{C}$  中的单连通域,  $f \in H(D)$ , 且  $f' \in C(D)$ , 则对  $D$  中的任意可求长闭曲线  $\gamma$ , 均有  $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ .

证明. 由 Green 公式以及 C-R 方程直接得到. □

**定理 3.2.2.** 设  $f$  是域  $D$  中的连续函数,  $\gamma$  是  $D$  内可求长曲线, 则  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在一条  $D$  上的折线  $P$  使得:

(i)  $P$  和  $\gamma$  有相同的起点和终点,  $P$  的其他顶点在  $\gamma$  上.

(ii)  $|\int_{\gamma} f(z)dz - \int_P f(z)dz| < \varepsilon$ .

证明. 见 chb 笔记. □

**定理 3.2.3 (Cauchy-Goursat).** 设  $D$  为  $\mathbb{C}$  中的单连通域, 若  $f \in H(D)$ , 则对于  $D$  中的任意可求长闭曲线  $\gamma$ , 均有  $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ .


证明. 利用上一定理 3.2.2, 见 chb 笔记. □

但定理 3.2.3 的条件仍可以再做减弱:

**定理 3.2.4.** 设  $D$  是简单可求长闭曲线  $\gamma$  的内部, 若  $f \in H(D) \cap C(\bar{D})$ , 则  $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ .

这一定理的证明现在无法进行, 我们对其弱化进行证明:

**定理 3.2.4 (\*).** 设  $\gamma$  为  $\mathbb{C}$  上分段光滑的可求长闭曲线, 记  $D$  为  $\gamma$  围成的区域内部, 且存在  $D$  中的点  $z_0$ , 使得任意一条从  $z_0$  发出的射线与  $\gamma$  有且只有唯一交点, 若  $f \in H(D) \cap C(\bar{D})$ , 则  $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ .





证明. 由于我们增加的条件, 故  $\gamma$  可写为  $z = z_0 + \gamma(t)$ ,  $a \leq t \leq b$ . 记  $p = \max_{a \leq t \leq b} |\lambda(t)|$ ,  $q = \max_{a \leq t \leq b} |\lambda'(t)|$ . 闭区间分段连续保证有最值 (光滑保证) 由于  $f$  在  $\bar{D}$  上连续, 故一致连续, 即  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$  s.t.  $z_1, z_2 \in \bar{D}$ ,  $|z_1 - z_2| < \delta$  时,  $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$  取  $\delta_0 = \min\{\delta, p\}$ , 故  $\frac{\delta_0}{p} < 1$ , 取  $\rho$  s.t.  $1 - \frac{\delta_0}{p} < \rho < 1$


记曲线  $\gamma_\rho: z = z_0 + \rho\lambda(t)$ ,  $a \leq t \leq b$ , 则  $\gamma_\rho \subset D$ . 由定理 3.2.3 得  $\int_{\gamma_\rho} f(z)dz = \int_a^b f(z_0 + \rho\lambda(t))\rho\lambda'(t)dt = 0 \Rightarrow \int_a^b f(z_0 + \rho\lambda(t))\lambda'(t)dt = 0$ . 由于  $|(z_0 + \rho\lambda(t)) - (z_0 + \lambda(t))| = (1 - \rho)|\lambda(t)| \leq (1 - \rho)p < \delta_0 < \delta$  故  $|f(z_0 + \rho\lambda(t)) - f(z_0 + \lambda(t))| < \varepsilon$ . 故

$$\begin{aligned} \left| \int_\gamma f(z)dz \right| &= \left| \int_a^b f(z_0 + \lambda(t))\lambda'(t)dt \right| \\ &= \left| \int_a^b [f(z_0 + \lambda(t)) - f(z_0 + \rho\lambda(t))]\lambda'(t)dt \right| \\ &\leq \int_a^b |f(z_0 + \rho\lambda(t)) - f(z_0 + \lambda(t))||\lambda'(t)|dt \\ &< \varepsilon q(b - a) \end{aligned}$$

由  $\varepsilon$  的任意性得  $\int_\gamma f(z)dz = 0$ .

□

定理 3.2.5 (多连同区域的 Cauchy 积分公式). 略.



eg. 计算积分  $\int_\gamma \frac{dz}{(z-a)^n}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $a$  在  $\gamma$  围成区域内部.

解. 故  $\int_\gamma \frac{dz}{(z-a)^n} = \int_{|z-a|=r} \frac{dz}{(z-a)^n} = \int_0^{2\pi} \frac{re^{i\theta} id\theta}{(re^{i\theta})^n} = ir^{1-n} \int_0^{2\pi} (e^{i\theta})^{1-n} d\theta$ .


若  $n \neq 1$ , 则  $\int_0^{2\pi} (e^{i\theta})^{1-n} d\theta$  为复积分, 值为 0; 若  $n = 1$ , 则  $\int_\gamma \frac{dz}{(z-a)^n} = i \int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi i$ .

eg. 计算积分  $\int_\gamma \frac{dz}{z-a}$ .

解. (1)  $a$  在  $\gamma$  围成区域内部, 结果同上,  $\int_\gamma \frac{dz}{z-a} = 2\pi i$ .

(2)  $a$  在  $\gamma$  围成区域外部, 故  $\int_\gamma \frac{dz}{z-a} = \int_{\gamma_2} \frac{dz}{z-a} - \int_{\gamma_1} \frac{dz}{z-a} = 0$ .





### §3.3 全纯函数的原函数

**定理 3.3.1.** 设  $f$  在域  $D$  中连续, 且对于  $D$  中任意可求长闭曲线, 均有  $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ , 那么  $F(z) = \int_{z_0}^z f(\xi)d\xi$  是  $D$  上的全纯函数且在  $D$  中有  $F'(z) = f(z)$ .

**定理 3.3.2.** 见 chb 笔记, 略.

**定理 3.3.3.** 设  $D$  是  $\mathbb{C}$  中的单连通域。  $f \in H(D)$ 。那么  $F(z) = \int_{z_0}^z f(\xi)d\xi$  是  $f$  在  $D$  中的一个原函数


**定理 3.3.4 (Newton-Leibniz).** 设  $D$  是  $\mathbb{C}$  中的单连通域。  $f \in H(D)$ 。  $\Psi$  是  $f$  的一个原函数。则  $\int_{z_0}^z f(\xi)d\xi = \Psi(z) - \Psi(z_0)$

若  $D$  为  $\mathbb{C}$  中的多连通区域  $f \in H(D)$ 。一般的  $F(z) = \int_{z_0}^z f(\xi)d\xi$  为一个多值函数。值受连接  $z_0$  与  $z$  的曲线控制。

令  $D = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ,  $f(z) = \frac{1}{z} \in H(D)$ 。考虑积分  $\int_1^z \frac{d\xi}{\xi}$ 。对于连接 1 与  $z$  的曲线  $\gamma$ :

- 若  $\gamma$  不围绕  $O$  点。

$$\int_1^z \frac{d\xi}{\xi} = \int_1^{|z|} \frac{dx}{x} + \int_0^{\arg z} \frac{d(|z|e^{i\theta})}{|z|e^{i\theta}} = \log |z| + i \arg z = \log Z$$




- 若  $\gamma$  围绕  $O$  点。则  $\gamma = \overline{abcd}$ 。考虑  $\gamma_1 = \overline{ad}$ ,  $\gamma_2 = \overline{cb}$ 。故  $\gamma'$  是不围绕  $O$  点的连线 1 与  $z$  的曲线。


故对于如图所示的  $\gamma$ , 有

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \int_{\gamma_1} \frac{dz}{z} + \int_{\gamma_2} \frac{dz}{z} = \log z + 2\pi i$$





故对于一般的曲线  $\gamma$ ,  $\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \log z + R \cdot 2\pi i = \text{Log} z$ .  $k$  为曲线  $\gamma$  绕原点所转圈数。




以上给出了  $\log z$  的另一种定义。

### §3.4 Cauchy 积分公式

**定理 3.4.1.** 设  $D$  是用简单可求长闭曲线  $\gamma$  围成的区域。若  $f \in H(D) \cap C(\bar{D})$ 。那么对任意的  $z \in D$  均有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

证明. 任取  $z \in D$ 。由于  $f$  在  $z$  处连续, 故  $\forall \epsilon > 0$ , 存在  $\sigma > 0$ . s.t.  $|z - \xi| < \sigma$  时,  $|f(z) - f(\xi)| < \epsilon$ 。取  $\rho < \sigma$ , s.t.  $B(z, \rho) \subset D$ 。记  $\gamma_{\rho} = \xi: |\xi - z| < \rho$  设由  $\gamma$  与  $\gamma_{\rho}$  新城的二连通区域为  $D'$ , 则  $\frac{f(\xi)}{\xi - z} \in H(D') \cap C(\bar{D}')$



于是有  $\int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$ , 又由于  $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{dz}{\xi - z} = 1$ , 故  $f(z) = \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(z)}{\xi - z} d\xi$ , 故,



$$\begin{aligned}
|f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z)}{\xi - z} d\xi - \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \right| \\
&= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z) - f(\xi)}{\xi - z} d\xi \right| \\
&\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_\rho} \frac{|f(z) - f(\xi)|}{|\xi - z|} d\xi \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi\rho \frac{\epsilon}{\rho} \\
&= \epsilon
\end{aligned}$$

□

于是有  $\int_\gamma \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$ , 又由于  $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{dz}{\xi - z} = 1$ , 故  $f(z) = \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z)}{\xi - z} d\xi$ , 故,

$$\begin{aligned}
|f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z)}{\xi - z} d\xi - \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \right| \\
&= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z) - f(\xi)}{\xi - z} d\xi \right| \\
&\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_\rho} \frac{|f(z) - f(\xi)|}{|\xi - z|} d\xi \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi\rho \frac{\epsilon}{\rho} \\
&= \epsilon
\end{aligned}$$

**定理 3.4.2.** 设  $\gamma$  是  $\mathbb{C}$  中可求长曲线,  $g$  是  $\gamma$  上的连续函数, 那么由 Cauchy 型积分确定的函数:

$$G(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{g(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

在  $\mathbb{C} \setminus \gamma$  上有任意阶导数。

证明. 见史济怀《复变函数》。

□

**定理 3.4.3.** 设  $D$  是由可求长简单闭曲线  $\gamma$  围成的域, 若  $f \in H(D) \cap C(D)$ , 那么  $f$  在  $D$  上有任意阶导数且对任意的  $z \in D$ , 有:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明. 在定理 3.4.2 中令  $g(z) = f(z)$  即可。

□

**定理 3.4.4.** 若  $f$  在  $D$  上解析, 则  $f$  在  $D$  上有任意阶导数。

证明. 任取  $z_0 \in D$ , 存在充分小的  $\delta, s, t, \bar{B}(z_0, \delta) \subset D$ . 由定理 3.4.3.  $f$  在  $B(z_0, \delta)$  中有任意阶导数. 又由于  $z_0$  是任意的, 故  $f$  在  $D$  中有任意阶导数

□



eg. 计算积分  $\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2+16)}$

法 1: 原式  $= \int_{|z|=2} \frac{\frac{dz}{z^2+16}}{\frac{z^2}{z^2}}$ , 令  $f(z) = \frac{1}{z^2+16}$ .  $f(z)$  在  $|z|=2$  内部解析:

由定理 3.4.3 得


$$\int_{|z|=2} \frac{f(z)}{z^2} dz = 2\pi i f'(0) = 0$$

法 2:  $\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2+16)} = \frac{1}{16} (\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2} - \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2+16}) = 0$

**定理 3.4.5.** 设  $r_0, r_1 \dots r_k$  是  $k+1$  条可求长简单闭曲线.  $r_1, r_2 \dots r_k$  都存在  $r_0$  内部.  $r_1, r_2 \dots r_k$  中每条都在其他  $k-1$  条外部.  $D$  是由这  $k+1$  条曲线围成的区域.  $D$  的边界  $r$  由  $r_0, r_1 \dots r_k$  组成. 若  $f \in H(D) \cap C(\bar{D})$ , 则  $\forall z \in D$ , 有  $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi-z} d\xi$ , 且  $f$  有任意阶导数.

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi-z)^{n+1}} d\xi, n=1, 2, \dots$$

eg. 计算积分  $\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2}$



以原点为圆心做半径大于 4, 半径为  $R$  得圆, 则在圆环  $z: 2 \leq |z| \leq R$  上  $f(z) = \frac{1}{z^3+1}$  解析. 故

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2} &= \left( \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} \right) \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2} \\ &= 2\pi i \left( \frac{1}{z^3-1} \right)' \Big|_{z=-4} \\ &= -\frac{32}{1323} \pi i \end{aligned}$$

故

$$\int_{|z|=2} = \frac{32}{1323} \pi i + \int_{|z|=R} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2} \quad (3.1)$$

由于  $|z|=R$  时有  $|(z^3-1)(z+4)^2| \leq (R^3-1)(R-4)^2$ , 故由长大不等式得:

$$\left| \int_{|z|=R} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2} \right| < \frac{2\pi R}{(R^3-1)(R-4)^2} \rightarrow 0 (R \rightarrow +\infty)$$

故在 (1) 中令  $R \rightarrow +\infty$ , 得  $\int_{|z|=R} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2} = \frac{32}{1323} \pi i$



### §3.5 Cauchy 积分公式的一些重要推论

**定理 3.5.1** (Liouville 定理). 有界整函数必为常数

证明. 设  $f$  为一有界整函数, 其模的上界设为  $M$ . 即  $\forall z \in \mathbb{C}$ , 有  $|f(z)| \leq M$ , 任取  $a \in \mathbb{C}$ , 在  $\partial B(a, R)$  上由 Cauchy 不等式得  $|f(a)| \leq \frac{M}{R}$ ,  $\forall R > 0$ . 令  $R \rightarrow \infty$  得  $|f'(a)| = 0 \Rightarrow f'(a) = 0 \forall a \in \mathbb{C}$  故  $f$  为常数.  $\square$

**定理 3.5.2** (代数基本定理). 任意复系数多项式  $P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$  ( $a_0 \neq 0$ ) 在  $\mathbb{C}$  中必有零点

证明. 略, 见 chb. 和史济怀  $(F(x) = \frac{1}{P_z})$   $\square$

**定理 3.5.3** (Morera). 若  $f$  是域  $\mathbb{D}$  上的连续函数, 且沿  $\mathbb{D}$  内任意可求长闭曲线上的积分是 0, 那么  $f$  在  $\mathbb{D}$  上解析

证明. 见 chb. 笔记  $\square$

#### 习题

**eg.** Liouville 定理的另一个证明

证明. 设  $f$  是有界整函数,  $z_1, z_2$  是  $B(0, r)$  中的任意两点, 则:

$$\begin{aligned} \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{(z-z_1)(z-z_2)} dz &= \frac{1}{z_1-z_2} \left( \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z-z_1} dz - \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z-z_2} dz \right) \\ &= \frac{1}{z_2-z_1} (f(z_1) - f(z_2)) \end{aligned}$$

由于  $f$  有界. 故存在  $M > 0$ , s.t.  $|f(z)| \leq M, \forall z \in \mathbb{C}$

故:

$$\begin{aligned} \left| \int_{|z|=r} \frac{f(z) dz}{(z-z_1)(z-z_2)} \right| &\leq \int_0^{2\pi} \left| \frac{f(z) \cdot z d\theta}{(z-z_1)(z-z_2)} \right| \\ &\leq \int_0^{2\pi} \frac{M \cdot r}{|z-z_1| \cdot |z-z_2|} d\theta \\ &\rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

故:  $\int_{|z|=r} \frac{f(z) dz}{(z-z_1)(z-z_2)} = 0$ . 故:  $f(z_1) = f(z_2)$ .

由于  $r, z_1, z_2$  的任意性, 故  $f(z)$  为常值函数.  $\square$

**eg.** 设  $f$  为整函数, 若当  $z \rightarrow +\infty$  时,  $f(z) = O(|z|^\alpha)$   $\alpha \geq 0$ . 证明  $f$  是次数不超过  $[\alpha]$  的多项式



证明. 记  $k = [\alpha] + 1$

$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z^k} = 0$ . 由于  $f^{(k)}(z) = \frac{k!}{z\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{k+1}} d\xi$ . 故  $\forall \epsilon > 0, \exists R, s.t. r > R$  有

$$\left| \frac{f(z)}{z^k} \right| < \epsilon, z \in B(0, r). \quad (\text{令 } r \rightarrow \infty)$$

$$\Rightarrow |f^{(k)}(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|z-\xi|=r} \left| \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{k+1}} \right| d\xi = r\epsilon. \text{ 故 } f^{(k)} \equiv 0. \quad \square$$

**eg.** 设  $f$  为整函数, 如果  $f(\mathbb{C}) \subset \{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Im} z > 0\}$ , 证明  $f$  为常值函数.

证明.  $\Rightarrow \forall z \in \mathbb{C}, |f(z) + i| \geq 1$  令  $g(z) = \frac{1}{f(z) + i}$

故  $g(z) \in H(\mathbb{C})$ . 并且  $|g(z)| \leq 1$ . 故  $g$  为常值函数, 故  $f$  为常值函数  $\square$

**eg.** 设  $f$  为整函数. 如果  $f(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus [0, 1]$ . 证明:  $f$  为常值函数.

证明. 令  $g(z) = \frac{f(z)}{1 - f(z)}$ . 若  $g(z) = r \in \mathbb{R}^+$ . 则  $f(z) = \frac{r}{r+1} \in [0, 1]$ . 矛盾

故  $g(z) \in \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ . 设  $h(z) = \sqrt{g(z)}$ . 显然  $h$  也为整函数.

故  $h(\mathbb{C}) \subset \{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Im} z > 0\}$ . 故  $h$  为常值函数. 故  $f$  为常值函数  $\square$

**eg** (更强形式的 Morera). 设  $f$  是域  $\mathbb{D}$  上的连续函数, 若对于任意边界和内部位于  $\mathbb{D}$  中三角形域  $\Delta$ , 总有  $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$ . 证明  $f \in H(\mathbb{D})$ .

证明. 思路同 Cauchy-Goursat. 此处省略  $\square$

**eg.**  $\int_{|z|=a} \frac{e^z}{z^2 + a^2} \cdot (a \in (\mathbb{R})^+).$

解.

$$\begin{aligned} & \int_{|z|=a} \frac{e^z}{z^2 + a^2} \\ &= \int_{|z|=a} \frac{e^z}{(z + ai)(z - ai)} dz = \frac{1}{2ai} \int_{|z|=a} \left( \frac{e^z}{z - ai} - \frac{e^z}{z + ai} \right) dz \\ &= \frac{2\pi i}{2ai} ((e^z)|_{z=ai} - (e^z)|_{z=-ai}) = \frac{2\pi i}{a} \sin a \end{aligned}$$

**eg.** 设  $f \in H(\{z: r < |z| < +\infty\})$ . 且  $\lim_{z \rightarrow \infty} z \cdot f(z) = A$ . 证明:  $\int_{|z|=R} f(z) dz \rightarrow 2\pi i A$ ,  $(R \rightarrow \infty)$ .

证明. 由条件得  $\forall \epsilon > 0, \exists R_0 > r, s.t. |z| \geq R_0$  时, 有  $|zf(z) - A| < \epsilon$ . 故:

$$\begin{aligned} \left| \int_{|z|=R} f(z) dz - 2\pi i A \right| &= \left| \int_{|z|=R} f(z) dz - \int_{|z|=R} \frac{A}{z} dz \right| \\ &= \left| \int_{|z|=R} \left( f(z) - \frac{A}{z} \right) dz \right| \leq \int_{|z|=R} \left| f(z) - \frac{A}{z} \right| dz \\ &\leq \int_{|z|=R} \frac{\epsilon}{R} dz = 2\pi\epsilon \end{aligned}$$



□

**eg.** 无界区域的 Cauchy 积分公式:

设  $\gamma$  为  $\mathbb{C}$  中的有限的可求长闭曲线, 设  $\gamma$  围成的区域为  $D$ . 记  $\Omega = \mathbb{C} \setminus (D \cup \gamma)$   
 设  $f \in C(\Omega \cup \gamma) \cap H(\Omega)$ , 且  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} f(z) = f(\infty) \in \mathbb{C}$ . 则  $f(z) = f(\infty) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$ .

证明. 任取  $z \in \Omega$ .  $\exists R > 0$ , s.t.  $\gamma \cup \{z\} \subset B(0, R)$ .

$$\text{由 } f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi.$$

取  $\xi \in \{z: |z| = R\}$ . 令  $R \rightarrow +\infty$ ,  $\frac{f(\xi)}{\xi - z} \cdot \xi \rightarrow f(\infty)$

$$\text{由前例子可得 } \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \rightarrow f(\infty), R \rightarrow +\infty$$

$$\text{故 } f(z) = f(\infty) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

□

**eg** (Painlevé 原理). 设  $D$  为域,  $\gamma_1, \gamma_2 \dots \gamma_n$  是  $D$  中的  $n$  条可求长闭曲线, 若  $f \in C(D) \cap H(D \setminus \bigcup_{k=1}^n \gamma_k)$  则  $f \in H(D)$ .

证明. 利用定理 3.2.4 及 Morera 定理即可, 略

□

### §3.6 最大模原理

**定理 3.6.1** (平均值定理). 设  $f \in H(B(z_0, r)) \cap C(\overline{B(z_0, r)})$ . 则:  $f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta$ .

$$\text{证明. 由 Cauchy 积分公式得 } f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} d\xi$$

$$\text{记 } \xi = z_0 + re^{i\theta} \Rightarrow d\xi = ire^{i\theta} d\theta = i(\xi - z_0) d\theta$$

$$\Rightarrow f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta$$

□

**定理 3.6.2** (最大模定理). 设  $\Omega$  为区域  $f \in H(\Omega)$ . 则  $|f|$  在  $\Omega$  内有最大值当且仅当  $f$  为常函数

证明. 此处给出利用区域连通性与平均值原理的证法, 见 chb 笔记. 略

具体可见方企勤《复变函数》

□

**定理 3.6.3.** 设  $D \subset \mathbb{C}$  为有界域. 设  $f$  为非常值函数.  $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$ . 则  $f$  的最大模在且只在  $\partial D$  上取到

证明. 由定理 3.6.2 可直接得到. 略

□





**定理 3.6.4** (Schwarz 引理). 设  $f \in H(B(0, 1))$ , 且有  $\forall z \in B(0, 1), |f(z)| \leq 1, f(0) = 0$ . 则  $\forall z \in B(0, 1)$  有  $|f(z)| \leq |z|, |f'(0)| \leq 1$ . 并且若存在  $z_0 \in B(0, 1) z_0 \neq 0$ , 有  $|f(z_0)| = |z_0|$ , 或  $|f'(0)| = 1$ , 则  $\exists \theta \in \mathbb{R}, s.t. \forall z \in B(0, 1)$  有  $f(z) = e^{i\theta} \cdot z$

证明. 略. 见 *chb* 笔记以及方企勤《复变函数》

□

### §3.7 非齐次 *Cauchy* 积分公式 \*

**定理 3.7.1.** 设  $\gamma_0, \gamma_1 \dots \gamma_n$  是  $n+1$  条可求长简单闭曲线,  $\gamma_1, \gamma_2 \dots \gamma_n$  在  $r_0$  的内部.  $\gamma_1, \gamma_2 \dots \gamma_n$  中的任一条均在其余的  $n-1$  条的外部. 设  $D$  是这  $n+1$  条曲线围成的区域, 若  $f \in C^1(D)$ . 则  $\forall z \in D$ . 有: 
$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi + \frac{1}{2\pi i} \int_D \frac{\partial f(\xi)}{\partial \bar{\xi}} \frac{1}{\xi - z} d\xi \wedge d\bar{\xi}$$

证明. 见史济怀《复变函数》

□



# 第四章 解析函数的 Taylor 展开及其应用



## §4.1 Weierstrass 定理

对于复数上的数列, 其收敛性可以类似于  $\mathbb{R}^2$  中点集的收敛性即可得到. 同样的我们有柯西收敛原理, 此处略去

对于复数上的数项级数  $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ , 类似于实数中的常数项级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ . 可以定义绝对收敛和条件收敛, 以及级数极限的存在性和柯西收敛原理.

下面讨论对于复变函数上的函数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ :

**定理 4.1.1.** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  是定义在  $E$  上的级数. 我们说  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  在  $E$  上一致收敛到  $f(z)$ . (记为  $\sum_{k=1}^n f_k(z) \Rightarrow f(z)$ ), 指  $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^* \quad s.t. \forall n > N$ . 有  $|S_n(z) - f(z)| < \epsilon, \forall z \in E$ , 其中  $S_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$ .

**定理 4.1.2.** 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  在  $E$  上一致收敛的充要条件是  $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^* \quad s.t. \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}$  有  $\left| \sum_{i=1}^p f_{n+i}(z) \right| < \epsilon$ . 对  $\forall z \in E$  均成立.

证明. 略. □

**定理 4.1.3** (函数项级数的 weierstrass 判别法, 略).

**定理 4.1.4.** 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) \Rightarrow f(z), z \in E, \forall n \in \mathbb{N}^*, f_n \in C(E)$ . 则  $f \in C(E)$ .

证明.  $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ .  $s.t. n > N$  时  $|f(z) - S_n(z)| < \frac{\epsilon}{3} \quad \forall z \in E$ .

对于给定的大于  $N$  的  $n_0$ . 显然  $S_{n_0} \in C(E)$ . 任取一个  $a \in E$ . 故  $S_{n_0}$  在  $a$  处连续.

故  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ .  $s.t. \forall z \in B(z, \delta)$  有  $|f(z) - f(a)| < \frac{\epsilon}{3}$ .

于是  $z \in E \cap B(a, \delta)$  时有:

$$|f(z) - f(a)| \leq |f(z) - S_{n_0}(z)| + |S_{n_0}(z) - S_{n_0}(a)| + |S_{n_0}(a) - f(a)| < \epsilon$$

□



**定理 4.1.5.** 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  在可求长曲线  $\gamma$  上一致收敛到  $f(z)$ , 若  $\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n \in C(\gamma)$ , 则  $\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz$ .

证明. 由定理 4.1.4.  $f \in C(\gamma)$ .

由于  $f_k \Rightarrow f$ . 故  $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^* \quad s.t. \quad n > N$  时, 有  $\left| \sum_{k=1}^n f_k(z) - f(z) \right| < \epsilon, \forall z \in \gamma$ . 故  $n > N$  时有  $\left| \sum_{k=1}^n \int_{\gamma} f_k(z) dz - \int_{\gamma} f(z) dz \right| = \left| \int_{\gamma} \left( \sum_{k=1}^n f_k(z) - f(z) \right) dz \right| < \epsilon \cdot |\gamma| \quad \square$

**定理 4.1.6.** 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  在区域  $\mathbb{D}$  的任一紧子集  $K$  上一致收敛, 则称  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  在  $\mathbb{D}$  上是内闭一致收敛的.

证明. 类似于实值函数中的例子, 函数项级数  $1 + \sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ ,  $f_k(z) = z^k - z^{k-1}$  部分和为  $z^k$  显然下单位球上内闭一致收敛, 但不一致收敛  $\square$

**定理 4.1.7 (Weierstrass I).** 设  $D$  是  $\mathbb{C}$  中的域. 若  $f_n \in C(D), n = 1, 2, \dots$ , 并且  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  在  $D$  中内闭一致收敛到  $f(z)$  则  $f \in H(D)$ , 并且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z)$  在上内闭一致收敛到  $f^{(k)}(z)$ .  $k \in \mathbb{N}$ .

证明. 任取  $z_0 \in D$ , 由于  $D$  为开集, 故存在  $\delta > 0, \quad s.t. \quad \overline{B(z_0, \delta)} \subset D$

由定理 4.1.4,  $f \in C(\overline{B(z_0, \delta)})$  在  $B(z_0, \delta)$  中任做一个可求长闭曲线  $r$ , 由定理 4.1.5 和定理 3.2.4 得  $\int_r f(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int_r f_n(z) dz = 0$ . 故由 Morera 定理得  $f \in H(B(z_0, \delta))$  故  $f \in H(D)$

任取  $\xi \in \partial B(z_0, \delta), \forall z \in B(z_0, \frac{\delta}{2})$ . 有  $\left| \frac{1}{(\xi - z)^{k+1}} \right| \leq \left( \frac{2}{\delta} \right)^{k+1}$

由一致收敛性得,  $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \quad s.t. \quad \forall n > N, \forall \xi \in \partial B(z_0, \delta)$ , 有:

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{j=1}^n f_j(\xi) - f(\xi) \right| < \frac{\epsilon}{k! \cdot \delta} \left( \frac{\delta}{2} \right)^{k+1} \\ \Rightarrow & \sum_{j=1}^n \frac{f_j(\xi)}{(\xi - z)^{k+1}} - \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{k+1}} < \frac{\epsilon}{k! \cdot \delta} \end{aligned}$$

故当  $z \in B(z_0, \frac{\delta}{2})$  时, 有:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^n f_j^{(k)}(z) - f^{(k)}(z) \right| &= \frac{k!}{2\pi} \cdot \left| \sum_{j=1}^n \int_{|\xi - z_0| = \delta} \frac{f_j(\xi) d\xi}{(\xi - z)^{k+1}} - \int_{|\xi - z_0| = \delta} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z)^{k+1}} \right| \\ &\leq \frac{k!}{2\pi} \int_{|\xi - z_0| = \delta} \left| \sum_{j=1}^n \frac{f_j(\xi)}{(\xi - z)^{k+1}} - \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{k+1}} \right| d\xi \\ &< \epsilon \end{aligned}$$



故  $\sum_{j=1}^n f_j^{(k)}(z) \Rightarrow f^{(k)}(z), z \in B(z_0, \frac{\delta}{2})$ , 对于  $D$  的任一紧集  $K, K$  有有限开球覆盖  $SI_k S_{k=1}^n$ , 故  $\sum_{j=1}^n f_j^{(k)} \Rightarrow f^{(k)}(z), z \in K$ .  $\square$

**定理 4.1.8 (Weierstrass II).** 设  $D$  为有界区域, 对于函数列  $\{f_n(z)\}$ . 有  $f_n(z) \in H(D) \cap C(\bar{D})$  且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  在  $\partial D$  上一致收敛, 则  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$  在  $\bar{D}$  上一致收敛.

证明.  $\forall \epsilon > 0, \exists N, s.t. n \geq N, p \geq 1$  时, 有  $|f_{n+1}(z) + f_{n+2}(z) + \cdots + f_{n+p}(z)| < \epsilon$ . 对任意  $z \in \partial D$  均成立, 由最大模定理, 上述不等式在  $\bar{D}$  上成立, 故级数在  $\bar{D}$  上一致收敛  $\square$

## §4.2 幂函数

幂级数:  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \cdots + a_n(z-z_0)^n + \cdots$

其中  $a_0, a_1 \dots$  均为复常数, 做平移  $w = z - z_0$ , 得  $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n + \cdots (*)$ .

**定理 4.2.1.** (收敛半径) (收敛圆). 用数分中定义, 略

**定理 4.2.2.** 级数  $(*)$  存在收敛半径  $R = (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|})^{-1}$ , 则:

- (1) 当  $R = 0$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  只在  $z = 0$  处收敛.
- (2) 当  $R = +\infty$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  在  $\mathbb{C}$  上收敛.
- (3) 当  $0 < R < +\infty$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  在  $\{z: |z| < R\}$  中收敛. 在  $\{z: |z| > R\}$  中发散.


证明. 同数学分析中的讨论, 此处略去  $\square$

**定理 4.2.3 (Abel I).** 如果  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot z^n$  在  $z = z_0 \neq 0$  处收敛, 则在  $\{z: |z| < z_0\}$  中内闭一致收敛.

证明. 设  $K$  为  $\{z: |z| < |z_0|\}$  中的一个紧集, 取  $r < |z_0|$ , 使得  $k \subset B(0, r)$  由于  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z_0^n$  收敛, 故  $|a_n z_0^n| \rightarrow 0$  故存在  $M \in \mathbb{R}$ . s.t.  $|a_n z_0^n| < M$

故当  $z \in k$  时,  $|a_k \cdot a^k| = \left| a_n \cdot z_0^k \cdot \frac{z^k}{z_0^k} \right| \leq M \left( \left| \frac{z}{z_0} \right| \right)^k$

由于  $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{z}{z_0} \right|^n$  收敛的, 故由 Weierstrass 判别法得  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  在  $k$



中一致收敛

□

由定理 4.2.3 以及 Weierstrass 定理可以得到:

**定理 4.2.4.** 幂级数在其收敛圆内确定了一个全纯函数

那么在收敛圆圆周上的收敛性如何呢?

**eg.** 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$  的收敛半径为 1, 它在收敛圆周  $|z|=1$  上处处发散.

**eg.** 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$  的收敛半径为 1, 它在收敛圆周  $|z|=1$  上处处收敛.

**eg.** 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n}$  的收敛半径为 1, 它在收敛圆周  $|z|=1$  上在  $z=e^{i\theta}$  ( $0<\theta<2\pi$ ) 处收敛, 在 1 处发散.

证明. 显然  $z=1$  时级数时发散的

当  $\theta \neq 0$  时  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n} + i \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{n}$  由实数项级数的 Dirichlet 判别法, 得  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{n}$  收敛

□

由上述例子可知, 收敛圆周上的收敛性无法确定

这也是我们下面要探讨的问题


设级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$  的收敛半径为  $R$ , 我们来研究  $\xi \in B(z_0, R)$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(\xi-z_0)^n$

与和函数  $f$  的关系: 令  $\omega = \frac{z-z_0}{\xi-z_0}$  故  $\omega \in B(0, 1)$ , 级数可改写为  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n \omega^n$ ,  $b_n = a_n(\xi-z_0)^n$ , 故新的幂级数的收敛半径为 1, 故以下我们在收敛半径为 1 的情况下做讨论.

**定理 4.2.5 (\*)**. 设  $g$  是定义在单位圆中的函数,  $e^{i\theta_0}$  是单位圆上的一点, 记  $S_\alpha(e^{i\theta_0})$  为以  $e^{i\theta_0}$  为顶点, 以  $e^{i\theta_0}$  点对应的极径在单位圆内侧向两侧张出的张角为  $2\alpha$  的角形区域 ( $\alpha < \frac{\pi}{2}$ )

若  $z$  在  $S_\alpha(e^{i\theta_0})$  中趋于  $e^{i\theta_0}$  时  $g(z)$  有极限  $C$  则称  $g$  在  $\theta_0$  处

有非切向极限  $C$ , 记为  $\lim_{\substack{z \rightarrow e^{i\theta_0} \\ z \in S_\alpha(e^{i\theta_0})}} g(z) = C$



**定理 4.2.6 (\*)**. (Abel II) 设  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  的收敛半径为  $R=1$ , 且级数在  $z=1$  处收敛于  $S$ , 则  $f$  在  $z=1$  处有非切向极限  $S$



证明. 记  $\sigma_{n,\rho} = \sum_{i=1}^p a_{n+i}$  由条件得  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  收敛.

故  $\forall \epsilon > 0, \exists$  正整数  $N$ , s.t. 当  $n > N$  时, 对任意自然数  $p$  有  $|\sigma_{n,p}| < \epsilon$   
由于

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^p a_{n+i} \cdot z^{n+i} &= \sum_{i=1}^{p-1} (\sigma_{n,i+1} - \sigma_{n,i}) z^{n+1+i} + \sigma_{n,1} z^{n+1} \\ &= \sum_{i=1}^{p-1} \sigma_{n,i} z^{n+i} \cdot (1-z) + \sigma_{n,p} z^{n+p} \\ &= z^{n+1} (1-z) \cdot \sum_{i=1}^{p-1} (\sigma_{n,i} \cdot z^{i-1}) + \sigma_{n,p} \cdot z^{n+p} \end{aligned}$$

故当  $|z| < 1, n > N$ . 时有:  $\left| \sum_{i=1}^p a_{n+i} \cdot z^{n+i} \right| < \epsilon \cdot |1-z| \cdot \sum_{n=p}^{\infty} |z^n| + \epsilon = \epsilon \left( \frac{|1-z|}{1-|z|} + 1 \right)$

任取  $z \in S_\alpha(1) \cap B(1, \delta)$  记  $|z| = r, |1-z| = \rho$  则由余弦定理得  $r^2 = 1 + \rho - 2\rho \cos \theta$


$$\text{故 } \frac{|1-z|}{1-|z|} = \frac{\rho}{1-r} = \frac{\rho(1+r)}{1-r^2} \leq \frac{2\rho}{2\rho \cos \theta - \rho^2} = \frac{2}{2 \cos \theta - \rho}$$

又由于  $z \in B(1, \delta)$ . 故  $\rho < \delta < \cos \alpha < \cos \theta$  故  $\frac{|1-z|}{1-|z|} < \frac{2}{\cos \alpha}$

故  $\left| \sum_{i=1}^p a_{n+i} \cdot z^{n+i} \right| < \epsilon \left( \frac{2}{\cos \alpha} + 1 \right)$ , 故  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  在  $S_\alpha(1) \cap B(1, \delta)$

上一致收敛设和函数为  $f$ , 由一致收敛性得  $f$  在  $S_\alpha(1) \cap B(1, \delta)$  上连续, 故

$$\lim_{\substack{z \in S_\alpha(1) \\ z \rightarrow 1}} f(z) = f(1) = S$$



□



# 发布说明





为了使这份精心制作的笔记以更好的面貌呈现在同学们的面前，钱院学辅组织了一些同学用  $\text{\LaTeX}$  进行排版。在此对他们表示衷心的感谢！

## 参与排版成员

- 钱 91 谢佳润
- 计试 71 朱泽荧
- 力学少 52 朱相辰
- 化生 81 郭骐瑞
- 整理发布：化生 81 高旭帆

如果对笔记有意见和建议，可通过以下方式联系我们：

-  钱院学辅信息发布站：<https://qyxf.site>
-  钱院学辅邮箱：[qianyuanxuefu@163.com](mailto:qianyuanxuefu@163.com)

除此之外，欢迎同学们扫码加入我们的 QQ 群：



群名称:钱院学辅交流分享群  
群 号:852768981



群名称:钱院科粉群1.0  
群 号:979670536



QIAN YUAN XUE FU

- 钱院学辅交流分享群：有钱院优秀的学长学姐为大家答疑平日学习中的问题，分享学习资料和经验；
- 钱院科粉群：分享科研资源、公开课、最新科技评论，转发创新竞赛相关信息，就科研方法、学习提供答疑。

如果你希望向我们投稿笔记，可以联系群内的化生 81 高旭帆同学。我们将用最整洁的排版，为你在钱院官方的平台发布一份完美的笔记！

期待与大家的见面！

钱院学辅

2020 年 5 月 2 日