

Vibrações Mecânicas

Aula10: Vibração Forçada

Sistemas não Amortecidos

Ramiro Brito Willmersdorf
ramiro@willmersdorf.net


Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Pernambuco

2015.1

Introdução

- Na vibração forçada energia é adicionada ao sistema;
- Tanto força quanto deslocamentos podem ser impostos;
- Tipos de excitação:
 - Harmônica;
 - Periódica não harmônica;
 - Não periódica;
 - Aleatória;
- Pode ocorrer **ressonância**;
- A resposta harmônica é o fundamento de todo o estudo.

Equação de Movimento



Do DCL,


$$m\ddot{x} + c\dot{x} + \kappa x = F(t),$$

a solução desta EDO é a solução $x_h(t)$ da equação homogênea

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + \kappa x = 0$$

somada com a solução particular $x_p(t)$.

Equação de Movimento



Do DCL,


$$m\ddot{x} + c\dot{x} + \kappa x = F(t),$$

a solução desta EDO é a solução $x_h(t)$ da equação homogênea

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + \kappa x = 0$$

somada com a solução particular $x_p(t)$.

Regimes Transiente e Permanente



- Sempre que há amortecimento, $x_h(t) \rightarrow 0$!
- A solução $x(t)$ portanto torna-se $x_p(t)$ apenas;
- A solução total é uma combinação dos regimes **transiente permanente**;
- Muitas vezes na engenharia consideramos apenas o regime permanente.

Solução Homogênea

Considerando que o amortecimento é nulo, sob uma força harmônica

$$F(t) = F_0 \cos \omega t,$$

a equação de movimento é

$$m\ddot{x} + \kappa x = F_0 \cos \omega t,$$

cuja solução da equação homogênea é, obviamente,

$$x_h(t) = C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t$$

Solução Particular

Supondo que a solução particular seja

$$x_p(t) = X \cos \omega t,$$

substituímos esta solução na equação particular, obtendo

$$-m\omega^2 X \cos \omega t + \kappa X \cos \omega t = F_0 \cos \omega t.$$

Claramente

$$(-m\omega^2 + \kappa)X = F_0,$$

ou

$$X = \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} = \frac{\delta_{st}}{1 - (\omega/\omega_n)^2}$$

Solução Geral

A solução geral é então

$$x(t) = C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t + \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \cos \omega t.$$

Aplicando as condições iniciais $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$, temos

$$C_1 = x_0 - \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2}, \quad C_2 = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n},$$

e, finalmente,

$$x(t) = \left(x_0 - \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \right) \cos \omega_n t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \cos \omega t.$$

Solução Geral

A solução geral é então

$$x(t) = C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t + \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \cos \omega t.$$

Aplicando as condições iniciais $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$, temos

$$C_1 = x_0 - \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2}, \quad C_2 = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n},$$

e, finalmente,

$$x(t) = \left(x_0 - \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \right) \cos \omega_n t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \cos \omega t.$$

Solução Geral

A solução geral é então

$$x(t) = C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t + \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \cos \omega t.$$

Aplicando as condições iniciais $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$, temos

$$C_1 = x_0 - \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2}, \quad C_2 = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n},$$


e, finalmente,

$$x(t) = \left(x_0 - \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \right) \cos \omega_n t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \cos \omega t.$$

Fator de Amplificação

Para a solução *particular*,
temos:


$$\frac{X}{\delta_{st}} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$




Resposta para $0 < \omega/\omega_n < 1$

O fator de amplificação é positivo e a resposta é **em fase** com a excitação.

$$F(t) = F_0 \cos \omega t$$




$$x_p(t) = X \cos \omega t$$




Resposta para $\omega/\omega_n > 1$

O fator de amplificação é negativo e a resposta está **em oposição de fase** à excitação.

$$F(t) = F_0 \cos \omega t$$



$$x_p(t) = -X \cos \omega t$$



Resposta para $\omega/\omega_n = 1$

Isto é, $\omega = \omega_n$, **ressonância!**

A resposta total pode ser reescrita como:

$$x(t) = x_0 \cos \omega_n t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \delta_{st} \left(\frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right)$$

O último termo tende para infinito, mas isto ocorre instantaneamente?

Resposta para $\omega/\omega_n = 1$

Isto é, $\omega = \omega_n$, **ressonância!**

A resposta total pode ser reescrita como:

$$x(t) = x_0 \cos \omega_n t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \delta_{st} \left(\frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right)$$

O último termo tende para infinito, mas isto ocorre instantaneamente?

Resposta para $\omega/\omega_n = 1$

Isto é, $\omega = \omega_n$, **ressonância!**

A resposta total pode ser reescrita como:

$$x(t) = x_0 \cos \omega_n t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \delta_{st} \left(\frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right)$$

O último termo tende para infinito, mas isto ocorre instantaneamente?

Resposta para $\omega/\omega_n = 1$

Aplicando a regra de L'Hospital,

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_n} \left[\frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right] = \lim_{\omega \rightarrow \omega_n} \left[\frac{\frac{d}{d\omega} (\cos \omega t - \cos \omega_n t)}{\frac{d}{d\omega} \left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)} \right],$$

o que dá

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_n} \left[\frac{t \sin \omega t}{2 \frac{\omega}{\omega_n^2}} \right] = \frac{\omega_n t}{2} \sin \omega_n t$$

Resposta para $\omega/\omega_n = 1$

Aplicando a regra de L'Hospital,

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_n} \left[\frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right] = \lim_{\omega \rightarrow \omega_n} \left[\frac{\frac{d}{d\omega} (\cos \omega t - \cos \omega_n t)}{\frac{d}{d\omega} \left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)} \right],$$

o que dá


$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_n} \left[\frac{t \sin \omega t}{2 \frac{\omega}{\omega_n^2}} \right] = \frac{\omega_n t}{2} \sin \omega_n t$$

Resposta para $\omega/\omega_n = 1$

A resposta total, **na ressonância**, é então

$$x(t) = x_0 \cos \omega_n t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \delta_{st} \frac{\omega_n t}{2} \sin \omega_n t.$$

A forma da solução particular é:



Resposta Total

Podemos escrever a resposta total para $\omega/\omega_n < 1$ como

$$x(t) = A \cos(\omega_n t - \phi) + \frac{\delta_{st}}{1 - (\omega/\omega_n)^2} \cos \omega t,$$

e, para $\omega > \omega_n$,

$$x(t) = A \cos(\omega_n t - \phi) - \frac{\delta_{st}}{1 - (\omega/\omega_n)^2} \cos \omega t,$$

Claramente, temos a soma de duas funções harmônicas de frequências *distintas*.

Resposta Total

Podemos escrever a resposta total para $\omega/\omega_n < 1$ como



$$x(t) = A \cos(\omega_n t - \phi) + \frac{\delta_{st}}{1 - (\omega/\omega_n)^2} \cos \omega t,$$

e, para $\omega > \omega_n$,

$$x(t) = A \cos(\omega_n t - \phi) - \frac{\delta_{st}}{1 - (\omega/\omega_n)^2} \cos \omega t,$$

Claramente, temos a soma de duas funções harmônicas de frequências *distintas*.

Resposta Total



Batimento

Se a frequência natural e a frequência de excitação são próximas, pode ocorrer **batimento**.

Para $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 0$, a resposta total é

$$x(t) = -\frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \cos \omega_n t + \frac{F_0}{\kappa - m\omega^2} \cos \omega t,$$

ou

$$x(t) = \frac{F_0/m}{\omega_n^2 - \omega^2} (\cos \omega t - \cos \omega_n t),$$

ou ainda,

$$x(t) = \frac{F_0/m}{\omega_n^2 - \omega^2} \left[2 \sin \frac{\omega + \omega_n}{2} t \sin \frac{\omega - \omega_n}{2} t \right]$$

Batimento

Supondo que

$$\omega_n - \omega = 2\epsilon, \quad \epsilon \ll 1,$$

então $\omega \approx \omega_n$ e

$$\omega + \omega_n \approx 2\omega.$$


Multiplicando estas duas equações,

$$\omega_n^2 - \omega^2 = 4\epsilon\omega,$$

e a resposta total torna-se

$$x(t) = \left[\frac{F_0/m}{2\epsilon\omega} \sin \epsilon t \right] \sin \omega t$$

Batimento



$$\tau_b = \frac{2\pi}{\epsilon} = \frac{2\pi}{\omega_n - \omega}$$

$$\omega_b = 2\epsilon = \omega_n - \omega$$