

On a donc nécessairement

$$\hat{f}(y) = \frac{\hat{g}(y)}{(2i\pi y)^{12} + (2i\pi y)^8 + 1}$$

C'est le produit de la fonction \hat{g} qui est C^∞ et d'une fonction rationnelle sans pôle réel, donc C^∞ , donc \hat{f} est aussi de classe C^∞ , on va aussi montrer que c'est une fonction à décroissance rapide, on va pour cela calculer partiellement ses dérivées, on va plus précisément montrer, par récurrence que

$$\forall n \in \mathbf{N}, \exists \{P_i, i \in [[1, n]]\} \in \mathbf{R}[X] \mid \forall y \in \mathbf{R}, \hat{f}^{(n)}(y) = \frac{\sum_{k=0}^n \hat{g}^{(k)}(y) P_k(y)}{\left((2i\pi y)^{12} + (2i\pi y)^8 + 1\right)^{2n}}$$

Pour simplifier les notation, on va noter le dénominateur u , ainsi pour le cas $n = 1$, c'est la formule de la dérivée d'un quotient et on a

$$\forall y \in \mathbf{R}, \hat{f}'(y) = \frac{\hat{g}'(y)v(y) - \hat{g}(y)v'(y)}{v(y)^2}$$

(il est claire que v' est un polynôme) et pour le cas $n \rightarrow n + 1$, on va dériver

$$\begin{aligned} \forall y \in \mathbf{R}, \hat{f}^{(n+1)}(y) &= \left(\frac{\sum_{k=0}^n \hat{g}^{(k)}(y) P_k(y)}{v(y)^{2n}} \right)' \\ &= \frac{\left(\sum_{k=0}^n \hat{g}^{(k)}(y) P_k(y) \right)' v(y) - \sum_{k=0}^n \hat{g}^{(k)}(y) P_k(y) v'(y)}{v(y)^{2(n+1)}} \\ &= \frac{\left(\sum_{k=0}^n \hat{g}^{(k+1)}(y) P_k(y) + \hat{g}^{(k)}(y) P'_k(y) \right) v(y) - \sum_{k=0}^n \hat{g}^{(k)}(y) P_k(y) v'(y)}{v(y)^{2(n+1)}} \\ &= \frac{\sum_{k=0}^n \hat{g}^{(k+1)}(y) P_k(y) v(y) - \hat{g}^{(k)}(y) (P_k(y) v'(y) - P'_k(y) v(y))}{v(y)^{2(n+1)}} \end{aligned}$$