

Comptage asymptotique des $D(n)$ -uplets

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 1.7 (Dujella, 2026). Soit $D_{m,n}(N)$ le nombre de $D(n)$ - m -uplets à éléments dans l'ensemble $\{1, 2, \dots, N\}$, pour un entier positif N donné.

1. Si n est un carré parfait, existe-t-il une constante $C(n)$ ne dépendant que de n telle que $D_{3,n} \sim C(n)N \log N$? Est-il vrai que $C(n) = C(1) = \frac{3}{\pi^2}$?
2. Si n n'est pas un carré parfait, existe-t-il une constante $C(n)$ ne dépendant que de n telle que $D_{3,n} \sim C(n)N$?
3. Si n est un carré parfait, que peut-on dire du comportement asymptotique de $D_{4,n}$?
4. Si n n'est pas un carré parfait, est-il vrai que $D_{4,n}$ est fini?

Remarque. Une réponse affirmative à la question (b), dans le cas où $|n|$ est premier ou $n = -1$, est donnée dans Adžaga, N., Dražić, G., Dujella, A., Pethő, A. : Asymptotics of $D(q)$ -pairs and triples via L -functions of Dirichlet characters. Ramanujan J. **66**, Article 11 (2025).

Les questions (a) et (b) sont entièrement résolues dans Badesa, J. : On the asymptotics of $D(n)$ -pairs and triples. Ramanujan J. **67**, Article 101 (2025); les réponses aux deux questions sont affirmatives. En particulier, pour n carré parfait, $D_{3,n} \sim \frac{3}{\pi^2} N \log N$.

Une preuve alternative de (a) et (b) est donnée dans l'article récent Dražić, G., Kazalicki, M., Mrazović, R. : Equidistribution of Diophantine pairs among the equivalence classes of quadratic forms. Prépublication (2025). arXiv : 2512.22902.