CHAPITRE 7

Invariants

De nombreux problèmes d'olympiades décrivent une situation que l'on transforme en répétant une même opération. On demande alors si un certain état peut être atteint, si le processus doit s'arrêter, ou quelle sera sa configuration finale.


Essayer toutes les suites d'opérations est souvent impossible. L'idée consiste plutôt à chercher une propriété qui ne change jamais au cours du processus : un **invariant**.

7.1 Exemple introductif : retourner des jetons

On dispose de 8 jetons, tous placés face blanche visible.

À chaque opération, on doit retourner exactement deux jetons.

Peut-on obtenir une configuration contenant exactement un jeton noir ?



Notons N le nombre de jetons noirs.

Lorsqu'on retourne deux jetons, trois situations sont possibles :

— deux jetons blancs deviennent noirs : N augmente de 2 ;
— un jeton blanc et un jeton noir sont retournés : N ne change pas ;
— deux jetons noirs deviennent blancs : N diminue de 2.

Ainsi, à chaque opération,

$$N \longmapsto N+2, \qquad N, \qquad \text{ou} \qquad N-2.$$

La parité de N ne change donc jamais.
Au départ,

$$N = 0,$$

qui est pair. Après n'importe quel nombre d'opérations, N reste pair.
Or l'état demandé contient exactement un jeton noir, donc

$$N = 1,$$

qui est impair.
L'état demandé est donc impossible à atteindre.

La parité du nombre de jetons noirs est un invariant.

7.2 Le concept d'invariant

7.2.1 Définition

Définition 7.1 (Invariant)**.** Un **état** décrit complètement la situation à un instant donné.


Une **opération autorisée** transforme un état en un autre.

Une quantité I est appelée un **invariant** lorsqu'elle conserve toujours la même valeur après chaque opération autorisée.

Autrement dit, si un état S est transformé en un état S', alors

$$\boxed{I(S') = I(S).}$$

On peut représenter le principe ainsi :



Proposition 7.2. *Si l'état initial et l'état visé n'ont pas la même valeur de l'invariant, alors l'état visé est inaccessible.*

$$\boxed{I(\textit{état initial}) \neq I(\textit{état visé}) \quad \Longrightarrow \quad \textit{état visé impossible.}}$$

7.2.2 Méthode de recherche

Méthode — *Chercher un invariant*

Pour résoudre un problème par invariant, on peut suivre les étapes suivantes.

1. **Décrire l'état.**

   Quels nombres, couleurs, positions ou objets caractérisent la situation ?
2. **Analyser une opération.**

   Quelles quantités sont modifiées ? De combien ?
3. **Chercher ce qui ne change pas.**

   Il peut s'agir :
   — d'une parité ;
   — d'un reste modulo un entier ;
   — d'une somme ;
   — d'une somme pondérée ;
   — d'un produit ;
   — d'un PGCD ;

— du nombre d'objets d'une certaine couleur.

4. **Comparer l'état initial et l'état visé.**
   Si les valeurs de l'invariant sont différentes, l'état visé est impossible.

Analyser une opération $\Longrightarrow$ trouver ce qui reste constant

Comparer l'état initial et l'état visé

Remarque (Une précaution importante). Un invariant donne souvent une **condition nécessaire**, mais pas toujours une condition suffisante.

Si deux états ont des valeurs différentes de l'invariant, alors ils ne peuvent pas être reliés.

En revanche, s'ils ont la même valeur de l'invariant, cela ne prouve pas automatiquement que l'on peut passer de l'un à l'autre.

$$I(S) = I(S')$$
ne garantit pas toujours que S' est accessible depuis S.

Il faut parfois compléter l'étude par une construction explicite ou par un second invariant.

7.3 Invariants classiques

7.3.1 Parité et congruences

La parité est l'invariant le plus simple.

Définition 7.3 (Reste modulo m)**.** Soit $m \geq 2$ un entier. Tout entier a (même négatif) s'écrit d'une seule façon $a = qm+r$, avec q entier et $0 \leq r \leq m-1$; l'entier r est le **reste de a modulo m**. Par exemple, $-2 = 3 \times (-1) + 1$, donc le reste de -2 modulo 3 est 1.

Définition 7.4 (Congruence)**.** On écrit

$$a \equiv b \pmod{m}$$

(« a est congru à b modulo m ») lorsque a et b ont le même reste modulo m, c'est-à-dire lorsque $a - b$ est un multiple de m.

Pour $m = 2$: $a \equiv b \pmod 2$ signifie que a et b sont tous deux pairs ou tous deux impairs, c'est-à-dire qu'ils ont la même parité.

Ajouter ou retrancher un multiple de m ne change pas le reste modulo m. C'est pourquoi le reste modulo un entier m bien choisi est souvent un invariant.

Exemple 7.5. Un nombre entier est initialement égal à 7.

À chaque opération, on peut :

— lui ajouter 6 ;
— ou lui retrancher 9.

Peut-on atteindre 101 ?

Solution. Les nombres 6 et 9 sont des multiples de 3. Chaque opération ajoute ou retranche un multiple de 3 : elle conserve donc le reste modulo 3.

Au départ,

$$7 \equiv 1 \pmod 3.$$

Tous les nombres accessibles sont donc congrus à 1 modulo 3.

Mais $101 = 3 \times 33 + 2$, donc

$$101 \equiv 2 \pmod 3.$$

Ainsi,

Le nombre 101 ne peut pas être atteint.


Ici, l'invariant est le reste modulo 3. □

7.3.2 Coloriages

Un coloriage permet d'associer à chaque case, sommet ou position une couleur. On étudie ensuite la façon dont chaque opération agit sur les différentes couleurs.

Exemple 7.6 (l'échiquier mutilé)**.** On considère un échiquier 4×4, colorié comme d'habitude : deux cases qui ont un côté commun sont de couleurs différentes (noire et blanche). On en retire deux coins opposés.

Peut-on recouvrir les 14 cases restantes à l'aide de 7 dominos 1×2 ?



Solution. Un domino placé sur l'échiquier recouvre deux cases ayant un côté commun, donc toujours :

— une case noire ;
— une case blanche.

Ainsi 7 dominos recouvrent exactement 7 cases noires et 7 cases blanches.

Un échiquier 4×4 contient initialement 8 cases noires et 8 cases blanches.

Les deux coins opposés retirés ont la même couleur (sur la figure, les cases noires sont grisées, et les deux coins retirés sont des cases noires). Il reste donc :

6 cases d'une couleur et 8 cases de l'autre couleur,

et non 7 de chaque couleur.

Ainsi,

L'échiquier mutilé ne peut pas être pavé par des dominos.

On peut le voir comme un invariant : si l'on pose les dominos un par un, la différence entre le nombre de cases libres d'une couleur et le nombre de cases libres de l'autre couleur ne change jamais, car chaque domino occupe une case de chaque couleur. Elle vaut $8 - 6 = 2$ au départ ; elle vaudrait $0 - 0 = 0$ si tout l'échiquier était pavé. □

7.3.3 Sommes et sommes pondérées

La somme totale des quantités présentes est parfois conservée.


Dans des problèmes plus délicats, la somme ordinaire varie, mais une **somme pondérée** reste constante : on multiplie chaque quantité par un coefficient fixe (son *poids*) avant d'additionner, par exemple $x + y + 2z$.

Exemple 7.7 (trois boîtes)**.** Trois boîtes A, B et C contiennent respectivement a, b et c pierres.

Les opérations autorisées sont les suivantes :

— transférer une pierre de A vers B ;
— retirer deux pierres de B et placer une pierre dans C.

Une opération n'est possible que si la boîte de départ contient assez de pierres (au moins une dans A, ou au moins deux dans B).



La somme ordinaire $a + b + c$ n'est pas conservée par la seconde opération.

Considérons plutôt

$$I = a + b + 2c.$$

Lors de la première opération,

$$(a, b, c) \longmapsto (a - 1, b + 1, c),$$

donc

$$I \longmapsto (a-1)+(b+1)+2c = I.$$

Lors de la seconde opération,

$$(a,b,c) \longmapsto (a,b-2,c+1),$$

donc

$$I \longmapsto a+(b-2)+2(c+1) = I.$$

Ainsi,

$$\boxed{I = a+b+2c}$$

est un invariant.
À partir de l'état

$$(8,0,0),$$

on a

$$I = 8.$$

L'état

$$(0,1,3)$$

a pour valeur

$$I = 0+1+2\times 3 = 7.$$

Il est donc inaccessible.
En revanche,

$$(0,2,3)$$

a la même valeur $I = 8$. L'invariant ne suffit pas à conclure : il faut construire le chemin. On transfère les 8 pierres de A vers B, puis on applique trois fois la seconde opération :

$$(8,0,0) \longmapsto \cdots \longmapsto (0,8,0) \longmapsto (0,6,1) \longmapsto (0,4,2) \longmapsto (0,2,3).$$

Cet état est donc accessible.

7.3.4 Le PGCD

Définition 7.8 (PGCD)**.** Le plus grand commun diviseur (PGCD) de deux entiers strictement positifs a et b, noté $\gcd(a,b)$, est le plus grand entier qui divise à la fois a et b.

Il peut également rester constant.

On utilise le fait suivant : si un entier d divise a et b, alors il divise aussi $a+b$ et $a-b$.

Proposition 7.9. *On en déduit, pour des entiers strictement positifs a et b,*

$$\boxed{\begin{array}{ll} & \gcd(a+b,b) = \gcd(a,b), \\ \text{et, si } a > b, & \gcd(a-b,b) = \gcd(a,b). \end{array}}$$

Démonstration. En effet, un diviseur commun de a et b divise $a+b$ et $a-b$; réciproquement, un diviseur commun de $a+b$ et b divise $a = (a+b)-b$, et un diviseur commun de $a-b$ et b divise $a = (a-b)+b$. Les deux couples ont donc les mêmes diviseurs communs, et en particulier le même plus grand. □

Exemple 7.10. On part d'un couple d'entiers strictement positifs (a,b). Une opération permet de remplacer l'un des deux nombres par sa somme avec l'autre, ou, si les deux nombres sont différents, par la différence positive des deux (le plus grand moins le plus petit).

Les deux nombres restent strictement positifs. Le nouveau nombre est la somme ou la différence des deux anciens ; inversement, le nombre

effacé est la somme ou la différence des deux nouveaux (par exemple, si l'on remplace $a < b$ par $b - a$, on retrouve $a = b - (b - a)$). Le raisonnement ci-dessus montre alors que l'ancien et le nouveau couple ont les mêmes diviseurs communs : chaque opération conserve le PGCD.

Ainsi, à partir de

$$(18, 30),$$

tous les couples accessibles ont pour PGCD

$$\gcd(18, 30) = 6.$$

Il est donc impossible d'atteindre le couple

$$(17, 31),$$

car

$$\gcd(17, 31) = 1 \neq 6.$$

7.4 Monovariants

Un invariant reste constant. Une autre idée très utile consiste à trouver une quantité qui varie toujours dans le même sens.

7.4.1 Définition

Définition 7.11 (Monovariant)**.** Un **monovariant** est une quantité M, calculée à partir de l'état, qui :

- soit augmente strictement après chaque opération ;
- soit diminue strictement après chaque opération.

Autrement dit, si S est un état et S' l'état obtenu après une opération, on a toujours

$$\boxed{M(S') > M(S)}$$

ou bien toujours

$$\boxed{M(S') < M(S).}$$

Supposons que M prenne des valeurs **entières**, positives ou nulles, et diminue strictement à chaque opération. Alors M diminue d'au moins 1 à chaque opération. Partant de la valeur M_0 de l'état initial, on ne peut donc pas effectuer plus de M_0 opérations : le processus s'arrête forcément. De même, un entier qui augmente strictement et ne peut pas dépasser une valeur fixée ne peut augmenter qu'un nombre fini de fois.

Un monovariant permet notamment de prouver :

- qu'un processus doit s'arrêter (avec un monovariant entier comme ci-dessus) ;
- qu'un état déjà rencontré ne peut jamais réapparaître (il aurait la même valeur de M, alors que M a strictement varié) : le processus ne peut donc pas tourner en rond.

7.4.2 Exemple : l'algorithme des différences

On considère deux entiers strictement positifs a et b.

Tant qu'ils sont différents, on remplace le plus grand par la différence des deux nombres (le plus grand moins le plus petit). Les deux nombres restent strictement positifs.

Par exemple,

$$(18, 30) \longmapsto (18, 12) \longmapsto (6, 12) \longmapsto (6, 6).$$

La somme

$$M = a + b$$

diminue strictement à chaque opération : si $a > b$, on passe de $a + b$ à $(a - b) + b = a$, donc M diminue de b, qui vaut au moins 1.

Elle reste pourtant un entier strictement positif. Elle ne peut donc pas diminuer indéfiniment.

Le processus doit s'arrêter.

Par ailleurs, cette opération est un cas particulier de celles de l'exemple précédent, donc le PGCD de a et b est invariant. Le processus ne s'arrête que lorsque les deux nombres sont égaux, à une valeur commune d. Comme $\gcd(d, d) = d$, cette valeur commune est le PGCD initial.

Dans l'exemple,

$$\gcd(18, 30) = 6.$$

On obtient bien le couple final

$$(6, 6).$$

Cet exemple utilise simultanément :

$$\boxed{\text{un invariant : le PGCD}}$$

et

$$\boxed{\text{un monovariant : la somme } a + b}.$$

7.5 À retenir

- **Invariant.** C'est une quantité qui garde la même valeur après chaque opération. Si elle n'a pas la même valeur dans l'état initial et dans l'état visé, l'état visé est impossible à atteindre.
- **La réciproque est fausse en général.** Deux états qui ont la même valeur de l'invariant ne sont pas forcément reliés. Pour prouver qu'un état est accessible, on construit une suite d'opérations qui y mène.
- **Monovariant.** C'est une quantité qui augmente strictement à chaque opération, ou qui diminue strictement à chaque opération. Un entier positif ou nul qui diminue strictement à chaque

opération prouve que le processus s'arrête.

- **Parité.** Penser à la parité quand chaque opération change une quantité d'un nombre pair (par exemple, quand on retourne deux jetons à la fois : le nombre de jetons noirs varie de -2, 0 ou $+2$).
- **Reste modulo m.** Si chaque opération ajoute ou retranche un multiple de m, le reste modulo m ne change pas.
- **Coloriage.** Pour un pavage ou des déplacements sur une grille, colorier les cases de sorte que chaque pièce (ou chaque déplacement) agisse de la même façon sur chaque couleur, puis compter les cases de chaque couleur.
- **Somme pondérée.** Quand la somme ordinaire varie, chercher des poids $w_1, \ldots, w_n$ tels que $w_1x_1 + \cdots + w_nx_n$ ne change pas : ce que l'opération enlève d'un côté est compensé de l'autre.
- **PGCD.** Quand on remplace un nombre par sa somme ou sa différence avec un autre nombre présent, les diviseurs communs, donc le PGCD, ne changent pas.

$$\boxed{\text{Invariant différent} \Longrightarrow \text{état inaccessible}}$$

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{Entier qui diminue strictement et reste positif} \\ \Longrightarrow \text{ le processus finit par s'arrêter}\end{array}}$$

7.6 Exercices

Exercices de compréhension

Exercice 7.1 — Vingt jetons

On dispose de 20 jetons, initialement tous blancs. À chaque opération, on retourne exactement 6 jetons.

1. Comment varie la parité du nombre de jetons noirs ?
2. Peut-on obtenir exactement 5 jetons noirs ?
3. Peut-on obtenir exactement 8 jetons noirs ? L'invariant suffit-il à conclure ?

Exercice 7.2 — Ajouter 10 ou retrancher 15

Un entier est initialement égal à 4. À chaque opération, on peut lui ajouter 10 ou lui retrancher 15.

1. Quel reste modulo 5 est invariant ?
2. Peut-on atteindre 2026 ?
3. Peut-on atteindre 2024 ?

Exercice 7.3 — Le cavalier

Un cavalier est placé sur une case noire d'un échiquier 8×8. Un déplacement du cavalier avance de deux cases dans une direction, puis d'une case dans une direction perpendiculaire.

1. Montrer qu'après chaque déplacement, il change de couleur de case.
2. Peut-il revenir à sa case initiale après un nombre impair de déplacements ?
3. Peut-il revenir à sa case initiale après un nombre pair de déplacements ? L'invariant suffit-il à répondre ?

Exercice 7.4 — Invariant ou monovariant ?

Pour chacune des quantités suivantes, dire s'il s'agit plutôt d'un invariant ou d'un monovariant :

1. le PGCD dans l'algorithme des différences ;
2. la somme des deux nombres dans ce même algorithme ;
3. la parité du nombre de jetons noirs lorsqu'on retourne deux jetons ;
4. le nombre de piles lorsqu'on fusionne deux piles de jetons en une seule.

Exercices faciles

Exercice 7.5 — Dix entiers et une parité

Dix entiers sont initialement tous égaux à 0.

À chaque opération, on choisit exactement deux de ces entiers et on ajoute 1 à chacun d'eux.

1. Montrer que la parité du nombre d'entiers impairs est invariante.
2. Peut-on obtenir une configuration contenant exactement un entier impair ?
3. Peut-on obtenir une configuration contenant exactement deux entiers impairs ?

Exercice 7.6 — Échiquier 6×6 mutilé

Un échiquier 6×6 est privé de deux coins opposés.

1. Combien contient-il initialement de cases noires et de cases blanches ?
2. Les deux coins opposés ont-ils la même couleur ?
3. Peut-on paver les cases restantes avec des dominos 1×2 ?

Exercice 7.7 — Le couple $(84, 30)$

On part du couple

$$(84, 30).$$

À chaque opération, on peut remplacer l'un des nombres par la somme des deux nombres, ou, s'ils sont différents, par leur différence positive (le plus grand moins le plus petit).

1. Montrer que le PGCD est invariant.
2. Peut-on atteindre le couple $(15, 21)$?
3. Peut-on atteindre le couple $(12, 18)$?
4. Un couple d'entiers strictement positifs de PGCD 6 est-il toujours accessible ? (Indication : montrer que chaque opération peut être annulée par une opération autorisée.)

Exercice 7.8 — Nombres aux sommets d'un triangle

Des nombres entiers sont écrits aux sommets d'un triangle.

À chaque opération, on ajoute 1 aux nombres situés à deux sommets différents.

1. Montrer que la parité de la somme des trois nombres est invariante.
2. En partant de $(0, 0, 0)$, peut-on atteindre $(1, 1, 1)$?
3. Peut-on atteindre $(1, 1, 0)$?

Exercices +

Exercice 7.9 — Les trois boîtes

Trois boîtes A, B et C contiennent respectivement a, b et c pierres.

Les opérations autorisées sont :

— transférer une pierre de A vers B ;

— remplacer deux pierres de B par une pierre dans C.

On part de la configuration

$$(12, 0, 0).$$

1. Montrer que $a + b + 2c$ est invariant.
2. Peut-on atteindre $(0, 1, 5)$?
3. Peut-on atteindre $(0, 2, 5)$?
4. Donner explicitement une suite d'opérations permettant d'atteindre $(0, 2, 5)$.

Exercice 7.10 — Pavage par carrés 2×2

On considère un damier 6×6. On retire les quatre cases

$$(1, 1), \quad (1, 3), \quad (3, 1), \quad (3, 3),$$

où (i, j) désigne la case située sur la ligne i et la colonne j (lignes et colonnes numérotées de 1 à 6).

On souhaite paver les 32 cases restantes avec des carrés 2×2.

1. Colorier les cases avec quatre couleurs selon les parités de i et de j.
2. Montrer que tout carré 2×2 recouvre exactement une case de chaque couleur.
3. Vérifier que les quatre cases retirées ont la même couleur.
4. En déduire que le pavage est impossible.

Exercice 7.11 — Pierres disposées en cercle

On dispose $2n$ tas de pierres ($n \geq 2$) sur un cercle, numérotés dans l'ordre : le tas $2n$ est voisin du tas 1. Leurs tailles sont

$$a_1, a_2, \ldots, a_{2n}.$$

À chaque opération, on choisit deux tas voisins et on ajoute une pierre à chacun d'eux.

1. Montrer que la somme alternée

   $$S = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{2n-1} - a_{2n}$$

   est invariante.
2. On part de $(1, 0, 0, \ldots, 0)$.

   Peut-on obtenir une configuration dans laquelle tous les tas ont la même taille ?
3. Même question si l'on part de $(1, 1, 0, \ldots, 0)$.

   L'invariant suffit-il à conclure ?

Exercice 7.12 — Produit invariant

Au moins quatre nombres non nuls sont écrits au tableau.

Une opération consiste à changer simultanément le signe de deux nombres.

1. Montrer que le produit de tous les nombres est invariant.
2. En partant de nombres tous positifs, peut-on obtenir exactement un nombre négatif ?
3. Peut-on obtenir exactement quatre nombres négatifs ?

Exercices ++

Exercice 7.13 — Jetons alignés

On considère n jetons alignés, initialement tous blancs.

À chaque opération, on retourne deux jetons voisins.

1. Montrer que toute configuration accessible contient un nombre pair de jetons noirs.
2. Soient $i < j$. Montrer qu'en retournant successivement les paires
$$(i, i+1), (i+1, i+2), \ldots, (j-1, j),$$
seuls les jetons situés aux positions i et j changent finalement de couleur.
3. En déduire que toute configuration contenant un nombre pair de jetons noirs est accessible.
4. Conclure qu'une configuration est accessible si et seulement si elle contient un nombre pair de jetons noirs.

Exercice 7.14 — Les quatre coins d'un rectangle

Une grille rectangulaire comporte $m \geq 2$ lignes et $n \geq 2$ colonnes. Toutes les cases sont initialement blanches.

Une opération consiste à choisir deux lignes et deux colonnes, puis à changer la couleur des quatre cases situées à leurs intersections.

1. Montrer que, dans chaque ligne, la parité du nombre de cases noires est invariante.
2. Montrer de même que, dans chaque colonne, cette parité est invariante.
3. En déduire que toute configuration accessible possède un nombre pair de cases noires dans chaque ligne et dans chaque colonne.
4. Réciproquement, considérer une configuration possédant cette propriété. Pour chaque case noire (i, j) de cette configuration, avec $i < m$ et $j < n$, effectuer l'opération sur les lignes i, m et les colonnes j, n.
5. Montrer que cette procédure permet d'effacer toutes les cases noires.

6. Conclure qu'une configuration est accessible si et seulement si chaque ligne et chaque colonne contient un nombre pair de cases noires (remarquer que répéter une même opération l'annule).

Exercice 7.15 — Invariant et monovariant

On considère une liste finie d'entiers strictement positifs.

À chaque opération, on choisit deux nombres distincts $a > b$ et on remplace a par $a - b$.

1. Montrer que le PGCD de tous les nombres de la liste est invariant.
2. Montrer que la somme de tous les nombres diminue strictement.
3. En déduire que le processus doit s'arrêter.
4. Décrire les configurations dans lesquelles aucune opération n'est possible.
5. Que peut-on déduire sur la valeur finale commune des nombres ?

7.7 Problèmes

Problème 7.1 — Le taquin de quinze pièces

Un taquin est constitué de 15 pièces numérotées et d'une case vide, disposées dans une grille 4×4.

Une opération consiste à déplacer dans la case vide une pièce voisine horizontalement ou verticalement.

On part de la configuration ordonnée

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	□

Peut-on atteindre la configuration

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	15	14	□

?

Indications :

— chaque déplacement échange la case vide et une pièce ;
— colorier la grille comme un échiquier ;
— si la case vide revient à sa position initiale, le nombre de déplacements est pair ;
— comparer la parité de la permutation des 16 objets.

Problème 7.2 — Une opération algébrique

Les nombres

$$x_1, x_2, \ldots, x_n$$

sont écrits au tableau.

À chaque opération, on choisit deux nombres x et y, on les efface et on écrit à leur place le nombre

$$x + y - xy.$$

Après $n - 1$ opérations, il ne reste qu'un seul nombre.

1. Montrer que

$$1 - (x + y - xy) = (1 - x)(1 - y).$$

2. Trouver une quantité multiplicative qui reste invariante au cours du processus.
3. Montrer que le dernier nombre ne dépend pas de l'ordre des opérations.
4. Exprimer ce dernier nombre en fonction de $x_1, x_2, \ldots, x_n$.
5. Calculer le nombre final lorsque les nombres initiaux sont

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{n+1}.$$

Problème 7.3 — Pavage par barres de longueur 3

On considère un damier 10×10, dont on retire la case située sur la première ligne et la deuxième colonne (lignes et colonnes numérotées de 1 à 10, la case (i, j) étant sur la ligne i et la colonne j).

Peut-on paver les 99 cases restantes à l'aide de rectangles 1×3, placés horizontalement ou verticalement ?

Indications :

— attribuer à la case (i, j) la couleur déterminée par

$$i + j \pmod 3;$$

— montrer que toute barre 1×3 recouvre une case de chacune des trois couleurs ;

— compter le nombre de cases de chaque couleur avant et après le retrait.

Problème 7.4 — Égalisation sur un cycle pair

Des entiers sont placés aux sommets d'un polygone à $2n$ sommets ($n \geq 2$).

Une opération permet d'ajouter 1, ou de retrancher 1, aux nombres situés à deux sommets voisins.

1. Montrer que la somme alternée des nombres est invariante.
2. Montrer que si tous les nombres peuvent être rendus égaux, alors la somme alternée initiale est nulle.
3. Prouver réciproquement que, si la somme alternée initiale est nulle, alors il est possible de rendre tous les nombres égaux.

Indication : procéder successivement autour du polygone en corrigeant les sommets les uns après les autres.

Problème 7.5 — Une suite de transformations

On place les nombres

$$1, 2, 3, \ldots, 2026$$

au tableau.

À chaque opération, on choisit deux nombres a et b, on les efface et on écrit leur somme $a + b$.

1. Quelle quantité reste invariante ?
2. Quel sera nécessairement le dernier nombre inscrit ?
3. Le résultat dépend-il de l'ordre des opérations ?
4. Combien d'opérations sont nécessaires ?
5. Identifier un monovariant simple.