

1. KOMPLEKS ƏDƏDLƏR

Ədəd analizi riyaziyyatın ilkin anlayışlarından biri olub, əvvəlcə natural ədədlər sonra tam, rəşional və irrasional ədədlər yaranmaqla həqiqi ədədlər çoxluğuna qədər gəlib çatmışdır. Qeyd edək ki, bu ədədlərin hər birinin yaranması praktiki məsələlərin həlli ilə əlaqədar olub, tarixin müəyyən dövrlərinə aiddir. Lakin $x^2 + 1 = 0$ kimi sadə bir tənliyin həqiqi ədədlər çoxluğunda həllinin olmaması yeni ədədlərin yaradılması zərurətini ortaya çıxardı. Bu ədədlər kompleks ədədlərdir. Kompleks ədədlərin qurulmasında gözlənilən prinsip ondan ibarətdir ki, kompleks ədədlər həqiqi ədədlər çoxluğunu da öz daxilində saxlamaqla onların malik olduğu bütün əsas xassələrə malik olsun və bu çoxluqda yuxarıda göstərilən tənliyin həlli olsun.

Nizam ilə götürülmüş bir cüt həqiqi ədədlə təyin olunan $\alpha = (a, b)$ $a, b \in R$ şəkilli ədədlər çoxluğuna baxaq. Bu çoxluğa kompleks ədədlər çoxluğu deyilir. Tutaq ki, $\beta = (c, d)$ $c, d \in R$. α və β kompleks ədədləri yalnız və yalnız o zaman bərabər hesab olunur ki, $a = c$, $b = d$ olsun. Bu çoxluqda cəm və vurma əməllərini aşağıdakı qaydada təyin edək.

$\alpha = (a, b)$ və $\beta = (c, d)$ kompleks ədədlərinin cəmi $\alpha + \beta = (a + c, b + d)$ ədədinə, hasilinə isə $\alpha \beta = (ac - bd, ad + bc)$ ədədinə deyilir. Asanlıqla yoxlamaq olar ki, bu iki əməl həqiqi ədədlər üzərində təyin olunmuş cəm və vurma əməllərinin malik olduğu bütün əsas xassələrə malikdir. "0" kompleks ədədi $0 = (0, 0)$ kimi təyin olunur. Bu iki əməlin köməyiylə çıxma və bölmə əməllərini də təyin etmək olar.

α ədədi ilə β ədədinin fərqi elə $\gamma = (x, y)$ ədədinə deyilir ki, onu β ilə topladıqda α -ya bərabər olsun. Yəni, $\beta + \gamma = \alpha$ olsun. Onda

$$(c, d) + (x, y) = (a, b)$$

$$(c + x, d + y) = (a, b)$$

$$c + x = a, \quad d + y = b$$

bərabərliyindən çıxır ki,

$$\left. \begin{array}{l} x = a - c \\ y = b - d \end{array} \right\}, \quad \text{buradan} \quad \alpha - \beta = \gamma = (a - c, b - d) \text{ olur.}$$

Tutaq ki, $\beta \neq 0$, yəni $c^2 + d^2 \neq 0$.

$\frac{\alpha}{\beta}$ kompleks ədədi elə $\gamma = (x, y)$ ədədinə deyilir ki, β -ni γ -ya vurduqda α -ya bərabər olsun: $\alpha = \beta \cdot \gamma$. Buradan

$$(a, b) = (c, d)(x, y),$$

$$(a, b) = (cx - dy, cy + dx)$$

Kompleks ədədlərin bərabərliyindən

$$\left\{ \begin{array}{l} cx - dy = a \\ dx + cy = b \end{array} \right\}$$

alırıq. Buradan

$$x = \frac{ac + db}{c^2 + d^2}, \quad y = \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}.$$

Beləliklə, $\frac{\alpha}{\beta} = \gamma = \left(\frac{ac + db}{c^2 + d^2}, \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right).$

Əgər $\alpha = (1,0)$ götürsək, $\frac{1}{\beta} = \left(\frac{c}{c^2 + d^2}, -\frac{d}{c^2 + d^2} \right)$ olar.

Hər bir a həqiqi ədədə $(a,0)$ şəklində yazılmış, kompleks ədəd kimi baxa bilərik. Asanlıqla görmək olar ki, bu şəkilli kompleks ədədlər üzərində toplama, çıxma, vurma və bölmə əməlləri həqiqi ədədlər üzərində aparılan əməllərdən yalnız yazılışı ilə fərqlənir. Məsələn, $(a,0), (b,0) \rightarrow (a+b,0), (a,0)(b,0) = (ab,0)$

Ona görə də biz həqiqi ədədlər çoxluğuna kompleks ədədlər çoxluğunun alt çoxluğu kimi baxa bilərik.

Göstərək ki, kompleks ədədlər çoxluğunda $x^2 + 1 = 0$ tənliyinin həlli var. $x = (0,1)$ kompleks ədədinin bu tənliyin kökü olduğunu göstərək. Aydındır ki,

$$x^2 = x \cdot x = (0,1) \cdot (0,1) = (-1,0).$$

Ona görə də, $(-1,0) + (1,0) = (0,0).$

Beləliklə, baxılan tənliyin komplekslər çoxluqda həlli var. $i = (0,1)$ kompleks ədədinə xəyali vahid deyilir. Bundan istifadə edərək (a,b) kompleks ədədini aşağıdakı şəkildə yazaq:

$$(a,b) = (a,0) + (0,b) = (a,0) + (0,1)(b,0) = (a,0) + i(b,0) = a + ib$$

$(a,b) = a + ib$ yazılışı kompleks ədədin cəbri şəkildə yazılışı adlanır. $\alpha = a + ib$ yazılışındakı a , kompleks ədədin həqiqi hissəsi, ib isə xəyali hissəsi adlanır.

Kompleks ədədlərin vurulma qaydasından istifadə etsək, görürük ki,

$i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$. Bundan istifadə edərək i -nin ixtiyari natural qüvvətini hesablamaq olar.

Kompleks ədədlərin cəbri şəkildə yazılışı, bu ədədlər üzərində hesab əməllərini daha asan şəkildə yerinə yetirməyə imkan verir. Məsələn, $\alpha = a + ib, \beta = c + id$ olarsa,

$$\alpha \mp \beta = (a + ib) \mp (c + id) = (a + c) \mp i(b + d)$$

$$\alpha \cdot \beta = (a + ib) \cdot (c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{a + ib}{c + id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{(c + id)(c - id)} = \frac{(ac + bd) + i(bc - ad)}{c^2 + d^2}$$

olar.

Asanlıqla görmək olar ki, hər bir $\alpha = (a, b)$ kompleks ədədinə üzərində düzbucaqlı Dekart koordinat sistemi seçilmiş müstəvinin müəyyən bir nöqtəsini qarşı qoymaq olar və bu qarşıqoyma qarşılıqlı birqiymətlidir. Belə uyğunluq yaradılmış müstəviyə kompleks müstəvi deyilir.

Tutaq ki, müstəvi üzərində düzbucaqlı Dekart koordinat sistemi verilmişdir. $\alpha = (a, b)$ kompleks ədədinə uyğun gələn nöqtəni bu müstəvi üzərində qeyd edək. $\overline{OM} = \rho$ OX oxunun $\overline{OM}$ üzərinə düşməsi üçün lazım gələn və saat əqrəbinin əksinə yönəlmiş kiçik fırlanma bucağını φ ilə işarə edək. Onda asanlıqla görmək olar ki,

$$\left. \begin{aligned} a &= \rho \cos \varphi \\ b &= \rho \sin \varphi \end{aligned} \right\}$$

Bunları α kompleks ədədinin cəbri şəkildə yazılışında nəzərə alsaq,

$\alpha = a + ib = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ olar.

α -nın bu şəkildə yazılışı onun triqonometrik şəkli adlanır. ρ -ya kompleks ədədin modulu, φ -yə isə arqumenti deyilir və $\rho = \text{mod } \alpha, \varphi = \arg \alpha$ kimi işarə edilir. Aydınır ki, $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$,

$$\text{tg } \varphi = \frac{b}{a}.$$

Qeyd edək ki, müstəvi nöqtələri ilə kompleks ədədlər arasındakı birqiymətliliyi təmin etmək üçün φ üzərinə $0 \leq \varphi < 2\pi$ şərtini qoymaq olar. $\overline{\alpha} = a - ib$ kompleks ədədinə α kompleks ədədinin qoşması deyilir.

Triqonometrik şəkildə verilmiş kompleks ədədlər üzərində vurma və bölmə əməllərini daha asan yerinə yetirmək olar.


Tutaq ki, $\alpha_1 = \rho_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $\alpha_2 = \rho_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$. Onda

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2 = \rho_1 \rho_2 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = \rho_1 \rho_2 [(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) +$$

$$+ i(\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2)] = \rho_1 \rho_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$$

Göründüyü kimi triqonometrik şəkildə verilmiş iki kompleks ədədinin hasilinin modulu onların modulları hasilinə, arqumenti isə arqumentlərin cəminə bərabərdir.

xüsusi halda alırıq ki, $\alpha^n = \rho^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$. $n = 2$ olduqda,



$[\rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^2 = \rho^2 (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi) = \rho^2 (\cos^2 \varphi + 2i \cos \varphi \sin \varphi - \sin^2 \varphi)$.
Buradan ikiqat argumentin düsturlarını alırıq:

$$\cos 2\varphi = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi ,$$

$$\sin 2\varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi .$$

$\frac{\alpha_1}{\alpha_2}$ kompleks ədədinin modulunun $\frac{\rho_1}{\rho_2}$ -yə, argumentinin isə $\varphi_1 - \varphi_2$ -yə bərabər

olduğunu analoji qayada göstərmək olar: $\operatorname{mod}\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right) = \frac{\rho_1}{\rho_2}$, $\arg\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right) = \varphi_1 - \varphi_2$.

Tutaq ki, $\alpha = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ və $\beta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ kompleks ədədləri verilmişdir.

Əgər $\alpha^n = \beta$ olarsa (n -natural ədəddir), onda α ədədinə β ədədinin n dərəcədən kökü deyilir. α və β -nin qiymətlərini nəzərə alsaq, aşağıdakı bərabərliyi ala bilərik:

$$\rho^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = r(\cos \theta + i \sin \theta) ,$$

$$\left. \begin{array}{l} \rho^n \cos n\varphi = r \cos \theta \\ \rho^n \sin n\varphi = r \sin \theta \end{array} \right\} \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r} ,$$

$$n\varphi = \theta + 2\pi k , \varphi = \frac{\theta + 2\pi k}{n} .$$

Göstərmək olar ki, φ üçün aldığımız sonsuz sayda qiymətdən yalnız n saydası müxtəlifdir: $\varphi_k = \frac{\theta + 2\pi k}{n}$, $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

Qalanları isə bu qiymətlərdən biri ilə üst-üstə düşür. Beləliklə, hər bir kompleks ədədin n dərəcədən n sayda kökü var və həmin köklər aşağıdakı düsturlarla tıılır:

$$\sqrt[n]{\beta} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\theta + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1 .$$

Xüsusi halda $\beta = 1$ olarsa, $r = 1$, $\theta = 0$ olar. Onda

$$\sqrt[n]{1} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1 .$$

Bu ədədlərə vahidin n dərəcədən kökləri deyilir.

2. YÜKSƏK TƏRTİBLİ MATRİSLƏR

Ədədlərdən düzəldilmiş m sayda sətiri və n sayda sütunu olan düzbucaqlı cədvələ $m \times n$ ölçülü matris deyilir. Matrisi əmələ gətirən ədədlərə onun elementləri deyilir. $m \times n$ ölçülü matris

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ və ya } \left\| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right\|$$

kimi işarə olunur.

Çox vaxt qısa olmaq üçün matrisləri $A, B, C, \dots, Z$ hərfləri ilə də işarə edirlər:

$$A = (a_{ij}), i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n} \text{ və ya } A = \|a_{ij}\|, i = \overline{1, \dots, m}, j = \overline{1, \dots, n}$$

Matrisin hər bir elementi iki indekslə təyin olunur. Onlardan birincisi bu elementin yerləşdiyi sətirin nömrəsini, ikincisi isə yerləşdiyi sütunun nömrəsini göstərir.

$a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$ i -nömrəli sətir, $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}$ isə j -nömrəli sütunun elementləridir.

Əgər $m=n$ olarsa, belə matrisə n tərtibli matris deyilir. n tərtibli matris üçün $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ baş diaqonal elementləri, $a_{1n-1}, a_{2n-1}, \dots, a_{nn-1}$ isə ikinci baş diaqonal və ya əlavə baş diaqonal elementləri adlanır. Əgər matrisin bütün elementləri sıfıra bərabər olarsa, ona sıfır matris deyilir. n tərtibli matrisin diaqonaldan bir tərəfdə yerləşən bütün elementləri sıfıra bərabər olarsa, ona üçbucaq matris, diaqonaldan kənarda yerləşən bütün elementlər sıfıra bərabər olarsa, ona diaqonal matris deyilir.

Matrislər üzərində xətti əməllər dedikdə matrislərin toplanması və matrisin ədədə vurulması əməlləri başa düşülür.

Matrislərin toplanması əməli eyni ölçülü matrislər üçün təyin olunur.

Tutaq ki,

$$A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}.$$

Bu iki matrisin cəmi, elementləri $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $(i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n})$ düsturu ilə təyin olunan $C = c_{ij}$ matrisinə deyilir. $C = A + B$ kimi işarə olunur.

Matrislərin toplanması əməli yerdəyişmə və qruplaşdırma xassələrinə malikdir:

1. $A + B = B + A$,
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$

Əgər B , $m \times n$ ölçülü sıfır matris olarsa, onda $A + B = A$.

Tutaq ki, A matrisi verilmişdir. Bu matrisin λ ədədinə hasili elementləri $b_{ij} = \lambda a_{ij}$, $(i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n})$ -yə bərabər olan $B = (b_{ij})$ matrisinə deyilir və $B = \lambda A$ kimi işarə olunur.

Matrisin ədədə vurma əməli aşağıdakı xassələrə malikdir:

1. $\lambda \cdot (A + B) = \lambda A + \lambda B$
2. $(\lambda + \beta) A = A(\lambda + \beta) = \lambda A + \beta A$

3. $(\alpha \beta)A = \alpha(\beta A)$

Matrislər üzərində təyin olunmuş əməllərdən biri də matrislərin vurulması əməlidir. Qeyd edək ki, bu əməl ixtiyari iki matris üçün təyin edilmir.

Tutaq ki, A $m \times n$ ölçülü, B isə $n \times p$ ölçülü matrisdir. Bu halda A matrisinin B matrisinə hasilini təyin etmək olar.

A matrisinin B matrisinə hasil elementləri

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}, \quad i = \overline{1, m}, k = \overline{1, p}$$

bərabərliklərə təyin olunan $C = (c_{ik})$ matrisinə deyilir və $C = A \cdot B$, kimi yazılır. Matrislərin vurulması əməli aşağıdakı xassələrə malikdir.

1. $A(BC) = (AB)C$
2. $A(B + C) = AB + AC$
3. $(A + B)C = AC + BC$

Matrislərin vurulması əməli yerdəyişmə xassəsinə malik deyil:

$$AB \neq BA$$

Bu onunla izah olunur ki, $m \neq p$ olduqda B matrisini A -ya vurmaq mümkün deyil. Hətta $m = p$ olduqda belə $A \cdot B$ matrisi $m \times m$, $B \cdot A$ matrisi isə $n \times n$ ölçülü matris olur. Ona görə də, $m \neq n$ olduqda AB və BA müxtəlif ölçülü matrislər olduğundan onların bərabərliyindən danışmaq olmaz. Qeyd edək ki, iki matris o zaman bərabər matrislər adlanır ki, onların tərtibləri eyni olmaqla, uyğun elementləri bərabər olsun. Əgər A və B -nin hər biri n tərtibli matris olarsa, hətta bu halda da $AB = BA$ olduğunu hər zaman demək olmaz.

Məsələn, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ götürsək,

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Göründüyü kimi $AB \neq BA$.

Bütün diaqonal elementləri vahidə bərabər olan matrisə vahid matris deyilir:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Qeyd edək ki, B diaqonal matris olduqda, yəni

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

olduqda, $b_{11} = b_{22} = \dots = b_{nn} = b$ olarsa, onda $AB = BA$ bərabərliyi ödənilir. Xüsusi halda $AE = EA = A$.

Əgər B n tərtibli sıfır matris olarsa, onda

$$A \cdot 0 = 0 \cdot A = 0$$

olar. Matrislərin vurulması üçün $A(BC) = (AB)C$ qruplaşdırma xassəsi də doğrudur.

n -TƏRTİBLİ DETERMİNANT

Tutaq ki, n tərtibli

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

matrisi verilmişdir.

$n = 1$ olduqda $A = (a_{11})$ matrisinin determinantı a_{11} ədədinə deyilir.

$n = 2$ olduqda

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

iki tərtibli matrisin determinantı, analitik həndəsədən məlum olduğu kimi, $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ ədədinə deyilir. A matrisinin determinantını $\det A$, Δ və ya

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ kimi işarə edəcəyik. Beləliklə,

$$\det A = \Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Üç tərtibli matrisin determinantını da biz analitik həndəsədə təyin etmişdik. Göründüyü kimi baxılan halların hər birində verilmiş matrisə onun ədədi xarakteristikası olan və determinantı adlanan müəyyən bir ədədi qarşı qoyuruq.

Tutaq ki, biz artıq $n-1$ tərtibli determinantı təyin etmişik. n tərtibli A matrisinin determinantı aşağıdakı qaydada təyin olunan ədədə deyəcəyik:

$$\Delta = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \bar{M}_j^1 \quad (1)$$

burada $\bar{M}_j^1$ A matrisinin 1-ci sətirini və j nömrəli sütununu atdıqdan sonra qalan elementlərdən düzəldilmiş $n-1$ tərtibli determinantdır. Göründüyü kimi biz n tərtibli determinantı $n-1$ tərtibli determinantın köməyi ilə təyin etdik. Əvvəlki mühakimələrdən aydındır ki, ikitərtibli determinanta görə üçtərtibli, üçtərtibliyə görə dördtərtibli və bu qaydaya ilə $n-1$ tərtibli determinantlara görə (1) düsturundan istifadə etməklə n tərtibli determinantı təyin edə bilərik. Qeyd edək ki, A iki tərtibli matris olduqda (1) düsturu ilə təyin olunan

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}\overline{M}_1^1 - a_{12}\overline{M}_2^1 = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

ədədi 2 tərtibli determinanta əvvəl verdiyimiz təriflə ilə üst-üstə düşür. A matrisinin ixtiyari a_{ij} elementini götürək. Bu elementin yerləşdiyi sətir və sütun elementlərini atdıqdan sonra qalan elementlərdən düzəldilmiş $n-1$ tərtibli determinantı $\overline{M}_j^i$ ilə işarə edək. Bu determinanta a_{ij} elementinin tamamlayıcı minoru və ya sadəcə olaraq minor, $(-1)^{i+j}\overline{M}_j^i$ ədədinə isə a_{ij} elementinin cəbri tamamlayıcı deyilir. Dediklərimizi nəzərə alsaq n tərtibli determinanta aşağıdakı tərifini verə bilərik.

Tərif 1. n tərtibli A matrisinin determinantı bu matrisin birinci sətir elementlərinin öz cəbri tamamlayıcılarının hasilləri cəminə bərabərdir.

İsbat etmək olar ki, n tərtibli determinantın istənilən $i > 2$ nömrəli sətir elementləri üçün aşağıdakı bərabərlik doğrudur:

$$\Delta = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \overline{M}_j^i \quad (2)$$

(2) düsturu n tərtibli determinantın i nömrəli sətir elementlərinə görə ayrılışı adlanır. (2) düsturuna analogi olaraq aşağıdakı düsturu da isbat etmək olar:

$$\Delta = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \overline{M}_j^i \quad (3)$$

(3) düsturu n tərtibli determinantın ixtiyari j nömrəli sütun elementlərinə görə ayrılışı adlanır. Dediklərimizdən aydındır ki, n tərtibli determinantın sətirləri və sütunları eyni hüquqludur.

3. DETERMINANTIN BİLAVASİTƏ ELEMENTLƏRİLƏ İFADƏSİ

Yuxarıda biz n tərtibli determinantı tərifini verdik və onun ixtiyari sətir və sütuna görə ayrılışının bu tərifə ekvivalent olduğunu qeyd etdik. İndi isə determinantın bilavasitə elementləri ilə ifadəsini yazaq.

Bunun üçün əvvəlcə bəzi köməkçi anlayışlarla tanış olaq. Tutaq ki, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ -lərdən hər biri $1, 2, \dots, n$ ədədlərindən birinə bərabər olan qiymət alır və onlar içərisində təkrar olunanı yoxdur. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ bu halda, $1, 2, \dots, n$ ədədlərindən düzəldilmiş yerdəyişmə adlanır. Tutaq ki, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ hər hansı yerdəyişmədir. Bu ədədlərdən $\alpha_i \alpha_j$ şəkilli cütləri düzəldək. Əgər $\alpha_i \alpha_j$ cütündə $i < j$ olduqda $\alpha_i > \alpha_j$ olarsa, onda belə cütə nizamsız cüt deyilir. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ədədlərindən düzəldilmiş bütün nizamsız cütlərin sayını $N(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ilə işarə edək.

Teorem 1. Tutaq ki, n tərtibli

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

determinant verilmişdir. Onda bu determinant üçün aşağıdakı bərabərlik doğrudur:

$$\det A = \Delta = \sum_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} (-1)^{N(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)} a_{\alpha_1 1} a_{\alpha_2 2} \dots a_{\alpha_n n}, \quad (1)$$

burada cəmləmə bütün mümkün olan $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ yerdəyişmələri üzrə aparılır. Qeyd edək ki, onların sayı $n!$ -a bərabərdir.

İsbatı. (1) düsturunu riyazi induksiya üsulu ilə isbat edək.

Tutaq ki, $n = 2$. Bu halda aydındır ki, iki yerdəyişməni düzəltmək olar: 1,2 və 2,1. Onda $N(1,2) = 0$, $N(2,1) = 1$ və (1) düsturuna görə $\Delta = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

Aydındır ki, bu 2-tərtibli determinantın tərfi ilə üst-üstə düşür.

Tutaq ki, $n > 2$. Fərz edək ki, biz artıq $n - 1$ tərtibli determinantlar üçün (1) düsturunun doğru olduğunu bilirik. n tərtibli determinantlar üçün də bu düsturun doğru olduğunu göstərək. Bunun üçün n tərtibli determinantın birinci sütununa görə ayrılışını yazaq:

$$\Delta = \sum_{\alpha_1=1}^n (-1)^{1+\alpha_1} a_{\alpha_1 1} \bar{M}_{\alpha_1}^1 \quad (2)$$

(2) bərabərliyindəki $\bar{M}_{\alpha_1}^1$ determinantlarının hər biri $n - 1$ tərtibli olduğundan onlar üçün (1) düsturunu yaza bilərik:

$$\bar{M}_{\alpha_1}^1 = \sum_{\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n} (-1)^{N(\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n)} a_{\alpha_2 2} a_{\alpha_3 3} \dots a_{\alpha_n n} \quad (3)$$

(3) bərabərliyini (2) də nəzərə alsaq, aşağıdakı bərabərliyi yaza bilərik

$$\Delta = \sum_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} (-1)^{1+\alpha_1+N(\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n)} a_{\alpha_1 1} a_{\alpha_2 2} \dots a_{\alpha_n n} \quad (4)$$

Qeyd edək ki, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ yerdəyişməsindən və $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ yerdəyişməsindən düzəltdiyimiz cütləri müqayisə etsək, görərik ki, birincidən düzəldilmiş cütlər ikincidən düzəldilmiş cütlərdən $\alpha_1\alpha_2, \alpha_1\alpha_3, \dots, \alpha_1\alpha_n$ cütləri qədər fərqlənir. Bu cütlər içərisində isə nizamsız cütlərin sayı $\alpha_1 - 1$ -ə bərabərdir. Bunu nəzərə alsaq aşağıdakı bərabərliyi yaza bilərik:

$$N(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = N(\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n) + \alpha_1 - 1 = 1 + \alpha_1 + N(\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n) - 2$$

Bu bərabərliyi nəzərə alsaq, (4) düsturunun (1) düsturu ilə üst-üstə düşdüyünü görərik. Bununla da n tərtibli determinantın bilavasitə elementləri ilə ifadəsini göstərən (1) düsturunu isbat etmiş olduq.

Tutaq ki, n tərtibli determinant verilmişdir. Fərz edək ki, k , n -dən kiçik olan ixtiyari natural ədəd, $i_1, i_2, \dots, i_k$ isə $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ bərabərsizliklərini ödəyən ixtiyari sətirlərdir. Bu determinantının $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$ bərabərsizliyini ödəyən $\forall k$ sayda sütunlarını götürək. $i_1, i_2, \dots, i_k$ sətirləri ilə $j_1, j_2, \dots, j_k$ sütunlarının kəsişməsində yerləşən elementlərdən düzəldilmiş

determinantı $M_{j_1, j_2, \dots, j_k}^{i_1, i_2, \dots, i_k}$ ilə, bu sətir və sütunları atdıqdan sonra qalan elementlərdən düzəldilmiş $n - k$ tərtibli determinantı isə $\overline{M}_{j_1, j_2, \dots, j_k}^{i_1, i_2, \dots, i_k}$ ilə işarə edək.

Teorem2(Laplas teoremi). n tərtibli determinant üçün aşağıdakı bərabərlik doğrudur:

$$\Delta = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_k} (-1)^{i_1+i_2+\dots+i_k+j_1+j_2+\dots+j_k} M_{j_1, j_2, \dots, j_k}^{i_1, i_2, \dots, i_k} \overline{M}_{j_1, j_2, \dots, j_k}^{i_1, i_2, \dots, i_k}, \quad (5)$$

burada cəmləmə $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$ bərabərsizliklərini ödəyən bütün $j_1, j_2, \dots, j_k$ indeksləri üzrə aparılır. Qeyd edək ki, Laplas teoremi yüksək tərtib determinantları aşağı tərtib determinantlara gətirməklə hesablamağa imkan verir.

n TƏRTİBLİ DETERMINANTIN XASSƏLƏRİ

Tutaq ki, n tərtibli determinant verilmişdir. Bu determinantın bütün sətirləri ilə onun uyğun sütunlarının yerini dəyişdirilməsi əməliyyatı determinantın “transponirə edilməsi” adlanır. Eyni əməliyyat matrislər üzərində də aparılır. A matrisini transponirə etdikdən sonra alınan matrisi A' və ya A^T kimi işarə edəcəyik. n tərtibli determinantı verdiyimiz tərif və onun ixtiyari sətir və sütuna görə yazdığımız ayrılışları aşağıdakı xassələrin doğru olduğunu göstərməyə imkan verir.

I. n tərtibli determinantı transponirə etdikdə onun qiyməti dəyişmir. Bu xassə onu göstərir ki, n tərtibli determinantın sətirləri üçün doğru olan hər bir xassə onun sütunları üçün də doğrudur. Ona görə də, biz determinantın bütün xassələrini onun sətirləri üçün qeyd edəcəyik.

II. Determinantın ixtiyari iki sətirinin yerini dəyişdikdə onun işarəsi əksinə dəyişmir.

İsbatı. Bu xassəni isbat etmək üçün Laplas teoremindən istifadə edəcəyik.

Fərz edək ki, n tərtibli determinantın ixtiyari iki i_1 və i_2 nömrəli sətirlərinin yerini dəyişmişik. n tərtibli determinantın bu iki sətirinə Laplas teoremini tətbiq etsək,

$$\det A = \sum_{j_1, j_2} (-1)^{i_1+i_2+j_1+j_2} M_{j_1, j_2}^{i_1, i_2} \overline{M}_{j_1, j_2}^{i_1, i_2} \quad (1)$$

Tutaq ki, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ determinantı verilmişdir. Asanlıqla görmək olar ki, bu determinantın 2 sətirinin yerini dəyişdikdə onun işarəsi əksinə dəyişir:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} = -(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}).$$

Bunu nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, i_1 və i_2 nömrəli sətirlərin yerini dəyişdikdə $M_{j_1, j_2}^{i_1, i_2} = -M_{j_1, j_2}^{i_2, i_1} \cdot \overline{M}_{j_1, j_2}^{i_1, i_2}$ determinantına gəldikdə isə i_1 və i_2 sətirləri silindiği üçün onların işarəsinin və qiymətinin bu sətirlərdən heç bir asılılığı

yoxdur. Bu isə o deməkdir ki, i_1 və i_2 nömrəli sətirlərin elementlərinin yerini dəyişdikdə determinantın işarəsi əksinə dəyişir.

Tutaq ki, determinantın sətirləri $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, ..., $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ elementlərindən ibarətdir. Əgər bu determinantın i nömrəli sətir elementləri üçün

$$a_{i1} = \lambda a_i + \mu b_i + \dots + \gamma c_i$$

bərabərliyi doğru olarsa, onda deyəcəyik ki, determinantın i nömrəli sətiri yuxarıda göstərdiyimiz sətirlərin xətti kombinasiyasıdır.

III. Əgər n tərtibli determinantının i nömrəli sətiri $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ və $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ sətirlərinin $a_{i1} = \lambda a_i + \mu b_i$, $(i = \overline{1, n})$ şəkilli xətti kombinasiyası olarsa, onda bu determinantın qiyməti

$$\det A = \lambda \Delta_1 + \mu \Delta_2$$

belə ki, Δ_1 və Δ_2 i nömrəli sətiri uyğun olaraq $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ və $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ olmaqla qalan bütün sətirləri $\det A$ -nın sətirləri ilə üst-üstə düşən n tərtibli determinantlardır.

Bu xassəni isbat etmək üçün n tərtibli determinantın i nömrəli sətirinə görə ayrılışını yazmaq kifayətdir.

n tərtibli determinantın qeyd etdiyimiz bu 3 xassəsindən istifadə edərək aşağıdakı xassələri də isbat etmək olar:

IV. Determinantın iki sətiri eyni olarsa, onun qiyməti sıfır bərabərdir.

İsbatı. Tutaq ki, i_1 və i_2 sətirləri eyni elementlərdən ibarətdir. Bu determinantın qiymətini Δ ilə işarə edək. Aydındır ki, i_1 və i_2 sətirlərinin yerini dəyişsək I xassəyə görə onun qiyməti $-\Delta$ -ya bərabər olar. Digər tərəfdən i_1 və i_2 sətirləri eyni olduğundan onun qiyməti dəyişməz. Beləliklə

$$\Delta = -\Delta, \quad 2\Delta = 0, \quad \Delta = 0.$$

V. Determinantın hər hansı sətiri yalnız sıfırlardan ibarət olarsa, onun qiyməti sıfır bərabər olar.

Bu xassəni isbat etmək üçün determinantın həmin sətirə ayrılışını yazmaq kifayətdir.

VI. Determinantı hər hansı λ ədədinə vurmaq, onun sətirlərindən hər hansı birinin bütün elementlərinin λ ədədinə vurulmasına ekvivalentdir.

Bu xassənin isbatı III xassədən $\mu = 0$ götürməklə alınır.

VII. Determinantın iki sətiri mütənasib olarsa, yəni bu iki sətirin uyğun elementlərinin nisbəti eyni olarsa, onda determinantın qiyməti sıfır bərabərdir.

Doğrudan da, əgər $\frac{a_i}{b_i} = \lambda$ olarsa, onda $a_i = \lambda b_i$ yazıb əvvəlcə VI, sonra isə IV

xassəni tətbiq etmək kifayətdir.

VIII. Determinantın hər hansı sətirinin bütün elementlərini eyni bir ədədə vurub, onun başqa bir sətirinin uyğun elementləri üzərinə əlavə etsək, determinantın qiyməti dəyişməz.

Bu xassənin də isbatı III xassədən alınır.

IX. Determinantın hər hansı sətir elementlərinin öz cəbri tamamlayıcılarına hasilləri cəmi determinantın qiymətinə, başqa bir sətirin uyğun elementlərinin cəbri tamamlayıcılarına hasilləri cəmi isə sıfıra bərabərdir.

Bu xassəni isbat etmək üçün n tərtibli determinantın götürdüyümüz sətirə görə ayrılışını yazmaq kifayətdir.

Tutaq ki, A və B n tərtibli matrislərdir. Bu matrislərin hasili və cəminin determinantı üçün aşağıdakı xassələri isbat etmək olar:

$$1. \det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

2. A və B matrislərinin cəminin determinantı, sətirlərinin bir hissəsi A -nın sətirlərindən, qalanları isə B -nin sətirlərindən ibarət olmaqla düzəldilməsi mümkün olan bütün n tərtibli determinantların cəminə bərabərdir.

4. Tərs matris və onun tapılması

Tutaq ki, A n tərtibli matrisdir:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Tərif 1. Əgər n tərtibli elə B matrisi varsa ki, $A \cdot B = E$ (E - n tərtibli vahid matrisdir) bərabərliyi ödənilsin, onda B matrisinə A matrisinin sağ tərsi deyilir.

Tərif 2. Əgər n tərtibli elə C matrisi varsa ki, $CA = E$ bərabərliyi ödənilsin, onda C matrisinə A matrisinin sol tərsi deyilir.

Tutaq ki, A matrisinin həm sağ, həm də sol tərsi var. Onda

$$C = C E = C (A B) = (C A) B = E B = B$$

Beləliklə matrisin həm sağ, həm də sol tərs varsa, onlar biri-birinə bərabərdir. Bu halda deyəcəyik ki, A matrisinin tərsi var və onu A^{-1} kimi işarə edəcəyik.

Teorem. n tərtibli A matrisinin tərsinin olması üçün zəruri və kafi şərt $\det A \neq 0$ olmasıdır.

İsbatı. Zərurilik Tutaq ki, A matrisinin tərsi var. Bu o deməkdir ki,

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E.$$

Matrislər hasilinin determinantının məlum xassəsinə görə

$$\det(A^{-1} \cdot A) = \det A^{-1} \cdot \det A.$$

Digər tərəfdən $\det(A^{-1} \cdot A) = \det E = 1$ olduğu üçün, $\det A \neq 0$ olur.

Kafilik. Tutaq ki, $\det A \neq 0$. A^{-1} ilə aşağıdakı matrisi işarə edək

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{A_{11}}{\det A} & \frac{A_{12}}{\det A} & \dots & \frac{A_{1n}}{\det A} \\ \frac{A_{21}}{\det A} & \frac{A_{22}}{\det A} & \dots & \frac{A_{2n}}{\det A} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{A_{n1}}{\det A} & \frac{A_{n2}}{\det A} & \dots & \frac{A_{nn}}{\det A} \end{pmatrix},$$

burada A_{ij} A matrisindəki a_{ij} elementinin cəbri tamamlayıcısıdır.

Matrislərin vurulma qaydasından və determinantların cəbri IX xassəsindən istifadə etsək, asanlıqla göstərmək olar ki,

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E.$$

Sonuncu bərabərliklər göstərir ki, A^{-1} matrisi A matrisinin tərsidir. Beləliklə biz $\det A \neq 0$ olduqda, həm A matrisinin tərsinin varlığını, həm də onun tapılma qaydasını göstərmiş olduq.

Qeyd edək ki, A matrisinin tərsinin tapılması üçün ikinci bir üsul, elementar çevirmələr üsuludur.

Matrisin sətirləri (sütunları) üzərində aparılan aşağıdakı çevirmələr elementar çevirmələr adlanır:

1. İsanılan iki sətirin (sütunun) yerinin dəyişdirilməsi.
2. Hər hansı sətirin (sütunun) bütün elementlərini sıfırdan fərqli ədədə vurmaq.
3. Hər hansı sətir (sütun) elementlərini eyni bir ədədə vurub, başqa bir sətirin (sütunun) uyğun elementləri üzərinə əlavə etmək.

Qeyd edək ki, elementar çevirmələrin köməyiylə də matrisin tərsini tapmaq üçün elementar çevirmələrin (yalnız sətirlər və ya yalnız sütunlar üzərində aparmaqla) köməyiylə verilmiş matrisi vahid matrisə gətirmək və eyni çevirmələri vahid matris üzərində aparmaq lazımdır. Sonda alınan matris verilmiş matrisin tərsi olur.

BAZİS MİNOR HAQQINDA TEOREM

Tutaq ki,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$m \times n$ ölçülü matrisdir. Əgər A matrisinin bütün elementləri sıfıra bərabər deyilsə, onda aşağıdakı iki xassəyə malik olan r natural ədədi var:

- 1) A matrisinin r tərtibli minorlarından heç olmazsa biri sıfırdan fərqlidir
- 2) $r + 1$ tərtibli bütün minorlar sıfıra bərabərdir.

Bu şərti ödəyən r ədədinə A matrisinin rəngi deyilir və $r = \text{rang } A$ kimi işarə edilir. Sıfırdan fərqli həmin minor isə bazis minor adlanır. Aydındır ki, eyni bir matrisdə birdən çox sayda bazis minor ola bilər. Bazis minor haqqında teoremə keçməzdən əvvəl determinantın (matrisin) sətirlərin xətti asılılığı haqqında aşağıdakıları qeyd edək.

Tutaq ki, $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$

$B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$

.....

$C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$

sətirləri verilmişdir. Bunların hər birinə $1 \times n$ tərtibli matris kimi baxmaq olar. Matrislərin toplanması və ədədə vurulması qaydasından istifadə edərək aşağıdakı $1 \times n$ tərtibli matrisi düzəldək

$$\lambda A + \mu B + \dots + \gamma C$$

Bu sətirə $A, B, \dots, C$ sətirlərinin xətti kombinasiyası deyilir.

Tutaq ki,

$$\lambda A + \mu B + \dots + \gamma C = 0 \quad (1)$$

Əgər (1) bərabərliyi $\lambda, \mu, \dots, \gamma$ ədədlərindən heç olmazsa birinin sıfırdan fərqli qiymətində ödənilərsə, onda $A, B, \dots, C$ sətirləri xətti asılı adlanır.

Əgər (1) bərabərliyi $\lambda = 0, \mu = 0, \dots, \gamma = 0$ ödənərsə, onda $A, B, \dots, C$ sətirləri xətti asılı olmayan adlanır. Analitik həndəsədə vektorlar üçün isbat etdiyimiz teoremə analogi olaraq aşağıdakı teoremi isbat etmək olar.

Teorem. $A, B, \dots, C$ sətirlərinin xətti asılı olması üçün zəruri və kafi şərt onlardan birinin qalanlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərilə bilməsidir.

Teorem (Bazis minor haqqında). Bazis minor sətirləri (sütunları) xətti asılı deyil və matrisin ixtiyari sətirini (sütunu) bazis minor sətirlərinin (sütunlarının) xətti kombinasiyası şəklində göstərmək olar.

İsbatı. Teoremi sətirlər üçün isbat edək. Tutaq ki, bazis minor sətirləri xətti asılıdır. Onda bu sətirlərdən birini qalanlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərmək olar. Biz həmin sətirdən bu xətti kombinasiyasını çıxsaq (determinantın xassəsinə görə) yalnız sıfırlardan ibarət olan sətir alarıq. Bildiyimiz kimi belə determinantın qiyməti sıfıra bərabər olar. Bu isə bazis minorun sıfırdan fərqli olması şərtinə ziddir. Ona görə də, deyə bilərik ki, bazis minor sətirləri xətti asılı deyil. İndi isə göstərək ki, A matrisinin istənilən sətirini bazis minor sətirlərinin xətti kombinasiyası şəklində göstərmək olar.

Ümumiliyi pozmadan hesab edəcəyik ki, bazis minor A matrisində yuxarı sol küncdə yerləşir, əgər belə olmazsa, sətirlərin və sütunların yerini dəyişməklə buna nail ola bilərik. (bu prosesdə $\det A \neq 0$ xassəsi saxlanılır). Aşağıdakı $r + 1$ tərtibli minora baxaq:

$$\begin{array}{c} \text{bazis min.} \\ \left| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{array} \right| \begin{array}{c} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{rj} \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{l} 1 \leq j \leq n \\ 1 \leq k \leq m \end{array}$$

Aydındır ki, $j \leq r$ və ya $k \leq r$ olduqda, bu determinantın qiyməti sıfıra bərabərdir. Çünki bu halda ya determinantın iki sətiri, ya da iki sütunu üst-üstə düşür. Əgər $j > r$ və ya $k > r$ olarsa, bazis minorun tərtibi r -ə bərabər olduğu üçün determinantın qiyməti sıfıra bərabər olar. Beləliklə, $1 \leq j \leq n, 1 \leq k \leq m$ olduqda

baxılan determinantın qiyməti sıfıra bərabər olar. Bu determinantın axıncı sütuna görə ayrılışını yazsaq,

$$a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{rj}A_{rj} + a_{kj}A_{kj} = 0 \quad (2)$$

olar. Asanlıqla görmək olar ki, $A_{1j}, A_{2j}, \dots, A_{kj}$ əmsalları j -dən asılı deyil. Bu əmsalları uyğun olaraq $c_1, c_2, \dots, c_k$ sabitləri ilə işarə edək. Qeyd edək ki, $c_{r+1} = A_{kj}$ bazis minora bərabərdir. Bunu nəzərə alıb (2) bərabərliyin hər tərəfini c_{r+1} -ə bölsək aşağıdakı bərabərlikləri yaza bilərik:

$$a_{kj} = -\frac{c_1}{c_{r+1}}a_{1j} - \frac{c_2}{c_{r+1}}a_{2j} - \dots - \frac{c_r}{c_{r+1}}a_{rj}, \quad (j=1,2,\dots,n) \quad (3)$$

(3) bərabərliklərindən görünür ki, A matrisinin k nömrəli sətiri bazis minor sətirlərinin xətti kombinasiyasıdır.

Teorem. n tərtibli determinantın sıfıra bərabər olması üçün zəruri və kafi şərt onun sətirlərinin (sütunlarının) xətti asılı olmasıdır.

İsbat. Zərurilik. Tutaq ki, $\det A = 0$. Bu, o deməkdir ki, A matrisinin bazis minorunun tərtibi n -dən kiçikdir və onun sətirlərindən heç olmazsa biri bazis minora daxil deyil. Bazis minor haqqında teoremə görə, bu sətiri bazis minor sətirlərinin xətti kombinasiyası şəklində göstərmək olar. Əgər bu xətti kombinasiyaya qalan sətirləri sıfır əmsalı ilə əlavə etsək, onda götürdüyümüz sətir A matrisinin qalan bütün sətirlərinin xətti kombinasiyası olar. Bu isə o deməkdir ki, A matrisinin sətirləri xətti asılıdır.

Kafilik. Tutaq ki, A matrisinin sətirləri xətti asılıdır. Onda sətirlərdən heç olmazsa biri qalanlarının xətti kombinasiyasıdır. Bu sətirdən həmin xətti kombinasiyanı çıxsaq, o yalnız sıfırlardan ibarət olar. Determinantın xassəsinə görə belə determinantın qiyməti sıfıra bərabərdir. Teorem isbat edildi.

Biz bazis minor haqqında teoremi, eləcə də sonuncu teoremi n tərtibli determinantın sətirləri üçün isbat etdik. Determinantın sətirləri və sütunları eyni xassələrə malik olduğuna görə həmin teoremlər determinantın sütunları üçün də doğrudur.

5. XƏTTİ FƏZA

Müxtəlif təbiətli $x, y, \dots$ elementlərindən təşkil olunmuş X çoxluğu aşağıdakı şərtləri ödədikdə həqiqi xətti fəza adlanır:

I. X çoxluğunun $\forall x, y$ elementinə onların cəmi adlanan və $x + y$ kimi işarə olunan üçüncü bir $z \in X$ elementini qarşı qoymaq qaydası verilsin,

II. X çoxluğunun $\forall x$ elementi və $\forall \lambda$ həqiqi ədədinə, λ ədədinin x elementinə hasili adlanan və $\lambda \cdot x$ kimi işarə olunan ikinci bir $y \in X$ elementini qarşı qoymaq qaydası verilsin.

III. Bu iki qayda aşağıdakı xassələrə məlik olsun:

- 1) $x + y = y + x$ (yerdəyişmə)
- 2) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (qruplaşdırma)
- 3) $\exists 0 \in X, \forall x \in X, x + 0 = x$ (0-sıfır elementi adlanır)
- 4) $\forall x \in X, \exists x' \in X, x + x' = 0$ (x' , x -in əksi adlanır)

$$5) 1 \cdot x = x \quad \forall x \in X$$

$$6) \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$$

$$7) \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$$

$$8) (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$$

Göstərmək olar ki, həqiqi ədədlər çoxluğu ədədlərin toplanması və vurulması, fəzada sərbəst vektorlar çoxluğu vektorların toplanması və həqiqi ədədə vurulması, eləcə də parçada kəsilməz funksiyalar çoxluğu funksiyaların toplanması və ədədə vurulması əməllərinə görə xətti fəza əmələ gətirir. Eyni bir çoxluq bəzi əməllərə görə xətti fəza əmələ gətirdiyi halda, bu çoxluqda təyin olunmuş başqa bir əməllərə görə xətti fəza əmələ gətirməyə də bilər. Bu müxtəlif səbəblərdən, məsələn, cəm və ədədə vurma əməllərinin nəticəsinin həmin çoxluğa daxil olmaması və ya yuxarıda qeyd etdiyimiz səkkiz xassədən bəzilərinin ödənilməməsi səbəbindən ola bilər.

Müstəvi üzərində düzbucaqlı Dekart koordinat sistemi götürək və X ilə bu müstəvi üzərində yerləşən vektorlar çoxluğunu işarə edək. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi X çoxluğu vektorların toplanması və həqiqi ədədə vurulması əməllərinə görə xətti fəza əmələ gətirir. Lakin X ilə müstəvidə koordinat başlanğıcından keçən hər hansı düz xətt üzərində yerləşən bütün vektorları atdıqdan sonra qalan vektorlar çoxluğunu işarə etsək, o xətti fəza olmaz. Çünki, X çoxluğuna daxil olan ixtiyari iki vektorun cəmi həmişə bu çoxluğa daxil deyil. Əgər müsbət ədədlər çoxluğunda (R_+) cəm və ədədə vurma əməllərini adi qaydada təyin etmək istəsək, aydındır ki, mənfi ədədə vurma əməlinin nəticəsi bu çoxluğa daxil deyil. Ona görə də, R_+ bu əməllərə görə xətti fəza əmələ gətirmir. Lakin müsbət ədədlər çoxluğunda x və y ədədlərinin cəmi əməlini onların adi mənada hasilini kimi, λ ədədinin x müsbət ədədinə hasilini isə x^λ kimi təyin etsək, hər iki əməlin nəticəsi müsbət ədədlər çoxluğuna daxil olar. Göstərmək olar ki, müsbət ədədlər çoxluğu bu iki əmələ görə xətti fəza əmələ gətirir.

İsbatsız olaraq aşağıdakı teoremləri verək:

Teorem 1. Xətti fəzada sıfır element və hər bir elementin əksi yeganədir.

Teorem 2. Xətti fəzanın sıfır elementi (θ) bu fəzanın $\forall x$ elementinin sıfır ədədinə hasilinə, hər bir x elementinin əksi (x') isə bu elementin "–1" ədədinə hasilinə bərabərdir. Başqa sözlə

$$\theta = 0x, \quad \forall x \in X$$

$$x' = (-1)x, \quad \forall x \in X$$

Tutaq ki, X həqiqi xətti fəzadır. Bu fəzaya daxil olan $\forall x, y, \dots, z \in X$ ədədlərini götürək. Bu elementləri $\forall \alpha, \beta, \dots, \gamma \in R$ həqiqi ədədlərinə vurub topladıqdan sonra alınan $\alpha x + \beta y + \dots + \gamma z$ elementinə $x, y, \dots, z \in X$ elementlərinin xətti kombinasiyası deyilir.

Aşağıdakı bərabərliyə baxaq

$$\alpha x + \beta y + \dots + \gamma z = 0$$

Əgər (1) bərabərliyi $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ ədədlərinin yalnız sıfır bərabər qiymətində ödənilərsə, onda $x, y, \dots, z$ elementləri xətti asılı olmayan adlanır.

Əgər (1) bərabərliyi $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ ədədlərinin heç olmazsa birinin sıfırdan fərqli qiymətində ödənilərsə, onda $x, y, \dots, z$ xətti asılı adlanır.

Teorem 3. $x, y, \dots, z$ elementlərinin xətti asılı olması üçün zəruri və kafi şərt onlardan birinin qalanlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərilə bilməsidir.

İsbatı.Zərurilik. Tutaq ki, $x, y, \dots, z$ elementləri xətti asılıdır. Onda (1) bərabərliyindəki $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ əmsallarından heç olmazsa biri sıfırdan fərqlidir. Ümumiliyi pozmadan hesab edək ki, $\alpha \neq 0$. Onda (1)-i aşağıdakı şəkildə yazı bilərik:

$$x = -\frac{\beta}{\alpha}y - \dots - \frac{\gamma}{\alpha}z \quad (2)$$

Buradan görünür ki, x elementi $y, \dots, z$ elementlərinin xətti kombinasiyasıdır.

Kafilik. Tutaq ki, $x, y, \dots, z$ elementlərindən biri qalanlarının xətti kombinasiyasıdır. Yəni,

$$x = \lambda y + \dots + \mu z$$

Bu bərabərliyi aşağıdakı şəkildə yazıq:

$$(-1)x + \lambda y + \dots + \mu z = 0$$

$(-1), \lambda, \dots, \mu$ ədədlərindən heç olmazsa biri sıfırdan fərqli olduğu üçün $x, y, \dots, z$ vektorları xətti asılıdır.

Asanlıqla göstərmək olar ki, "0" elementin daxil olduğu ixtiyari vektorlar sistemi xətti asılıdır. Eləcə də əgər vektorlar sisteminin müəyyən hissəsi xətti asılıdırsa, onda bu sistem bütünlükdə xətti asılıdır.

Xətti fəzaya aid gələcəkdə bizim çox istifadə edəcəyimiz daha bir misal göstərək:

$R_n(R^n)$ ilə nizam ilə götürülmüş n sayda həqiqi ədədlə təyin olunan $x = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ($\alpha_i \in R$) şəkilli elementlər çoxluğunu işarə edək. Bu çoxluqdacəm və həqiqi ədədə vurma əməllərini aşağıdakı qaydada təyin edək:

$$\begin{aligned} y &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \\ x + y &= (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n) \\ \lambda x &= (\lambda \alpha_1, \lambda \alpha_2, \dots, \lambda \alpha_n) \end{aligned}$$

Yoxlamaq olar ki, R_n çoxluğu bu qaydada təyin olunmuş cəm və ədədə vurma əməllərinə nəzərən xətti fəza əmələ gətirir. Başqa sözlə bu əməllər xətti fəzanın tərifindəki bütün xassələri ödəyir. Aydındır ki, əgər müstəvi üzərində düzbucaqlı Dekart koordinat sistemi götürüb hər bir x vektorunun $\bar{i}, \bar{j}$ bazisində koordinatlarını α_1 və α_2 ilə işarə etsək, yəni $x = (\alpha_1, \alpha_2)$ yazsaq, onda R_2 fəzasını almış olarıq.

Qeyd edək ki, xətti fəzanın tərifində təyin etdiyimiz həqiqi ədədə vurma əməli kompleks ədədə vurma əməli ilə əvəz edilərsə, bu halda alınan xətti fəza kompleks xətti fəza adlanır

XƏTTİ FƏZADA BAZİS VƏ XƏTTİ FƏZANIN ÖLÇÜSÜ

X həqiqi xətti fəzasına daxil olan $\forall x, y, \dots, z \in X$ elementlərini götürək və onları hər hansı $\lambda, \mu, \dots, \gamma$ ədədlərinə vurub topladıqdan sonra alınan

$$\lambda x + \mu y + \dots + \gamma z \in X$$

elementinə (vektoruna) $x, y, \dots, z$ elementlərinin xətti kombinasiyası deyilir.

Tutaq ki,

$$\lambda x + \mu y + \dots + \gamma z = 0 \quad (1)$$

Əgər (1) bərabərliyi $\lambda, \mu, \dots, \gamma$ ədədlərindən heç olmazsa birinin sıfırdan fərqli qiymətində ödənilərsə, onda $x, y, \dots, z$ vektorları xətti asılı adlanır.

Əgər (1) bərabərliyi yalnız $\lambda = \mu = \dots = \gamma = 0$ olduqda ödənilərsə, onda $x, y, \dots, z$ vektorları xətti asılı olmayan adlanır.

Tutaq ki, $e_1, e_2, \dots, e_n \in X$ vektorları verilmişdir.

Əgər bu vektorlar xətti asılı deyilsə və fəzanın istənilən x vektorunu onların xətti kombinasiyası şəklində göstərmək mümkündürsə,

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

onda $e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorları X fəzasında bazis adlanır. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ədədlərinə isə x vektorunun bu bazisdə koordinatları deyilir.

Göstərmək olar ki, hər bir vektorun verilmiş bazisdə koordinatları yeganə qaydada təyin olunur. Tutaq ki, x vektoru üçün ikinci bir ayrılışı da mümkündür:

$$x = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_n e_n$$

Bu iki ayrılışdan alırıq ki,

$$(\alpha_1 - \beta_1)e_1 + (\alpha_2 - \beta_2)e_2 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)e_n = 0$$

vektorları xətti asılı olmadığı üçün $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2, \dots, \alpha_n = \beta_n$ olmalıdır.

Məsələn, $X = R_n$ olarsa, onda

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$$

$$e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$$

.....

$$e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

vektorları bu fəzada bazis əmələ gətirir.

Əgər X xətti fəzasında n sayda xətti asılı olmayan vektor varsa, və $n+1$ sayda vektordan ibarət olan ixtiyari vektorlar sistemi xətti asılıdırsa, onda X n ölçülü xətti fəza adlanır.

Əgər X xətti fəzasının ölçüsü n -ə bərabərdirsə, bunu $\dim X = n$ kimi işarə edəcəyik. İndi isə xətti fəzada bazis vektorlarının sayı ilə xətti fəzanın ölçüsü arasındakı əlaqəni göstərək.

Teorem 1. n ölçülü xətti fəzada n sayda xətti asılı olmayan vektor bazis əmələ gətirir.

İsbatı. Tutaq ki, $\dim X = n$ və $e_1, e_2, \dots, e_n$ X fəzasına daxil olan ixtiyari vektorlar sistemidir. $\forall x \in X$ götürək və $x, e_1, e_2, \dots, e_n$ sisteminə baxaq. Bu

vektorların sayı $n + 1$ -ə bərabər olduğundan onlar xətti asılıdır. Onda heç olmazsa biri sıfırdan fərqli elə $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ədədləri var ki,

$$\alpha x + \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = 0 \quad (2)$$

Əgər (2) bərabərliyində $\alpha = 0$ olarsa, onda $e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorları xətti asılı olmadığı üçün $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_n = 0$ olar. Bu isə həmin ədədlərdən heç olmazsa birinin sıfırdan fərqli olması şərtinə ziddir. Ona görə də $\alpha \neq 0$ olmalıdır. Bunu nəzərə alsaq,

$$x = -\frac{\alpha_1}{\alpha} e_1 - \frac{\alpha_2}{\alpha} e_2 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha} e_n$$

yaza bilərik. Bu isə $\forall x$ vektorunun $e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərilməsi deməkdir. Ona görə $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazis əmələ gətirir.

Teorem 2. Əgər X xətti fəzasında n sayda vektor bazis əmələ gətirirsə, onda bu fəzanın ölçüsü n -ə bərabərdir.

İsbatı. Aydınır ki, teoremi isbat etmək üçün $n + 1$ sayda vektorlardan ibarət ixtiyari sistemin xətti asılı olduğunu göstərmək kifayətdir. $\forall x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1} \in X$ vektorlarını götürək və onların hər birinin $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisinə görə ayrılışını yazaq:

$$\begin{aligned} x_1 &= a_{11}e_1 + a_{12}e_2 + \dots + a_{1n}e_n, \\ x_2 &= a_{21}e_1 + a_{22}e_2 + \dots + a_{2n}e_n, \\ &\dots\dots\dots \\ x_n &= a_{n+11}e_1 + a_{n+12}e_2 + \dots + a_{n+1n}e_n. \end{aligned}$$

Bu ayrılışların əmsallarından aşağıdakı matrisi düzəldək:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n+11} & a_{n+12} & \dots & a_{n+1n} \end{pmatrix}$$

Bu matris $(n + 1) \times n$ ölçülü olduğuna görə onun ranqı n -dən böyük ola bilməz. Bu o deməkdir ki, bazis minor sətirlərinin sayı n -dən böyük deyil. Deməli sətirlərdən heç olmazsa biri bazis minora daxil deyil. Ona görə də, həmin sətiri qalan sətirlərin xətti kombinasiyası şəklində göstərmək olar. Başqa sözlə, $x_1, x_2, \dots, x_n$ vektorlarından birini qalanlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərmək olar. Bu isə həmin vektorların xətti asılı olması deməkdir. Teorem isbat olundu.

Qeyd edək ki, eyni bir bazisdə verilmiş 2 vektoru topladıqda onların uyğun koordinatları toplanır, vektoru ədədə vurduqda isə onun bütün koordinatları ədədə vurulur:

$e_1, e_2, \dots, e_n$ X fəzasında bazisdirsə, onda

$$\begin{aligned} \forall x, y \in X \text{ üçün } x &= \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n, \quad y = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_n e_n. \text{ Onda} \\ x + y &= (\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n) + (\beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_n e_n) = \\ &= (\alpha_1 + \beta_1) e_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) e_n, \end{aligned}$$

$$\lambda x = \lambda(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n) = (\lambda \alpha_1) e_1 + \dots + (\lambda \alpha_n) e_n.$$

Biz yuxarıda n ölçülü xətti fəzaya misal göstərdik. n ölçülü fəza dedikdə n sayda xətti asılı olmayan vektoru olan və $n+1$ sayda vektordan ibarət istənilən sistemin xətti asılı olduğu xətti fəza başa düşülür.

Əgər xətti fəzada $\forall n$ sayda xətti asılı olmayan vektor varsa, belə fəzaya sonsuz ölçülü xətti fəza deyilir.

Məsələn, $C[a,b]$ fəzası sonsuz ölçülü xətti fəzadır. Çünki bu fəzada $1, t, t^2, \dots, t^4, \dots$ funksiyaları xətti asılı olmayan sistem əmələ gətirir.

6. XƏTTİ FƏZALARIN İZOMORFLUĞU

Tutaq ki, X və X' həqiqi xətti fəzaları verilib. Aşağıdakı şərtlər ödəndikdə bu iki fəza izomorf adlanır:

1. X və X' fəzalarının elementləri arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq olsun.
2. X fəzasının ixtiyari x və y elementlərinə X' fəzasının uyğun olaraq x' və y' elementləri qarşı qoyulmuşdursa, onda $x + y$ elementinə $x' + y'$ elementi və $\forall \lambda$ ədədi üçün λx elementinə $\lambda x'$ elementi qarşı qoyulsun.

Tərifiən aydındır ki, X fəzasının sıfır(0) elementinə X' fəzasının sıfır($0'$) elementi qarşı durur. Doğrudan da əgər $\forall x \in X$ elementinə $x' \in X'$ elementi qarşı qoyulmuşdursa, onda $0 \cdot x$ elementinə $0 \cdot x'$ elementi qarşı durur. $0 = 0 \cdot x$, $0' = 0 \cdot x'$ olduğundan, alırıq ki, X fəzasının sıfır elementinə X' fəzasının sıfır elementi qarşı durur.

Eləcə də, X fəzasından götürülmüş $\forall x, y, \dots, z$ elementlərinə uyğun olaraq X' fəzasının $x', y', \dots, z'$ elementləri qarşı qoyulmuşdursa, onda $\forall \alpha, \beta, \dots, \gamma$ həqiqi ədədləri üçün $\alpha x + \beta y + \dots + \gamma z$ elementinə $\alpha x' + \beta y' + \dots + \gamma z'$ elementi qarşı durur. Buradan xüsusi halda alırıq ki, $x, y, \dots, z$ elementləri xətti asılı deyilsə, onda onlara qarşı qoyulmuş $x', y', \dots, z'$ elementləri də xətti asılı deyil.

Teorem. Bütün n ölçülü həqiqi xətti fəzalar biri-birinə izomorfdur.

İsbatı. Tutaq ki, $\dim X = \dim X' = n$. X fəzasında $\forall e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisi, X' fəzasında $\forall e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ bazisi götürək. $\forall x \in X$ götürüb onun bazisə görə ayrılışını yazaq:

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

Bu x vektoruna X' fəzasında $x' = \alpha_1 e'_1 + \alpha_2 e'_2 + \dots + \alpha_n e'_n$ vektorunu qarşı qoyaq. Bazisə görə ayrılış yeganə olduğundan aydındır ki, bu qarşıqoyma qarşılıqlı birqiymətlidir. Asanlıqla yoxlamaq olar ki, əgər $y \in X$ vektoruna $y' \in X'$ vektoru qarşı qoyulmuşdursa, onda $x + y$ vektoruna $x' + y'$ vektoru, $\forall \lambda$ üçün, $\lambda x \in X$ vektoruna $\lambda x' \in X'$ vektoru qarşı durur. Buna görə də, X və X' fəzaları izomorfdur.

Qeyd edək ki, yuxarıda göstərilən bütün tərif və xassələr kompleks xətti fəzalar üçün də analogi qaydada ifadə oluna bilər.

XƏTTİ ALT FƏZALAR


Tutaq ki, X xətti fəza, L isə onun alt çoxluğudur. Aşağıdakı iki xassə ödəndikdə L çoxluğuna X xətti fəzasının xətti alt fəzası və ya sadəcə olaraq alt fəzası deyilir:

1. $\forall x, y \in L$ üçün $x + y \in L$,
2. $\forall \lambda$ ədədi üçün $\lambda x \in L$

Asanlıqla yoxlamaq olar ki, L çoxluğu X fəzasında təyin olunmuş cəm və ədədə vurma əməllərinə görə xətti fəza əmələ gətirir. L alt çoxluğunun xətti alt fəza adlandırılması da bununla izah olunur. Alt fəzaya ən sadə misal olaraq yalnız sıfır elementdən ibarət olan alt çoxluğu və X fəzasının özünü göstərmək olar. X xətti fəzasının, sonlu sayda, ixtiyari $x, y, \dots, z$ elementlərini götürək. Bu elementlərin bütün xətti kombinasiyaları çoxluğunu $L(x, y, \dots, z)$ ilə işarə edək. Qeyd edək ki, X həqiqi (kompleks) xətti fəza olduqda $L(x, y, \dots, z)$ həqiqi (kompleks) xətti kombinasiyalar çoxluğu kimi başa düşülür. Bu çoxluğa $x, y, \dots, z$ elementlərinin xətti örtüyü deyilir. Yoxlamaq olar ki, $L(x, y, \dots, z)$ X -in alt fəzasıdır. $L(x, y, \dots, z)$ alt fəza olduğundan onun ölçüsündən danışmaq olar. Əvvəlcə qeyd edək ki, $L(x, y, \dots, z)$ X fəzası ilə üst-üstə düşmürsə, onda onun ölçüsü X -in ölçüsündən kiçikdir. Çünki bu alt fəzada xətti asılı olmayan vektorlar X fəzasının da xətti asılı olmayan vektorlarıdır. Hətta X fəzasının bazis vektorları ümumiyyətlə $L(x, y, \dots, z)$ alt fəzasına daxil olmaya da bilər. Lakin L -də götürülmüş hər bir bazisi X fəzasında bazisə qədər tamamlamaq olar.

Tutaq ki, $\dim X = n$, $\dim L = k$ $k < n$. $\bar{L}$ -də $\forall e_1, e_2, \dots, e_k$ bazisi götürək. $k < n$ olduğundan onda X -ə daxil olan elə $e_{k+1} \in X$ var ki, $e_{k+1} \notin L$. Ona görə də, $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}$ vektorları xətti asılı deyil. Əgər $k+1 < n$ olarsa, onda $\exists e_{k+2} \in X$ var ki, o $L(e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1})$ xətti örtüyünə daxil deyil. Bunu da həmin sistemə daxil etsək, $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, e_{k+2}$ vektorunu alarıq. Prosesi bu qaydada davam etdirsək, sonlu sayda addımdan sonra X fəzasında n vektordan ibarət bazis almış olarıq.

Göstərək ki, $L(x, y, \dots, z)$ xətti örtüyünün ölçüsü $x, y, \dots, z$ vektorları içərisində xətti asılı olmayanların maksimal sayına bərabərdir. Tutaq ki, bu vektorlar içərisində xətti asılı olmayanların maksimal sayı k -ya bərabərdir. Həmin vektorları $x_1, x_2, \dots, x_k$ ilə işarə edək. Aydındır ki, $x, y, \dots, z$ vektorlarından hər biri bu vektorların xətti kombinasiyası şəklində göstərilə bilər. $L(x, y, \dots, z)$ xətti örtüyünə daxil olan hər bir vektor $x, y, \dots, z$ vektorlarının xətti kombinasiyası olduğundan, xətti örtüyün hər bir vektorunun da $x_1, x_2, \dots, x_k$ vektorlarının xətti



kombinasiyası olduğunu deyə bilərik. Bu isə o deməkdir ki, $x_1, x_2, \dots, x_k$ vektorları $L(x, y, \dots, z)$ -də bazis əmələ gətirir. Onda məlum teoremə görə xətti örtüyün ölçüsü k -ya bərabər olar. Xətti örtüyün ölçüsü haqqında bu dediklərimizi nəzərə alaraq matrisin rənginə aşağıdakı tərfi də vermək olar:

Tərif. $m \times n$ ölçülü ixtiyari A matrisinin rəngi bu matrisin xətti asılı olmayan sətirlərinin maksimal sayına bərabərdir.

Doğrudan da matrisin hər bir sətirinə R_n fəzasının bir elementi kimi baxsaq, bu elementlərin xətti örtüyünün ölçüsü onlar içərisində xətti asılı olmayanların maksimal sayına bərabər olar. Digər tərəfdən bazis minor haqqında teoremə görə bazis minor sətirləri xətti asılı olmadığından və ixtiyari sətiri bazis minor sətirlərinin xətti kombinasiyası şəklində göstərmək mümkün olduğundan A matrisinin sətirlərinin xətti örtüyü bazis minor sətirlərinin xətti örtüyü ilə üst-üstə düşər. Bazis minor sətirlərinin sayı matrisin rənginə bərabər olduğundan deyə bilərik ki, A matrisinin rəngi da onun xətti asılı olmayan sətirlərinin maksimal sayına bərabərdir.

Qeyd edək ki, eyni tərfi sütunlar üçün də vermək olar.

ALT FƏZALARIN CƏMİ VƏ KƏSİŞMƏSİ

Tutaq ki, X xətti fəza, L_1 və L_2 isə onun alt fəzalarıdır.

Tərif1. X fəzasının $x \in L_1$, $y \in L_2$ olmaqla $z = x + y$ kimi göstərilə bilən bütün z elementlərindən ibarət çoxluğa L_1 və L_2 alt fəzalarının cəmi deyilir və $L_1 + L_2$ kimi işarə edilir.

Tərif2. X fəzasının eyni zamanda həm L_1 -ə, həm L_2 -yə daxil olan bütün elementlərindən ibarət çoxluğa L_1 və L_2 alt fəzalarının kəsişməsi deyilir və $L_1 \cap L_2$ kimi işarə edilir.

Göstərmək olar ki, $L_1 + L_2$ və $L_1 \cap L_2$ çoxluqları da X fəzasının alt fəzalarıdır.

Teorem. L_1 və L_2 alt fəzalarının ölçüləri cəmi onların cəminin ölçüsü ilə kəsişməsinin ölçüsü cəminə bərabərdir.

İsbatı. Tutaq ki, $\dim X = n$, $\dim L_1 = k$, $\dim L_2 = m$. L_1 və L_2 -nin kəsişməsini $L_1 \cap L_2 = L_0$ ilə işarə edək və L_0 -da $\forall e_1, e_2, \dots, e_p$ bazisi götürək. Aydındır ki, $\dim L_0 = p$ olar. Bu vektorları $e_{p+1}, e_{p+2}, \dots, e_k$ vektorları ilə L_1 -də, $f_{p+1}, \dots, f_m$ vektorları ilə L_2 -də bazisə qədər tamamlayaq. Göstərək ki, $e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_k, f_{p+1}, \dots, f_m$ vektorları $L_1 + L_2$ -də bazis əmələ gətirir. Bunun üçün əvvəlcə bu vektorların xətti asılı olmadığını isbat edək. Onların “0”-a bərabər olan xətti kombinasiyasını götürək:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_p e_p + \beta_{p+1} e_{p+1} + \dots + \beta_k e_k + \dots + \gamma_{p+1} f_{p+1} + \dots + \gamma_m f_m = 0 \quad (1)$$

(1) bərabərliyini aşağıdakı şəkildə yazaq:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_p e_p + \beta_{p+1} e_{p+1} + \dots + \beta_k e_k + \dots = -\gamma_{p+1} f_{p+1} - \dots - \gamma_m f_m$$

Bu bərabərliyin sol tərəfindəki vektor L_1 alt fəzasına, sağ tərəfindəki vektor isə L_2 alt fəzasına daxildir. Buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki, bərabərliyin sağ tərəfindəki vektor L_1 və L_2 -nin kəsişməsinə də daxildir. Ona görə də, həmin vektoru L_0 -da bazis əmələ gətirən $e_1, e_2, \dots, e_p$ vektorlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərmək olar:

$$-\gamma_{p+1}f_{p+1} - \dots - \gamma_m f_m = c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_p e_p$$

Buradan alırıq ki,

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_p e_p + \gamma_{p+1} f_{p+1} + \dots + \gamma_m f_m = 0$$

$e_1, e_2, \dots, e_p, f_{p+1}, \dots, f_m$ vektorları L_2 alt fəzasında bazis əmələ gətirdiyinə görə xətti asılı deyil. Ona görə də, $c_1 = 0, c_2 = 0, \dots, c_p = 0, \gamma_{p+1} = 0, \dots, \gamma_m = 0$. Bunları (1)-də nəzərə alıb, $e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_k$ vektorlarının L_1 -də bazis əmələ gətirməsindən istifadə etsək, $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_p = 0, \beta_{p+1} = 0, \dots, \beta_k = 0$ olduğunu deyə bilərik. Yəni, (1) bərabərliyin bütün əmsalları sıfıra bərabərdir. Ona görə də, götürdüyümüz vektorlar sistemi xətti asılı deyil. $\forall x \in L_1 + L_2$ götürsək, $x = x_1 + x_2$, $x_1 \in L_1, x_2 \in L_2$ yazı bilərik. x_1 vektorunun L_1 alt fəzasındakı, x_2 vektorunun isə L_2 alt fəzasındakı bazisə görə ayrılışını yazsaq, x vektoru $e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_k, f_{p+1}, \dots, f_m$ vektorlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərilmiş olar. Ona görə də, həmin vektorlar $L_1 + L_2$ -də bazis əmələ gətirir. Bu isə o deməkdir ki,

$$\dim(L_1 + L_2) = k + m - p = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2) \text{ və ya} \\ \dim L_1 + \dim L_2 = \dim(L_1 + L_2) + \dim(L_1 \cap L_2).$$

7. ALT FƏZALARIN DÜZ CƏMİ

Tutaq ki, L_1 və L_2 X fəzasının alt fəzalarıdır. Əgər X -ə daxil olan $\forall x$ elementini $x = x_1 + x_2$, $x_1 \in L_1, x_2 \in L_2$ şəklində göstərmək mümkündürsə, və bu ayrılış yeganədirsə, onda deyəcəyik ki, X xətti fəzası L_1 və L_2 alt fəzalarının düz cəmi şəklində göstərilmişdir. Əgər X fəzası L_1 və L_2 alt fəzalarının düz cəmi şəklində göstərilmişdirsə, onda bunu $X = L_1 \oplus L_2$ və ya $X = L_1 + L_2$ kimi işarə edəcəyik.

Teorem: X fəzasının L_1 və L_2 alt fəzalarının düz cəmi şəklində göstərilə bilməsi üçün kafi şərt L_1 və L_2 alt fəzalarının kəsişməsinin yalnız sıfır elementdən ibarət olması və L_1 və L_2 alt fəzalarının ölçüləri cəminin X fəzasının ölçüsünə bərabər olmasıdır. Yəni,

$$L_1 \cap L_2 = \{0\}, \dim L_1 + \dim L_2 = \dim X \text{ olmasıdır.}$$

İsbatı. Tutaq ki, $\dim X = n, \dim L_1 = m, \dim L_2 = k$. L_1 -də hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_m$ bazisi, L_2 -də hər hansı $f_1, f_2, \dots, f_k$ bazisi götürək. Göstərək ki, $e_1, e_2, \dots, e_m, f_1, f_2, \dots, f_k$ vektorları X fəzasında bazis əmələ gətirir. Əvvəlcə bu vektorların xətti asılı olmadığını isbat edək. Bunun üçün onların sıfıra bərabər olan xətti kombinasiyasına baxaq:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \dots + \beta_k f_k = 0 \quad (2)$$

Bu bərabərliyi aşağıdakı şəkildə yazmaq:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m = -\beta_1 f_1 - \beta_2 f_2 - \dots - \beta_k f_k$$

Bərabərliyin sol tərəfindəki vektor L_1 -ə, sağ tərəfindəki vektor isə L_2 -yə daxildir. L_1 və L_2 alt fəzalarının kəsişməsinin yalnız sıfır vektordan ibarət olduğunu nəzərə alsaq, bu vektorların hər birinin sıfıra bərabər olduğunu deyə bilərik.

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m = 0, \quad \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \dots + \beta_k f_k = 0,$$

$e_1, e_2, \dots, e_m$ vektorları L_1 -də, $f_1, f_2, \dots, f_k$ vektorları L_2 -də bazis əmələ gətirdiyindən bu vektorlar xətti asılı deyil. Ona görə də, birinci bərabərlikdən $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_m = 0$, ikinci bərabərlikdən isə $\beta_1 = 0, \beta_2 = 0, \dots, \beta_k = 0$ alırıq. Bu isə götürdüyümüz vektorlar sisteminin xətti asılı olmadığını göstərir. L_1 və L_2 alt fəzalarının ölçüləri cəmi X fəzasının ölçüsünə bərabər olduğundan $e_1, e_2, \dots, e_m, f_1, f_2, \dots, f_k$ vektorları X fəzasında bazis əmələ gətirir. $\forall x \in X$ götürək, və bu vektorun bazisə görə ayrılışını yazmaq:

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \dots + \beta_k f_k.$$

$$x_1 = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m, \quad x_2 = \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \dots + \beta_k f_k$$

işarə etsək, $x = x_1 + x_2$ ($x_1 \in L_1, x_2 \in L_2$) yazı bilərik. Beləliklə X fəzasının $\forall x$ elementini biri L_1 -dən, digər L_2 -dən olan iki elementin cəmi şəklində göstərmiş oluruq. Göstərək ki, bu ayrılış yeganədir.

Tutaq ki, x vektoru üçün ikinci bir ayrılış da yazmaq mümkündür. Yəni,

$$x = x'_1 + x'_2, \quad x'_1 \in L_1, \quad x'_2 \in L_2$$

x üçün yazdığımız bu iki ayrılışdan alırıq ki,

$$(x_1 - x'_1) + (x_2 - x'_2) = 0 \quad \text{və ya} \quad (x_1 - x'_1) = (x'_2 - x_2).$$

L_1 ilə L_2 -nin kəsişməsi yalnız sıfır vektordan ibarət olduğu üçün

$$x_1 - x'_1 = 0 \Rightarrow x_1 = x'_1$$

$$x'_2 - x_2 = 0 \Rightarrow x'_2 = x_2$$

olur. Deməli, ayrılış yeganədir. Ona görə də deyə bilərik, X fəzası L_1 və L_2 alt fəzalarının düz cəminə bərabərdir: $x = L_1 \oplus L_2$.

Teorem isbat olundu.

XƏTTİ FƏZADA BAZİS DƏYİŞDİKDƏ KOORDİNATLARIN DƏYİŞMƏSİ

Tutaq ki, X n ölçülü xətti fəzadır. X fəzasında ixtiyari iki $e_1, e_2, \dots, e_n$ və $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ bazis'ini götürək. Onda aydındır ki, ikinci bazisin hər bir vektorunun birinci bazisə görə ayrılışını yazmaq olar:

$$e'_1 = \alpha_{11} e_1 + \alpha_{12} e_2 + \dots + \alpha_{1n} e_n$$

$$e'_2 = \alpha_{21} e_1 + \alpha_{22} e_2 + \dots + \alpha_{2n} e_n$$

.....

$$e'_n = \alpha_{n1} e_1 + \alpha_{n2} e_2 + \dots + \alpha_{nn} e_n$$

(1)

Bu ayrılışın əmsallarından aşağıdakı matrisi düzəldək:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

A matrisinə birinci bazisdən ikinci bazisə keçid matrisi deyilir. İndi isə bu matrisin köməyi ilə ikinci bazisdən birinci bazisə keçid matrisini tapaq. A matrisinin a_{ij} elementinin cəbri tamamlayıcısını A_{ij} ilə işarə edək. (1) bərabərliklərindən birincisini A_{1j} -yə, ikincisini A_{2j} -yə,..., sonuncusunu A_{nj} -yə vurub tərəf-tərəfə toplasaq, aşağıdakı bərabərliyi alarıq:

$$A_{1j}e'_1 + A_{2j}e'_2 + \dots + A_{nj}e'_n = \sum_{i=1}^n (a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \dots + a_{ni}A_{nj})e_i$$

n tərtibli determinantın cəbri tamamlayıcılar üçün olan xassəsindən istifadə etsək, deyə bilərik ki, sonuncu bərabərliyin sağ tərəfində, $i \neq j$ olduqda bütün hədlər sıfıra, $i = j$ olduqda isə e_i həddinin əmsalı A matrisinin determinantına bərabərdir.

Ona görə də, aşağıdakı bərabərliyi yazı bilərik:

$$\det A \cdot e_j = A_{1j}e'_1 + A_{2j}e'_2 + \dots + A_{nj}e'_n, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Buradan

$$e_j = \frac{A_{1j}}{\det A} e'_1 + \frac{A_{2j}}{\det A} e'_2 + \dots + \frac{A_{nj}}{\det A} e'_n, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (2)$$

olur. Bu bərabərlikləri j -nin bütün qiymətləri üçün yazsaq,

$$\begin{aligned} e_1 &= \frac{A_{11}}{\det A} e'_1 + \frac{A_{21}}{\det A} e'_2 + \dots + \frac{A_{n1}}{\det A} e'_n \\ e_2 &= \frac{A_{12}}{\det A} e'_1 + \frac{A_{22}}{\det A} e'_2 + \dots + \frac{A_{n2}}{\det A} e'_n \\ &\vdots \\ e_n &= \frac{A_{1n}}{\det A} e'_1 + \frac{A_{2n}}{\det A} e'_2 + \dots + \frac{A_{nn}}{\det A} e'_n. \end{aligned} \tag{3}$$

(3) düsturları birinci bazis vektorlarının ikinci bazis vektorlarına görə ayrılışını verir. Əgər bu ayrılışın əmsallarından matris düzəltsek, görərik ki, o A matrisinin tərsinə bərabərdir. Beləliklə, ikinci bazisdən birinci bazisə keçid matrisi birinci bazisdən ikinci bazisə keçid matrisinin tərsinə bərabərdir.

İndi X fəzasının ixtiyari elementinin bu iki bazisdəki koordinatları arasındakı əlaqəni tapaq.

$\forall x \in X$ götürək və bu vektorun həm birinci, həm də ikinci bazisə görə ayrılışını yazaq:

$$x = \alpha'_1 e'_1 + \alpha'_2 e'_2 + \dots + \alpha'_n e'_n = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

$e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorlarının $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ bazisinə görə yuxarıda yazdığımız (2) ayrılışlarını nəzərə alsaq, aşağıdakı bərabərliyi yazı bilərik:

burada $x_1, x_2, \dots, x_n$ axtarılan məchullar, $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{mn}$ məchulların əmsalları, $b_1, b_2, \dots, b_m$ isə sərbəst hədlər adlanırlar. Əgər $b_1 = 0, b_2 = 0, \dots, b_m = 0$ olarsa, (1) sisteminə xətti bircins tənliklər sistemi deyilir. $m=n$ olduqda (1) sistemi kvadrat sistem adlanır. (1) sisteminin həlli $x_1, x_2, \dots, x_n$ məchullarının elə $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ qiymətlərinə deyilir ki, bu qiymətləri (1) sisteminin hər bir tənliyində uyğun məchulların yerinə yazdıqda onu doğru ədədi bərabərliyə çevirsin. Əgər (1) sisteminin həlli varsa, ona uyuşan sistem, yoxdursa uyuşmayan

Teorem. Bircins sistemin sıfırdan fərqli həllinin olması üçün zəruri və kafi şərt məchulların əmsallarından düzəldilmiş matrisin ranqının məchulların sayından kiçik olmasıdır.

Tutaq ki, $\text{rang } A = r$. A matrisinin sütunlarının xətti örtüyünü L ilə işarə edək. A matrisinin ranqı r -ə bərabər olduğundan, bazis minorun tərtibi də, matrisin xətti asılı olmayan sütunların maksimal sayı da r -ə bərabərdir. Ona görə L alt fəzasının ölçüsü də r -ə bərabərdir. (4) bərabərliklərindən görünür ki, A matrisinin sonuncu sütunu da L xətti örtüyünə daxildir. Ona görə də, $\tilde{A}$ matrisinin

sütunlarının xətti örtüyü də L alt fəzası ilə üst-üstə düşür. Deməli, $\tilde{A}$ matrisinin xətti asılı olmayan sütunlarının maksimal sayı da r -ə bərabərdir. Yəni, $\text{rang } \tilde{A} = r$.

Kafilik. Tutaq ki, $\text{rang } A = \text{rang } \tilde{A} = r$. A matrisindəki bazis minor $\tilde{A}$ matrisi üçün də bazis minordur. Ona görə də, $\tilde{A}$ matrisinin hər bir sütununu və xüsusi halda sonuncu sütununu bazis minor sütunlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərmək olar. Bu xətti kombinasiyaya A matrisinin bazis minora daxil olmayan sütunlarını da sıfır əmsalı ilə əlavə etsək, $\tilde{A}$ matrisinin sonuncu sütunu onun əvvəlki sütunlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərilmiş olar. Bu isə o deməkdir ki, elə $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ ədədləri var ki, (4) bərabərlikləri doğrudur. Yəni, bu ədədlər (1) sisteminin həllidir. Başqa sözlə (1) sistemi uyşandır.

Beləliklə, biz xətti tənliklər sistemi ilə əlaqədar olan birinci məsələni tam həll etmiş olduq.

9. SISTEMİN BÜTÜN HƏLLƏRİNİN TAPILMASI

Tutaq ki, n məchullu n xətti tənliklər sistemi verilmişdir:

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{array} \right\} \quad (1)$$

Bu sistemin əsas matrisinin determinantını

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

İlə işarə edək. Δ -ya sistemin baş determinantı deyilir. Δ determinantında j nömrəli sütunu sərbəst hədlərdən ibarət sütunla əvəz etdikdən sonra alınan determinantı Δ_j ($j = \overline{1, n}$) ilə işarəedək. Bu determinantlara köməkçi determinantlar deyilir. Əvvəlcə göstərk ki, $\Delta \neq 0$ olduqda (1) sisteminin həlli varsa, o yeganədir.

Tutaq ki, $x_1, x_2, \dots, x_n$ ədədləri (1) sisteminin həllidir. Bu ədədləri sistemin hər bir tənliyində uyğun məchulların yerinə yazsaq və alınan bərabərliklərdən birincini A_{1j} -yə, ikincini A_{2j} -yə, ..., sonuncusunu A_{nj} -yə vurub tərəf-tərəfə toplasaq (burada A_{ij} sistemin əsas matrisindəki a_{ij} elementinin cəbri tamamlayıcılarıdır) aşağıdakı bərabərliyi alarıq:

$$\sum_{i=1}^n (a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \dots + a_{ni}A_{nj})x_i = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \dots + b_nA_{nj} \quad (2)$$

Determinantın cəbri tamalayıcılara aid olan xassəsindən istifadə etsək, deyə bilərik ki, (2) bərabərliyinin sol tərəfində $i \neq j$ olduqda bütün hədlər sıfır, $i = j$ olduqda

isə $a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \dots + a_{ni}A = \Delta$ -ya bərabərdir. Bərabərliyin sağ tərəfinə gəldikdə isə asanlıqla görmək olar ki, o Δ_j determinantına bərabərdir. Dediklərimizi nəzərə alsaq, (2) bərabərliyini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:

$$\Delta \cdot x_j = \Delta_j \quad (j=1,2,...,n) \quad (3)$$

$\Delta \neq 0$ olduğunu nəzərə alsaq,

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Lambda} \quad (j=1,2,\dots,n). \quad (4)$$

Beləliklə, $\Delta \neq 0$ olduqda (1) sisteminin həlli varsa, bu həll (4) düsturları vasitəsilə yeganə qaydada təyin olunnur. Bu düsturlara Kramer düsturları deyilir.

İndi isə $\Delta \neq 0$ olduqda (1) sisteminin uyuşan olduğunu göstərək. Bunun üçün sistemin genişlənmiş matrisinə baxaq:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}$$

Bu matrisin tərtibi $n \times (n+1)$ -ə bərabər olduğuna görə onun rəngi n -dən böyük ola bilməz. $\Delta \neq 0$ olmasından alırıq ki, $\text{rang } A = r$. Onda Kroneker-Kapelli teoreminə görə (1) sistemi uyşandır. Beləliklə $\Delta \neq 0$ olduqda (1) sisteminin yeganə həlli var və bu həll Kramer düsturları ilə tapılır.

Bununla da biz, kvadrat sistem üçün yuxarıda qeyd etdiyimi bütün məsələləri həll etmiş olduq.

$\Delta = 0$ olduqda (1) sisteminin müəyyən və ya qeyri-müəyyən olduğunu, eləcə də onun həllərinin tapılmasını ümumi halda öyrənəcəyik

n məchullu m xətti tənliklər sistemi uyuşan olduqda, onun bütün həllərini tapaq. Fərz edək ki, əsas matrisdə bazis minor yuxarı sol küncdə yerləşir (əgər belə olmazsa, tənliklərin yerini dəyişməklə və məchulları yenidən nömrələməklə həmişə buna nail olmaq olar) və $\text{rang } A = r$. Matrisin ixtiyari sətiri bazis minor sətirlərinin xətti kombinasiyası olduğundan deyə bilirik ki, bazis minora daxil olmayan hər bir sətirə uyğun tənlik, bazis minor sətirlərinə uyğun tənliyiylərin xətti kombinasiyasıdır. Ona görə də, belə tənlikləri sistemdən atmaqla onu aşağıdakı şəkildə yaza bilərik:

[illegible]

Göründüyü kimi (5) sistemi $x_1, x_2, \dots, x_r$ məchullarına nəzərən r məchullu xətti tənliklər sistemidir. Bu sistemin baş determinantı sıfırdan fərqli olduğu üçün $x_{r+1}, \dots, x_n$ məchullarının hər bir qiymətində onun yeganə həlli var və bu həlli

Kramer düsturları vasitəsilə tapıla bilər. Qeyd edək ki, $x_{r+1}, \dots, x_n$ məchulları ixtiyari ədədi qiymətlər ala bildiyindən onlara sərbəst məchullar deyilir.

(5) sisteminin baş determinantını M ilə, onun j nömrəli sütununu $d_1, d_2, \dots, d_i, \dots, d_r$ ədədləri ilə əvəz etdikdən sonra alınan determinantı isə $M_j(d_i)$ ilə işarə etsək, (5) sisteminin həllərini aşağıdakı düsturlarla tapmaq olar:

$$x_j = \frac{1}{M} M_j [b_i - (a_{ir+1}x_{r+1} + \dots + a_{in}x_n)] =$$

$$= \frac{1}{M} [M_j(b_i) - x_{r+1}M_j(a_{ir+1}) - \dots - x_nM_j(a_{in})] \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

Əgər xüsusi halda sistem bircins olarsa, onda bircins sistemin həlləri aşağıdakı düsturlarla tapılır:

$$x_j = -\frac{1}{M} M_j [(a_{ir+1}x_{r+1} + \dots + a_{in}x_n)] =$$

$$= -\frac{1}{M} [x_{r+1}M_j(a_{ir+1}) + \dots + x_nM_j(a_{in})] \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

BİRCİNS SİSTEMİN HƏLLƏRİNİN XASSƏLƏRİ

Tutaq ki, n məchullu n xətti bircins tənliklər sistemi verilmişdir. Bildiyimiz kimi belə sistem həmişə uyuşandır. Bu sistemin bütün həllər çoxluğunu R ilə işarə edək. Aydındır ki, bu sistemin hər bir həllinə eyni zamanda R_n fəzasının elementi kimi də baxa bilərik. Ona görə də, R çoxluğu R_n fəzasının müəyyən bir alt çoxluğudur. Gostərək ki, R həmçinin R_n fəzasının alt fəzasıdır. Bunun üçün R -ə daxil olan ixtiyari iki elementin cəminin və hər bir elementin $\forall \lambda$ ədədinə hasilinin də R çoxluğuna daxil olduğunu göstərmək kifayətdir. Başqa sözlə, bircins sistemin ixtiyari iki həllinin cəminin və hər bir həllinin $\forall \lambda$ ədədinə hasilinin də bu sistemin həlli olduğunu göstərmək kifayətdir.

Tutaq ki, $X_1 = (x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1)$ və $X_2 = (x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2)$ bircins sistemin ixtiyari iki həlidir. Onda sistemin $\forall i (i = 1, 2, \dots, n)$ nömrəli tənliyi üçün aşağıdakı bərabərliklər doğrudur

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^1 = 0, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^2 = 0.$$

Onda,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}(x_j^1 + x_j^2) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^1 + \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^2 = 0 + 0 = 0$$

Yəni, $X_1 + X_2 \in R$. Digər tərəfdən,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}(\lambda x_j^1) = \lambda \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^1 = \lambda \cdot 0 = 0$$

$$X = C_1 X_1 + C_2 X_2 + \dots + C_{n-r} X_{n-r} \quad (3)$$

Bu həll bircins sistemin bütün həllərini özündə saxladığına görə ona bircins sistemin ümumi həlli deyilir.

İndi isə bircins sistemin həlləri ilə uyğun qeyri-bircins sistemin həlləri arasındakı əlaqələri göstərək:

1. Qeyri-bircins sistemin ixtiyari iki həllinin fərqi uyğun bircins sistemin həllidir.

Tutaq ki, $x_1 = c_1^{(1)}, \dots, x_n = c_n^{(1)}$ və $x_1 = c_1^{(2)}, \dots, x_n = c_n^{(2)}$ bircins sistemin ixtiyari iki həllidir. Onda qeyri-bircins sistemin $\forall i$ nömrəli tənliyi üçün aşağıdakı bərabərlik doğrudur:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} c_j^{(1)} = b_i \quad \text{və} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j^{(2)} = b_i$$

Ona görə də, bircins sistemin $\forall i$ nömrəli tənliyi üçün

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} (c_j^{(1)} - c_j^{(2)}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j^{(1)} - \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j^{(2)} = b_i - b_i = 0.$$

Bununla birinci xassə isbat olunur.

2. Bircins sistemin ixtiyari həlli ilə uyğun qeyri-bircins sistemin hər hansı həllinin cəmi də qeyri-bircins sistemin həllidir.

Tutaq ki, $x_1 = c_1, \dots, x_n = c_n$ qeyri-bircins sistemin hər hansı həlli, $x_1 = c_1^{(0)}, \dots, x_n = c_n^{(0)}$ isə bircins sistemin ixtiyari həllidir. Onda,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} c_j = b_i \quad \text{və} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j^{(0)} = 0.$$

Bunları nəzərə alsaq, qeyri-bircins sistemin ixtiyari i nömrəli tənliyi üçün

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} (c_j + c_j^{(0)}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j + \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j^{(0)} = b_i + 0 = b_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

olar. Bu isə, ikinci xassənin isbatı deməkdir.

Qeyri-bircins sistemin hər hansı həllini X_0 -la işarə edək. Göstərək ki,

$$X = C_1 X_1 + C_2 X_2 + \dots + C_{n-r} X_{n-r} + X_0 \quad (4)$$

qeyri-bircins sistemin ümumi həllidir, burada $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$ ixtiyari sabitlərdir.

Yəni, bu həlldən qeyri-bircins sistemin ixtiyari həllini almaq olar.

Tutaq ki, X qeyri-bircins sistemin hər hansı həllidir. X_0 da qeyri-bircins sistemin həlli olduğundan, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu iki həllin $X - X_0$ fərqi uyğun bircins sistemin həlli olar. Onda $X - X_0$ həllinin normal fundamental həllər sisteminə görə ayrılışını yazmaq olar. Yəni, elə $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$ ədədləri var ki,

$$X - X_0 = C_1 X_1 + C_2 X_2 + \dots + C_{n-r} X_{n-r}.$$

Buradan, $X = C_1 X_1 + C_2 X_2 + \dots + C_{n-r} X_{n-r} + X_0$ alınır. Beləliklə, (4) düsturu qeyri-bircins sistemin ümumi həlli olur.

8. XƏTTİ TƏNLİKLƏR SİSTEMİNİN Q AUS ÜSULU İLƏ HƏLLİ

Tutaq ki, n məchullu m xətti tənliklər sistemi verilmişdir:

(1)

Bu üsulun mahiyyəti, sistemin tənliklərindən məchulları ardıcıl olaraq yox etməklə, verilmiş sistemin həllini tapmaqdır. Qaus üsulunu tətbiq etmək üçün, ümumiliyi pozmadan hesab edəcəyik ki, (1) sistemindəki $a_{11} \neq 0$. Əgər belə olmazsa, tənliklərin yerini dəyişməklə və ya məchulları yenidən nömrələməklə buna həmişə nail olmaq olar. Qeyd edək ki, tənliklərin hər hansı birində x_1 məchulunun əmsalı 1-ə bərabər olarsa, sonrakı hesablamaları asanlaşdırmaq üçün onu birinci yerdə yazmaq məqsədə uyğundur.

üzərinə, $-\frac{a_{31}}{a_{11}}$ -ə vurub üçüncü tənlik üzərinə, bu qayda ilə davam edərək, nəhayət

qalan bütün hədlərdən x_1 məchulunu yox etmiş olarıq. Bu əməliyyat nəticəsində aşağıdakı iki hala rast gəlmək olar:

- I. Alınan tənliklərdən hər hansı birinin sol tərəfində sıfır, sağ tərəfində sıfırdan fərqli ədəd alınsın. Bu halda (1) sisteminin həlli yoxdur.
- II. Tənliklərdən hər hansı birinin və ya bir neçəsinin həm sol, həm də sağ tərəfində sıfır alınsın. Belə olan halda, həmin bərabərliklərin hamısını sistemdən atırıq.

Əgər x_1 məchulunu yox etdikdən sonra birinci halla rast gəlməsək, onda aldığımız yeni tənliklər sistemində birinci tənliyi olduğu kimi saxlamaqla yuxarıda göstərdiyimiz qaydanı ikincidən başlayaraq qalan bütün tənliklərin əmələ gətirdiyi sistemə tətbiq edirik. Yəni, ikinci tənlikdə x_2 məchulunun əmsalını sıfırdan fərqli götürməklə, üçüncüdən başlayaraq bütün tənliklərdən x_2 məchulunu yox edirik. Bu qayda ilə davam edərək, hər dəfə ikinci hala rast gəlməmək şərtilə, sonda, üçbucaq :

$$a_{11} \neq 0, a'_{22} \neq 0, \dots, a_{nn}^{(k)} \neq 0$$

və ya trapesiya

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n &= b'_2 \\ &\vdots \\ a_{kj}^{(m)}x_j + \dots + a_{kn}^{(m)}x_n &= b_k^{(m)} \end{aligned}$$

$$a_{11} \neq 0, a'_{22} \neq 0, \dots, a_{kj}^{(m)} \neq 0$$

şəkilli sistem alırıq.

Əgər sonda üçbucaq şəkilli sistem alınmışdırsa, axırncı tənlikdən x_n məchulunun qiymətini tapıb, özündən əvvəlki tənlikdə nəzərə almaqla, x_{n-1} məchulunun və bu qayda ilə davam etməklə, nəhayət birinci tənlikdən x_1 məchulunun qiymətini tapırıq.

Əgər sonda trapesiya şəkilli sistem alınmışdırsa, bu sistemdə $x_{j+1}, \dots, x_n$ məchullarını sistemin hər bir həllində bərabərliyin sağ tərəfinə keçirməklə onu üçbucaq şəkilli sistemə gətiririk. Bu sistemi yuxarıda göstərdiyimiz qaydada həll etməklə (1) sisteminin bütün həllərini tapırıq.

Aydındır ki, üçbucaq şəkilli sistem alındıqda (1) sisteminin yeganə həlli var.

Qeyd edək ki, trapesiya şəkilli sistem alındıqda bərabərliyin sağ tərəfinə keçirdiyimiz məchullara sərbəst məchullar deyilir. Onlar ixtiyari ədədi qiymətlər ala bildiyindən, sistemin sonsuz sayda həlləri var.

HƏQIQI EVKLİD FƏZASI

Tərif 1. X həqiqi xətti fəzası aşağıdakı şərtləri ödədikdə həqiqi Evklid fəzası adlanır:

- I. X fəzasının ixtiyari iki x və y elementinə, onların skalyar hasili adlanan və (x, y) kimi işarə olunan bir həqiqi ədədi qarşı qoymaq qaydası verilsin,
- II. bu qayda aşağıdakı xassələrə malik olsun
 1. $(x, y) = (y, x)$
 2. $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$
 3. $(\lambda x, y) = \lambda (x, y), \forall \lambda$ həqiqi ədədi üçün

$$4. (x, x) \geq 0 \text{ və } (x, x) = 0 \leftrightarrow x = 0.$$

Qeyd edək ki, analitik həndəsədə vektorlar üçün $(\bar{x}, \bar{y}) = |\bar{x}| \cdot |\bar{y}| \cdot \cos \varphi$ qaydası ilə təyin etdiyimiz skalyar hasil yuxarıda qeyd etdiyimiz bütün xassələri ödəyir. Həqiqi xətti fəzalarda isə skalyar hasil, bundan fərqli olaraq, aksiomatik qaydada təyin edilir. Burada həmçinin X fəzası da hər hansı konkret xətti fəza olmayıb, mücərrəd həqiqi xətti fəzadır.

Həqiqi Evklid fəzasına bəzi misallar göstərək:

- 1) $[a, b]$ parçasında təyin olunmuş həqiqi qiymətli kəsilməz funksiyalar fəzasında $(C[a, b])$ skalyar hasil

$$(x(t), y(t)) = \int_a^b x(t) \cdot y(t) dt$$

düsturu ilə təyin etsək, bu qayda skalyar hasilin bütün xassələrini ödəyər.

- 2) R_n fəzasında $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ elementlərinin skalyar

hasilini $(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ düsturu ilə təyin etsək, bu qayda da skalyar hasilin

bütün xassələrini ödəyər.

Beləliklə, baxılan xətti fəzaların hər biri həqiqi Evklid fəzasıdır.

Tərif 2. X həqiqi xətti fəzası aşağıdakı şərtləri ödədikdə normalaşmış və ya normalı xətti fəza adlanır:

- I. X fəzasının $\forall x$ elementinə bu elementin norması (uzunluğu) adlanan və $\|x\|$ kimi işarə olunan bir həqiqi ədədi qarşı qoymaq qaydası verilsin,
II. bu qayda aşağıdakı xassələrə malik olsun:

1. $\|x\| \geq 0$ və $\|x\| = 0 \leftrightarrow x = 0$,
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$, $\forall \lambda$ -həqiqi ədədi və $\forall x \in X$ üçün ,
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Sonuncu bərabərsizlik üçbucaq və ya Minkovski bərabərsizliyi adlanır.

Qeyd edək ki, həqiqi ədədin mütləq qiyməti normanın bütün xassələrini ödəyir.

Teorem 1. X həqiqi Evklid fəzasının $\forall x, y$ elementləri üçün aşağıdakı bərabərsizlik doğrudur:

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y) \quad (1)$$

İsbatı. Bu bərabərsizliyi isbat etmək üçün $\forall x, y \in X$ və $\forall \lambda$ həqiqi ədədi götürək. Onda skalyar hasilin 4-cü xassəsinə görə aşağıdakı bərabərsizliyi yazı bilərik:

$$(\lambda x - y, \lambda x - y) \geq 0 \quad (2)$$

Skalyar hasilin digər xassələrindən istifadə edərək, (2) bərabərsizliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar:

$$\lambda^2(x, x) - 2\lambda(x, y) + (y, y) \geq 0 \quad (3)$$

Göründüyü kimi (3) bərabərsizliyinin sol tərəfi λ -ya nəzərən həqiqi əmsallı kvadrat üçhədlidir. Belə kvadrat üçhədlinin sıfırdan böyük bərabər olması üçün zəruri və kafi şərt

$$(x, y)^2 - (x, x)(y, y) \leq 0$$

bərabərsizliyinin ödənməsidir. Buradan isə (1) bərabərsizliyi alınır.

Qeyd edək ki, (1) bərabərsizliyinə Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyi deyilir.

İndi isə göstərək ki, hər bir həqiqi Evklid fəzasını

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}$$

təyin etməklə normalı fəza etmək olar. Aydın ki, bunun üçün təyin etdiyimiz bu qaydanın normanın bütün üç xassəsini ödədiyini yoxlamaq kifayətdir.

Normanın 1-ci xassəsinin ödənməsi skalyar hasilin 4-cü xassəsindən alınır.

2-ci xassə $\|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{\lambda^2 (x, x)} = |\lambda| \|x\|$ bərabərliyindən çıxır.

3-cü xassəni Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin köməyi ilə yoxlayaq:

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \sqrt{(x + y, x + y)} = \sqrt{(x, x) + 2(x, y) + (y, y)} = \\ &= \sqrt{(\sqrt{(x, x)})^2 + 2\sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} + (\sqrt{(y, y)})^2} \leq \sqrt{\|x\|^2 + 2\sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} + \|y\|^2} = \\ &= \sqrt{\|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2} = \sqrt{(\|x\| + \|y\|)^2} = \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

Misallar. $C[a, b]$ və R_n həqiqi Evklid fəzalarında Koşi-Bunyakovski və Minkovski bərabərsizliklərini yazaq

1. $C[a, b]$ fəzasında $(x, y) = \int_a^b x(t)y(t)dt$, $\|x\| = \sqrt{\int_a^b x^2(t)dt}$ olduğu üçün

Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyi $\left(\int_a^b x(t)y(t)dt \right)^2 \leq \int_a^b x^2(t)dt \int_a^b y^2(t)dt$,

Minkovski bərabərsizliyi isə $\sqrt{\int_a^b (x(t) + y(t))^2 dt} \leq \sqrt{\int_a^b x^2(t)dt} + \sqrt{\int_a^b y^2(t)dt}$

kimi olur.

2. R_n fəzasında $(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$, $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ olduğu üçün

Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyi $\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2$,

Minkovski bərabərsizliyi isə $\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$

kimi olur.

9. ORTONORMAL BAZİS VƏ ORTOQONALLAŞDIRMA ÜSULU

Tutaq ki, X həqiqi Evklid fəzasıdır. Bu fəzaya daxil olan x və y elementləri üçün $(x, y) = 0$ olarsa, onlara ortoqonal elementlər deyilir. Əgər x və y ortoqonaldırsa, onda bu elementlər üçün

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2, \quad \|x\| = \sqrt{(x, x)} \quad (1)$$

bərabərliyi ödənilir. Doğrudan da

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

((x, y) = 0, (y, x) = 0 olduğu üçün)

(1) bərabərliyi Pifaqor teoremi adlanır. Qeyd edək ki, Pifaqor teoremi cüt-cüt ortoqonal olan ixtiyari n sayda vektor üçün də doğrudur. Yəni, $x_1, x_2, \dots, x_n$ vektorları üçün $(x_i, x_j) = 0, \quad i \neq j$ şərtləri ödənilərsə, onda

$$\|x_1 + x_2 + \dots + x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + \dots + \|x_n\|^2$$

Tutaq ki, n ölçülü X həqiqi Evklid fəzasına daxil olan $e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorları üçün

$$(e_i, e_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

şərtləri ödənilir. Bu şərtləri ödəyən $e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorlarına X fəzasında ortonormal bazis deyilir. Göstərək ki, onlar doğrudan da bazis əmələ gətirir. Həmin vektorların sıfıra bərabər olan xətti kombinasiyasını götürək:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = 0 \quad (2)$$

(2) bərabərliyinin hər iki tərəfini $e_k (k=1, 2, \dots, n)$ vektoruna skalyar vursaq, $\alpha_k (e_k, e_k) = 0$ alırıq. $(e_k, e_k) = 1$ olduğu üçün $\alpha_k = 0$ olur. Beləliklə xətti kombinasiyanın bütün əmsalları sıfıra bərabərdir. Ona görə də, $e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorları xətti asılı deyil. Bu vektorların sayı fəzanın ölçüsünə bərabər olduğundan məlum teoremə görə onlar X fəzasında bazis əmələ gətirir.

İndi isə göstərək ki, hər bir n ölçülü həqiqi Evklid fəzasında ortonormal bazis var. Bunu riyazi induksiya metodunun köməyi ilə isbat edək.

Tutaq ki, $\dim X = n$. Onda X fəzasında n sayda vektordan ibarət bazis var.

$f_1, f_2, \dots, f_n$ -lə bu fəzada hər hansı bazisi işarə edək. $n=1$ olduqda $e_1 = \frac{f_1}{\sqrt{(f_1, f_1)}}$

götürək. Aydındır ki, $e_1 \neq 0$ və $(e_1, e_1) = 1$. Ona görə də, e_1 vektoru birölçülü X fəzasında ortonormal bazis əmələ gətirir. Tutaq ki, $n=m$ olduqda $f_1, f_2, \dots, f_m$ vektorlarına görə $e_1, e_2, \dots, e_m$ ortonormal sistemini artıq qurmuşuq. $n=m+1$ olduqda $f_1, f_2, \dots, f_m, f_{m+1}$ vektorlarına görə $e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}$ ortonormal sistemini quraq. Bunun üçün

$$e_{m+1} = \alpha_{m+1} [f_{m+1} - (f_{m+1}, e_m) e_m - (f_{m+1}, e_{m-1}) e_{m-1} - \dots - (f_{m+1}, e_1) e_1] \quad (3)$$

götürək. Aydındır ki, $\alpha_{m+1} \neq 0$ olduqda $e_{m+1} \neq 0$. Çünki $e_{m+1} = 0$ olarsa, onda (3) bərabərliyindən çıxır ki, f_{m+1} vektoru $e_1, e_2, \dots, e_m$ vektorlarının xətti kombinasiyasıdır. Bu vektorların hər biri $f_1, f_2, \dots, f_m$ vektorlarının xətti kombinasiyası olduğundan alırıq ki, f_{m+1} vektoru da $f_1, f_2, \dots, f_m$ vektorlarının xətti kombinasiyasıdır. Bu isə $f_1, f_2, \dots, f_m, f_{m+1}$ vektorlarının xətti asılı olmaması

olar, burada $a_{ij} = (f_i, f_j) \quad (i, j = \overline{1, n})$.

(3) bərabərliyindən görünür ki, x və y vektorlarının skalyar hasilinin uyğun koordinatların hasilləri cəminə bərabər olması üçün

$$(f_i, f_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Olmalıdır. Başqa sözlə, $f_1, f_2, \dots, f_n$ ortonormal bazis olmalıdır. Beləliklə, yalnız və yalnız ortonormal bazisdə iki vektorun skalyar hasilini onların uyğun koordinatlarının hasilləri cəminə bərabər olur.

KOMPLEKS EVKLİD FƏZASI

X kompleks xətti fəzası aşağıdakı şərtləri ödədikdə kompleks Evklid fəzası adlanır:

- I. X fəzasının ixtiyari iki x və y elementinə onların skalyar hasilini adlanan və (x, y) kimi işarə olunan bi kompleks ədədi qarşı qoymaq qaydası verilsin,
- II. bu qayda aşağıdakı xassələrə malik olsun
 1. $(x, y) = \overline{(y, x)}$, burada $\overline{(y, x)}$, (y, x) kompleks ədədinin qoşmasıdır,
 2. $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$,
 3. $(\lambda x, y) = \lambda (x, y)$, $\forall \lambda$ kompleks ədədi üçün,
 4. (x, x) həqiqi ədəddir, $(x, x) \geq 0$ və $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Qeyd edək ki, bu xassələrin köməyiylə skalyar hasilin aşağıdakı xassələrini də göstərmək olar:

1. $(x, y + z) = \overline{(y + z, x)} = \overline{(y, x)} + \overline{(z, x)} = (x, y) + (x, z)$,
2. $(x, \lambda y) = \overline{(\lambda y, x)} = \overline{\lambda (y, x)} = \overline{\lambda} \overline{(y, x)} = \overline{\lambda} (x, y)$.

Misallar.

1. $[a, b]$ parçasında kəsilməz olan kompleks qiymətli funksiyalar fəzasında

$$(x(t), y(t)) = \int_a^b x(t) \overline{y(t)} dt$$

qaydası ilə skalyar hasilini təyin etsək, alınan fəza kompleks Evklid fəzası olar.

2. n sayda, nizam ilə götürülmüş kompleks ədədlə təyin olunan $x = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ şəkilli elementlər çoxluğunda (burada $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ -lər kompleks ədədlərdir) cəm və ədədə vurma əməllərini

$$x + y = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n), \quad y = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

$$\lambda x = (\lambda \alpha_1, \lambda \alpha_2, \dots, \lambda \alpha_n), \quad \lambda \text{ - kompleks ədəddir,}$$

kimi təyin etməklə alınan xətti fəzada skalyar hasilini

$$(x, y) = \alpha_1 \overline{\beta_1} + \alpha_2 \overline{\beta_2} + \dots + \alpha_n \overline{\beta_n}$$

qaydası ilə təyin etsək o, kompleks xətti fəza olar.

Qeyd edək ki, kompleks Evklid fəzasında da Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyi doğrudur. Bu bərabərsizlik aşağıdakı şəkildə yazılır:

$$\forall x, y \in X, |(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y), \quad (1)$$

burada $|(x, y)| = \text{mod}(x, y)$.

Bu bərabərsizliyi isbat etmək üçün $\forall x, y \in X$ və $\forall \lambda$ kompleks ədədi üçün doğru olan aşağıdakı bərabərsizliyə baxaq:

$$(\lambda x - y, \lambda x - y) \geq 0$$

Skalyar hasilin xassələrindən istifadə edərək bu bərabərsizliyi aşağıdakı şəkildə yazı bilərik:

$$|\lambda|^2(x, x) - \lambda(x, y) - \bar{\lambda}(y, x) + (y, y) \geq 0.$$

Buradan alırıq ki,

$$|\lambda|^2(x, x) - \lambda(x, y) - \bar{\lambda}(x, \bar{y}) + (y, y) \geq 0.$$

(x, y) ədədini triqonometrik şəkildə yazsaq, $(x, y) = |(x, y)|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ olar.

Tutaq ki, $\lambda = t(\cos \varphi - i \sin \varphi)$, $t = |\lambda|$. Bunları sonuncu bərabərlikdə nəzərə alsaq,

$$t^2(x, x) - t|(x, y)| - t|(x, y)| + (y, y) \geq 0 \quad \text{və ya}$$

$$t^2(x, x) - 2t|(x, y)| + (y, y) \geq 0 \quad (2)$$

Göründüyü kimi (2)-nin sol tərəfi t -yə nəzərən həqiqi əmsallı kvadrat üçhədlidir. Ona görə də, bu bərabərsizliyin t -nin ixtiyari qiymətində ödənilməsi üçün onun diskriminantı aşağıdakı bərabərsizliyi ödəməlidir:

$$|(x, y)|^2 - (x, x)(y, y) \leq 0$$

Buradan Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyi alınır.

Kompleks Evklid fəzasında da həqiqi Evklid fəzasında olduğu kimi $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ təyin etməklə onu normalı fəzaya çevirmək olar.

Tutaq ki, X n ölçülü kompleks Evklid fəzasıdır. Bu fəzada da, həqiqi fəzaya analogi olaraq, ortonormal bazisə tərif vermək olar. Həqiqi Evklid fəzasında olduğu kimi burada da, ortonormal bazisin varlığını və qurulma qaydasını göstərmək olar.

Tutaq ki, $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisdir. Onda, $\forall x, y \in X$ vektorları üçün $x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$, $y = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_n e_n$ ayrılışlarını yazmaq olar. Kompleks Evklid fəzasında verilmiş ortonormal bazisdə bu iki vektorun skalyar hasiliaşağıdakı düsturla tapılır.:

$$(x, y) = (\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n, \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_n e_n) = \alpha_1 \bar{\beta}_1 + \alpha_2 \bar{\beta}_2 + \dots + \alpha_n \bar{\beta}_n.$$

10. HƏQİQİ EVKLİD FƏZALARININ İZOMORFLUĞU

Tutaq ki, X və X' həqiqi Evklid fəzalarıdır. Aşağıdakı şərtlər ödəndikdə bu iki Evklid fəzası biri-birinə izomorf adlanır:

1. X və X' fəzaları həqiqi xətti fəza kimi bir-birinə izomorfdur.

2. $x, y \in X$ elementlərinə uyğun olaraq $x', y' \in X'$ elementləri qarşı qoyulmuşdursa, onda

$$(x, y)_X = (x', y')_{X'},$$

burada $(x, y)_X$ və $(x', y')_{X'}$ ilə uyğun olaraq X və X' fəzasında skalyar hasil işarə edilmişdir.

Teorem. Bütün n ölçülü həqiqi Evklid fəzaları biri-birinə izomorfdur.

İsbatı. Teoremi isbat etmək üçün n ölçülü $\forall X$ həqiqi Evklid fəzasının $(x, y) = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \dots + \alpha_n \beta_n$ ($x = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ $y = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$) skalyar hasil R_n fəzasına izomorf olduğunu göstərmək kifayətdir.

X fəzasında ixtiyari $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisi götürək və $\forall x, y \in X$ vektorlarının bu bazisə görə ayrılışını yazaq:

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n, \quad y = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_n e_n$$

x vektoruna R_n fəzasının $x' = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ elementini, y vektoruna isə $y' = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ elementini qarşı qoyaq. Bazisə görə atılış yeganə olduğuna görə bu qarşıqoyma qarşılıqlı birqiymətlidir. Eyni bazisdə verilmiş iki vektorun toplanması və ədədə vurulması əməllərinin xassələrindən istifadə etsək, asanlıqla görmək olar ki, $x + y \in X$ vektoruna $x' + y' \in R_n$, $\lambda x \in X$ vektoruna isə $\lambda x' \in R_n$ vektoru qarşı qoyulur. Yəni, X və X' fəzaları həqiqi xətti fəza kimi bir-birinə izomorfdur.

Ortonormal bazisdə

$$(x, y)_X = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \dots + \alpha_n \beta_n$$

olduğunu nəzərə alsaq və bu bərabərliyin sağ tərəfinin $(x', y')_{R_n}$ -ə bərabər olduğunu nəzərə alsaq, X və R_n fəzalarının Evklid fəzası kimi izomorf olduğunu deyə bilərik. Bununla da teorem isbat olundu.

Analoji qaydada bütün n ölçülü kompleks evklid fəzalarının da izomorf olduğunu isbat etmək olar.

XƏTTİ OPERATORLAR

Tutaq ki, X və Y uyğun olaraq m və n ölçülü xətti fəzalardır. Əgər X fəzasının hər bir x elementinə Y fəzasının müəyyən bir y elementini qarşı qoymaq qaydası verilmişdirsə, onda deyəcəyik ki, X fəzasından Y fəzasına təsir edən operator verilmişdir və bunu $y = (Ax)$ və ya $y = Ax$ kimi işarə edəcəyik.

Tutaq ki, X və Y eyni zamanda həqiqi və ya kompleks xətti fəzalardır. X -dən Y -ə təsir edən A operatoru aşağıdakı şərtləri ödədikdə xətti operator adlanır:

1. $A(x + y) = Ax + Ay$, $\forall x, y \in X$,
2. $A(\lambda x) = \lambda Ax$, $\forall x \in X$ və $\forall \lambda$ ədədi üçün.

Qeyd edək ki, bu fəzalar həqiqi olduqda λ həqiqi, kompleks olduqda isə kompleks hesab olunur.

X fəzasından Y fəzasına təsir edən xətti operatorlar çoxluğunu $L(X, Y)$ -lə işarə edək. Bu çoxluqda $\forall A, B \in L(X, Y)$ üçün aşağıdakı qaydada cəm və ədədə vurma əməlləri təyin edək:

$$(A + B)x = Ax + Bx, \quad \forall x \in X \text{ üçün,}$$

$$A(\lambda x) = \lambda Ax, \quad \forall \lambda \text{ ədədi və } \forall x \in X \text{ üçün.}$$

X fəzasının hər bir elementinə Y fəzasının sıfır elementini qarşı qoyan operatoru sıfır operator adlandırır O hərfi ilə işarə edəcəyik:

$$O \cdot x = 0, \quad \forall x \in X.$$

Hər bir A operatorunun əksini $-A$ ilə ifadə edib, aşağıdakı kimi təyin edəcəyik:

$$(-A)x = -Ax, \forall x \in X.$$

Yoxlamaq olar ki, $L(X, Y)$ çoxluğu təyin etdiyimiz cəm və ədədə vurma əməllərinə görə, yuxarıda təyin etdiyimiz sıfır və əks operatorlarla birlikdə xətti fəza əmələ gətirir.

$L(X, Y)$ xətti fəzasına misal olaraq, R_n fəzasında təyin olunmuş n tərtibli matrislər çoxluğunu göstərmək olar. Bu xətti fəzanın ölçüsü n^2 -na bərabərdir. İndi isə X xətti fəzasından X fəzasına təsir edən xətti operatorlar çoxluğuna baxaq. Bu fəzanı $L(X, X)$ əvəzinə $L(X)$ ilə ifadə edəcəyik.

$$Ix = x$$

qaydası ilə təsir edən I operatoruna vahid operator deyilir. $L(X)$ fəzasında iki $A, B \in L(X)$ operatorlarının AB hasilini aşağıdakı qaydada təyin edilir:

$$(AB)x = A(Bx), \forall x \in X \text{ üçün.}$$

Qeyd edək ki, ümumiyyətlə $AB \neq BA$

Bu əməl aşağıdakı xassələrə malikdir:

1. $(\lambda A)B = \lambda(AB),$
2. $A(B + C) = AB + AC,$
3. $(A + B)C = AC + BC,$
4. $A(BC) = (AB)C.$

1-ci xassə operatorun ədədə vurulması əməlinin tərifindən alınır.

2-ci xassə $\forall x \in X$ üçün aşağıdakı bərabərliklərdən alınır:

$$\begin{aligned} A(B + C)x &= A((B + C)x) = A(Bx + Cx) = A(Bx) + \\ &+ A(Cx) = (AB)x + (AC)x = (AB + AC)x. \end{aligned}$$

Buradan,

$$A(B + C) = AB + AC.$$

Analoji qaydada digər xassələri də göstərmək olar.

Qeyd edək ki, operatorların hasilini əməlini ixtiyari sonlu sayda operator üçün də təyin etmək olar. Xüsusi halda, A^n operatorunu

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_n$$

düsturu ilə təyin edirlər. Aydındır ki, aşağıdakı bərabərlik doğrudur:

$$A^{n+m} = A^n \cdot A^m$$

Tərif. Əgər $B \in L(X)$ operatoru üçün

$$AB = BA = I$$

olarsa, onda B operatoruna $A \in L(X)$ operatorunun tərsi deyilir.

A operatorunun tərsini adətən A^{-1} ilə ifadə edirlər. Aydındır ki, $\forall x \in X$ üçün $A^{-1}Ax = x$. Qeyd edək ki, əgər A -nın tərsi varsa və $Ax = 0$, onda $x = 0$.

Tutaq ki, $A \in L(X)$. Əgər $\forall x_1, x_2 \in X$ üçün $x_1 \neq x_2$ olduqda $Ax_1 \neq Ax_2$ olarsa, onda deyəcəyik ki, A operatoru X fəzasında qarşılıqlı birqiymətli təsir edir. Göstərək ki, əgər A operatoru X fəzasında qarşılıqlı birqiymətli təsir edirsə, onda bu operator X fəzasını bütün X fəzasına köçürür. Başqa sözlə, $\forall y \in X$ üçün

elə $x \in X$ var ki, $y = Ax$. Bunu isbat etmək üçün X fəzasında hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisi götürək. Onda $\forall x \in X$ üçün

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

ayrılışını yaza bilərik. $Ae_1, Ae_2, \dots, Ae_n \in X$ vektorlarına baxaq. Göstərək ki, bu vektorlar xətti asılı deyil. Bunun üçün onların sıfıra bərabər olan xətti kombinasiyasını götürək:

$$c_1 Ae_1 + c_2 Ae_2 + \dots + c_n Ae_n = 0.$$

A xətti operator olduğundan bu bərabərliyi aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:

$$A(c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n) = 0.$$

A qarşılıqlı birqiymətli təsir etdiyindən bu bərabərlikdən alırıq ki,

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n = 0$$

$e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorları xətti asılı olmadığından $c_1 = 0, c_2 = 0, \dots, c_n = 0$ olmalıdır.

Beləliklə $Ae_1, Ae_2, \dots, Ae_n$ vektorları xətti asılı deyil. Onların sayı X fəzasının ölçüsünə bərabər olduğundan, bu vektorlar bazis əmələ gətirir. $\forall y \in X$ götürək.

Onda, bazisə görə aşağıdakı ayrılışı yaza bilərik:

$$y = \alpha_1 Ae_1 + \alpha_2 Ae_2 + \dots + \alpha_n Ae_n = A(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n) = Ax$$

Beləliklə, $\forall y \in X$ üçün $\exists x \in X$ vektoru var ki, $Ax = y$. Yəni, A operatoru X fəzasını bütün X fəzasına köçürür.

Aşağıdakı teorem doğrudur.

Teorem. A operatorunun tərsinin olması üçün zəruri və kafi şərt onun X fəzasında qarşılıqlı birqiymətli təsir etməsidir.

İsbatı. Zərurilik. Tutaq ki, A operatorunun tərsi var, lakin A qarşılıqlı birqiymətli təsir etmir. Yəni, elə $x_1, x_2 \in X$ və $x_1 \neq x_2$ elementləri var ki, $Ax_1 = Ax_2$. Buradan alırıq ki, $A(x_1 - x_2) = 0$, və A -nın tərsi olduğu üçün $x_1 - x_2 = 0$. Bu isə $x_1 \neq x_2$ olmasına ziddir. Ona görə də, $Ax_1 \neq Ax_2$ olmalıdır.

Kafilik. Tutaq ki, A operatoru X fəzasında qarşılıqlı birqiymətli təsir edir. $\forall y \in X$ götürək. Onda, elə $x \in X$ elementi var ki, $Ax = y$. Götürdüyümüz bu y elementinə x elementini qarşı qoyan operatoru A^{-1} ilə işarə edək. Onda $A^{-1}y = x$. Yoxlamaq olar ki, A^{-1} operatoru X fəzasında təyin edilmiş xətti operatorudur və $A^{-1}y = A^{-1}(Ax) = (A^{-1}A)x = x$. Tərifə görə A^{-1} operatoru A operatorunun tərsidir.

Tutaq ki, X n ölçülü xətti fəzadır. $A \in L(X)$ götürək və aşağıdakı iki çoxluğu təyin edək:

$$\ker A = \{x \mid Ax = 0, x \in X\}$$

$$\operatorname{im} A = \{y \mid y = Ax, x \in X\}$$

$\ker A$ çoxluğuna A operatorunun nüvəsi, $\operatorname{im} A$ çoxluğuna isə obrazı deyilir. Asanlıqla yoxlamaq olar ki, A operatorunun həm nüvəsi, həm də obrazı X fəzasının alt fəzalarıdır.

Bu alt fəzaların ölçüləri arasındakı əlaqəni göstərən aşağıdakı teoremləri isbat edək.

Teorem1. n ölçülü X xətti fəzasında təsir edən A xətti operatorunun nüvəsinin ölçüsü ilə obrazının ölçüsü cəmi X fəzasının ölçüsünə bərabərdir. Yəni,

$$\dim(\ker A) + \dim(imA) = \dim X .$$

İsbatı. Tutaq ki, $\dim(\ker A) = k$. A operatorunun nüvəsində hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_k$ bazisi götürək və bu bazisi $e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_n$ vektorları ilə X xətti fəzasında bazisə qədər tamalayaq. Aydınır ki, $Ae_{k+1}, Ae_{k+2}, \dots, Ae_n$ vektorları A operatorunun obrazına daxildir. Bu vektorların sayı $n - k$ -ya bərabər olduğuna görə, teoremi isbat etmək üçün onların imA -da bazis əmələ gətirdiyini göstərmək kifayətdir. Əvvəlcə bu vektorların xətti asılı olmadığını göstərək. Onların sıfıra bərabər xətti kombinasiyasını götürək:

$$c_{k+1}Ae_{k+1} + c_{k+2}Ae_{k+2} + \dots + c_nAe_n = 0,$$

A xətti operator olduğundan

$$A(c_{k+1}e_{k+1} + c_{k+2}e_{k+2} + \dots + c_ne_n) = 0.$$

Sonuncu bərabərlikdən görünür ki, $c_{k+1}e_{k+1} + c_{k+2}e_{k+2} + \dots + c_ne_n \in \ker A$. Ona görə də, həmin vektoru $e_1, e_2, \dots, e_k$ bazis vektorlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərmək olur. Lakin $e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorları X fəzasında bazis əmələ gətirdiyindən bu xətti kombinasiyanın bütün əmsalları sıfıra bərabər olmalıdır. O cümlədən, $c_{k+1} = 0, c_{k+2} = 0, \dots, c_n = 0$ olmalıdır. Beləliklə, $Ae_{k+1}, Ae_{k+2}, \dots, Ae_n$ vektorları xətti asılı deyil.

$\forall y \in imA$ götürək. Onda, elə $x \in X$ vektoru var ki, $y = Ax$. x vektorunun bazisə görə ayrılışını yazıb bərabərliyin hər iki tərəfinə A operatoru ilə təsir etsək:

$$x = c_1e_1 + \dots + c_ke_k + c_{k+1}e_{k+1} + \dots + c_ne_n,$$

$$y = Ax = c_{k+1}Ae_{k+1} + \dots + c_nAe_n$$

bərabərliyini alırıq. Bu göstərir ki, obrazdan götürülmüş $\forall y$ vektorunu

$Ae_{k+1}, Ae_{k+2}, \dots, Ae_n$ vektorlarının xətti kombinasiyası şəklində göstərmək olar. Ona görə, də bu vektorlar A operatorunun obrazında bazis əmələ gətirir. Bazis vektorların sayı xətti fəzanın ölçüsünə bərabər olduğundan obrazın ölçüsü $n - k$ -ya bərabərdir.

Teorem2. Tutaq ki, X n ölçülü xətti fəza, L_1 və L_2 isə onun alt fəzalarıdır. Belə ki, $\dim L_1 + \dim L_2 = n$. Onda elə $A \in L(X)$ operatoru var ki, L_1 bu operatorun nüvəsi, L_2 isə onun obrazıdır.

İsbatı. Tutaq ki, $\dim L_1 = k$. Onda, $\dim L_2 = n - k$ olar. L_1 alt fəzasında hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_k$ bazisi götürək və bu bazisi X fəzasında bazisə qədər tamamlayaq:

$$e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_n.$$

Sonra isə L_2 alt fəzasında hər hansı $g_{k+1}, g_{k+2}, \dots, g_n$ bazisi götürərək, aşağıdakı qaydada A operatoru təyin edək:

$$Ae_1 = 0, Ae_2 = 0, \dots, Ae_n = 0$$

$$Ae_{k+1} = g_{k+1}, \dots, Ae_n = g_n$$

X fəzasının ixtiyari $x = c_1e_1 + \dots + c_ke_k + c_{k+1}e_{k+1} + \dots + c_ne_n$ vektoru üçün,

$$Ax = \alpha_{k+1}g_{k+1} + \dots + \alpha_n g_n.$$

Asanlıqla yoxlamaq olar ki, bu qaydada təyin olunmuş A operatoru xətti operatorudur. Aydındır ki, L_1 bu operatorun nüvəsi, L_2 isə onun obrazıdır.

Bu teoremlərdən aşağıdakı nəticələr çıxır:

1. A operatorunun tərsinin olması üçün zəruri və kafi şərt $\ker\{A\}=0, imA = X$ olmasıdır.
2. A operatorunun tərsinin olması üçün zəruri və kafi şərt $\dim(\ker A) = 0, \dim(imA) = n$ olmasıdır.

11. XƏTTİ OPERATORUN MATRİSİ

Tutaq ki, X n ölçülü xətti fəza, $A \in L(X)$ isə bu fəzada təsir edən operatorudur. X fəzasında hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisi götürək. Onda $\forall x \in X$ vektoru üçün bazisə görə aşağıdakı

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \quad (1)$$

ayrılığı yazı bilərik. Bu bərabərliyin hər iki tərəfinə A operatoru ilə təsir etsək,

$$Ax = \sum_{i=1}^n \alpha_i Ae_i \quad (2)$$

olar. Ae_i elementlərinin hər biri X fəzasına daxil olduğundan onların da götürdüyümüz bazisə görə ayrılığını yazı bilərik:

$$Ae_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

Bu ayrılışın əmsallarından düzəldilmiş $A_1 = (a_{ij})_{i=1, n}^{j=1, n}$ matrisinə A xətti operatorunun $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində matrisi deyilir. Əgər xüsusi halda A operatoru sıfır operator olarsa, onda A_1 n tərtibli sıfır matris, vahid operator olarsa, n tərtibli vahid matris olur.

(3) ayrılışlarını (2)-də nəzərə alsaq, aşağıdakı bərabərliyi yazı bilərik:

$$Ax = \sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i a_{ij} \right) e_j \quad (4)$$

$$y = Ax$$

işarə etsək, y elementinin $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində koordinatları $y = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$

olar belə ki, $\beta_j = \sum_{i=1}^n \alpha_i a_{ij}$ $j = 1, 2, \dots, n$. Beləliklə biz n ölçülü xətti fəzada təsir edən hər bir A xətti operatoruna qarşı müəyyən bir A_1 n tərtibli matrisini qarşı qoymuş

olduq. İndi isə fərz edək ki, hər hansı $A_1 = (a_{ij})_{\substack{i=1,n \\ j=1,n}}$ matrisi və $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisi

vardır. Göstərək ki, onda X fəzasında təsir edən elə yeganə A xətti operatoru var ki, onun bu bazisdə matrisi A_1 –dir. Bunun üçün A operatorunu bazis vektorlar üzərində (3) bərabərliyi ilə, (1) bərabərliyi ilə təyin olunan $\forall x$ vektoru üzərində isə (4) bərabərliyi ilə təyin edək. Bu qayda ilə təyin olunan A operatoru xətti operatorudur və asanlıqla göstərmək olar ki, onun $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində matrisi A_1 –dir. Bu operatorun yeganəliyi isə bazisə görə ayrılışın yeganə olmasından alınır. Beləliklə, biz n ölçülü xətti fəzada təsir edən xətti operatorlar çoxluğu ilə n tərtibli matrislər çoxluğu arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq yaratmış olduq.

İndi isə xətti operatorun müxtəlif bazisdəki matrisləri arasında əlaqəni tapaq. Bunun üçün X fəzasında iki müxtəlif $e_1, e_2, \dots, e_n$ və $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_n$ bazislərini götürək. A xətti operatorunun birinci bazisdəki matrisini $A_1 = (a_{ij})_{\substack{i=1,n \\ j=1,n}}$, ikinci

bazisdəki matrisini $\tilde{A}_1 = (\tilde{a}_{ij})_{\substack{i=1,n \\ j=1,n}}$ işarə edək. Onda

$$Ae_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j \quad (3) \quad \text{və} \quad \tilde{A}e_i = \sum_{j=1}^n \tilde{a}_{ij} \tilde{e}_j \quad (5)$$

birinci bazisdən ikinci bazisə keçid matrisini $(U_{ij})_{\substack{i=1,n \\ j=1,n}}$ ilə işarə edək. Onda

$$\tilde{e}_i = \sum_{j=1}^n U_{ij} e_j \quad (i = \overline{1, n}). \quad (6)$$

(6) bərabərliyinin hər iki tərəfinə A operatoru ilə təsir edək və (3) bərabərliyini nəzərə alaraq, onda

$$A\tilde{e}_i = \sum_{j=1}^n U_{ij} Ae_j = \sum_{j=1}^n U_{ij} \sum_{k=1}^n a_{jk} e_k = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n U_{ij} a_{jk} \right) e_k. \quad (7)$$

(6) ayrılışlarını (5)-də nəzərə alsaq,

$$A\tilde{e}_i = \sum_{j=1}^n \tilde{a}_{ij} \tilde{e}_j = \sum_{j=1}^n \tilde{a}_{ij} \sum_{k=1}^n U_{jk} e_k = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \tilde{a}_{ij} U_{jk} \right) e_k \quad (8)$$

(7) və (8) bərabərliklərinin sol tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Ona görə də, onların sağ tərəflərini müqayisə etsək və matrislərin vurulma qaydasını yada salsaq, aşağıdakı bərabərliyi yazı bilərik:

$$UA_1 = \tilde{A}_1 U.$$

Buradan alırıq ki,

$$A_1 = U^{-1} \tilde{A}_1 U \quad \text{və ya} \quad \tilde{A}_1 = U A_1 U^{-1} \quad (9)$$

(9) bərabərlikləri A xətti operatorunun götürdüyümüz iki müxtəlif bazisdəki matrisləri arasındakı əlaqəni göstərir.

Tutaq ki, A_1 və B_1 n tərtibli matrislərdir. X xətti fəzasında hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisi götürək. Tutaq ki, A_1 matrisinə A operatoru, B_1 matrisinə isə B

(9) bərabərliklərindən istifadə etsək, X fəzasında götürülmüş $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_n$ bazisində A və B operatorlarının matrislərini A_i və B_i ilə işarə etsək, onda

$$A_1 + \lambda B_1 = U^{-1}(\tilde{A}_1 + \lambda \tilde{B}_1)U.$$
$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$
$$\det(A - \lambda E) = \sum_{k=0}^n d_k \lambda_k .$$
$$trA = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

$\det(A - \lambda E) = 0$ tənliyinə A operatorunun xarakteristik tənliyi deyilir.

$$\text{rang} AB \leq \text{rang} A, \quad \text{rang} AB \leq \text{rang} B$$

İsbatı. Birinci bərabərsizliyi isbat etmək üçün, qeyd edək ki, $im(AB) \subseteq imA$. Ona görə də, $\dim(imAB) \leq \dim(imA)$. Yəni, $rangAB \leq rangA$.

İndi isə ikinci bərabərsizliyi isbat edək. Aydındır ki, $\ker B \subseteq \ker(AB)$. Ona görə də, $\dim(\ker B) \leq \dim(\ker(AB))$. Bu bərabərliyin hər iki tərəfini (-1) -ə vurub, alınan bərabərsizliyin hər iki tərəfinə n əlavə etsək ($n = \dim X$), aşağıdakı bərabərsizliyi alırıq:

$$\dim X - \dim(\ker AB) \leq \dim X - \dim(imX).$$

Teorem 1-ə görə sonuncu bərabərsizlikdən alırıq ki,

$$\dim(im(AB)) \leq \dim(imB)$$

Bu isə ikinci bərabərsizliyin isbatı deməkdir.

İsbatsız olaraq aşağıdakı teoremi qeyd edək.

Teorem 2. Əgər $A, B \in L(X)$ olarsa, onda

$$rang(AB) \geq rang(A) + rang(B) - n$$

Qeyd etdiyimiz bu iki teoremdən aşağıdakı nəticə çıxır:

Nəticə. Əgər $rangA = n$ olarsa, onda $rang(AB) = rangB = rang(BA)$.

Başqa sözlə desək, A operatorunun ranqı fəzanın ölçüsünə bərabər olarsa, onda AB hasilinin ranqı B operatorların ranqına bərabərdir.

Göstərək ki, xətti operatorun ranqı onun hər hansı bazisdəki matrisinin ranqına bərabərdir. Tutaq ki, A operatorunun $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində matrisi $(a_{ij})_{\substack{i=\overline{1,n} \\ j=\overline{1,n}}}$ -dir.

Onda

$$Ae_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}e_j$$

$g_i = Ae_i$ işarə etsək, $g_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}e_j$ olar.

Aydındır ki, A operatorunun obrazı $g_1, g_2, \dots, g_n$ vektorlarının xətti örtüyü ilə üst-üstə düşür. Bildiyimiz kimi xətti örtüyün ölçüsü xətti asılı olmayan vektorların maksimal sayına bərabərdir. Sonuncu bərabərlik göstərir ki, xətti asılı olmayan vektorların sayı a_{ij} matrisinin ranqına bərabərdir.

12. XƏTTİ OPERATORUN MƏXSUSİ ƏDƏDİ VƏ MƏXSUSİ VEKTOR

Tutaq ki, X n ölçülü xətti fəza, A isə bu fəzada təsir edən xətti operatorudur. $L \subseteq X$ alt fəzasını götürək.

Tərif 1. Əgər $\forall x \in X$ üçün $Ax \in L$ olarsa, onda L – A operatorunun invariant alt fəzası deyilir.

Invariant alt fəzaya ən sadə misal olaraq A operatorunun nüvəsini və obrazını misal göstərmək olar.

Tərif 2. Əgər λ ədədi üçün sıfırdan fərqli elə $x \in X$ vektoru varsa ki,

$$Ax = \lambda \cdot x$$

bərabərliyi ödənsin, onda λ -ya A operatorunun məxsusi ədədi, x -ə isə bu məxsusi ədədə uyğun məxsusi vektoru deyilir.

Eyni bir λ ədədinə uyğun iki məxsusi vektorların cəmi və sıfırdan fərqli ixtiyari ədədə hasili də λ -ya uyğun məxsusi vektordur. Ona görə də, eyni bir məxsusi ədədinə uyğun məxsusi vektorların xətti örtüyü də A operatoru üçün invariant alt fəzadır.

Teorem 1. λ ədədinin $A \in L(X)$ operatorunun məxsusi ədədi olması üçün zəruri və kafi şərt λ -nın xarakteristik çoxhədlinin kökü olmasıdır.

İsbatı. Zərurilik. Tutaq ki, λ $A \in L(X)$ operatorunun məxsusi ədədidir. Onda sıfırdan fərqli elə $x \in X$ vektoru var ki, $Ax = \lambda x$. Buradan alırıq ki, $(A - \lambda I)x = 0$. Yəni, $A - \lambda I$ operatorunun nüvəsində sıfırdan fərqli vektor var. Ona görə də, $\dim(\ker(A - \lambda I)) \geq 1$. Xətti operatorun obrazı və nüvəsinin ölçüləri haqqındakı teoremə görə deyə bilərik ki, $\dim(\operatorname{im}(A - \lambda I)) < n$. Bu isə o deməkdir ki, $A - \lambda I$ operatorunun ranqı n -dən kiçikdir: $\operatorname{rang}(A - \lambda I) < n$. A xətti operatorunun ranqı onun hər hansı bazisdəki matrisinin ranqına bərabər olduğundan sonuncu bərabərsizlikdən alırıq ki, $\det(A - \lambda I) = 0$. Yəni, λ xarakteristik çoxhədlinin köküdür.

Kafilik. Tutaq ki, λ xarakteristik çoxhədlinin köküdür. Onda $\det(A - \lambda I) = 0$. Bu, o deməkdir ki, A operatorunun matrisinin ranqı n -dən kiçikdir. Ona görə A operatorunun obrazının ölçüsü də n -dən kiçik olar. Obraz və nüvənin ölçüsü haqqında teoremə görə A operatorunun nüvəsinin ölçüsü 1-dən kiçik deyil. Yəni, $\dim(\ker A) \geq 1$. Deməli, A operatorunun nüvəsində sıfırdan fərqli heç olmazsa bir x elementi var. Onda $(A - \lambda I)x = 0$ və ya $Ax = \lambda x$. Yəni, x A operatorunun λ məxsusi ədədinə uyğun məxsusi vektorudur. Ona görə də, xarakteristik çoxhədlinin hər bir kökü A operatorunun məxsusi ədədidir.

Qeyd edək ki, xətti operatorun məxsusi ədədi haqqında isbat etdiyimiz bu teorem kompleks xətti fəzalarda doğrudur. Həqiqi xətti fəzalarda isə xarakteristik çoxhədlinin hər bir kökünün məxsusi ədəd olduğunu ümumiyyətlə demək olmaz.

Teorem(Cəbrin əsas teoremi)2. Dərəcəsi birdən kiçik olmayan həqiqi və ya kompleks əmsallı hər bir çoxhədlinin kompleks ədədlər çoxluğunda heç olmazsa bir kökü var.

Bu teorem cəbrin əsas teoremi adlanır və onun isbatı kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsində veriləcəkdir.

Xətti operatorun xarakteristik çoxhədlisinə bu teoremi tətbiq etsək, deyə bilərik ki, n ölçülü kompleks xətti fəzada təsir edən hər bir xətti operatorun heç olmazsa bir məxsusi ədədi var.

Teorem3. A xətti operatorunun verilmiş bazisdə matrisinin diaqonal şəklində olması üçün zəruri və kafi şərt bazis vektorların A operatorun məxsusi vektorları olmasıdır.

İsbatı. Zərurilik. Tutaq ki, $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində A xətti operatorunun matrisi diaqonal şəklindədir:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Onda aydındır ki,

$$Ae_1 = \lambda_1 e_1$$

$$Ae_2 = \lambda_2 e_2$$

.....

$$Ae_n = \lambda_n e_n$$

Buradan görünür ki, $e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorları $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ məxsusi ədədlərinə uyğun məxsusi vektorlardır.

Kafilik. Tutaq ki, $e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorları $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ məxsusi ədədlərinə uyğun məxsusi vektorlardır. Onda

$$Ae_1 = \lambda_1 e_1 + 0e_2 + \dots + 0e_n$$

$$Ae_2 = 0e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + 0e_n$$

.....

$$Ae_n = 0e_1 + 0e_2 + \dots + \lambda_n e_n$$

yaza bilərik. Bu ayrılışın əmsallarından matris düzəltsek onun diaqonal şəklində olduğunu görürük.

Teorem4. A xətti operatorunun müxtəlif məxsusi ədədlərinə uyğun məxsusi vektorları xətti asılı deyil.

İsbatı. Tutaq ki, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ A operatorunun müxtəlif məxsusi ədədləridir. Bu məxsusi ədədlərə uyğun məxsusi vektorları $e_1, e_2, \dots, e_k$ ilə işarə edək. Teoremi riyazi induksiya metodu ilə isbat edək.

$k=1$ olduqda, $Ae_1 = \lambda_1 e_1, e_1 \neq 0$ olduğu üçün e_1 vektoru xətti asılı deyil.

Tutaq ki, $k=m$ olduqda $e_1, e_2, \dots, e_m$ vektorları xətti asılı deyil. $k=m+1$ üçün $e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}$ vektorunun xətti asılı olmadığını göstərək. Bu vektorun sıfıra bərabər olan xətti kombinasiyasına baxaq:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m + \alpha_{m+1} e_{m+1} = 0 \quad (1)$$

(1) bərabərliyinin hər iki tərəfinə A operatoru ilə təsir edib, $e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}$ vektorlarının məxsusi vektorlar olduğunu nəzərə alaraq,

$$\alpha_1 \lambda_1 e_1 + \alpha_2 \lambda_2 e_2 + \dots + \alpha_m \lambda_m e_m + \alpha_{m+1} \lambda_{m+1} e_{m+1} = 0 \quad (2)$$

yaza bilərik. (1) bərabərliyinin hər iki tərəfini λ_{m+1} -ə vurub (2) bərabərliyindən çıxaraq ($\lambda_{m+1} \neq 0$ olduqda), aşağıdakı bərabərliyi alarıq:

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{m+1}) e_1 + \alpha_2 (\lambda_2 - \lambda_{m+1}) e_2 + \dots + \alpha_m (\lambda_m - \lambda_{m+1}) e_m = 0.$$

$e_1, e_2, \dots, e_n$ vektorları xətti asılı olmadığından bu bərabərliyin əmsalları sıfıra bərabər olmalıdır:

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_{m+1}) = 0$$

$$\alpha_2(\lambda_2 - \lambda_{m+1}) = 0$$

.....

$$\alpha_m(\lambda_m - \lambda_{m+1}) = 0$$

Məxsusi ədədlər müxtəlif olduğundan bu bərabərliklərdən alırıq ki,

$$\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_m = 0.$$

Bunları (1)-də yerinə yazsaq, $\alpha_{m+1}e_{m+1} = 0$ alırıq. Buradan $\lambda_{m+1} = 0$ olur. Beləliklə (1) bərabərliyindəki bütün əmsalların sıfıra bərabər olduğunu göstərdik.

Bu teoremdən belə bir nəticə çıxır ki, əgər A xətti operatorunun bütün məxsusi ədədləri müxtəlifdirsə, onda bu məxsusi ədədlərə uyğun məxsusi vektorlar bazis əmələ gətirir. Ona görə də, həmin bazisdə xətti operatorun matrisi diaqonal şəklində olur.

XƏTTİ VƏ BİXƏTTİ FORMALAR

Tutaq ki, X kompleks (həqiqi) xətti fəza, Y isə kompleks (həqiqi) ədədlər çoxluğudur. X fəzasından Y çoxluğuna təsir edən xətti operatora xətti forma və ya xətti funksional deyilir.

Tutaq ki, X kompleks Evklid fəzası, $Y = C$ - kompleks ədədlər çoxluğudur.

Teorem1. X fəzasından C çoxluğuna təsir edən hər bir $f(x)$ xətti funksionalı üçün elə yeganə $h \in X$ elementi var ki, $f(x) = (x, h)$, burada (x, h) , X fəzasında skalyar hasildir.

İsbatı1. X fəzasında hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisi götürək. Onda $\forall x \in X$ üçün

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n \quad (1)$$

ayrılışını yazmaq olar. f xətti funksional olduğundan

$$f(x) = \alpha_1 f(e_1) + \alpha_2 f(e_2) + \dots + \alpha_n f(e_n) \quad (2)$$

$h = (\overline{f(e_1)}, \dots, \overline{f(e_n)})$ işarə edək, burada $\overline{f(e_i)}$, $f(e_i)$ kompleks ədədinin qoşmasıdır. Kompleks Evklid fəzasında ortonormal bazisin xassəsindən istifadə etsək və $h = \overline{f(e_1)}e_1 + \overline{f(e_2)}e_2 + \dots + \overline{f(e_n)}e_n$ olduğunu nəzərə alsaq (2) bərabərliyini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:

$$f(x) = (\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n, \overline{f(e_1)}e_1 + \overline{f(e_2)}e_2 + \dots + \overline{f(e_n)}e_n) = (x, h) \quad (3)$$

Göstərək ki, $f(x) = (x, h)$ bərabərliyini ödəyən bu $h \in X$ elementi yeganədir.

Tutaq ki, elə $h_1 \in X$ elementi də var ki, $f(x) = (x, h_1)$. Onda, son iki bərabərlikdən alırıq ki, $(x, h - h_1) = 0, \forall x \in X$. $x = h - h_1$ götürsək, onda $(h - h_1, h - h_1) = 0$ olar. Buradan isə skalyar hasilin tərifinə görə, $h = h_1$ alırıq.

Bu teorem Riss teoremi adlanır. Çox vaxt ona, n ölçülü kompleks Evklid fəzasında xətti funksionalın ümumi şəkili haqqında teorem də deyilir.

Qeyd edək ki, bu teorem X -həqiqi Evklid fəzası, Y isə həqiqi ədədlər çoxluğu olduqda da doğrudur.

Tutaq ki, X kompleks xətti fəza, $A(x, y)$ isə X fəzasından götürülmüş hər bir x və y -ə bir kompleks ədədi qarşı qoyan funksiya (inikasdır). $A(x, y)$ aşağıdakı şərtləri ödədikdə II növ bixətti forma adlanır:

1. $A(x + y, z) = A(x, z) + A(y, z)$
2. $A(x, y + z) = A(x, y) + A(x, z)$
3. $A(\lambda x, y) = \lambda A(x, y)$
4. $A(x, \lambda y) = \lambda A(x, y)$

Əgər X həqiqi xətti fəza, $A(x, y)$ isə həqiqi qiymətlidirsə, onda bu 4 şərti ödəyən funksiya I növ bixətti forma adlanır. Biz hələlik II növ bixətti formaları öyrənəcəyik.

Teorem 2. n ölçülü kompleks Evklid fəzasında təyin olunmuş II növ $A(x, y)$ bixətti forması üçün elə $A \in L(X)$ operatoru var ki,

$$A(x, y) = (x, Ay) \quad (4)$$

İsbatı. Aydındır ki, hər bir qeyd olunmuş y elementi üçün $A(x, y)$ x -ə nəzərən xətti formadır. Onda Riss teoreminə görə, elə yeganə h elementi var ki,

$$A(x, y) = (x, h)$$

Bu y elementinə h elementini qarşı qoyan operatoru A ilə işarə edək: $Ay = h$. Onda $A(x, y) = (x, Ay)$. Asanlıqla yoxlamaq olar ki, A xətti operatorudur. Göstərək ki, (4) bərabərliyini ödəyən A operatoru yeganədir. Tutaq ki, ikinci bir A_1 xətti operatoru da var ki, $A(x, y) = (x, A_1 y)$. Bunu (4)-də nəzərə alsaq:

$$(x, A_1 y - Ay) = 0 \quad \forall x, y \in X.$$

$$x = A_1 y - Ay \text{ götürsək, } (A_1 y - Ay, A_1 y - Ay) = 0 \quad \forall x, y \in X.$$

Skalyar hasilin dördüncü xassəsinə görə alırıq ki, $A_1 y = Ay$ və ya $A_1 = A$.

Bu teoremdən aşağıdakı nəticə çıxır.

Nəticə. Hər bir II növ $A(x, y)$ bixətti forması üçün elə $A \in L(X)$ operatoru var ki, $A(x, y) = (Ax, y)$.

Bu bərabərliyi isbat etmək üçün $B_1(y, x) = \overline{A(x, y)}$ işarə edək. Asanlıqla görmək olar ki, $B_1(y, x)$ II növ bixətti formadır və isbat etdiyimiz Teorem 2-yə görə elə A xətti operatoru var ki, $B_1(y, x) = (x, Ay)$. Ona görə də, $A(x, y) = \overline{B_1(y, x)} = \overline{(x, Ay)} = (Ay, x)$.

X fəzasında hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisi götürək. Onda ixtiyari $x, y \in X$ vektorları üçün

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n \beta_j e_j$$

ayrılışlarını yazmaq olar. $A(x, y)$ bixətti formasının bu vektorlarda qiymətini tapaq:

$$A(x, y) = A\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \sum_{j=1}^n \beta_j e_j\right) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \overline{\beta_j} A(e_i, e_j).$$

$a_{ij} = A(e_i, e_j), \quad (i, j = \overline{1, n})$ ədədlərindən düzəldilmiş $(a_{ij})_{\substack{i=\overline{1, n}, \\ j=\overline{1, n}}}$ matrisinə $A(x, y)$

bixətti formasının $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində matrisi deyilir. Biz yuxarıda isbat etdik ki, hər bir II növ bixətt forma üçün elə $A \in L(X)$ operatoru var ki, $A(x, y) = (Ax, y)$. Tutaq ki, $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisdir. Bu bazisdə A xətti operatorunun matrisini $(b_{ij})_{\substack{i=\overline{1, n}, \\ j=\overline{1, n}}}$ ilə işarə edək. Bu o deməkdir ki, $Ae_i = b_{i1}e_1 + \dots + b_{in}e_n$. $A(x, y)$

bixətt formasının matrisi ilə A xətti operatorunun matrisi arasında əlaqəni tapaq:

$$a_{ij} = A(e_i, e_j) = (Ae_i, e_j) = \left(\sum_{k=1}^n b_{ik} e_k, e_j \right) = \sum_{k=1}^n b_{ik} (e_k, e_j) = b_{ij}$$

Beləliklə $a_{ij} = b_{ij} \quad (i, j = \overline{1, n})$. Eyni qayda ilə göstərmək olar ki, $A(x, y) = (x, Ay)$ şərtini ödəyən A xətti operatorunun matrisi ilə $A(x, y)$ bixətti formasının matrisi arasında aşağıdakı əlaqə var:

$$a_{ij} = A(e_i, e_j) = (e_i, Ae_j) = \left(e_i, \sum_{k=1}^n b_{jk} e_k \right) = \sum_{k=1}^n \overline{b_{jk}} (e_i, e_k) = \overline{b_{ji}}$$

Qeyd edək ki, bu əlaqə $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazis olduqda bu şəkildədir. Ortonormal olmayan bazisdə bu əlaqə daha mürəkkəb şəkildə ifadə olunur.

13. QOŞMA OPERATOR VƏ XASSƏLƏRİ

Tutaq ki, X n ölçülü kompleks Evklid fəzası, A isə bu fəzaya təsir edən xətti operatorudur. Əgər $\exists A^* \in L(X)$ operatoru varsa ki, $\forall x, y \in X$ üçün

$$(Ax, y) = (x, A^* y) \quad (1)$$

bərabərliyi ödənilsin, onda A^* operatoruna A operatorunun qoşması deyilir. Göstərək ki, $A \in L(X)$ operatorunun qoşması da (əgər varsa) xətti operatorudur. $\forall x, y \in X$ və $\forall \alpha, \beta$ kompleks ədədləri götürək. Onda $\forall z \in X$ üçün

$$\begin{aligned} (Az, (\alpha x + \beta y)) &= (Az, \alpha x) + (Az, \beta y) = \overline{\alpha} (Az, x) + \overline{\beta} (Az, y) = \overline{\alpha} (z, A^* x) + \\ &+ \overline{\beta} (z, A^* y) = (z, \alpha A^* x) + (z, \beta A^* y) = (z, \alpha A^* x + \beta A^* y) \end{aligned} \quad (2)$$

yaza bilərik. Digər tərəfdən,

$$(z, A^* (\alpha x + \beta y)) = (z, \alpha A^* x + \beta A^* y) \quad (3)$$

(2) və (3)-dən alırıq ki,

$$A^* (\alpha x + \beta y) = \alpha A^* x + \beta A^* y.$$

Bu isə A^* -un xətti operator olması deməkdir.

İndi isə göstərək ki, hər bir $A \in L(X)$ operatorunun yeganə qoşması var.

Tutaq ki, $A \in L(X)$. Onda skalyar hasilin xassələrindən istifadə etməklə asanlıqla yoxlamaq olar ki, $A(x, y)$ II növ bixətti formadır. Onda isbat etdiyimiz teoremə görə $\exists A^* \in L(X)$ operatoru var ki,

$$(Ax, y) = (x, A^* y)$$

Ona görə də, A^* operatoru A operatorunun qoşnasıdır. Qoşma operatorun aşağıdakı xassələri var:

1. $(I)^* = I$
2. $(\lambda A)^* = \bar{\lambda} A^*$
3. $(A + B)^* = A^* + B^*$
4. $(A^*)^* = A$
5. $(AB)^* = B^* A^*$

Bu xassələr qoşma operatorun tərifindən istifadə etməklə isbat olunur. Məsələn, 5-ci xassəni isbat edək:

$$((AB)x, y) = (A(Bx), y) = (Bx, A^* y) = (x, B^* A^* y) = (x, (B^* A^*) y), \quad \forall x, y \in X.$$

Qoşma operatorun tərifinə görə, $(AB)^* = B^* A^*$.

Əgər xüsusi halda $A = A^*$ olarsa, onda A öz-özünə qoşma operator adlanır. Öz-özünə qoşma operatorun köməylə hər bir A xətti operatoru üçün xüsusi şəkilli ayrılış yazmaq mümkündür. Tutaq ki, $A \in L(X)$. Aşağıdakı iki operatoru təyin edək:

$$A_R = \frac{A + A^*}{2}, \quad A_I = \frac{A - A^*}{2i}$$

Asanlıqla göstərmək olar ki, bu operatorların hər biri öz-özünə qoşmadır və $A = A_R + iA_I$, burada A_R və A_I uyğun olaraq A operatorunun həqiqi və xəyali hissələridir.

Teorem 1. Tutaq ki, A və B öz-özünə qoşma operatorlardır. Onda AB hasilinin öz-özünə qoşma olması üçün zəruri və kafi şərt $AB = BA$ olmasıdır.

İsbatı. Zərurilik. Tutaq ki, AB öz-özünə qoşma operatorudur: $(AB)^* = AB$. Onda $AB = (AB)^* = B^* A^* = BA$.

Kafilik. Tutaq ki, $AB = BA$. Onda $(AB)^* = (BA)^* = A^* B^* = AB$. Yəni, AB öz-özünə qoşmadır.

Teorem 2. Əgər A öz-özünə qoşma operator olarsa, onda $\forall x \in X$ üçün (Ax, x) həqiqi ədəddir.

İsbatı. A öz-özünə qoşma operator olduğundan, $\forall x, y \in X$ üçün $(Ax, y) = (x, Ay) = \overline{(Ay, x)}$. Bu bərabərlikdə $x = y$ götürsək, $(Ax, x) = \overline{(Ax, x)}$. Bu isə o deməkdir ki, (Ax, x) həqiqi ədəddir.

Teorem 3. Öz-özünə qoşma operatorun bütün məxsusi ədədləri həqiqidir.

İsbatı. Tutaq ki, $A = A^*$ və λ , A operatorunun məxsusi ədədidir. Onda $\exists x \neq 0$ var ki, $Ax = \lambda x$. Buradan alırıq ki, $(Ax, x) = (\lambda x, x) = \lambda (x, x)$.

$$x \neq 0 \text{ olduğundan } \lambda = \frac{(Ax, x)}{(x, x)}$$

Bu kəsrin həm sürəti, həm də məxrəci həqiqi ədəd olduğundan λ da həqiqidir.

Teorem4. Öz-özünə qoşma operatorun müxtəlif məxsusi ədədlərinə uyğun məxsusi vektorları ortoqonaldır.

İsbatı. Tutaq ki, λ_1 və λ_2 A operatorunun müxtəlif məxsusi ədədləridir. Onda $\exists x_1 \neq 0, x_2 \neq 0$ vektorları var ki, $Ax_1 = \lambda_1 x_1$, $Ax_2 = \lambda_2 x_2$. Buradan alırıq ki,

$$(Ax_1, x_2) = (\lambda_1 x_1, x_2) = \lambda_1 (x_1, x_2)$$

$$(x_1, Ax_2) = (x_1, \lambda_2 x_2) = \lambda_2 (x_1, x_2)$$

Bu iki bərabərlikdən alırıq ki, $(\lambda_1 - \lambda_2)(x_1, x_2) = 0$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ olduğu üçün $(x_1, x_2) = 0$. Bu isə x_1 və x_2 vektorlarının ortoqonal olması deməkdir.

XƏTTİ OPERATORUN NORMASI

Tutaq ki, X xətti fəza, A isə bu fəzada təsir edən xətti operatorudur. Aşağıdakı qaydada təyin olunan ədədə A operatorunun norması deyilir.

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \quad (1)$$

Yoxlamaq olar ki, bu qayda normanın bütün xassələrini ödəyir.

Göstərək ki, $\forall x \in X$ üçün

$$\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\| \quad (2)$$

Doğrudan da $Ax = \left(A \frac{x}{\|x\|} \right) \|x\|$ yazsaq, $\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = 1$ olduğundan alırıq ki,

$$\|Ax\| \leq \sup_{\|z\|=1} \|Az\| \cdot \|x\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

İndi isə fərz edək ki, X n ölçülü kompleks Evklid fəzasıdır.

Teorem1. Əgər A , X fəzasında təsir edən öz-özünə qoşma xətti operatordursa, onda

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|. \quad (3)$$

İsbatı. Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyindən istifadə etsək, aşağıdakı bərabərsizliyi yazı bilərik

$$\forall x \in X, |(Ax, x)| \leq \|Ax\| \cdot \|x\| \leq \|A\| \cdot \|x\|^2.$$

Buradan, $\left| \left(A \frac{x}{\|x\|}, \frac{x}{\|x\|} \right) \right| \leq \|A\|$ alırıq. Ona görə də, $\sup_{\|z\|=1} |(Az, z)| \leq \|A\|$ olur.

$\mu = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$ işarə edək. Onda sonuncu bərabərlikdən görünür ki,

$$\mu \leq \|A\| \quad (4)$$

Digər tərəfdən, yuxarıda göstərdiyimiz kimi,

$$\forall z \in X, |(Az, z)| \leq \left| \left(A \frac{z}{\|z\|}, \frac{z}{\|z\|} \right) \right| \|z\|^2 \leq \mu \|z\|^2 \quad (5)$$

Aşağıdakı bərabərsizliyə baxaq:

$$\begin{aligned} 4 \operatorname{Re}(Ax, y) &= |(A(x+y), (x+y)) - (A(x-y), (x-y))| \leq \\ &\leq \mu (\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) = 2\mu (\|x\|^2 + \|y\|^2) \end{aligned}$$

Tutaq ki, $\|x\| = \|y\| = 1$. Onda aşağıdakı bərabərliyi yazı bilərik:

$$4\operatorname{Re}(Ax, y) \leq 4\mu, \quad \operatorname{Re}(Ax, y) \leq \mu \quad (6)$$

$y = \frac{Ax}{\|Ax\|}$ götürək. Bunu (6)-da nəzərə alsaq,

$$\left| \operatorname{Re} \left(Ax, \frac{Ax}{\|Ax\|} \right) \right| \leq \mu, \quad \|Ax\| \leq \mu, \quad \|x\| = 1, \quad \forall x \in X$$

Bu o deməkdir ki, $\sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \leq \mu$. Buradan,

$$\|A\| \leq \mu \quad (7)$$

(4) və (7) bərabərliklərindən çıxır ki, $\mu = \|A\|$ və $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$.

Beləliklə öz-özünə qoşma operatorun normasını (3) düsturu ilə də təyin etmək olar.

Teorem 2. A xətti operatorunun öz-özünə qoşma olması üçün zəruri və kafi şərt $\operatorname{Im}(Ax, x) = 0$ olmasıdır.

İsbatı. Bildiyimiz kimi hər bir A xətti operatorunu aşağıdakı şəkildə göstərmək olar:

$$A = A_R + iA_I,$$

belə ki, A_R və A_I öz-özünə qoşma operatorlardır. Onda, $\forall x \in X$ üçün

$$(Ax, x) = (A_R x, x) + i(A_I x, x).$$

A_R və A_I öz-özünə qoşma operator olduğundan $(A_R x, x)$ və $(A_I x, x)$ ədədləri həqiqidir. Ona görə də, $\operatorname{Re}(Ax, x) = (A_R x, x)$, $\operatorname{Im}(Ax, x) = (A_I x, x)$. Sonuncu bərabərlikdən istifadə edərək əvvəlcə teoremin zəruriliyini isbat edək.

Tutaq ki, A öz-özünə qoşma operatorudur. Onda, (Ax, x) həqiqi ədəd olduğundan, $\operatorname{Im}(Ax, x) = 0$ olar.

Tutaq ki, $\operatorname{Im}(Ax, x) = 0$. Onda $(A_I x, x) = 0$. Teorem 1-ə görə

$$\|A_I\| = \sup_{\|x\|=1} |(A_I x, x)| = 0$$

Buradan alırıq ki, $A_I = O$ və deməli $A = A_R$. A_R öz-özünə qoşma operator olduğu üçün A da öz-özünə qoşma operatorudur.

Teorem 3. Əgər λ öz-özünə qoşma A operatorunun məxsusi ədədirsə, onda A operatorunun bu məxsusi ədədə uyğun norması 1-ə bərabər olan məxsusi vektoru var.

İsbatı. λ məxsusi ədəd olduğundan sıfırdan fərqli elə $x \in X$ vektoru var ki, $Ax = \lambda \cdot x$. Buradan alırıq ki, $A \frac{x}{\|x\|} = \lambda \frac{x}{\|x\|}$. $z = \frac{x}{\|x\|}$ işarə etsək, aydındır ki, $\|z\| = 1$ və $Az = \lambda z$. Teorem isbat olundu.

14. ÖZ-ÖZÜNƏ QOŞMA OPERATORUN MƏXSUSİ ƏDƏDLƏRİNİN XASSƏLƏRİ

Tutaq ki, X n ölçülü kompleks Evklid fəzası, A isə bu fəzada təsir edən öz-özünə qoşma operatorudur.

$m = \inf_{\|x\|=1} (Ax, x)$, $M = \sup_{\|x\|=1} (Ax, x)$ işarə edək. Öz-özünə qoşma operator üçün

$\forall x \in X$ olduqda (Ax, x) həqiqi ədəd olduğundan, m və M ədədləri də həqiqidir. Digər tərəfdən (Ax, x) funksiyası x -ə nəzərən kəsilməz olduğundan $\|x\|=1$ qapalı məhdud çoxluğunda özünün ən böyük və ən kiçik qiymətlərini alır.

Tutaq ki, λ , A operatorunun məxsusi ədədidir. Onda yuxarıda isbat etdiyimiz Teorem 3-ə görə norması 1-ə bərabər olan elə $x \in X$ vektoru var ki, $Ax = \lambda \cdot x$. Buradan alırıq ki, $\lambda = (Ax, x)$. Ona görə də, deyə bilərik ki, $m \leq \lambda \leq M$. Başqa sözlə A operatorunun məxsusi ədədləri m və M ədədləri arasında yerləşir.

$\forall x \in X$ üçün $(Ax, x) \geq 0$ ($(Ax, x) > 0, x \neq 0$) olarsa, onda A müsbət (müsbət müəyyən) operator adlanır .

Teorem. Tutaq ki, A öz-özünə qoşma müsbət operatorudur. Onda $\|A\|$ ədədi A operatorunun ən böyük məxsusi ədədidir.

İsbatı. Öz-özünə qoşma operatorun norması haqqında isbat etdiyimiz teoremə görə

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)| = \sup_{\|x\|=1} (Ax, x)$$

Digər tərəfdən (Ax, x) funksiyası, $\|x\|=1$ çoxluğunda özünün ən böyük qiymətini aldığından, elə $x_0 \in X, \|x_0\|=1$ vektoru var ki, $\|A\| = (Ax_0, Ax_0) = \lambda$

Asanlıqla göstərmək olar ki, $\|Ax_0\| = \|A\|$. Onda alırıq ki,

$$\|(A - \lambda I)x_0\|^2 = \|Ax_0\|^2 - 2\lambda(Ax_0, x_0) + \lambda^2\|x_0\|^2 = \|A\|^2 - 2\|A\| \cdot \|A\| + \|A\|^2 \cdot 1 = 0.$$

Beləliklə, $(A - \lambda I)x_0 = 0$ və ya $Ax_0 = \lambda x_0$. Teorem isbat olundu.

Bu teoremdən istifadə edərək göstərək ki, m və M ədədləri öz-özünə qoşma A operatorunun məxsusi ədədləridir. $B = A - mI$ işarə edək. Onda aydındır ki, B öz-özünə qoşma operatorudur və $\forall x \in X$ üçün

$$(Bx, x) = ((A - mI)x, x) = (Ax, x) - m(x, x).$$

$\|x\|=1$ götürsək, alırıq ki, $(Bx, x) \geq 0$. Buradan alırıq ki, $\forall x \in X$ üçün $(Bx, x) \geq 0$.

Onda B operatoruna yuxarıda isbat etdiyimiz teoremi tətbiq etsək, deyə bilərik ki, $\|B\|$ ədədi B operatorunun ən böyük məxsusi ədədidir. Digər tərəfdən

$$\|B\| = \sup_{\|x\|=1} |(Bx, x)| = \sup_{\|x\|=1} (Bx, x) - m = M - m.$$

Beləliklə $M - m$ ədədi B operatorunun məxsusi ədədidir. Ona görə $\exists x_0 \neq 0$ elementi var ki, $Bx_0 = (M - m)x_0$ və ya

$$(A - mI)x_0 = (M - m)x_0 \Rightarrow Ax_0 - mx_0 = Mx_0 - mx_0 \Rightarrow Ax_0 = Mx_0.$$

Buradan görünür ki, M ədədi A operatorunun məxsusi ədədidir. İndi isə $B = -A$ işarə edək. Asanlıqla görmək olar ki,

$$-m = \sup_{\|x\|=1} (Bx, x)$$

Deməli $-m$ ədədi B operatorunun məxsusi ədədidir və $Bx = -mx$, $-Bx = mx$.
Yəni, m ədədi A operatorunun məxsusi ədədidir: $Ax = \lambda \cdot x$.

ÖZ-ÖZÜNƏ QOŞMA OPERATORUN MƏXSUSİ VEKTORLARININ VƏ ƏDƏDLƏRİNİN BƏZİ XASSƏLƏRİ

Teorem. n ölçülü X kompleks Evklid fəzasında, təsir edən öz-özünə qoşma A xətti operatorunun məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazis var.

İsbatı. Bildiyimiz kimi A operatorunun ən böyük məxsusi ədədi var və o aşağıdakı bərabərliklə təyin olunur:

$$\lambda_1 = \sup_{\|x\|=1} (Ax, x) = M$$

λ_1 məxsusi ədədinə uyğun və norması vahidə bərabər olan məxsusi vektoru e_1 ilə işarə edək. X fəzasının e_1 vektoruna ortoqanal olan $(n-1)$ ölçülü alt fəzasını X_1 -lə işarə edək. Göstərək ki, X_1 A operatoru üçün invariant (yəni, əgər $x \in X_1$ olarsa, onda $Ax \in X_1$) alt fəzadır. $\forall x \in X_1$ götürək. Onda,

$$(Ax, e_1) = (x, Ae_1) = (x, \lambda_1 e_1) = \lambda_1 (x, e_1) = 0.$$

Başqa sözlə, X_1 alt fəzası A operatoru üçün invariant alt fəzadır. Ona görə də, A operatoruna X_1 fəzasında öz-özünə qoşma operator kimi baxa bilərik. X_1 fəzasında da A operatorunun ən böyük məxsusi ədədi var. Həmin məxsusi ədədi

$$\lambda_2 = \sup_{\substack{\|x\|=1 \\ x \perp e_1}} (Ax, x)$$

ilə, ona uyğun norması vahidə bərabər olan məxsusi vektoru isə e_2 ilə işarə edək. X_1 fəzasının e_2 vektoruna ortoqonal olan $(n-2)$ ölçülü alt fəzanı X_2 ilə işarə edək. Asanlıqla göstərmək olar ki, X_2 də A operatoru üçün invariant alt fəzadır. Bu alt fəzada A -nın ən böyük məxsusi ədədini λ_3 ilə, ona uyğun norması vahidə bərabər olan məxsusi vektorunu isə e_3 ilə işarə edərək və prosesi bu qayda ilə davam etdirsək, X n ölçülü fəza olduğundan, sonlu sayda addımdan sonra A operatorunun $e_1, e_2, \dots, e_n$ məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazis almış olarıq. Teorem isbat edildi.

Qeyd edək ki, bu məxsusi vektorlara uyğun məxsusi ədədləri bundan sonra, təkrarlananları da nəzərə almaqla, $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ artmayan sırası ilə düzülmüş hesab edəcəyik. Yuxarıda isbat etdiyimiz teoremdən aydındır ki, A operatorunun $(m+1)$ -inci məxsusi ədədini aşağıdakı bərabərliklə təyin etmək olar:

$$\lambda_{m+1} = \max_{\substack{x \perp e_k \\ k=1, 2, \dots, m}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}$$

Doğurddan da, $\left(A \frac{x}{\|x\|}, \frac{x}{\|x\|}\right) = \frac{(Ax, x)}{(x, x)}$ olduğundan $\frac{x}{\|x\|}$ elementinin norması

vahidə bərabər olduğundanəvvəlki bərabərlik alınır.

Öz-özünə qoşma A operatorunun $e_1, e_2, \dots, e_m$ məxsusi vektorlarının xətti örtüyünü E_m ilə, X fəzasının m ölçülü alt fəzaları çoxluğunu isə ε_m ilə işarə edək. Aydınır ki, $E_m \in \varepsilon_m$. Göstərək ki, $m+1$ -ci məxsusi ədədi aşağıdakı bərabərlikdən təyin etmək olar:

$$\lambda_{m+1} = \min_{E \in \varepsilon_m} \max_{x \perp E} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \quad (1)$$

Əvvəlcə qeyd edək ki, $E = E_m$ olduqda, $\max_{x \perp E_m} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} = \lambda_{m+1}$ olduğunu yuxarıda

göstərmişdik. Başqa sözlə, (1) bərabərliyini isbat etmək üçün $\forall E \in \varepsilon_m$ üçün

$$\max_{x \in E \in \varepsilon_m} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \geq \max_{x \perp E_m} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} = \lambda_{m+1}$$

bərabərsizliyini göstərmək kifayətdir.

E alt fəzasının X -ə qədər ortoqonal tamamlayıcısını $E^\perp$ ilə işarə edək. $\dim E^\perp = n - m$ və $\dim E_{m+1} = m + 1$ olduğuna görə $\dim E^\perp + \dim E_{m+1} = n - m + m + 1 = n + 1 > n = \dim X$ olur. Alt fəzaların ölçülərinin cəmi haqqında teoremə görə deyə bilərik ki, $E^\perp$ və E_{m+1} alt fəzalarının kəsişməsinin ölçüsü 1-dən kiçik deyil ona görə də sıfırdan fərqli elementi özündə saxlayır. Ümumiliyi pozmadan hesab edəcəyik ki, həmin elementin norması vahidə bərabərdir. Bu elementi $\tilde{x}$ ilə işarə edək. Aydınır ki, $\tilde{x} \in E^\perp$, $\tilde{x} \in E_{m+1}$, $\|\tilde{x}\| = 1$. $\tilde{x} \in E^\perp$ olduğu üçün $\tilde{x} \perp E$ və $\tilde{x} \in E_{m+1}$ olduğu üçün bu vektorun $e_1, e_2, \dots, e_{m+1}$ bazisinə görə ayrılışını yazmaq olar:

$$\tilde{x} = \sum_{k=1}^{m+1} c_k e_k$$

$\|\tilde{x}\| = 1$ olduğu üçün,

$$\|\tilde{x}\| = (\tilde{x}, \tilde{x}) = \left(\sum_{k=1}^{m+1} c_k e_k, \sum_{k=1}^{m+1} c_k e_k \right) = \sum_{k=1}^{m+1} c_k \bar{c}_k = \sum_{k=1}^{m+1} |c_k|^2$$

bərabərliyindən alırıq ki, $\sum_{k=1}^{m+1} |c_k|^2 = 1$.

Digər tərəfdən $A\tilde{x} = \sum_{k=1}^{m+1} c_k A e_k = \sum_{k=1}^{m+1} c_k \lambda_k e_k$ bərabərliyini və $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$

məxsusi ədədlərinin $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ bərabərsizliklərini ödədiyini nəzərə alsaq,

$$\max_{x \perp E} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \geq (A\tilde{x}, \tilde{x}) \geq \left(\sum_{k=1}^{m+1} c_k \lambda_k e_k, \sum_{k=1}^{m+1} c_k e_k \right) \geq \sum_{k=1}^{m+1} \lambda_k |c_k|^2 \geq \lambda_{m+1} \sum_{k=1}^{m+1} |c_k|^2 = \lambda_{m+1}$$

yaza bilərik. Beləliklə, $\max_{x \perp E} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \geq \lambda_{m+1}$. Bu isə (1) bərabərliyinin isbatı

deməkdir.

Qeyd edək ki, (1) bərabərliyi öz-özünə qoşma operatorun məxsusi ədədlərinin **minimaks xassəsi** adlanır.

15. ÖZ-ÖZÜNƏ QOŞMA OPERATORUN SPEKTRAL AYRILIŞI

Tutaq ki, X n ölçülü Evklid fəzası, A isə bu fəzada təsir edən öz-özünə qoşma operatorudur. Onda isbat etdiyimiz teoremə görə A operatorunun məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazis var. Bu bazisi $e_1, e_2, \dots, e_n$ -lə, onlara uyğun məxsusi ədədləri isə $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ilə işarə edək. $\forall x \in X$ vektorunun bu bazisə görə ayrılışını yazaq:

$$x = \sum_{k=1}^n c_k e_k.$$

$c_k = (x, e_k)$ ($k = 1, 2, \dots, n$) olduğuna görə

$$x = \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k. \quad (1)$$

Aşağıdakı operatoru təyin edək:

$$P_k x = (x, e_k) e_k, \quad k = \overline{1, n}.$$

Skalyar hasilin xassəsindən istifadə edərək, asanlıqla göstərmək olar ki, k -nın hər bir qiymətində P_k xətti öz-özünə qoşma operatorudur. Bu operatora e_k məxsusi vektorunun əmələ gətirdiyi məxsusi alt fəzaya proyeksiyalayan operator deyilir. Göstərək ki, P_k operatorları üçün $P_k^2 = P_k$, $P_k P_m = 0$, $k \neq m$.

Aşağıdakı bərabərliyə baxaq:

$$\begin{aligned} P_k P_m x &= P_k (P_m x) = P_k ((x, e_m) e_m) = (x, e_m) P_k e_m = (x, e_m) (e_m, e_k) e_k = \\ &= \begin{cases} (x, e_k) e_k, & k = m \\ 0, & k \neq m. \end{cases} \end{aligned}$$

Bu isə yuxarıda qeyd etdiyimiz bərabərliklərin isbatı deməkdir.

(1) bərabərliyinin hər iki tərəfinə A operatoru ilə təsir etsək,

$$Ax = \sum_{k=1}^n (x, e_k) A e_k = \sum_{k=1}^n (x, e_k) \lambda_k e_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k (x, e_k) e_k. \quad (3)$$

Qeyd edək ki, (1) və (3) bərabərliklərini aşağıdakı şəkildə də yazmaq olar:

$$x = \sum_{k=1}^n P_k x \quad (4)$$

$$Ax = \sum_{k=1}^n \lambda_k P_k x \quad (5)$$

və ya

$$I = \sum_{k=1}^n P_k \quad (6)$$

$$A = \sum_{k=1}^n \lambda_k P_k \quad (7)$$

(6) bərabərliyinə vahid operatorun, (7)-yə isə öz-özünə qoşma A operatorunun spektral ayrılığı deyilir.

Tutaq ki, $P(\lambda) = \sum_{i=0}^m c_i \lambda^i$ çoxhədlisi verilmişdir. $P(A) = \sum_{i=0}^m c_i A^i$ operatorunu təyin edək, burada $A^0 = I$ işarə edilmişdir. Asanlıqla göstərmək olar ki, A^i (i - müsbət tam ədəddir) operatorunun spektral ayrılığı

$$A^i = \sum_{k=1}^n \lambda_k^i P_k \quad (8)$$

şəklindədir. Məsələn, $A = \sum_{k=1}^n \lambda_k P_k$, $A^2 = A \cdot A = \sum_{k=1}^n \lambda_k P_k \cdot \sum_{i=1}^n \lambda_i P_i = \sum_{k=1}^n \lambda_k^2 P_k$.

(8) bərabərliyini $P(A)$ çoxhədlisinin ifadəsində nəzərə alsaq, aşağıdakı bərabərliyi alarıq:

$$P(A) = \sum_{i=1}^m c_i \sum_{k=1}^n \lambda_k^i P_k = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^m c_i \lambda_k^i \right) P_k = \sum_{k=1}^n P(\lambda_k) P_k \quad \text{və ya}$$

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(\lambda_k) P_k. \quad (9)$$

Qeyd edək ki, $P(\lambda)$ olaraq xüsusi halda A operatorunun xarakteristik çoxhədlisini də götürmək olar. Onda aşağıdakı teorem doğrudur.

Teorem(Hamelton-Kelli). Hər bir öz-özünə qoşma operator öz xarakteristik çoxhədlisinin köküdür. Yəni, $\det(A - \lambda E) = 0$.

İsbatı. Tutaq ki, $P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Bildiyimiz kimi λ -nın məxsusi ədəd olması ümün zəruri və kafi şərt onun xarakteristik çoxhədlinin kökü olmasıdır. Ona görə də, $P(\lambda)$ xarakteristik çoxhədli olduqda $P(\lambda_k) = 0$, $k = \overline{1, n}$. Bunu (9)-da nəzərə alsaq, $\det(A - \lambda E) = 0$ olar.

KVADRATİK FORMALARIN KANONİK ŞƏKİLƏ GƏTİRİLMƏSİ

Tutaq ki, X n ölçülü kompleks Evklid fəzası, $A(x, y)$ isə bu fəzada təyin olunmuş ikinci növ bixətti formadır. Əgər $\forall x, y \in X$ üçün $A(x, y) = \overline{A(y, x)}$ olarsa, onda $A(x, y)$ ermit bixətti forma adlanır.

Bildiyimiz kimi hər bir ikinci növ bixətti forma üçün elə $A \in L(X)$ operatoru var ki,

$$A(x, y) = (Ax, y) \quad (1)$$

Teorem. $A(x, y)$ bixətti formasının ermit bixətti forması olamsı üçün zəruri və kafi şərt (1) bərabərliyindəki A xətti operatorunun öz-özünə qoşma olmasıdır.

İsbatı. Zərurilik. Tutaq ki, $A(x, y)$ ermit bixətti formadır. Onun üçün (1) bərabərliyini yazsaq, aşağıdakı bərabərliyi alarıq:

$$(Ax, y) = A(x, y) = \overline{A(y, x)} = \overline{(Ay, x)} = (x, Ay)$$

Beləliklə,

$$\forall x, y \in X \text{ üçün } (Ax, y) = (x, Ay). \quad (2)$$

Bu isə o deməkdir ki, $A = A^*$.

Kafilik. Tutaq ki, (1) bərabərliyindəki A xətti operatoru öz-özünə qoşmadır. Onda (2) bərabərliyi doğrudur. Bunu nəzərə alsaq,

$$A(x, y) = (Ax, y) = \overline{(y, Ax)} = \overline{(Ay, x)} = A(\overline{y}, \overline{x}).$$

Yəni (1) bərabərliyi doğrudur. Teorem isbat olundu.

Bildiyimiz kimi A operatorunun öz-özünə qoşma olması üçün zəruri və kafi şərt $\forall x \in X$ üçün (Ax, x) -in həqiqi olmasıdır. Bunu nəzərə alsaq, isbat etdiyimiz teoremdən aşağıdakı nəticə çıxır.

Nəticə. $A(x, y)$ bixətti formasının ermit bixətti forma olması üçün zəruri və kafi şərt (Ax, x) -in həqiqi olmasıdır.

Tutaq ki, $A(x, y)$ ikinci növ ermit bixətti formadır. $y = x$ götürməklə alınan (Ax, x) funksiyasına $A(x, y)$ bixətti formasına uyğun kvadratik forma deyilir.

Teorem. n ölçülü X kompleks Evklid fəzasında təyin olunmuş (Ax, x) kvadratik forması üçün elə $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisi və $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ həqiqi ədədləri var ki, aşağıdakı bərabərlik doğrudur:

$$(Ax, x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k |\xi_k|^2 \quad (3)$$

burada $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ x vektorunun e_k bazisində koordinatlarıdır.

İsbatı. $A(x, y)$ ermit bixətti forma olduğundan elə $A = A^* \in L(X)$ operatoru var ki, $A(x, y) = (Ax, y)$. A operatorunun məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazisi $e_1, e_2, \dots, e_n$ ilə, bu məxsusi vektorlara uyğun məxsusi ədədləri isə $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ilə işarə etsək $Ae_i = \lambda_i e_i$ ($i = \overline{1, n}$) olar. x vektorunun bu bazisə görə ayrılışını yazıb, $x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k$ bərabərliyin hər iki tərəfinə A operatoru ilə təsir etsək:

$$Ax = \sum_{k=1}^n \xi_k A e_k = \sum_{k=1}^n \xi_k \lambda_k e_k .$$

$$\text{Buradan } A(x, x) = (Ax, x) = \left(\sum_{k=1}^n \xi_k \lambda_k e_k, \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \xi_k \bar{\xi}_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k |\xi_k|^2 \text{ alarıq.}$$

Teorem isbat olundu.

Teorem. Tutaq ki, X n ölçülü kompleks xətti fəza, $A(x, y)$ və $B(x, y)$ isə bu fəzada təyin olunmuş ermit bixətti formalarıdır. Belə ki, $\forall x \neq 0, x \in X, B(x, x) > 0$. Onda X fəzasında elə $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisi və $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ həqiqi ədədləri var ki, aşağıdakı bərabərliklər doğrudur:

$$A(x, x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k |\xi_k|^2 \quad (4)$$

$$B(x, x) = \sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 \quad (5)$$

İsbatı. $B(x, y)$ ermit bixətti forma olduğu üçün, $\forall x \neq 0$ olduqda $B(x, x) > 0$ olduğunu nəzərə alsaq, bu bixətti formanın köməyiylə X fəzasında aşağıdakı qaydada skalyar hasil təyin edə bilərik:

$$(x, y) = B(x, y) \quad (6)$$

Beləliklə, biz X xətti fəzasını Evklid fəzasına çevirmiş olduq. $A(x, y)$ ermit bixətti forma olduğundan yuxarıda isbat etdiyimiz teorem görə elə $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisi və $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ həqiqi ədədləri var ki, (4) bərabərliyi doğrudur. x vektorunun bu bazisə görə ayrılışını yazıb, onu $B(x, x) = (x, x)$ bərabərliyində nəzərə alsaq, (5) bərabərliyinin də doğru olduğunu görərik.

Beləliklə, biz bir cüt kvadratik formanı eyni zamanda kanonik şəkilə gətirmiş olduq.

16. UNITAR VƏ NORMAL OPERATORLAR

Tərif 1. n ölçülü X kompleks Evklid fəzasında təsir edən U xətti operatoru üçün

$$\forall x, y \in X, (Ux, Uy) = (x, y) \quad (1)$$

olarsa, onda U unitar operator adlanır.

Əgər (1) bərabərliyində $y = x$ götürsək, $\|Ux\| = \|x\|$ alarıq. Bu bərabərlikdən görünür ki, unitar operator elementin normasını dəyişmir. Bundan əlavə, əgər X fəzasında hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisi götürsək, onda (1) bərabərliyindən çıxır ki, $Ue_1, Ue_2, \dots, Ue_n$ də ortonormal bazisdir. Başqa sözlə, unitar operator ortonormal bazisi ortonormal bazisə çevirir.

Tutaq ki, λ unitar U operatorunun məxsusi ədədidir. Onda norması vahidə bərabər olan elə $e \in X$ vektoru var ki, $Ue = \lambda e$. Buradan

$$(Ue, Ue) = (\lambda e, \lambda e) = \lambda \bar{\lambda} (e, e) = |\lambda|^2 (e, e) = |\lambda|^2 .$$

$(Ue, Ue) = (e, e) = 1$ olduğundan alırıq ki, $|\lambda|^2 = 1$ və ya $|\lambda| = 1$. Ona görə də, deyə bilərik ki, unitar operatorun məxsusi ədədləri kompleks müstəvidə mərkəzi koordinat başlanğıcında, radiusu vahidə bərabər olan çevrənin üzərində yerləşir.

Teorem1. $U \in L(X)$ operatorunun unitar operator olması üçün zəruri və kafi şərt

$$U^* = U^{-1} \quad (2)$$

olmasıdır.

İsbatı. Zərurilik. Tutaq ki, U unitar operatorudur. Onda $\forall x, y \in X$, $(Ux, Uy) = (x, y)$, $(x, U^*Uy) = (x, y)$, $(x, (U^*U - I)y) = 0$. Sonuncu bərabərlikdə $x = (U^*U - I)y$ götürsək, alırıq ki, $\|(U^*U - I)y\| = 0, \forall y \in X$ və ya

$$U^*U = I \quad (3)$$

Eyni qayda ilə göstərmək olar ki, $UU^* = I$. Bu iki bərabərlik göstərir ki, $U^* = U^{-1}$

Kafilik. Tutaq ki, (2) bərabərliyi doğrudur. Onda, $U^*U = I$, $UU^* = I$ bərabərlikləri doğru olar. Bunu nəzərə alsaq,

$$\forall x, y \in X, (Ux, Uy) = (x, U^*Uy) = (x, Iy) = (x, y)$$

Başqa sözlə U unitar operatorudur.

Tərif 2. $A \in L(X)$ operatoru üçün $AA^* = A^*A$ olarsa, onda A normal operator adlanır.

Aydındır ki, hər bir unitar operator həm də normal operatorudur.

Lemma. A və A^* operatorlarının ortaq e məxsusi vektoru var və $Ae = \lambda e$ isə onda $A^*e = \bar{\lambda} e$.

İsbatı. Bildiyimiz kimi n ölçülü X kompleks Evklid fəzasında təsir edən A xətti operatorunun heç olmazsa bir məxsusi ədədi var. Bu məxsusi ədədi λ ilə, ona uyğun məxsusi vektoru isə e ilə işarə edək. $R_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ çoxluğuna baxaq. Aydındır ki, $\forall x \in R_\lambda, Ax = \lambda x$. Göstərək ki, R_λ çoxluğu A^* operatoru üçün invariant alt fəzadır. Yəni, $\forall x \in R_\lambda, A^*x \in R_\lambda$. Aşağıdakı bərabərliyə baxaq

$$A(A^*x) = (AA^*)x = (A^*A)x = A^*(Ax) = A^*(\lambda x) = \lambda(A^*x).$$

Buradan görünür ki, $A^*x \in R_\lambda$. Ona görə də, A^* -a R_λ fəzasında təsir edən xətti operator kimi baxa bilərik. Aydındır ki, bu operatorun da R_λ fəzasında heç olmazsa bir μ məxsusi ədədi var. Bu məxsusi ədədə uyğun məxsusi vektoru e ilə işarə edək. Aşağıdakı bərabərliyi yazı bilərik: $Ae = \lambda e$, $A^*e = \mu e$. Bu iki bərabərlikdən alırıq ki,

$$(Ae, e) = (\lambda e, e) = \lambda(e, e),$$

$$(e, A^*e) = (e, \mu e) = \bar{\mu}(e, e).$$

$(Ae, e) = (e, A^*e)$ olduğundan alırıq ki, $(\lambda - \bar{\mu})(e, e) = 0$. $(e, e) \neq 0$ olduğundan $\mu = \lambda$ olur.

Teorem2. A normal operatorunun məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazis var.

İsbatı. Yuxarıda isbat etdiyimiz lemmaya görə və A və A^* operatorlarının ortaq e_1 məxsusi vektoru var. Ümumiliyi pozmadan bu məxsusi vektorun uzunluğunu vahidə bərabər hesab edəcəyik. e_1 -ə uyğun məxsusi ədədi λ_1 ilə işarə edək. Onda, $Ae_1 = \lambda_1 e_1$, $A^*e_1 = \bar{\lambda}_1 e_1$ olur. X fəzasının e_1 -ə ortoqonal olan bütün elementləri çoxluğunu X_1 ilə işarə edək. Göstərək ki, X_1 həm A , həm də A^* operatorları üçün invariant alt fəzadır. $\forall x \in X_1$ götürək, onda $(x, e_1) = 0$

$$(Ax, e_1) = (x, A^*e_1) = (x, \bar{\lambda}_1 e_1) = \lambda_1 (x, e_1) = 0$$

Deməli, $Ax \in X_1$ Eyni qayda ilə göstərə bilərik ki, $A^*x \in X_1$. Yəni, X_1 hər iki operator üçün invariant alt fəzadır. Ona görə A və A^* -a X_1 fəzasında xətti operator kimi baxsaq, bu fəzada isbat etdiyimiz lemmaya görə A və A^* operatorlarının ortaq məxsusi vektoru olar. Həmin vektoru e_2 ($\|e_2\| = 1$) ilə, ona uyğun məxsusi ədədi isə λ_2 ilə işarə edək. X_1 fəzasının e_2 -yə ortoqonal olan bütün elementləri çoxluğunu X_2 ilə işarə etsək, X_2 -nin də A və A^* operatorları üçün invariant alt fəza olduğunu göstərmək olar. Bu alt fəzada da A və A^* operatorlarının ortaq məxsusi vektoru var. Prosesi yuxarıdakı qaydada davam etdirsək, A və A^* operatorlarının ortaq məxsusi vektorlarından ibarət $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisini almış olarıq. İsbat etdiyimiz teoremdən aşağıdakı nəticələr çıxır:

Nəticə 1. Əgər A normal operator dursa, onda X fəzasında elə bazis var ki, bu bazisdə A operatorunun matrisi diaqonal şəklindədir

Nəticə 2. Unitar operatorun məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazis var.

Teorem3. n ölçülü X kompleks Evklid fəzasında təsir edən A xətti operatorunun məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazis varsa, onda A normal operatorudur.

İsbatı. Tutaq ki, X n ölçülü Evklid fəzası, A isə bu fəzada təsir edən xətti operatorudur. A operatorunun məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazisi $e_1, e_2, \dots, e_n$ ilə işarə edək. Onda

$$\forall x \in X, \quad x = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k = \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \quad (1)$$

yaza bilərik. Buradan alırıq ki,

$$Ax = \sum_{k=1}^n \lambda_k (x, e_k) e_k \quad (2)$$

A^* ilə aşağıdakı qaydada təsir edən operatoru təyin edək:

$$Ay = \sum_{k=1}^n \bar{\lambda}_k (y, e_k) e_k, \quad (3)$$

burada $\bar{\lambda}_k$, λ_k ədədinin kompleks qoşmasıdır. Skalyar hasilin xassələrindən istifadə etməklə asanlıqla yoxlamaq olar ki, A^* xətti operatorudur. Göstərək ki, A^* həm də A operatorunun qoşmasıdır. Bunun üçün $\forall x, y \in X$ olduqda (Ax, y) və (x, A^*y) skalyar hasilərini tapaq. Tutaq ki, $y = \sum_{k=1}^n (y, e_k) e_k$. Onda

$$(Ax, y) = \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k (x, e_k) e_k, \sum_{k=1}^n (y, e_k) e_k \right) = \sum_{k=1}^n \lambda_k (x, e_k) \overline{(y, e_k)} \quad (4)$$

(4) və (5) bərabərliklərinin sağ tərəfləri bərabər olduğundan sol tərəfləri də bərabərdir. Bu isə A^* operatorunun A operatorunun qoşması olması deməkdir. İndi isə göstərək ki, A normal operatorudur. Yəni, $AA^* = A^*A$. Bunun üçün (2) bərabərliyinin hər iki tərəfinə A^* , (3) bərabərliyinin hər iki tərəfinə isə A operatoru ilə təsir edək. Onda

$$A^*Ax = \sum_{k=1}^n \lambda_k (x, e_k) A^*e_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k \bar{\lambda}_k (x, e_k) e_k,$$

$$AA^*y = \sum_{k=1}^n \bar{\lambda}_k (y, e_k) Ae_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k \bar{\lambda}_k (y, e_k) e_k.$$

Sonuncu bərabərlikdə $y = x$ götürsək, $\forall x \in X$ üçün $A^*A = AA^*$ alırıq. Bu isə A -nın normal operator olması deməkdir.

17.XƏTTİ OPERATOR MATRİSİNİN NORMAL ŞƏKLİ

Məlumdur ki, n ölçülü X kompleks Evklid fəzasında təsir edən öz-özüə qoşma operatorun məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazis var və bu bazisdə A operatorunun matrisi diaqonal şəklindədir. Biz isbat etdik ki, əgər A normal operatordursa, onda bu operatorun da məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazis var. Ona görə həmin bazisdə A normal operatorunun da matrisi diaqonal şəklindədir. Əgər A hər hansı xətti operator olarsa, onda bu operatorun məxsusi vektorlarının bazis əmələ gətirdiyini ümumiyyətlə söyləmək olmaz. Lakin bu operatorun məxsusi vektorları bazis əmələ gətirirsə, onda A xətti operatorunun matrisi diaqonal şəklində olar. Xətti operatorun müxtəlif məxsusi ədədlərinə uyğun məxsusi vektorları xətti asılı olmadığından deyə bilərik ki, A xətti operatorunun məxsusi ədədləri müxtəlifdirsə, onda elə bazis var ki, bu bazisdə xətti operatorun matrisi yenə də diaqonal şəklindədir. İndi isə fərz edək ki, A xətti operatorunun məxsusi ədədləri içərisində təkrar olunanı var. Bu zaman 2 hal mümkündür:

1. Bu operatorun məxsusi ədədlərinə uyğun məxsusi vektorları bazis əmələ gətirir. Bu halda aydındır ki, xətti operatorun həmin bazisində matrisi diaqonal şəklində olar.

2. Məxsusi ədədlərə uyğun məxsusi vektorlar bazis əmələ gətirmir. Bu o deməkdir ki, təkrarlanan məxsusi ədədlərə uyğun məxsusi vektorların sayı məxsusi

ədədin təkrarlanma tərtibindən kiçikdir. Bu halda artıq xətti operatorun matrisi diaqonal şəkildə olmaz.

Beləliklə, ixtiyari xətti operator üçün ümumiyyətlə elə bazisin varlığını söyləmək olmaz ki, bu bazisdə xətti operatorun matrisi diaqonal şəkildə olsun. Ona görə də, X xətti fəzasında elə bazis seçməyə çalışırlar ki, bu bazisdə xətti operatorun matrisi ən sadə şəkildə olsun. Xətti operator matrisinin bu şəkli onun **normal və ya Jordan şəkli** adlanır. Hər bir xətti operator üçün belə bazisin olması aşağıda qeyd edəcəyimiz teoremdən alınır.

Tutaq ki, A n ölçülü X kompleks xətti fəzasında təsir edən xətti operatorudur. Sıfırdan fərqli x vektoru üçün elə $m \geq 1$ natural ədədi varsa ki, $(A - \lambda I)^m x \neq 0$, $(A - \lambda I)^{m+1} x = 0$ bərabərlikləri ödənilsin, onda x -ə A operatorunun λ məxsusi ədədinə uyğun m tərtibdən qoşma elementi deyilir. m ədədi x elementinin qoşmalıq tərtibi adlanır. Asanlıqla görmək olar ki, əgər x vektoru A operatorunun λ məxsusi ədədinə uyğun m tərtibdən qoşma elementidirsə, onda $(A - \lambda I)^m x$ elementi A operatorunun λ məxsusi ədədinə uyğun vektorudur.

Teorem. n ölçülü X kompleks Evklid fəzasında təsir edən hər bir A xətti operatoru üçün elə $\{e_k^m\} (k=1,2,\dots,l, m=1,2,\dots,n_k, n_1 + n_2 + \dots + n_l = n)$ bazisi var ki, bu bazisdə A xətti operatoru aşağıdakı qaydada təsir edir:

$$Ae_k^1 = \lambda_k e_k^1 \quad (k=1,2,\dots,l)$$

$$Ae_k^m = \lambda_k e_k^m + e_k^{m-1} \quad (k=1,2,\dots,l, m=2,3,\dots,n_k)$$

Aydındır ki, A xətti operatorunun $\{e_k^m\}$ bazisində matrisi aşağıdakı şəkildədir:

$$\begin{pmatrix} \Lambda_1 & & & & \\ & \Lambda_2 & & & \\ & & \dots & & \\ & & & \dots & \\ & & & & \Lambda_l \end{pmatrix}$$

burada Λ_k -ların hər biri n_k tərtibli matrisdir. Yazılmayan elementlər isə sıfırlardan ibarət olan müvafiq tərtibli matrislərdir. Λ_k matrislərinin hər biri isə aşağıdakı şəkildədir:

$$\begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_k & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_k \end{pmatrix}$$

HƏQİQİ XƏTTİ FƏZALARDA XƏTTİ OPERATORLAR

Tutaq ki, X n ölçülü həqiqi xətti fəza, A isə bu fəzada təsir edən operatorudur. A operatoru aşağıdakı şərtləri ödədikdə xətti operator adlanır:

1. $\forall x, y \in X, A(x + y) = Ax + Ay,$
2. $\forall x, y \in X \text{ və } \forall \lambda \text{ həqiqi ədədi üçün } A(\lambda x) = \lambda Ax.$

Həqiqi xətti fəzada da məxsusi ədəd və məxsusi vektorun tərfi kompleks fəzadakı tərifə analoji qaydada verilir. Kompleks xətti fəzada isbat etdik ki, λ -nın A xətti operatorunun məxsusi ədədi olması üçün zəruri və kafi şərt λ -nın xarakteristik çoxhədlinin kökü olmasıdır. Həqiqi xətti fəzada da hər bir məxsusi ədədin xarakteristik çoxhədlinin kökü olduğunu isbat etmək olar. Lakin xarakteristik çoxhədlinin hər bir kökünün məxsusi ədəd olduğunu bu ədəd yalnız həqiqi ədəd olduqda söyləmək olar. Kompleks Evklid fəzasında öz-özünə qoşma operatorun bütün məxsusi ədədlərinin həqiqi olduğunu isbat etmişdik. Həqiqi Evklid fəzasında da xarakteristik çoxhədlisinin bütün kökləri həqiqi olan müəyyən sinif operatorları təyin edəcəyik. Göstərəcəyik ki, bu sinif, öz-özünə qoşma operatorlardan ibarətdir. Əvvəlcə X həqiqi Evklid fəzasında qoşma operatora tərif verək.

Tutaq ki, A, X fəzasında təsir edən xətti operatorudur. Əgər bu fəzada təsir edən elə A^* xətti operatoru varsa ki,

$$\forall x, y \in X, (Ax, y) = (x, A^*y)$$

bərabərliyi ödənsin, onda A^* operatoru A operatorunun qoşması deyilir. Kompleks fəzada qoşma operatorun varlığını və yeganəliyini biz Riss teoremi və ikinci növ bixətti formanın köməyi ilə isbat etmişdik. Qeyd edək ki, Riss teoremi həqiqi Evklid fəzasında da doğrudur. Yəni, həqiqi Evklid fəzasında təsir edən hər bir $f(x)$ xətti funksionalı üçün elə yeganə $h \in X$ elementi var ki, $f(x) = (x, h)$.

$\forall x, y, z \in X$ üçün həqiqi qiymətli $A(x, y)$ funksiyası aşağıdakı şərtləri ödədikdə birinci növ bixətti forma və ya sadəcə olaraq bixətti forma adlanır:

1. $A(x + y, z) = A(x, z) + A(y, z),$
2. $A(x, y + z) = A(x, y) + A(x, z),$
3. $A(\lambda x, y) = A(x, \lambda y) = \lambda A(x, y).$

Kompleks Evklid fəzasında olduğu kimi isbat etmək olar ki, hər bir bixətti forma üçün elə yeganə A xətti operatoru var ki, $A(x, y) = (Ax, y)$ və elə B operatoru var ki, $A(x, y) = (x, By)$.

Həqiqi Evklid fəzasında ermit bixətti formasının analoqu simmetrik bixətti formadır.

Əgər $\forall x, y \in X$ üçün $A(x, y) = A(y, x)$ olarsa, onda $A(x, y)$ simmetrik bixətti forma adlanır.

Əgər $A(x, y) = -A(y, x)$ olarsa, onda $A(x, y)$ çap simmetrik bixətti forma adlanır. Tutaq ki, $A(x, y)$ bixətti forması verilib. Onun köməyi ilə aşağıdakı iki bixətti formanı təyin edək:

$$A_1(x, y) = \frac{A(x, y) + A(y, x)}{2}$$

$$A_2(x, y) = \frac{A(x, y) - A(y, x)}{2}$$

Asanlıqla yoxlamaq olar ki, $A_1(x, y)$ simmetrik, $A_2(x, y)$ isə çəp simmetrik bixətti formadır və $A(x, y) = A_1(x, y) + A_2(x, y)$. Beləliklə, hər bir birinci növ bixətti formanı simmetrik və çəp simmetrik bixətti formanın cəmi şəklində göstərmək olar. Yuxarıda qeyd etdik ki, hər bir bixətti forma üçün həqiqi Evklid fəzasında elə A xətti operatoru var ki, $A(x, y) = (Ax, y)$.

Göstərək ki, $A(x, y)$ bixətti formasının simmetrik olması üçün zəruri və kafi şərt A operatorunun öz-özünə qoşma olmasıdır. Doğrudan da, $A(x, y)$ simmetrik bixətti olarsa, onda $(Ax, y) = A(x, y) = A(y, x) = (Ay, x) = (x, Ay)$. Bu isə o deməkdir ki, A öz-özünə qoşma operatorudur. İndi isə fərz edək ki, A öz-özünə qoşma operatorudur. Onda, $A(x, y) = (Ax, y) = (x, Ay) = (Ay, x) = A(y, x)$. Ona görə də $A(x, y)$ simmetrik bixətti formadır.

18. Həqiqi xətti fəzada öz-özünə qoşma operatorun məxsusi ədədləri

Tutaq ki, n ölçülü X həqiqi xətti fəzasında təsir edən A xətti operatoru verilmişdir. Bu fəzada hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisi götürək. Onda $\forall x \in X$ üçün

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

ayrılışını yaza bilərik. Aydınadır ki, belə ayrılışı Ae_i ($i = \overline{1, n}$) vektorları üçün də yazmaq olar:

$$Ae_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} e_k \quad (i = \overline{1, n})$$

Ayrılışın əmsallarından (onlar həqiqidir) düzəldilmiş $(a_{ik})_{i=\overline{1, n}, k=\overline{1, n}}$ matrisinə A xətti operatorunun $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində matrisi deyilir. Qeyd edək ki, $\det(A - \lambda E)$, A xətti operatorunun xarakteristik çoxhədlisi adlanır.

Teorem. n ölçülü həqiqi Evklid fəzasında təsir edən öz-özünə qoşma A operatorunun xarakteristik çoxhədlisinin bütün kökləri həqiqidir.

İsbatı. Tutaq ki, λ xarakteristik çoxhədlinin köküdür. n məchullu aşağıdakı xətti tənliklər sisteminə baxaq:

$$\sum_{k=1}^n a_{jk} \xi_k = \xi_j \lambda \quad (j = \overline{1, n}) \quad (1)$$

Asanlıqla görmək olar ki, sistemin baş determinantı A operatorunun xarakteristik çoxhədlisidir. $\lambda = \alpha + i\beta$ xarakteristik çoxhədlinin kökü olduğundan deyə bilərik ki, bu sistemin baş determinantı sıfıra bərabərdir. Sistem bircins olduğundan, aydındır ki, onun sıfırdan fərqli $\xi_k = x_k + iy_k$ həlli var, burada α, β, x_k, y_k -lər həqiqi ədədlərdir. Bunları (1) sisteminin sol və sağ tərəflərində nəzərə alıb həqiqi və xəyali hissələrini ayırsaq, $2n$ məchullu, $2n$ sayda tənlikdən ibarət olan aşağıdakı sistemi alırıq:

$$\left. \begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_{jk} x_k &= x_j \alpha - y_j \beta \\ \sum_{k=1}^n a_{jk} y_k &= x_j \beta + y_j \alpha \end{aligned} \right\} j = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

$e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində koordinatları uyğun olaraq, $x_1, x_2, \dots, x_n$ və $y_1, y_2, \dots, y_n$ olan vektorları x və y -lə işarə edək. Asanlıqla görmək olar ki, bu sistemi aşağıdakı şəkildə də yazmaq olar:

$$\begin{aligned} (Ax, y) &= \alpha(x, y) - \beta(y, y) \\ (x, Ay) &= \beta(x, x) + \alpha(x, y) \end{aligned} \quad (3)$$

A öz-özünə qoşma operator olduğundan bu iki bərabərlikdən alırıq ki,

$$\beta[(x, x) + (y, y)] = 0. \quad (4)$$

(1) sistemin sıfırdan fərqli həllini axtardığımız üçün x və y vektorlarından heç olmazsa biri sıfırdan fərqlidir. Bu isə o deməkdir ki, $[(x, x) + (y, y)] \neq 0$. Ona görə də, (4) bərabərliyinin ödənilməsi üçün $\beta = 0$ olmalıdır. Bunu $\lambda = \alpha + i\beta$ bərabərliyində nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, λ həqiqi ədəddir. Beləliklə öz-özünə qoşma operatorun xarakteristik çoxhədlisinin bütün kökləri həqiqidir. ona görə də xarakteristik çoxhədlinin hər bir kökü öz-özünə qoşma operatorun məxsusi ədədidir.

Kompleks Evklid fəzasında olduğu kimi həqiqi Evklid fəzasında da öz-özünə qoşma operatorun məxsusi vektorlarından ibarət ortonormal bazisin olduğunu göstərmək olar. Bu xassə kompleks Evklid fəzasındakı isbat etdiyimiz teoremə analoji qaydada isbat olunur. Kompleks Evklid fəzasında öyrəndiyimiz unitar operatorun həqiqi Evklid fəzasında analoqu ortoqonal operatordur.

Tutaq ki, X n ölçülü həqiqi Evklid fəzası, P isə bu fəzada təsir edən xətti operatorudur.

Əgər

$$\forall x, y \in X \text{ üçün } (Px, Py) = (x, y)$$

olarsa, onda P ortoqonal operator adlanır.

X fəzasında hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisi götürək. Onda aydındır ki,

$$(Pe_i, Pe_j) = (e_i, e_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Bu bərabərliklərdən görünür ki, ortoqonal operator ortonormal bazisi ortonormal bazisə çevirir.

Tutaq ki, P , n tərtibli matris P' isə P -nin transponirə edilmişidir. Əgər $PP' = P'P = J$ (vahid matris) olarsa, onda P ortoqonal matris adlanır. Asanlıqla görmək olar ki, P ortoqonal matrisdirsə, onda onun p_{ij} elementləri üçün aşağıdakı münasibət doğrudur:

$$\sum_{k=1}^n p_{ik} p_{kj} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Göstərmək olar ki, P xətti operatorunun ortonormal bazisdə matrisinin ortoqonal olması üçün zəruri və kafi şərt bu operatorun ortoqonal olmasıdır.

İndi isə bir və ikiölçülü fəzalarda ortoqonal operatorları öyrənək.

Tutaq ki, X birölçülü həqiqi Evklid fəzasıdır. Bu fəzada $e \neq 0$ və $\|e\|=1$ bazis vektorunu götürək. Onda aydındır ki, bu fəzanın hər bir x vektorunu $x = \alpha e$ şəklində göstərmək olar. Bu fəzada təsir edən P ortoqonal operatoruna baxaq. Tutaq ki,

$$Pe = \lambda e$$

onda,

$$(Pe, Pe) = (\lambda e, \lambda e) = \lambda^2 (e, e), \text{ buradan alırıq ki, } \lambda^2 = 1 \text{ və ya } \lambda = \pm 1.$$

$P_+ e = e$ və $P_- e = -e$ işarə edək. Beləliklə, bir ölçülü həqiqi Evklid fəzasında iki ortoqonal operator var:

$$P_+ x = x \text{ və } P_- x = -x$$

İndi isə fərz edək ki, X iki ölçülü həqiqi Evklid fəzasıdır. Tutaq ki, P bu fəzada təsir edən ortoqonal operatorudur. X fəzasında e_1, e_2 ortonormal bazisini götürək. P operatorunun bu bazisdə matrisini $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ilə işarə edək. P ortoqonal operator olduğundan onun matrisi də ortoqonal matris olar. Ona görə də, $PP' = P'P = J$ bərabərliklərindən

$$a^2 + b^2 = 1, ac + bd = 0, ab + cd = 0, a^2 = d^2, b^2 = c^2$$

alırıq.

$$a = \cos \varphi, b = -\sin \varphi \text{ işarə etsək, } d = \pm \cos \varphi, c = \pm \sin \varphi$$

Beləliklə, aşağıdakı ikitərtibli ortoqonal matrisləri almış oluruq:

$$P_+ = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \text{ və } P_- = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ -\sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$$

Beləliklə, iki ölçülü fəzada P ortoqonal operatorunun iki müxtəlif matrisini almış olduq. Bu o deməkdir ki, ikiölçülü fəzada iki ortoqonal operator var. Bunlardan birinci matrisə uyğun operatoru P_+ ilə, ikinci matrisə uyğun operatoru isə P_- işarə edək. P_+ operatorunun e_1, e_2 bazisindəki matrisindən görünür ki, bu operator e_1, e_2 müstəvisini φ bucağı qədər fırladan operatorudur. P_- operatoru isə e_1, e_2 müstəvisini φ bucağı qədər fırladan və sonra 180° əks etdirən operatorudur. Əgər X n ölçülü həqiqi Evklid fəzası, P isə bu fəzada təsir edən ortoqonal operatordursa, onda elə $e_1, e_2, \dots, e_n$ ortonormal bazisi var ki, bu bazisdə operatorun matrisi aşağıdakı şəkildədir:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & 0 \\ & 1 & & & & & & \\ & & \dots & & & & & \\ & & & -1 & & & & \\ & & & & -1 & & & \\ & & & & & \cos \varphi_1 & -\sin \varphi_1 & \\ & & & & & \sin \varphi_1 & \cos \varphi_1 & \dots \\ & & & & & & & \cos \varphi_k & -\sin \varphi_k \\ 0 & & & & & & & \dots & \sin \varphi_k & \cos \varphi_k \end{pmatrix}$$

Bu matrisdə yazılmayan bütün elementlər sıfıra bərabərdir.

19. BİXƏTTİ FORMALAR

Bixətti forma anlayışı ilə müxtəlif xətti fəzalarda tanış olsaq da, həqiqi xətti fəzada bixətti formalar haqqındakı əsas məlumatları bir daha qeyd edək.

Tutaq ki, X n ölçülü həqiqi xətti fəzadır. Bu fəzada təyin olunmuş x və y dəyişənlərindən asılı həqiqi qiymətli $A(x, y)$ funksiyası aşağıdakı şərtləri ödədikdə bixətti forma adlanır:

1. $A(x + y, z) = A(x, z) + A(y, z)$.
2. $A(x, y + z) = A(x, y) + A(x, z)$
3. $A(\lambda x, y) = A(x, \lambda y) = \lambda A(x, y)$, $\forall x, y \in X$ və λ həqiqi ədədi üçün

Əgər $\forall x, y \in X$ üçün $A(x, y) = A(y, x)$ olarsa, $A(x, y)$ simmetrik, $A(x, y) = -A(y, x)$ olarsa, çəp simmetrik bixətti forma adlanır. X fəzasında hər hansı $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisi götürək. Onda, $\forall x, y \in X$ vektorları üçün bazisə görə aşağıdakı ayrılışları yazı bilərik:

$$x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i, \quad y = \sum_{k=1}^n \eta_k e_k.$$

$A(x, y)$ bixətti formasının x və y vektorlarında qiymətini tapaq:

$$A(x, y) = A\left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i, \sum_{k=1}^n \eta_k e_k\right) = \sum_{i,k=1}^n A(e_i e_k) \xi_i \eta_k.$$

$a_{ik} = A(e_i, e_k)$ ($i = \overline{1, n}; k = \overline{1, n}$) elementlərindən düzəldilmiş

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

matrisinə $A(x, y)$ bixətti formasının $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində matrisi deyilir. Aydındır ki,

$$A(x, y) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \xi_i \eta_k. \quad (1)$$

Beləliklə, hər bir bixətti formaya verilmiş bazisdə müəyyən bir n tərtibli matris uyğun gəlir.

İndi isə fərz edək ki, n tərtibli $(a_{ik})_{i=\overline{1,n}, k=\overline{1,n}}$ matrisi verilmişdir. Bu matrisin köməyiylə, $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində $A(x, y)$ funksiyasını (1) düsturu ilə təyin edək, burada $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ və $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ uyğun olaraq x və y vektorlarının $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində koordinatlarıdır. Asanlıqla yoxlamaq olar ki, $A(x, y)$ bixətti formadır və bu bixətti formanın $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində matrisi $(a_{ik})_{i=\overline{1,n}, k=\overline{1,n}}$ –dir.

Beləliklə hər bir n tərtibli matrisə də verilmiş bazisdə müəyyən bir $A(x, y)$ bixətti forması qarşı qoymaq olar. (1) ayrılışının yeganəliyini göstərmək üçün (1)-də $x = e_i, y = e_k$ götürmək kifayətdir. Göstərmək olar ki, $A(x, y)$ bixətti forması yalnız və yalnız o zaman simmetrik (çəp simmetrik) olur ki, onun verilmiş bazisdə matrisi simmetrik (çəp simmetrik) olsun. Qeyd edək ki, $a_{ik} = a_{ki}$ olduqda (a_{ik}) simmetrik, $a_{ik} = -a_{ki}$ olduqda isə (a_{ik}) çəp simmetrik adlanır.

İndi isə bixətti formanın müxtəlif bazislərdəki matrisləri arasında əlaqəni göstərək.

Tutaq ki, n ölçülü X həqiqi xətti fəzasında $e_1, e_2, \dots, e_n$ və $f_1, f_2, \dots, f_n$ bazisləri verilmişdir. $A(x, x)$ kvadratik formasının $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində matrisini $A(e) = (a_{ik})_{i,k=\overline{1,n}}$ ilə, $f_1, f_2, \dots, f_n$ bazisində matrisini isə $A(f) = (b_{ik})_{i,k=\overline{1,n}}$ ilə işarə edək. Onda

$$A(x, x) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \xi_i \xi_k \quad \text{və} \quad A(x, x) = \sum_{i,k=1}^n b_{ik} \eta_i \eta_k$$

bərabərliklərini yaza bilərik. Burada $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ x vektorunun birinci bazisdə, $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ isə ikinci bazisdə koordinatlarıdır. Aydındır ki, $a_{ik} = A(e_i, e_k), b_{ik} = A(f_i, f_k), i, k = \overline{1, n}$ birinci bazisdən ikinci bazisə keçid matrisini $C = (c_{ik})$ ilə işarə edək. Onda

$$f_i = \sum_{k=1}^n c_{ik} e_k, \quad i = \overline{1, n} \quad (4)$$

Aşağıdakı bərabərliyə baxaq:

$$\begin{aligned} b_{ik} &= A(f_i, f_k) = A\left(\sum_{m=1}^n c_{im} e_m, \sum_{p=1}^n c_{kp} e_p\right) = \sum_{m=1}^n \sum_{p=1}^n c_{im} c_{kp} A(e_m, e_p) = \\ &= \sum_{m=1}^n \sum_{p=1}^n c_{im} c_{kp} a_{mp} = \sum_{p=1}^n \left(\sum_{m=1}^n c_{im} a_{mp} \right) c_{kp} = \sum_{p=1}^n \left(\sum_{m=1}^n c_{im} a_{mp} \right) c'_{pk}, \end{aligned}$$

burada $c'_{pk} = c_{kp}$. $C' = (c'_{pk})$ işarə etsək və matrislər hasilinin tərifindən istifadə etsək,

$$A(f) = CA(e)C' \quad (6)$$

olduğunu görürük. (6) bərabərliyi $A(x, y)$ bixətti formasının iki müxtəlif bazisdəki matrisləri arasında əlaqəni göstərir.

Bir bazisdən digər bazisə keçid matrisi qeyri-məxsusi matris olduğundan (6) düsturundan alırıq ki, $A(e)$ və $A(f)$ matrislərinin rəngi bir-birinə bərabərdir. Başqa sözlə bixətti formanın matrisinin rəngi bazisin seçilməsindən asılı deyil. Ona görə də, bixətti formanın hər hansı bazisdəki matrisinin rəngi bu bixətti formanın özünün rəngi adlanır.

Əgər bixətti formanın matrisinin rəngi fəzanın ölçüsünə bərabər olarsa, ona qeyri-məxsusi və ya cırılmayan bixətti forma, əks halda isə məxsusi və ya cırılan bixətti forma deyilir.

20. Kvadratik formalar

Tutaq ki, $A(x, y)$ simmetrik bixətti forması verilmişdir. $y = x$ götürməklə alınan $A(x, x)$ funksiyasına $A(x, y)$ bixətti formasına uyğun kvadratik forma deyilir. Əgər verilmiş bazisdə

$$A(x, y) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \xi_i \eta_k \quad (2)$$

olarsa, onda

$$A(x, x) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \xi_i \xi_k \quad (3)$$

olar. Qeyd edək ki, $A(x, y)$ bixətti formasının verilmiş bazisdə matrisi həmçinin $A(x, x)$ kvadratik formasının da matrisi adlanır.

Hər bir simmetrik bixətti formanı öz kvadratik forması vasitəsilə bərpa etmək mümkündür. Doğrudan da,

$$A(x + y, x + y) = A(x, x) + A(x, y) + A(y, x) + A(y, y)$$

bərabərliyində $A(x, y) = A(y, x)$ olduğunu nəzərə alsaq, sonuncu bərabərlikdən

$$A(x, y) = \frac{1}{2} [A(x + y, x + y) - A(x, x) - A(y, y)]$$

alırıq.

Əgər $\forall x, y \in X$ üçün $A(x, y) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \xi_i \eta_k$ simmetrik bixətti forma olarsa,

onda uyğun kvadratik formanı $A(x, x) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \xi_i \xi_k$ şəklində yazmaq olar. Aydındır

ki, sonuncu yazılış $A(x, x)$ kvadratik formasının müəyyən bir bazisdə yazılışıdır.

$A(x, y)$ bixətti formasının verilmiş bazisdə matrisi $A(x, x)$ kvadratik formasının da həmin bazisdə matrisi adlanır. Bu matris simmetrik olmaqla, onun rəngi bazisin seçilməsindən asılı deyil. Ona görə də, kvadratik formanın hər hansı

bazisdə matrisinin rənginə bu kvadratik formanın özünün rəngi deyilir. Əgər kvadratik formanın matrisinin rəngi fəzanın ölçüsünə bərabər olarsa, ona qeyri-məxsusi və ya cırlaşmayan kvadratik forma, əks halda isə məxsusi və ya cırlaşan kvadratik forma deyilir.

İndi isə kvadratik formaların aşağıdakı təsnifatını verək.

Tutaq ki, $A(x, x)$ kvadratik forması verilmişdir.

1. Əgər $\forall x \in X$ və $x \neq 0$ üçün $A(x, x) > 0$ ($A(x, x) < 0$) olarsa, $A(x, x)$ müsbət müəyyən (mənfi müəyyən) kvadratik forma adlanır. Müsbət müəyyən, mənfi müəyyən kvadratik formalara müəyyənişarəli kvadratik formalar deyilir.
2. Əgər elə $x, y \in X$ varsa ki, $A(x, x) > 0$, $A(y, y) < 0$ bərabərsizlikləri ödənsin, onda $A(x, x)$ işarəsini dəyişən kvadratik forma adlanır.
3. Əgər $\forall x \in X$ üçün $A(x, x) \geq 0$ və ya ($A(x, x) \leq 0$), lakin elə $x \neq 0$ vektoru varsa ki, $A(x, x) = 0$ olsun, onda $A(x, x)$ kvazimüəyyən işarəli kvadratik forma deyilir.

Tutaq ki, $A(x, y)$ simmetrik bixətti forma, $A(x, x)$ isə ona uyğun müsbət müəyyən kvadratik formadır. Onda X xətti fəzasında bu bixətti formanın köməyiylə $(x, y) = A(x, y)$ skalyar hasilini təyin etmək olar. Bu bərabərliklə təyin olunan qaydanın skalyar hasilin malik olduğu bütün xassələri ödədiyini asanlıqla yoxlamaq olar.

KVADRATİK FORMANIN KANONİK ŞƏKİLƏ GƏTİRİLMƏSİ

Məlumdur ki n ölçülü X həqiqi xətti fəzasında təyin olunmuş hər bir $A(x, x)$ kvadratik formasını verilmiş bazisdə

$$A(x, x) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \xi_i \xi_k$$

şəklində yazmaq olar. Lakin, elə bazis ola bilər ki, bu bazisdə $A(x, x)$ kvadratik forması aşağıdakı şəkildə yazılsın:

$$A(x, x) = \lambda_1 \xi_1^2 + \lambda_2 \xi_2^2 + \dots + \lambda_n \xi_n^2$$

burada $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ x vektorunun həmin bazisdə koordinatlarıdır. $A(x, x)$ kvadratik formasının bu şəkildə yazılışı onun **kanonik şəkilli**, həmin bazis isə **kanonik bazis** adlanır. Beləliklə, kvadratik formanı kanonik şəkilə gətirmək üçün verilmiş bazisdən elə bir bazisə keçmək lazımdır ki, bu bazisdə kvadratik forma kanonik şəkildə yazılsın. Biz həqiqi xətti fəzada $A(x, x)$ kvadratik formasının kanonik şəkilə gətirilməsi üçün müxtəlif üsullar göstərəcəyik.

1.Laqranj üsulu. Tutaq ki, $A(x, x)$ kvadratik forması $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində aşağıdakı şəkildədir:

$$A(x, x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j \quad (1)$$

burada $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ x vektorunun $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində koordinatlarıdır. Biz hesab edəcəyik ki, $A(x, x) \neq 0$. Bu şərt daxilində aydındır ki, a_{ij} əmsallarından heç olmazsa biri sıfırdan fərqlidir. Biz hesab edəcəyik ki, $a_{11} \neq 0$. Əgər $a_{11} = 0$ olduqda $a_{ii} (i = 2, \dots, n)$ əmsallarından heç olmazsa biri sıfırdan fərqli olarsa, onda bazis vektorlarını yenidən nömrələməklə həmişə a_{11} əmsalını sıfırdan fərqli etmək olar. Əgər bütün $a_{ii} (i = 2, \dots, n)$ əmsalları sıfıra bərabər olarsa, onda müəyyən əvəzləmə vasitəsilə yenə də a_{11} əmsalını sıfırdan fərqli etmək olar. Məsələn, $a_{ij} \neq 0$ olarsa, onda

$$\left. \begin{aligned} \xi'_i &= \frac{(\xi_i + \xi_j)}{2} \\ \xi'_j &= \frac{(\xi_i - \xi_j)}{2} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \xi_i &= \xi'_i + \xi'_j \\ \xi_j &= \xi'_i - \xi'_j \end{aligned} \right\}$$

əvəzləməsini aparmaqla qalan koordinatları dəyişməsək ξ'_i -in əmsalını sıfırdan fərqli etmək olar.

Beləliklə, ümumiliyi pozmadan hesab edəcəyik ki, $a_{11} \neq 0$. Bunu nəzərə alıb $A(x, x)$ kvadratik formasını aşağıdakı şəkildə yazarıq:

$$A(x, x) = a_{11}\xi_1^2 + 2a_{12}\xi_1\xi_2 + \dots + 2a_{1n}\xi_1\xi_n + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}\xi_i\xi_j \quad (2)$$

Bu bərabərliyin sağ tərəfindəki cəmləmə işarəsindən kənarda olan hədləri tam kvadrat şəklində yazaq:

$$\begin{aligned} A(x, x) &= a_{11} \left(\xi_1^2 + \frac{a_{12}}{a_{11}} \xi_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} \xi_n \right)^2 - 2\xi_2\xi_3 \frac{a_{12}a_{13}}{a_{11}} - \dots - \\ &- 2 \frac{a_{1n-1}a_{1n}}{a_{11}} \xi_{n-1}\xi_n - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \xi_2^2 - \dots - \frac{a_{2n}^2}{a_{11}} \xi_n^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}\xi_i\xi_j = \\ &= a_{11} \left(\xi_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} \xi_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} \xi_n \right)^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}^* \xi_i\xi_j \end{aligned} \quad (3)$$

Beləliklə, $A(x, x)$ kvadratik formasını

$$A(x, x) = a_{11} \left(\xi_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} \xi_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} \xi_n \right)^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}^* \xi_i\xi_j \quad (4)$$

şəkilndə yazmaq olar.

Aşağıdakı şəkildə əvəzləmə aparaq:

$$\left. \begin{aligned} \eta_1 &= \xi_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} \xi_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} \xi_n \\ \eta_2 &= \xi_2 \\ \eta_3 &= \xi_3 \\ &\dots\dots\dots \\ \eta_n &= \xi_n \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Göründüyü kimi bu çevirmənin matrisi qeyri-məxsusi matrisdir. Bu o deməkdir ki, $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisindən elə bir yeni bazisə keçmişik ki, həmin bazisdə x vektorunun $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ koordinatları (5) düsturları vasitəsilə təyin olunur. Beləliklə yeni bazisdə

$$A(x, x) = a_{11}\eta_1^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}^* \eta_i \eta_j \quad (6)$$

Əgər (6) ifadəsində bütün a_{ij}^* əmsalları sıfıra bərabər olarsa, onda aydındır ki, $A(x, x)$ kvadratik forması kanonik şəkildə gətirilmiş olur. Əgər onlardan heç olmazsa biri sıfırdan fərqli olarsa, onda yuxarıda tətbiq etdiyimiz qaydanı $\sum_{i,j=2}^n a_{ij}^* \eta_i \eta_j$ kvadratik formasına tətbiq etsək və prosesi bu qayda ilə davam etdirsək, sonlu sayda addımdan sonra $A(x, x)$ kvadratik formasını kanonik şəkildə gətirmiş olarıq.

Göründüyü kimi Laqranj üsulu ilə kvadratik formanı kanonik şəkildə gətirərkən, biz hər dəfə qeyri-məxsusi koordinat çevrilməsi aparırıq. Bu isə öz növbəsində bir bazisdən digərinə keçmək deməkdir. Apardığımız qeyri-məxsusi çevrilmələri ardıcıl olaraq tətbiq etməklə sonda x vektorunun kanonik formadakı bazisə uyğun koordinatlarını tapa bilərik. Qeyd edək ki, kvadratik formanın kanonik şəkildə yazıldığı bazis kanonik bazisdir

21. Yakobi üsulu

Kvadratik formanı Yakobi üsulu ilə kanonik şəkildə gətirməzdən əvvəl bazis vektorların üçbucaq çevirməsi ilə tanış olaq.

Tutaq ki, n ölçülü X həqiqi xətti fəzasında $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisi verilmişdir. Bu vektorların köməyi ilə aşağıdakı vektorları təyin edək:

$$\left. \begin{aligned} f_1 &= e_1 \\ f_2 &= \alpha_{21}e_1 + e_2 \\ f_3 &= \alpha_{31}e_1 + \alpha_{32}e_2 + e_3 \\ f_j &= \alpha_{j1}e_1 + \alpha_{j2}e_2 + \dots + \alpha_{jj-1}e_{j-1} + e_j \\ &\dots\dots\dots \\ f_n &= \alpha_{n1}e_1 + \alpha_{n2}e_2 + \dots + \alpha_{nn-1}e_{n-1} + e_n \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

(1) bərabərliyindən görünür ki, bu çevirmənin əmsallarından düzəldilmiş matris qeyri-məxsusudur. Ona görə $f_1, f_2, \dots, f_n$ vektorları da X fəzasında bazis əmələ gətirir. $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazis vektorlarının bu qeyri-məxsusi çevrilməsi üçbucaq çevirməsi adlanır. Göstərək ki, hər bir $A(x, x)$ kvadratik forması üçün ($e_1, e_2, \dots, e_n$ - də verilmiş) bazis vektorların elə üçbucaq çevirməsi var ki, bu çevirmə nəticəsində alınan yeni bazisdə $A(x, x)$ kvadratik forması kanonik şəkildə yazılır. Tutaq ki, $A(x, x)$ kvadratik forması $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində aşağıdakı bərabərliklə təyin olunur

$$A(x, x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j \quad (2)$$

a_{ij} ($a_{ij} = a_{ji}$) əmsallarından aşağıdakı determinantları düzəldək:

$$\Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_{n-1} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n-1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n-11} & a_{n-12} & \dots & a_{nn-1} \end{vmatrix}$$

Teorem. Əgər $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində verilmiş $A(x, x)$ kvadratik forması üçün $\Delta_1 \neq 0, \Delta_2 \neq 0, \dots, \Delta_{n-1} \neq 0$

olarsa, onda bu bazis vektorlarının elə üçbucaq çevirməsi var ki, alınmış yeni bazisdə $A(x, x)$ kvadratik forması kanonik şəkildə yazılır.

İsbatı. Bildiyimiz kimi $A(x, x)$ kvadratik formasının $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində matrisinin əmsalları $a_{ij} = A(e_i, e_j)$ bərabərlikləri ilə təyin olunur. Yeni $f_1, f_2, \dots, f_n$ bazisində $b_{ij} = A(f_i, f_j)$ ($i, j = \overline{1, n}$) işarə edək. Bu bazisdə kvadratik forma kanonik şəkildə olduğundan $i \neq j$ olduqda $b_{ij} = 0$. Sonuncu bərabərlik o deməkdir ki, $A(f_i, f_j) = 0, i \neq j$. Asanlıqla görmək olar ki, bu bərabərliklərin ödənməsi

$$A(f_i, f_j) = 0, \quad i < j \quad (3)$$

bərabərliyinin ödənməsi deməkdir.

Qeyd edək ki, (3) bərabərliklərindən aşağıdakı bərabərliklər alınır:

$$A(e_1, f_j) = 0, A(e_2, f_j) = 0, \dots, A(e_{j-1}, f_j) = 0, \quad j = 2, 3, \dots, n \quad (4)$$

Eləcə də, f_i vektorları üçün yazılmış ifadələrdən və $A(x, x)$ kvadratik formasının hər bir arqumentinə nəzərən xətti olmasından istifadə edərək, (4) bərabərliklərindən (3) bərabərliklərini alınaq olar.

$f_j = \alpha_{j1}e_1 + \alpha_{j2}e_2 + \dots + \alpha_{jj-1}e_{j-1} + e_j$ olduğunu nəzərə alıb, j -yə qiymətlər verməklə (4) bərabərliklərini açıq şəkildə yazsaq, α_{ji} əmsallarına görə aşağıdakı xətti tənliklər sistemini alarıq:

$$\lambda_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta_1}, \lambda_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \lambda_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2}, \dots, \lambda_n = \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}. \quad (8)$$

KVADRATİK FORMALAR ÜÇÜN ƏTALƏT QANUNU

Tutaq ki, $A(x, x)$ kvadratik forması hər hansı yolla kanonik şəkilə gətirilmişdir. Yəni,

$$A(x, x) = \lambda_1 \mu_1^2 + \lambda_2 \mu_2^2 + \dots + \lambda_k \mu_k^2 \quad k \leq n$$

Aşağıdakı şəkildə əvəzləmə apararaq:

$$\eta_1 = \sqrt{\lambda_1} \mu_1, \eta_2 = \sqrt{\lambda_2} \mu_2, \dots, \eta_p = \sqrt{\lambda_p} \mu_p \quad (\lambda_p > 0).$$

$$\eta_{p+1} = \sqrt{-\lambda_{p+1}} \mu_{p+1}, \eta_{p+2} = \sqrt{-\lambda_{p+2}} \mu_{p+2}, \dots, \eta_k = \sqrt{-\lambda_k} \mu_k \quad (\lambda_{p+1} < 0, \dots, \lambda_k < 0)$$

$$\eta_{k+1} = \mu_{k+1}, \dots, \eta_n = \mu_n.$$

Bu qeyri-məxsusi çevirmədən sonra $A(x, x)$ kvadratik formasını aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:

$$A(x, x) = \eta_1^2 + \eta_2^2 + \dots + \eta_p^2 - \eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_k^2 \quad (k \leq n).$$

$A(x, x)$ kvadratik formasının bu şəkildə yazılışı onun normal şəkli adlanır. Beləliklə müəyyən bir qeyri məxsusi çevirmə vasitəsilə, kvadratik formanı normal şəkilə gətirmək olar.

Teorem(Kvadratik formalar üçün ətalət qanunu). Kvadratik formanın hansı yolla normal şəkilə gətirilməsindən asılı olmayaraq, onun normal şəkilindəki müsbət və mənfi işarəli hədlərin sayı dəyişmir.

İsbatı. Tutaq ki, $A(x, x)$ kvadratik forması $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində aşağıdakı bərabərlik vasitəsilə verilmişdir:

$$A(x, x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j,$$

$(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ x vektorunun $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisində koordinatlarıdır. Bu kvadratik formanı iki müxtəlif yolla normal şəkilə gətirdikdən sonra onu aşağıdakı kimi yazmaq olar:

$$A(x, x) = \eta_1^2 + \eta_2^2 + \dots + \eta_p^2 - \eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_k^2 \quad (k \leq n). \quad (2)$$

$$A(x, x) = \zeta_1^2 + \zeta_2^2 + \dots + \zeta_q^2 - \zeta_{q+1}^2 - \dots - \zeta_k^2 \quad k \leq n \quad (3)$$

(2) və (3) bərabərliklərindən görünür ki, birinci halda kvadratik formanın müsbət işarəli hədlərinin sayı p -yə, ikincidə isə q -yə bərabərdir. Göstərək ki, $p = q$.

Tutaq ki, $p > q$. Bu halda isbat edək ki, sıfırdan fərqli elə x vektoru var ki, onun (2) və (3) normal şəkillərinə uyğun bazislərdəki aşağıdakı koordinatları sıfıra bərabərdir:

$$\zeta_1 = 0, \zeta_2 = 0, \dots, \zeta_q = 0, \eta_{p+1} = 0, \dots, \eta_k = 0. \quad (4)$$

Qeyd edək ki, η_i və ζ_i koordinatları $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ koordinatlarının uyğun olaraq,

$$\eta_i = a_{i1}\xi_1 + a_{i2}\xi_2 + \dots + a_{in}\xi_n \quad \text{və} \quad \zeta_i = b_{i1}\xi_1 + b_{i2}\xi_2 + \dots + b_{in}\xi_n$$

şəkilli qeyri məxsusi xətti çevirmələri vasitəsilə alınmışdır. Ona görə də, (4) münasibətlərini sistem şəklində yazsaq, $p > q$ olduğu üçün $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ məchullarına nəzərən, n – dən az sayda xətti bircins tənliklər sistemi alırıq. Bildiyimiz kimi belə sistemin həmişə sıfırdan fərqli həlli var. Başqa sözlə sıfırdan fərqli elə x vektoru var ki, onun koordinatları üçün (4) bərabərlikləri doğrudur. Bu bərabərlikləri (2) və (3)-də nəzərə alsaq,

$$A(x, x) = \eta_1^2 + \eta_2^2 + \dots + \eta_p^2 = -\xi_{q+1}^2 - \xi_{q+2}^2 - \dots - \xi_k^2.$$

Sonuncu bərabərlik yalnız $\eta_1 = 0, \eta_2 = 0, \dots, \eta_p = 0, \xi_{q+1} = 0, \dots, \xi_k = 0$ olduqda ödənilə bilər. Bu bərabərlikləri (4) ilə birlikdə götürsək,

$\eta_1 = 0, \eta_2 = 0, \dots, \eta_p = 0, \eta_{p+1} = 0, \dots, \eta_n = 0$ alırıq. Başqa sözlə, $x \neq 0$ vektorunun müəyyən bazisdə bütün koordinatları sıfıra bərabərdir. Alınan ziddiyyət göstərir ki, fərziyyəmiz doğru deyil. Yəni, $p > q$ ola bilməz. Eyni qayda ilə isbat etmək olar ki, $p < q$ ola bilməz. Deməli $p = q$ olmalıdır. Teorem isbat edildi.

22. KVADRATİK FORMALARIN TƏSNİFATI

Tutaq ki, n ölçülü X xətti fəzasında $A(x, x)$ kvadratik forması verilmişdir. Ətalət qanununa görə bu kvadratik formanın hansı yolla normal şəkildə gətirilməsindən asılı olmayaraq, normal şəkildəki müsbət və mənfi işarəli hədlərin sayı dəyişmir. Kvadratik formanın normal şəklindəki sıfırdan fərqli hədlərin sayı onun ətalət indeksi adlanır. Müsbət işarəli hədlərin sayına onun müsbət indeksi, mənfi işarəli hədlərin sayına isə mənfi indeksi deyilir. Müsbət və mənfi indekslərin cəmi kvadratik formanın rənginə bərabərdir. $A(x, x)$ kvadratik formasının ətalət indeksini k , müsbət indeksini p , mənfi indeksini isə q ilə işarə edəcəyik.

Məlumdur ki, kvadratik formalar aşağıdakı üç sinifə bölünürlər:

- müəyyən işarəli kvadratik formalar
- işarəsini dəyişən kvadratik formalar
- kvazi müəyyən işarəli kvadratik formalar

$A(x, x)$ kvadratik formasının normal şəklindən istifadə edərək, onun bu üç növdən hansına aid olduğunu müəyyən etməyə imkan verən aşağıdakı teoremləri qeyd edək.

Teorem1. $A(x, x)$ kvadratik formasının müəyyən işarəli olması üçün zəruri və kafi şərt onun müsbət indeksinin (p) və ya mənfi indeksinin (q) fəzanın ölçüsünə (n) bərabər olmasıdır.

Daha dəqiq desək, müsbət müəyyən olması üçün $p = n$, mənfi müəyyən olması üçün $q = n$ olmasıdır.

İsbatı. Tutaq ki,

$$A(x, x) = \eta_1^2 + \eta_2^2 + \dots + \eta_p^2 - \eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_k^2 \quad (1)$$

Teoremi müsbət müəyyən kvadratik forma üçün isbat edəcəyik, mənfi müəyyən kvadratik forma üçün isbat analogidir.

Zərurilik. Tutaq ki, $A(x, x)$ müsbət müəyyəndir. Göstərək ki, $p = n$ Tutaq ki, $p < n$. Onda sıfırdan fərqli $x = (0, \dots, 0, \eta_{p+1}, \dots, \eta_k)$ $\eta_i \neq 0, i = \overline{p+1, n}$ vektoru üçün $A(x, x) = 0$. Bu usə $A(x, x)$ kvadratik formanın müsbət müəyyən olması şrtinə ziddir.

Kafilik. Tutaq ki, $p = n$. Onda (1) kvadratik forması

$$A(x, x) = \eta_1^2 + \dots + \eta_n^2$$

şeklində olar. Aydındır ki, $A(x, x) \geq 0$, belə ki, əgər $A(x, x) = 0$ olarsa, onda $\eta_1 = 0, \eta_2 = 0, \dots, \eta_n = 0$, yəni x vektoru sıfıra bərabərdir. Bu isə $A(x, x)$ kvadratik formasının müsbət müəyyən olması deməkdir.

Teorem2. $A(x, x)$ kvadratik formasının işarəsini dəyişən olması üçün zəruri və kafi şərt onun həm müsbət, həm də mənfi indeksinin sıfırdan fərqli olmasıdır.

İsbatı. Zərurilik. Tutaq ki, $A(x, x)$ işarəsini dəyişən kvadratik formadır. Onda $A(x, x)$ həm müsbət, həm də mənfi işarəli qiymətlər alar. Ona görə də, bu kvadratik formanın normal şəklində həm müsbət, həm də mənfi işarəli hədlər iştirak etməlidir. Beləliklə, $A(x, x)$ kvadratik formasının həm müsbət, həm də mənfi indeksi sıfırdan fərqli olmalıdır.

Kafilik. Tutaq ki, $A(x, x)$ kvadratik formasının həm müsbət, həm də mənfi indeksi sıfırdan fərqlidir. Yəni o aşağıdakı şəkildədir:

$$A(x, x) = \eta_1^2 + \eta_2^2 + \dots + \eta_p^2 - \eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_k^2$$

Aydındır ki, $x = (0, 0, \dots, 0, \eta_{p+1}, \dots, \eta_n)$, $\eta_{p+1} \neq 0, \eta_{p+2} \neq 0, \dots, \eta_k \neq 0$, vektoru üçün $A(x, x) < 0$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p, 0, \dots, 0)$, $\eta_1 \neq 0, \eta_2 \neq 0, \dots, \eta_p \neq 0$ vektoru üçün $A(y, y) > 0$. Yəni $A(x, x)$ kvadratik forması işarəsini dəyişəndir.

Teorem3. $A(x, x)$ kvadratik formasının kvazimüsbət (kvazimənfi) işarəli olması üçün zəruri və kafi şərt, onun müsbət (mənfi) indeksinin fəzanın ölçüsündən kiçik, mənfi (müsbət) indeksinin isə sıfıra bərabər olmasıdır.

Teoremi kvazimüsbət kvadratik forma üçün isbat edək. kvazimənfi kvadratik forma üçün analogi qaydada isbat olunur.

İsbatı. Zərurilik. Tutaq ki, $A(x, x)$ kvazimüsbət işarəli kvadratik formadır. Onda aydındır ki, $q = 0, p < n$ olmalıdır, çünki $p = n$ olarsa, onda kvadratik forma müsbət müəyyən olardı.

Kafilik. Tutaq ki, $q = 0, p < n$. Onda aydındır ki, $A(x, x) \geq 0$ və sıfırdan fərqli $x = (0, 0, \dots, 0, \eta_{p+1}, \eta_{p+2}, \dots, \eta_n)$, $\eta_{p+1} \neq 0, \eta_{p+2} \neq 0, \dots, \eta_n \neq 0$ vektoru üçün $A(x, x) = 0$. Yəni $A(x, x)$ kvazimüsbət işarəli kvadratik formadır.

SİLVESTR ƏLAMƏTİ

Tutaq ki, $A(x, x)$ kvadratik formasının $e_1, e_2, \dots, e_n$ bazisindəki matrisi $A(e) = (a_{ij})$ –dir. Bu matrisin baş diaqonal minorlarını $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ ilə işarə edək.

Kafilik. Teoremin şərtindən çıxır ki, bütün $\Delta_i \neq 0 (i=1,2,\dots,n)$. Onda, yenə də Yakobi üsulu ilə kvadratik formanı kanonik şəkildə gətirmək olar. $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$ olduqda (2) düsturlarından $\lambda_j > 0 (j=1,2,\dots,n)$ olması, yəni $A(x, x)$ kvadratik formasının müsbət müəyyən olması alınır. Əgər $\Delta_1 < 0, \Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ -lər işarəsini növbə ilə dəyişən olarsa, onda (2) düsturlarından $\lambda_j < 0 (j=1,2,\dots,n)$ olması yəni, $A(x, x)$ kvadratik formasının mənfi müəyyən olması alınır. Teorem isbat edildi.

