Sklicevanje in okolja

Sklici

```
\section{Uvod}
Trikotnike poznamo že iz osnovne šole.

\section{Pitagorov izrek}
\textbf{Izrek~2.1 (Pitagorov izrek).}
\emph{V pravokotnem trikotniku s katetama~\(a\)
in~\(b\) ter hipotenuzo~\(c\) velja
\(a^2 + b^2 = c^2\).}

Iz izreka~2.1 izpeljemo razdaljo med
točkama v prostoru~[1].

\section*{Literatura}
[1] I.~Vidav, \emph{Višja matematika I}, 2008.
```

1 Uvod

Trikotnike poznamo že iz osnovne šole.

2 Pitagorov izrek

Izrek 2.1 (Pitagorov izrek). *V pravokotnem trikotniku s katetama a in b ter hipotenuzo c velja $a^2 + b^2 = c^2$.*

Iz izreka 2.1 izpeljemo razdaljo med točkama v prostoru [1].

Literatura

[1] I. Vidav, *Višja matematika I*, 2008.

```
\section{Uvod}
Trikotnike poznamo že iz osnovne šole.

\section{Talesov izrek}
\textbf{Izrek~2.1 (Talesov izrek).}
\emph{Obodni kot nad premerom je pravi.}

\section{Pitagorov izrek}
\textbf{Izrek~2.1 (Pitagorov izrek).}
\emph{V pravokotnem trikotniku s katetama~\(a\)
in~\(b\) ter hipotenuzo~\(c\) velja
\(a^2 + b^2 = c^2\).}

\section*{Literatura}
[1] I.~Vidav, \emph{Višja matematika I}, 2008.
```

1 Uvod

Trikotnike poznamo že iz osnovne šole.

2 Talesov izrek

Izrek 2.1 (Talesov izrek). *Obodni kot nad premerom je pravi.*

3 Pitagorov izrek

Izrek 2.1 (Pitagorov izrek). *V pravokotnem trikotniku s katetama a in b ter hipotenuzo c velja $a^2 + b^2 = c^2$.*

Iz izreka 2.1 izpeljemo razdaljo med točkama v prostoru [1].

Literatura

[1] I. Vidav, *Višja matematika I*, 2008.

```
\usepackage{amsthm}
\newtheorem{izrek}{Izrek}[section]
...
\begin{document}
...
\section{Pitagorov izrek}
\begin{izrek}[Pitagorov izrek]
  V pravokotnem trikotniku ...
\end{izrek}
```

2 Pitagorov izrek

Izrek 2.1 (Pitagorov izrek). *V pravokotnem trikotniku . . .*

```
\usepackage{amsthm}
\newtheorem{izrek}{Izrek}[section]
...
\begin{document}
...
\section{Talesov izrek}
\begin{izrek}[Talesov izrek]
  Obodni kot nad premerom je pravi.
\end{izrek}

\section{Pitagorov izrek}
\begin{izrek}[Pitagorov izrek]
  V pravokotnem trikotniku ...
\end{izrek}
```

2 Talesov izrek

Izrek 2.1 (Talesov izrek). *Obodni kot nad premerom je pravi.*

3 Pitagorov izrek

Izrek 3.1 (Pitagorov izrek). *V pravokotnem trikotniku . . .*

`\newtheorem{izrek}{Izrek}`	Izrek 1, Izrek 2, Izrek 3
`\newtheorem{izrek}{Izrek}[section]`	Izrek 2.1, Izrek 3.1, Izrek 3.2
`\newtheorem{posledica}[izrek]{Posledica}`	Izrek 3.1, Posledica 3.2, Izrek 3.3

```
{\theoremstyle{plain}
\newtheorem{izrek}{Izrek}[section]
\newtheorem{posledica}[izrek]{Posledica}
}

{\theoremstyle{definition}
\newtheorem{definicija}[izrek]{Definicija}
}
```

3 Pitagorov izrek

Definicija 3.1. Trikotnik je *pravokoten*, če je eden od njegovih kotov pravi. Stranici ob pravem kotu sta *kateti*, tretja stranica je *hipotenuza*.

Izrek 3.2 (Pitagorov izrek)**.** *V pravokotnem trikotniku s katetama a in b ter hipotenuzo c velja $a^2 + b^2 = c^2$.*

Posledica 3.3. *V pravokotnem trikotniku je hipotenuza daljša od vsake od katet.*

```
\section{Pitagorov izrek}
\begin{izrek}[Pitagorov izrek]
  V pravokotnem trikotniku ...
\end{izrek}

Iz izreka~2.1 izpeljemo razdaljo med
točkama v prostoru~[1].
```

2 Pitagorov izrek

Izrek 2.1 (Pitagorov izrek). *V pravokotnem trikotniku . . .*

Iz izreka 2.1 izpeljemo razdaljo med točkama v prostoru [1].

```
\section{Talesov izrek}
\begin{izrek}[Talesov izrek]
  Obodni kot nad premerom je pravi.
\end{izrek}

\section{Pitagorov izrek}
\begin{izrek}[Pitagorov izrek]
  V pravokotnem trikotniku ...
\end{izrek}

Iz izreka~2.1 izpeljemo razdaljo med
točkama v prostoru~[1].
```

2 Talesov izrek

Izrek 2.1 (Talesov izrek). *Obodni kot nad premerom je pravi.*

3 Pitagorov izrek

Izrek 3.1 (Pitagorov izrek). *V pravokotnem trikotniku . . .*

Iz izreka 2.1 izpeljemo razdaljo med točkama v prostoru [1].

```
\section{Pitagorov izrek}
\begin{izrek}[Pitagorov izrek]
  \label{izr:pitagora}
  V pravokotnem trikotniku s katetama~\(a\)
  in~\(b\) ter hipotenuzo~\(c\) velja ...
\end{izrek}

Iz izreka~\ref{izr:pitagora} izpeljemo
razdaljo med točkama v prostoru~[1].
```

3 Pitagorov izrek

Izrek 3.1 (Pitagorov izrek). *V pravokotnem trikotniku s katetama a in b ter hipotenuzo c velja . . .*

Iz izreka 3.1 izpeljemo razdaljo med točkama v prostoru [1].

```
Iz izreka~2.1

Iz izreka~\ref{izr:pitagora}
```

```
Iz izreka~\ref{izr:pitagor}
izpeljemo razdaljo med
točkama v prostoru~[1].
```

Iz izreka ?? izpeljemo razdaljo med točkama v prostoru [1].

```
LaTeX Warning: Reference `izr:pitagor' on page 2 undefined on input line 31.
```

```
$ pdflatex dokument.tex
$ pdflatex dokument.tex
```

```
\[
  a^2 + b^2 = c^2
\]
```

$$a^2 + b^2 = c^2$$

```
\begin{equation}
  a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}
```

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

```
\begin{equation}
  \label{enc:pitagora}
  a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}
```

`izreka~\ref{izr:pitagora}`	izreka 3.1
`enačbe~\eqref{enc:pitagora}`	enačbe (1)
`na strani~\pageref{izr:pitagora}`	na strani 2

Predpone `izr:`, `enc:`, `tab:` so dogovor.

$$
\begin{aligned}
a x^2 + b x + c &= 0 \\
\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2-4ac}{4a^2} \\
x_{1, 2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}
\end{aligned}
$$

```
\begin{align*}
  a x^2 + b x + c &= 0 \\
  \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2-4ac}{4a^2} \\
  x_{1, 2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}
\end{align*}
```

Če nočete oštevilčenja, uporabite `align*`

Dobro

```
\begin{align*}
  a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n &= b_1 \\
  a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n &= b_2 \\
                                               &\vdotswithin{=} \\
  a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n &= b_n,
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
&\vdots \\
a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n,
\end{aligned}
$$

Če nočete oštevilčenja, uporabite `align*`

Slabo

```
\begin{align}
  a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n &= b_1 \\
  a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n &= b_2 \\
                                               &\vdotswithin{=} \\
  a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n &= b_n,
\end{align}
```

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \tag{2}$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \tag{3}$$
$$\vdots \tag{4}$$
$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \tag{5}$$

Če nočete oštevilčenja, uporabite `align*`

Slabo

```
\begin{align}
  a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n &= b_1 \nonumber \\
  a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n &= b_2 \nonumber \\
                                               &\vdotswithin{=} \nonumber \\
  a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n &= b_n, \nonumber
\end{align}
```

$$
\begin{aligned}
a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n &= b_1 \\
a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n &= b_2 \\
&\vdotswithin{=} \\
a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n &= b_n,
\end{aligned}
$$

Če uporabljate `align`, uporabite tudi `&`

Dobro

```
\begin{align*}
  a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n &= b_1 \\
  a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n &= b_2 \\
                                               &\vdotswithin{=} \\
  a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n &= b_n,
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
&\vdots \\
a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n,
\end{aligned}
$$

Če uporabljate `align`, uporabite tudi `&`

Slabo

```
\begin{align*}
  a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1 \\
  a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_2 \\
                                          \vdotswithin{=} \\
  a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n = b_n,
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
&\vdots \\
a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n,
\end{aligned}
$$

Če uporabljate `align`, uporabite tudi `&`

Slabo

```
\begin{align*}
  a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1 \\
  a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_1 + b_2 \\
                                          \vdotswithin{=} \\
  a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n,
\end{align*}
```

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_1 + b_2 \\
&\vdots \\
a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_1 + b_2 + \cdots + b_n,
\end{aligned}
$$

Tabele se po lahko premikajo po straneh

Slabo

```
\begin{table}[!ht]
  \centering
  \caption{Pitagorejske trojice}
  \begin{tabular}{ccc}
    3 & 4 & 5 \\
    5 & 12 & 13 \\
  \end{tabular}
\end{table}

Prvih nekaj pitagorejskih trojic je v zgornji tabeli.
```

Tabele se po lahko premikajo po straneh

Dobro

```
\begin{table}[!ht]
  \centering
  \caption{Pitagorejske trojice}
  \label{tab:trojice}
  \begin{tabular}{ccc}
    3 & 4 & 5 \\
    5 & 12 & 13 \\
  \end{tabular}
\end{table}

Prvih nekaj pitagorejskih trojic je v tabeli~\ref{tab:trojice}.
```

Literatura

```
...
Iz izreka~\ref{izr:pitagora} izpeljemo
razdaljo med točkama v prostoru~[1].

\section*{Literatura}
[1] I.~Vidav, \emph{Višja matematika I}, 2008.
```

Iz izreka 3.1 izpeljemo razdaljo med točkama v prostoru [1].

Literatura

[1] I. Vidav, *Višja matematika I*, 2008.

```
Dokaz izreka je že v Evklidovih
Elementih~[1].
...
Iz izreka~\ref{izr:pitagora} izpeljemo
razdaljo med točkama v prostoru~[2].

\section*{Literatura}
[1] Evklid, \emph{Elementi}.

[2] I.~Vidav, \emph{Višja matematika I}, 2008.
```

Dokaz izreka je že v Evklidovih Elementih [1].

...

Iz izreka 3.1 izpeljemo razdaljo med točkama v prostoru [1].

Literatura

[1] Evklid, *Elementi*.

[2] I. Vidav, *Višja matematika I*, 2008.

```
...
Iz izreka~\ref{izr:pitagora} izpeljemo
razdaljo med točkama v prostoru~[1].

\section*{Literatura}
[1] Evklid, \emph{Elementi}.

[2] I.~Vidav, \emph{Višja matematika I}, 2008.
```

...

Iz izreka 3.1 izpeljemo razdaljo med točkama v prostoru [1].

Literatura

[1] Evklid, *Elementi*.

[2] I. Vidav, *Višja matematika I*, 2008.

literatura.bib

```
@book{evklid56,
  author    = {Evklid},
  title     = {The Thirteen Books
               of the Elements},
  note      = {prevedel T.~L.~Heath},
  publisher = {Dover},
  year      = 1956
}
```

```
@book{vidav08,
  author    = {Ivan Vidav},
  title     = {Višja matematika I
               (12.~ponatis)},
  publisher = {DMFA--Založništvo},
  year      = 2008
}
@book{rudin87,
  author    = {Walter Rudin},
  title     = {Real and Complex Analysis},
  publisher = {McGraw-Hill},
  year      = 1987
}
```

```
Dokaz izreka je že v Evklidovih Elementih~\cite{evklid56}.
...
Iz izreka~\ref{izr:pitagora} izpeljemo razdaljo med točkama
v prostoru~\cite{vidav08}.

\bibliographystyle{plain}
\bibliography{literatura}
```

```
Iz izreka~\ref{izr:pitagora}
izpeljemo razdaljo med
točkama v prostoru~\cite{vidav}.
```

Iz izreka 3.1 izpeljemo razdaljo med točkama v prostoru [?].

```
LaTeX Warning: Citation `vidav' on page 2 undefined on input line 31.
```

```
$ pdflatex dokument.tex
$ bibtex dokument
$ pdflatex dokument.tex
$ pdflatex dokument.tex
```

`\bibliographystyle{plain}`	Elementih [1]	prostoru [2]
`\bibliographystyle{alpha}`	Elementih [Evk56]	prostoru [Vid08]

Vnosov ne tipkamo sami

zbMATH Open 🔓

MathSciNet 🔒

Lastni ukazi in okolja

Za pogoste izraze si definiramo ukaze

Slabo

```
Kjer je matrika s koeficienti iz $\mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$
je stolpec skalarjev, $x \in \mathbb{R}^n$ pa stolpec neznank.
```

Dobro

```
\newcommand{\Rn}{\mathbb{R}^n}
Kjer je matrika s koeficienti iz $\Rn$, $b \in \Rn$ je stolpec
skalarjev, $x \in \Rn$ pa stolpec neznank.
```

Matematične ukaze definiramo brez $

Slabo

```
\newcommand{\Rn}{$\mathbb{R}^n$}
Kjer je matrika s koeficienti iz \Rn, $b \in$ \Rn je stolpec
skalarjev, $x \in$ \Rn pa stolpec neznank.
```

Kjer je matrika s koeficienti iz $\mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$ je stolpec skalarjev, $x \in \mathbb{R}^n$ pa stolpec neznank.

Dobro

```
\newcommand{\Rn}{\mathbb{R}^n}
Kjer je matrika s koeficienti iz $\Rn$, $b \in \Rn$ je stolpec
skalarjev, $x \in \Rn$ pa stolpec neznank.
```

Kjer je matrika s koeficienti iz $\mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$ je stolpec skalarjev, $x \in \mathbb{R}^n$ pa stolpec neznank.