

HW3

February 11, 2022

Math 104A Homework 3

Rad Mallari 8360828

```
[1]: from IPython.display import Latex
Latex('''

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) l_j(x)$$


We can look for our  $l_j(x)$  which are given by

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

So for each  $i=2$  we have

$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{x(x-1)}{6}$$


$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{-x^2 + x - 2}{2}$$


$$l_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{x(x+2)}{3}$$


And we get the polynomial

$$p_2(x) = \frac{-5x^2 - 7x + 6}{6}$$


Approximating  $f(-1)$  gives us

$$p_2(-1) = \frac{-5(-1)^2 - 7(-1) + 6}{6} = \frac{-5 + 7 + 6}{6} = \frac{2}{3}$$

''')
```

[1]:

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) l_j(x)$$

We can look for our $l_j(x)$ which are given by

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

So for each $i = 2$ we have

$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{x(x-1)}{6}$$

$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{-x^2 + x - 2}{2}$$

$$l_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{x(x+2)}{3}$$

And we get the polynomial

$$p_2(x) = \frac{-5x^2 - 7x + 6}{6}$$

Approximating $f(-1)$ gives us

$$p_2(-1) = \frac{-5(1)^2 - 7(-1) + 6}{6} = \frac{-5 + 7 + 6}{6} = \frac{2}{3}$$

[]: