



Química Nivel medio Prueba 2

Jueves 12 de mayo de 2016 (mañana)

Numero de com	/ocatoria del alumn⊲

1 hora 15 minutos

Instrucciones para los alumnos

- Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba.
- · No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- · Conteste todas las preguntas.
- Escriba sus respuestas en las casillas provistas.
- En esta prueba es necesario usar una calculadora.
- Se necesita una copia sin anotaciones del cuadernillo de datos de química para esta prueba.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es [50 puntos].

2216-6129

© International Baccalaureate Organization 2016

Cont	este t	odas	las preguntas. Escriba sus respuestas en las casillas provistas.	
1.	La fo	sfina	(nombre IUPAC fosfano) es un hidruro de fósforo, de fórmula PH ₃ .	
	(a)	(i)	Dibuje una estructura de Lewis (representación de electrones mediante puntos) de la fosfina.	[1]
			r '	
		(ii)	Resuma si espera que los enlaces en la fosfina sean polares o no polares, dando una razón breve.	[1]
	e 15005			
		(iii)	Explique por qué la molécula de fosfina no es plana.	[2]

		. 7 2 7 7		=
	(2)(3) t	3 3		
	0 0 000 0 0			
		(iv)	La masa molar de la fosfina es mucho mayor que la del amoníaco. Explique por qué el punto de ebullición de la fosfina es significativamente menor que el del amoníaco.	[2]

	2.55			



(Pregunta 1: continuación)

(b) La fosfina se prepara generalmente calentando fósforo blanco, uno de los alótropos del fósforo, con hidróxido de sodio acuoso concentrado. La ecuación para la reacción es:

$$P_4(s) + 3OH^-(aq) + 3H_2O(l) \rightarrow PH_3(g) + 3H_2PO_2^-(aq)$$

(i) Identifique otro elemento que tenga alótropos y enumere dos de esos alótropos. [2]

Alótropo 1:
Alótropo 2:

(ii) El primer reactivo está escrito como P₄, no como 4P. Describa la diferencia entre P₄ y 4P. [1]

(iii) El ion $H_2PO_2^-$ es anfiprótico. Resuma qué se entiende por anfiprótico, dando las

fórmulas de ambas especies implicadas cuando se comporta de esta manera.

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)



[2]

(Pregunta 1: continuación)

(iv) In	diaue el	estado o	de oxid	dación de	el fósforo	en e	al Pa	y en	el H ₂ PO ₂
---------	----------	----------	---------	-----------	------------	------	-------	------	-----------------------------------

[2]

P ₄ :	
H ₂ PO ₂ ⁻ :	

(v) En la actualidad, la oxidación se define en función de la variación del número de oxidación. Explore cómo las anteriores definiciones de oxidación y reducción pueden haber conducido a respuestas conflictivas para la conversión del P₄ en H₂PO₂⁻ y cómo el uso de los números de oxidación ha resuelto este conflicto.

[3]

 	 	•
 	 	•
 	 	•
 	 	٠
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	 	\$2 . **
 	 	0.00

(c) Se usaron 2,478 g de fósforo blanco para obtener fosfina de acuerdo con la ecuación:

$$P_4(s) + 3OH^-(aq) + 3H_2O(l) \rightarrow PH_3(g) + 3H_2PO_2^-(aq)$$

(i) Calcule qué cantidad, en mol, de fósforo blanco se usó.

[1]





11.16	guiita i.	Continuacion	
	(ii)	Este fósforo reaccionó con 100,0 cm³ de hidróxido de sodio acuoso 5,00 mol dm⁻³. Deduzca cuál fue el reactivo limitante, muestre su trabajo.	[1]

		ii) Determine la cantidad en exceso, en mol, del otro reactivo.	[1]
	(iii	Determine la cantidad en exceso, en moi, dei ono reactivo.	[1]

8	****	***************************************	
	(iv	v) Determine el volumen de fosfina obtenido, medido en cm³ a temperatura y presión estándar.	[1
			iš



2.			ezas provocan la combustión espontánea de la fosfina en el aire para formar un ósforo y agua.	
	(a)	(i)	Se calentaron 200,0 g de aire con la energía procedente de la combustión completa de 1,00 mol de fosfina. Calcule el aumento de temperatura usando la sección 1 del cuadernillo de datos y los datos de abajo.	[1]
			Entalpía estándar de combustión de la fosfina, $\Delta H_{c}^{\Theta} = -750 \mathrm{kJ}\mathrm{mol}^{-1}$	
			Capacidad calorífica específica del aire = $1,00 \mathrm{Jg^{-1}K^{-1}} = 1,00 \mathrm{kJkg^{-1}K^{-1}}$	
	* * *			
		(ii)	El óxido formado en la reacción con aire contiene 43,6 % de fósforo en masa. Determine la fórmula empírica del óxido, muestre su método.	[3]
	* * *			
		* * *****		
		# ####################################		
		* * * * * *		
	* * *	*****		
		(iii)	La masa molar del óxido es aproximadamente 285 g mol ⁻¹ . Determine la fórmula molecular del óxido.	[1
	# 14 1X			
	\ 	d		



(P	regunta 2	2: co	entinuación)	
	(b)	(i)	Indique la ecuación para la reacción de este óxido de fósforo con agua.	[1]
	25 (25 (15) 5) (
<u>.</u>	20	(ii)	Prediga cómo la disolución de un óxido de fósforo afectaría el pH y la conductividad eléctrica del agua.	[1]
	pH:			
	5•00•040 € i			
	Cond	uctivi	idad eléctrica:	
	charach s			
		(iii)	Sugiera por qué los óxidos de fósforo no contribuyen de forma sustancial a la deposición ácida.	[1]
	25.00\$0050 Sc			

	* * * *			



Véase al dorso

(Pregunta 2: continuación)

(iv)	Los niveles de dióxido de azufre, un contribuyente sustancial a la
	deposición ácida, se pueden minimizar por los métodos de precombustión o
	postcombustión. Resuma una técnica de cada método.

[2]

Precombustión:	f	
£11111111111111111111111111		 ***********

Postcombustión:		
£11111 ********************************		



3.	Il fosgeno, COCl ₂ , se obtiene generalmente por la reacción entre el monóxido de carbone	о у
	l cloro de acuerdo con la ecuación:	

$$CO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons COCl_2(g)$$

$$\Delta H = -108 \,\mathrm{kJ}$$

(a) (i) Deduzca la expresión de la constante de equilibrio, K_c , para esta reacción.

[1]

.....

(ii) Indique el efecto de un aumento de la presión total sobre la constante de equilibrio, $K_{\rm c}$.

[1]

(b) (i) En los ejes dados, dibuje aproximadamente el perfil de energía potencial para la síntesis del fosgeno, indicando la entalpía de la reacción y la energía de activación.

[2]

Energía

Progreso de la reacción

(ii) Esta reacción se lleva a cabo normalmente usando un catalizador. Dibuje una línea de puntos rotulada "Catalizada" en el diagrama de arriba para indicar el efecto del catalizador.

[1]




Véase al dorso

(Pregunta 3: continuación)

(iii) Dibuje aproximadamente y rotule una segunda curva de distribución de energía de Maxwell–Boltzmann que represente el mismo sistema pero a mayor temperatura, $T_{\rm mayor}$.

[1]




(iv) Explique por qué un aumento de temperatura aumenta la velocidad de esta reacción.

[2]

	٠	٠	٠	٠	٠		•	٠	•	ò	٠		٠	٠	٠	•		•	9		 ٠	•	20	20		r.	4	. 10	20	21 0	٠		. 10		•	2 0			H . 000		8 6	٠	٠	N I	::S	200	100	4		٠	•		
	٠	٠	٠	٠	٠		÷		٠	•	٠		3	9)	٠	•				٠		٠	ě		٠.	٠	2 9		2				1 14	4	٠			 5	818		e 8		٠	¥ s	4	9,69	-		e w	•			
	٠	٠	•	0		ě			٠	Ē	٠		•	٠			•		٠	. 1	 •	•	*	•	•	2	÷			. ,	Ť	4		140				 - (la	F¥60	٠.			٠		÷	•				÷	•		
ě	•	٠		•	٠	 ٠	•		٠	•	•	•	٠	٠	٠					•)	 ٠	٠	•	•		٠	•		ě		٠			٠		20 2	*	 16	ero:				÷			100	٠			٠			
•		٠	٠		٠		•		٠	·							•	•	٠		•	•		1		٠			 •			•			٠			 •	1200		e y	·	è	v s	0	700				÷		s 15	

4. Los alquenos se usan ampliamente para la producción de polímeros. El compuesto A, que se muestra abajo, se usa para la fabricación de goma sintética.



(a)	(i)	Indique el nombre del compuesto A, aplicando las reglas de la IUPAC.	[1]
-----	-----	--	-----

(ii)	Dibuje una sección del polímero que se puede formar a partir del compuesto A	
	en la que se muestren tres unidades que se repitan.	[1]

	ŗ.	

(iii)		El compuesto A es inflamable. Formule la ecuación para su combustión completa.	[1	
			9 8 7	


(Esta pregunta continúa en la página siguiente)



Véase al dorso

(Pregunta 4: continuación)

(b) El compuesto B está relacionado con el compuesto A.



(i)	Indique el término que se utiliza para describir moléculas que están relacionadas entre sí de la misma forma que el compuesto A y el compuesto B .	[1]
(ii)	Sugiera un ensayo químico para distinguir entre el compuesto A y el compuesto B , dando la observación esperada para cada uno.	[2]
Ensayo:		
		-
Observac	ión con A :	
Observac	ción con B:	8
* * * * * ***		



(Pregunta 4: continuación)

(iii) Los métodos espectroscópicos también se podrían usar para distinguir entre los compuestos A y B.

Prediga una diferencia en el espectro IR **y** una diferencia en el espectro de RMN de ¹H de estos compuestos, usando las secciones 26 y 27 del cuadernillo de datos.

[2]

Espectro IR:	
***************************************	s . c <u>e</u>
Espectro de NMR de ¹ H:	
***************************************	% (#) ₩ #1
(c) Se preparó una muestra del compuesto A en la que el ¹² C del grupo CH ₂ se reemplaz por ¹³ C.	ó
 (i) Indique la diferencia principal entre el espectro de masas de esta muestra y el del compuesto normal A. 	[1
	.es ⊴.
(ii) Indique la estructura del núcleo y el diagrama orbital del ¹³ C en su estado fundamental.	[2
Nº de protones	

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)



Véase al dorso

(Pregunta 4: continuación)

(d)	Dibuje un orbital atómico 1s y un orbital atómico 2p.	[3

1s:	2p:	
	*	



No escriba en esta página.

Las respuestas que se escriban en esta página no serán corregidas.



16EP15

No escriba en esta página.

Las respuestas que se escriban en esta página no serán corregidas.



16EP16