



Guia para o *intestino em dia*

O que muda quando o plano muda, e o que ajuda

RAFAELA SCHUMACHER · NUTRICIONISTA



Intestino em dia

Quando a alimentação muda, o intestino costuma sentir. Este guia explica o que é normal, por que ele muda no começo do plano e o que ajuda com intestino preso, gases, estufamento e intestino solto.

• ATUALIZADO EM OUTUBRO DE 2026

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

- 01 O que é normal
- 02 Por que muda com o plano
- 03 Intestino preso
- 04 Gases e estufamento
- 05 Intestino solto
- 06 Quando procurar um médico

Cada intestino tem o seu ritmo. Ir ao banheiro de três vezes por dia a três vezes por semana costuma ser considerado normal. Mais do que a frequência, o que importa é se a evacuação é fácil, sem esforço e sem dor, e se o seu padrão mudou.

O formato também conta

A escala de Bristol é a referência usada por médicos e nutricionistas para descrever as fezes. Ela ajuda você a me contar o que está acontecendo sem constrangimento: basta dizer o número.

TIPO	COMO É	O QUE COSTUMA INDICAR
1 e 2	Bolinhas duras e separadas, ou em formato de salsicha, mas empelotadas	Intestino preso
3 e 4	Formato de salsicha, com algumas rachaduras ou lisa e macia	O ideal
5	Pedaços macios, com bordas definidas	Tendendo a solto
6 e 7	Pastosas, sem forma, ou líquidas	Intestino solto ou diarreia

O intestino se adapta ao que você come

Nas primeiras semanas de um plano novo, é comum o intestino mudar de ritmo. Na maior parte das vezes, ele se ajusta em alguns dias. As causas mais frequentes são estas:

MAIS FIBRA DE UMA VEZ

Fibra faz bem ao intestino, mas um aumento grande e rápido pode trazer gases e estufamento. E, sem água suficiente junto, ela pode até prender.

MENOS VOLUME DE COMIDA

Num plano para emagrecer, o volume total diminui, e o intestino pode ficar mais lento até se acostumar.

MAIS PROTEÍNA

Proteína não prende o intestino por si só. O que costuma acontecer é ela ocupar no prato o lugar de vegetais, frutas e feijão, e a fibra do dia cair.

PRODUTOS ZERO, BARRAS E WHEY

Muitos produtos zero açúcar e barras de proteína levam polióis, como sorbitol, maltitol e xilitol, que em excesso causam gases e intestino solto. O whey concentrado tem um pouco de lactose, que incomoda quem tem intolerância.

ROTINA, ESTRESSE E VIAGENS

Mudança de horário, viagem, estresse e noites mal dormidas também mexem com o intestino, independentemente da comida.

CICLO MENSTRUAL

É comum o intestino mudar nos dias antes e durante a menstruação, por efeito dos hormônios.

O que ajuda

FIBRA, AOS POUCOS

A referência para adultos fica em torno de 25 g de fibra por dia ou mais. Aumente ao longo de uma ou duas semanas, e não de um dia para o outro, para o intestino se acostumar. As fontes que mais ajudam:

- aveia;
 - chia e linhaça, hidratadas antes;
 - feijão, lentilha e grão-de-bico;
 - frutas com casca e bagaço;
 - mamão, ameixa seca e kiwi;
 - verduras e legumes;
 - pão e arroz integrais.
-

ÁGUA JUNTO COM A FIBRA

A fibra precisa de água para formar fezes macias. Um jeito simples de acompanhar é a cor da urina: amarelo-claro indica uma boa hidratação. Nos dias de treino e de calor, beba mais.

ROTINA E MOVIMENTO

- reserve um horário tranquilo, de preferência depois do café da manhã, quando o intestino costuma estar mais ativo;
- não segure a vontade de ir ao banheiro;
- apoie os pés num banquinho, com os joelhos acima do quadril: a posição facilita a evacuação;
- movimente o corpo: caminhar já estimula o intestino.

Evite usar laxante por conta própria. Ele alivia o sintoma, mas não resolve a causa, e o tipo certo depende de avaliação. Se as medidas acima não resolverem em duas ou três semanas, me chama.

Um pouco é normal

Ter gases faz parte do funcionamento do intestino, e a barriga costuma ficar um pouco mais estufada no fim do dia. O que merece atenção é o desconforto que atrapalha a rotina.

COMA MAIS DEVAGAR

Comer rápido, falar muito durante a refeição, mascar chiclete e beber de canudo fazem você engolir mais ar.

REPARE NAS BEBIDAS COM GÁS

Refrigerante, inclusive o zero, e água com gás aumentam o estufamento em algumas pessoas.

FEIJÃO DE MOLHO

Deixe o feijão de molho de 8 a 12 horas e descarte a água antes de cozinhar. Isso reduz parte dos açúcares que fermentam no intestino.

CONFIRA OS POLIÓIS

Se o desconforto aparece depois de barras, doces zero ou chicletes, procure sorbitol, maltitol ou xilitol na lista de ingredientes.

LACTOSE

Se você suspeita que o leite incomoda, me conta. Iogurte e queijos mais curados costumam ser mais bem tolerados, e existem versões zero lactose.

VÁ COM CALMA NA FIBRA

Se a fibra aumentou de repente, segure um pouco o aumento e retome aos poucos.

Quando o intestino solta

Um episódio isolado costuma ter uma causa pontual e passa sozinho. Se o intestino ficar mais solto que o normal por alguns dias, olhe primeiro para estes suspeitos:

- barras, doces e produtos zero com polióis;
 - café em excesso ou pré-treino com muita cafeína;
 - whey concentrado, se houver intolerância à lactose;
 - refeições muito gordurosas;
 - álcool;
 - comida mal conservada, principalmente marmitas fora da geladeira.
-

O QUE FAZER

Beba bastante líquido para repor o que foi perdido, prefira refeições simples por um ou dois dias e tire o suspeito para ver se melhora. Se identificar a causa, me conta, para a gente ajustar o plano.

Sinais que não esperam a próxima consulta

A maior parte das mudanças do intestino se resolve com ajustes na alimentação. Mas procure um médico se você tiver:

- sangue nas fezes ou fezes pretas, com aspecto de borra de café;
- perda de peso que não é explicada pelo plano;
- dor abdominal forte ou que não passa;
- diarreia por mais de alguns dias, ou com febre ou sinais de desidratação;
- vômitos com barriga inchada e dificuldade de eliminar gases;
- uma mudança no seu padrão de intestino que dura semanas, sem explicação.

Na dúvida, me chama. Eu te ajudo a avaliar se é algo para ajustar no plano ou para investigar com um médico.

IMPORTANTE

As orientações deste guia são gerais. Se você tem um diagnóstico como síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal ou doença celíaca, a conduta é individual e a gente ajusta junto.

Antes de começar fibra em pó, probióticos ou qualquer suplemento para o intestino, me consulta.

FALAR COM A NUTRI



Nutricionista · Acompanhamento nutricional

Este portal é um material de apoio para pacientes da consultoria. As orientações gerais não substituem seu plano individualizado.