



Análise da Composição Corporal




Dicas de Controle de Peso




Análise do Grau de Obesidade



Consumo e gasto calórico



Análise segmentar



Bioimpedância por Segmento

Z(Ω)	20 kHz	100 kHz
Braço direito	261.1	231.6
Braço esquerdo	264.9	233.4
Tronco	23.1	20.9
Perna direita	261.4	234.6
Perna esquerda	246.3	219.4

Tendências de peso e gordura corporal

Data	Peso(kg)	Percentual de
31/10/2025	85.5	25.2

Avaliação de risco de postura frontal

Espaço Occipital 16.87 cm

Refere-se à distância lateral entre o ponto mais externo dos ombros e as orelhas do corpo humano.

Circunferência do Braço 32.21 cm


Comprimento horizontal do braço superior naturalmente pendente, na parte mais grossa do bíceps do braço.

Circunferência da Cintura 98.58 cm

Comprimento horizontal da cintura, medido usando uma fita métrica ao redor do centro do umbigo.

Dimensão da Coxa 62.26 cm

A circunferência da coxa é medida no ponto com o maior diâmetro no interior.



Largura dos Ombros 49.92 cm

Também chamada de largura dos ombros, é a medida linear entre os pontos altos dos ombros esquerdo e direito.

Envergadura dos Braços 178.87 cm

Refere-se ao comprimento quando ambas as mãos estão estendidas para os lados e os braços estão nivelados.

Circunferência dos Quadril 104.91 cm

Comprimento horizontal na parte mais proeminente dos quadris.

Relação Cintura-Quadril 0.94

Refere-se à relação entre a circunferência da cintura e a circunferência da anca, sendo um indicador importante para avaliar a distribuição da gordura corporal e o estado de saúde.

Projeto

Deslocamento

Dica de risco



0 cm

Risco de Ombros
Desnivelados:
MUITO Baixo

A diferença entre o ombro esquerdo e o direito é de baixo 0 centímetros, o desnível dos ombros refere-se à diferença na altura dos ombros, geralmente causada por uma postura inadequada e força incorreta. A correção geralmente envolve ajustar a postura corporal inadequada, fortalecer o sistema muscular dos ombros e costas do lado mais fraco e desenvolver bons hábitos de sentar-se e de força.



Perna esquerda
3.2°
Perna direita 2.7°

Risco de Pernas
em X/O: Leve

O ângulo de curvatura da perna esquerda para fora é de 3.2°, e o ângulo de curvatura da perna direita para dentro é de 2.7°, o risco de pernas em X/O refere-se à forma das pernas causada por postura inadequada durante o crescimento. Este risco pode ser reduzido corrigindo a postura ao caminhar e correr, fortalecendo os músculos das pernas e melhorando a força e flexibilidade dos músculos e articulações do quadril, joelho e tornozelo.



0.9 cm

Risco de Curvatura
da Coluna: MUITO
Baixo

A diferença entre o centro dos ombros e o centro dos quadris é de aproximadamente 0.9 centímetros, a escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral, incluindo anomalias nos planos coronal, sagital e axial. A coluna vertebral de uma pessoa normal deve ser reta quando vista de trás, com o tronco simétrico dos dois lados.



1.5°

Risco de Inclinação
da Cabeça:
MUITO Baixo

A inclinação da cabeça para esquerda é de aproximadamente 1.5°, risco de inclinação lateral da cabeça: MUITO Baixo, refere-se a uma anomalia de postura onde a base do crânio gera um desequilíbrio, levando a uma inclinação da cabeça para um lado. Normalmente, a linha central da cabeça e do rosto deve estar alinhada com a linha central do tronco.

Avaliação de risco de postura lateral

Comprimento da cabeça 25 cm

Refere-se à distância vertical do ponto mais alto da cabeça até o ponto mais baixo do queixo

Comprimento do Tronco Superior 94.35 cm


Refere-se ao comprimento da cabeça até a articulação do quadril.

Comprimento do Tronco Inferior 83.65 cm

Refere-se à distância entre a articulação do quadril e o chão.

Comprimento da Perna Inferior 45.50 cm

Medida do comprimento da perna inferior, do joelho ao tornozelo.



Proporção Cabeça-Corpo 6.99

É a proporção entre o comprimento da cabeça (do topo ao queixo, sem contar o cabelo) e a altura do corpo.

Relação perna-corpo 0.47

Refere-se à proporção entre o comprimento da parte inferior do corpo (ou seja, o comprimento das pernas) e a altura total do corpo

Comprimento da Coxa 38.15 cm

Comprimento horizontal na parte mais proeminente dos quadris.

Comprimento do pé 25.43 cm

A distância do calcanhar até a ponta do dedo mais longo (geralmente o primeiro ou o segundo dedo) do pé

Projeto

Deslocamento

Dica de risco



19.4°

Risco de Corcunda: Alto

Curvatura do tronco 19.4°, a corcunda refere-se à deformação da curvatura dos ombros e tronco, levando o centro de gravidade do corpo para frente e a cabeça para frente. Este problema pode ser abordado através de alongamento dos músculos dos ombros e costas, e ajustando os hábitos de caminhada e postura ao sentar-se.



6.3°

Risco de Inclinação da Pélvis: Moderado

Inclinação da pelve em relação ao plano vertical do corpo 6.3°, a inclinação anterior da pelve refere-se à posição deslocada dos quadris em relação ao plano vertical do corpo. A inclinação anterior da pelve geralmente desloca o centro de gravidade do corpo, aumentando a carga sobre os músculos do core e aumentando o risco de lesões durante esforços intensos. Este risco pode ser reduzido fortalecendo os músculos do core e corrigindo uma postura inadequada.



0.8°

Risco de Hiperextensão: MUITO Baixo

O ângulo entre os joelhos, quadris e tornozelos é de 0.8°, a hiperextensão do joelho refere-se ao estiramento excessivo do joelho durante a caminhada ou ao ficar em pé, quando o ângulo de extensão do joelho é maior que 5°. Normalmente, ao olhar de lado, os joelhos, quadris e tornozelos devem estar alinhados verticalmente.



22.6°

Risco de Projeção da Cabeça: MUITO ALTO

Inclinação anterior da cabeça 22.6°, refere-se à diminuição ou desaparecimento da curvatura fisiológica natural das vértebras cervicais, levando a uma posição para frente da cabeça. Isso ocorre frequentemente em pessoas que têm o hábito de manter o pescoço em uma posição de flexão anterior por longos períodos, causando tensão prolongada nos músculos do pescoço e da parte superior das costas. Isso pode ser corrigido com exercícios como ficar de costas na parede, treinar a postura ao sentar-se e praticar yoga.

Conselho do treinador