

Najlepsze albumy muzyczne

wg użytkowników RateYourMusic.com

Bartosz Łuksza, Rafał Głodek

Wprowadzenie

Muzyka towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Zawsze stanowiła nieodłączną część naszej kultury. Niestety ograniczenia technologiczne przez długi czas nie pozwalały artystom utrwalić swoich dzieł. Fonografia narodziła się w XIX wieku, a jej największy rozkwit przypada na drugą połowę wieku XX. Z tego względu najstarsze oryginalne dzieła muzyczne, do których mamy obecnie dostęp, pochodzą poprzedniego stulecia. W ostatnich latach rynek muzyczny przeżywa niebywały rozkwit. Każdego roku miliardy słuchaczy na całym świecie, przesłuchuje miliony nowych albumów, generując przychody rzędu dziesiątek miliardów dolarów ze sprzedaży nagrań. Rynek muzyczny jest jednak ściśle powiązany z wieloma innymi gałęziami biznesu, takimi jak: film, moda, czy technologie cyfrowe. Szacuje się, że każdego dnia na serwisy streamingowe trafia nawet 120 000 utworów! W tej sytuacji można pokusić się o stwierdzenie, że obecny przemysł muzyczny jest wręcz “przeladowany” muzyką. Warto zadać sobie pytanie, czy za ilością idzie również jakość?

W naszej pracy zajrzemy wгłęb współczesnej historii muzyki i przeanalizujemy bazę pięciu tysięcy najlepiej ocenianych albumów muzycznych przez użytkowników RateYourMusic.com - największego portalu do oceniania muzyki w internecie. Dane pochodzą z 12 grudnia 2021 r. i zostały pobrane z serwisu kaggle.com. Wyodrębniliśmy z nich następujące zmienne:

1. **Album** - nazwa albumu
 - Zawiera 4928 unikalne wartości
2. **Artist Name** - artysta (imię i nazwisko lub pseudonim artystyczny)
 - Zawiera 2787 unikalne wartości
 - 25 rekordów to *Various Artists*, czyli różni artyści, których jednak nie możemy wyodrębnić, więc pomijamy te wartości
3. **Release Date** - dokładna data wydania albumu (dzień/miesiąc/rok), wyodrębniliśmy z niej dwie zmienne:

- a) **Year** - rok wydania albumu
- najmniejsza wartość: 1947
 - największa wartość: 2021
 - średnia arytmetyczna: 1987,46
 - mediana: 1988
 - wariancja: 253,23
- b) **Month** - miesiąc wydania albumu
4. **Genres** - gatunki (lub gatunek), do których należy album
- Niekiedy trudno jest ustalić, do jakiego gatunku należy album. Wówczas określany jest mianem międzygatunkowego i klasyfikuje się go jako przynależnego do każdego z wymienionych gatunków.
 - Możliwe wartości to: "Rock", "Hip Hop", "Pop", "Jazz", "Soul", "Dance", "Techno", "Punk", "Metal", "Folk"
5. **Descriptors** - krótki opis albumu
- Opis zawiera kilka przymiotników najlepiej oddających charakter albumu, np. "melancholic, anxious, futuristic, alienation, existential, male vocals, atmospheric, lonely, cold, introspective"
 - Opisy będą potrzebne, by sprawdzić jak oceniane są albumy w zależności od nastroju, jaki wywołują w słuchaczu
6. **Average Rating** - średnia ocen użytkowników
- Na stronie RateYourMusic.com użytkownicy mogą wystawiać albumom oceny w skali od 0 do 5, z uwzględnieniem "połówek"
 - Średnie oceny, które są brane pod uwagę w tym spisie uwzględniają także wagi ocen - oceny użytkowników wykazujących się dużą aktywnością i doświadczeniem mają wyższą wagę niż tych, którzy oceniają muzykę sporadycznie
 - najmniejsza wartość: 3,52
 - największa wartość: 4,34
 - średnia arytmetyczna: 3,771
 - mediana: 3,75
 - wariancja: 0,0098
7. **Number of Ratings** - liczba ocen użytkowników
- najmniejsza wartość: 260

- największa wartość: 70 400
- średnia arytmetyczna: 4084.511
- mediana: 1820
- wariancja: 36016085

8. *Number of Reviews* - liczba recenzji użytkowników

- najmniejsza wartość: 0
- największa wartość: 1 549
- średnia arytmetyczna: 71.4492
- mediana: 34
- wariancja: 11766.56

Dogłębna analiza pozwoli nam znaleźć korelacje między różnymi zmiennymi ujętymi w zestawieniu i wyciągnąć nieoczywiste wnioski. W ten sposób nie tylko dowiemy się, jak muzyka rozwijała się w ubiegłych dekadach, ale także nakreślimy ścieżkę jej dalszego rozwoju.

W jakich latach powstawało najwięcej “dobrych” albumów? Czy istnieje korelacja między średnią oceną użytkowników a datą wydania dzieła? Jakie są średnie ocen dla różnych gatunków muzycznych? Którzy artyści mogą się poszczycić najlepiej ocenianą dyskografią? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w naszej pracy.

Analiza danych

Analiza rozkładów lat oraz średnich ocen


W pierwszej części naszej analizy zbadamy, jak rozkładają się średnie ocen wystawionych przez użytkowników oraz lata wydania albumów. Zaczniemy od wygenerowania wykresów pudełkowych dla każdej z nich oraz wyliczenia jego parametrów - mediany, pierwszego i trzeciego kwartyła, rozstępu międzykwartyłowego oraz górnego i dolnego wąsa. Ponadto na wykres pudełkowy nałożymy także realizację naszej zmiennej w postaci punktów oraz jej średnią arytmetyczną.

Wykres pudełkowy dla średnich ocen prezentuje się następująco

Warning: package 'hrbrthemes' was built under R version 4.4.2

Warning: package 'viridis' was built under R version 4.4.2

Loading required package: viridisLite




Korzystając z funkcji *boxplot.stats* wydobędziemy z wykresu najważniejsze dane. Przedstawimy je w formie tabeli

Wąs dolny	3.54
Pierwszy kwartył	3.70
Mediana	3.75
Trzeci kwartył	3.81
Wąs górny	3.97

Na bazie wykresu oraz tabeli możemy wyciągnąć kilka istotnych wniosków. Zgodnie z ideą wykresu pudełkowego, zdecydowana większość punktów znajduje się w przedziale między wąsem dolnym a wąsem górnym, czyli (3.54, 3.97). Obserwacje wypadające z niego możemy uznać za odstające. Jeden punkt znajduje się pod wąsem dolnym, natomiast możemy odnaleźć dużo więcej punktów osadzonych ponad wąsem górnym. W kontekście tematyki naszej pracy, możemy interpretować je jako ścisłą czołówkę albumów. Średnia arytmetyczna, będąca nieobciążonym estymatorem wartości oczekiwanej, jest większa niż mediana, a zatem mamy w tym przypadku do czynienia z rozkładem prawoskośnym. Oznacza to dla nas, że wyniki poniżej średniej są w naszej próbie przeważające. Oceny znacznie odbiegające od średniej są zatem dużą rzadkością i tym samym czołówka rankingu zarysowuje się nam coraz mocniej.

Teraz przeprowadzimy analogiczną analizę dla lat wydania albumów. Wygenerujemy dla danych wykres pudełkowy

Wykres pudełkowy dla lat wydania albumów




Znów wykorzystamy funkcję *boxplot.stats* i wyliczymy parametry tego wykresu pudełkowego. Zawiera je poniższa tabela.

Wąs dolny	1947
Pierwszy kwartył	1973
Mediana	1988
Trzeci kwartył	2000
Wąs górny	2021


Wyciągnijmy teraz wnioski z tabeli i wykresu. Zauważmy, że wąsy górne i dolne pokrywają się z minimum i maksimum lat wydania albumów. Z tego powodu w rozważanym zbiorze nie występują żadne wartości odstające. Średnia arytmetyczna niemalże pokrywa się z medianą, więc rozkład lat będzie przypominał rozkład symetryczny. Największe zagęszczenie danych występuje między 1973 a 2000 rokiem, czyli między pierwszym a czwartym kwartylem. Oznacza to, że aż 50% wszystkich albumów zakwalifikowanych do rankingu zostało wydanych w okresie tych 27 lat, a w całym zestawieniu rozważamy przedział 74 lat. Można zatem stwierdzić, że najwięcej wysoko ocenianych albumów zostało wydanych w latach 70., 80. i 90. XX wieku.

W następnym kroku dla każdej z rozważanych zmiennych wygenerujemy histogram prawdopodobieństwa *geom_histogram* i dopasujemy do niego jądrowy estymator gęstości używając *geom_density*. Wynik dla średnich ocen prezentuje się następująco





Na bazie wykresu możemy stwierdzić, że oceny użytkowników mają rozkład prawostronnie skośny, z pojedynczą górką (modą) znajdującą się w okolicach punktu 3.7, co sugeruje, że większość albumów uzyskuje taką ocenę. Gęstość empiryczna zaczyna gwałtownie maleć w okolicach punktu 4.1, co potwierdza wniosek wyciągnięty na bazie wykresu pudełkowego - takie oceny są bardzo rzadkie, bowiem charakteryzują jedynie ścisłą czołówkę albumów. Rozkład ten swoim kształtem nieco przypomina rozkład normalny, lecz występuje tu wyraźna asymetria, świadcząca o jego skośności z prawej strony. Można zatem potwierdzić wcześniejszą obserwację, że oceny najczęściej pojawiające się w naszym zestawieniu, znajdują się w przedziale od umiarkowanych do nieco poniżej średniej.

Następnie wygenerujemy analogiczny wykres dla lat wydania albumów.



Rozkład lat wydania albumów ma nieco bardziej skomplikowaną naturę. Można go zaklasyfikować jako dwumodalny, czyli posiadający dwa wyraźne punkty skupienia. Pierwszy wierzchołek tego rozkładu znajduje się w okolicy lat 70., gdy światem muzyki zawładnęły gatunki, takie jak rock, metal i disco. Kolejny szczyt widoczny jest na przełomie lat 90. i 2000., kiedy na światowych scenach dominowały: pop, grunge oraz przede wszystkim - hip hop. Poza tymi okresami występowały znaczące spadki w liczbie dobrze ocenianych albumów. Szokującym może być fakt, że w obecnych czasach obserwowany jest największy spadek jakościowej muzyki od lat 50 z tym, że wtedy wydawano znacznie mniej albumów w porównaniu do dzisiejszych czasów. Warto więc zastanowić się nad pytaniem, czy w czasach współczesnych, pomimo szerokiej dostępności muzyki oraz ogromnych pieniędzy wydawanych na jej produkcję i dystrybucję, стоимy w obliczu największego kryzysu muzycznego?



	Ratings	Years	Number of Ratings	Number of Reviews
Min	3.54	1947	260.0	0.0
First Quartile	3.70	1973	752.5	14.0
Median	3.75	1988	1820.0	34.0
Third Quartile	3.81	2000	4720.5	82.5

Maximum 3.97 2021 10649.0 185.0

```
lm_ratings_and_years = lm(ratings~years)
summary(lm_ratings_and_years)
```

Call:

```
lm(formula = ratings ~ years)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.25179	-0.06707	-0.02552	0.04131	0.54285

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	5.871e+00	1.724e-01	34.05	<2e-16 ***
years	-1.057e-03	8.676e-05	-12.18	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1


Residual standard error: 0.09762 on 4998 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.02882, Adjusted R-squared: 0.02863


F-statistic: 148.3 on 1 and 4998 DF, p-value: < 2.2e-16

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

Regresja liniowa Average_Ratings~Years




Histogram licznosci gatunków




Warning: package 'ggpattern' was built under R version 4.4.2


10 najlepiej ocenianych artystów




Wytworzenie albumów: Rok wydania vs Średnia ocena




Gatunek najlepiej ocenianego albumu w poszczególnych latach



Music Ratings by Genre




Rozpiętość ocen i liczba wystąpień dla wybranych gatunków



Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
i Please use `linewidth` instead.

Srednie oceny i liczba wystąpień dla gatunków



```

xpp <- rym
xpp$"Number of Ratings" <- as.numeric(gsub(",", "", rym$"Number of Ratings"))


# Filter out missing values correctly
daxpp <- xpp %>%
  filter(!is.na(`Number of Ratings`) & !is.na(`Average Rating`))

# Updated ggplot call with correct references
ggplot(daxpp, aes(x = `Number of Ratings`, y = as.numeric(`Average Rating`))) +
  geom_point(alpha = 0.6, color = "blue") + # Points
  geom_smooth(method = "lm", color = "red", se = TRUE) + # Trend line (linear regression)
  scale_x_log10() + # Logarithmic scale for number of reviews
  labs(
    title = "Średnia ocena vs Liczba recenzji",
    x = "Liczba recenzji (skala logarytmiczna)",
    y = "Średnia ocena"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 16, face = "bold"),
    axis.title = element_text(size = 14),
    axis.text = element_text(size = 12)
  )

```

`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

Srednia ocena vs Liczba recenzji



```
# Definicja podstawowych gatunków
library(dplyr)
library(tidyr)
library(stringr)
library(ggplot2)

# Definicja podstawowych gatunków
basic_genres <- c("Rock", "Hip Hop", "Pop", "Jazz", "Soul",
                  "Dance", "Techno", "Punk", "Metal", "Folk")

# Podzielenie albumów na podstawowe gatunki
filtered_data <- xpp %>%
  rowwise() %>%
  mutate(
    Basic_genres_split = list(
      basic_genres[basic_genres %>% sapply(function(genre) str_detect(Basic_Genres, fixed(genre)))
    ] %>%
  unnest(Basic_genres_split) %>% # Rozdzielenie przypisanych gatunków na osobne wiersze
  rename(Genre = Basic_genres_split) %>% # Zmiana nazwy kolumny na 'Genre'
  ungroup()

# Dodanie kolumny z dekadą
filtered_data <- filtered_data %>%
```

```

mutate(Decade = floor(Years / 10) * 10)

# Obliczenie średnich ocen dla każdego gatunku w każdej dekadzie
average_ratings_by_decade <- filtered_data %>%
  group_by(Decade, Genre) %>%
  summarize(Average_Rating = mean(`Average Rating`, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

# Wykres
ggplot(average_ratings_by_decade, aes(x = Decade, y = Average_Rating, color = Genre, group = 
  geom_line(size = 1) +
  geom_point(size = 2) +
  labs(
    title = "Średnia ocena albumów w dekadach dla każdego gatunku",
    x = "Dekada",
    y = "Średnia ocena",
    color = "Gatunek"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 16, face = "bold"),
    axis.title = element_text(size = 14),
    axis.text = element_text(size = 12),
    legend.position = "bottom"
  )
)

```

Srednia ocena albumów w dekadach dla kazdego ga

