
Ejercicios para pies cansados de estar de pie

Para turnos largos de pie. Una hoja para imprimir de walkito.site.

Cómo usar esta hoja: empieza con los ejercicios más fáciles y la dosis más baja. Una molestia leve está bien. Un dolor agudo no. Si el dolor es peor a la mañana siguiente, baja un paso por unos días. Las dosis son las dosis de inicio de Walkito, no una indicación médica para ti. Guía completa con videos y estudios: **walkito.site/es/dolor-de-pies-por-estar-de-pie**




Estiramiento de pantorrilla

2 series de 30 segundos, cada pierna

Casi todas las sesiones

Pon las manos en una pared. Mantén la pierna de atrás estirada, el talón abajo y la cadera hacia adelante. Una pantorrilla tensa jala del talón todo el día, así que este estiramiento trabaja el mayor factor de riesgo que encontró el estudio de 2003.

Evidencia: Moderada. La guía de 2023 para el dolor de talón le da al estiramiento de pantorrilla una A para la fascitis plantar. Una pantorrilla tensa fue el mayor factor de riesgo en un estudio de casos y controles de 2003.




Estiramiento de sóleo

2 series de 30 segundos, cada pierna

Casi todas las sesiones

Ponte en la misma posición contra la pared y dobla la rodilla de atrás hasta sentir el estiramiento más abajo, cerca del talón. El sóleo, el músculo más profundo de la pantorrilla, solo se suelta con la rodilla doblada.

Evidencia: Moderada. Mismo mecanismo que el estiramiento de pantorrilla: trabaja la flexibilidad del tobillo, el mayor factor de riesgo de fascitis plantar en el estudio de 2003.




Estiramiento plantar

2 series de 30 segundos, cada pie

Casi todas las sesiones

Siéntate y cruza el pie sobre la otra rodilla. Jala los dedos hacia atrás hasta sentir el estiramiento a lo largo del arco, no en la pantorrilla. Si el talón te duele más al despertar, haz este antes de que el pie toque el piso.

Evidencia: Moderada. La guía de 2023 para el dolor de talón le da al estiramiento de la fascia plantar una A para la fascitis plantar.



Elevaciones de talón con dos pies

3 series de 10, los dos pies

Días de fuerza

Párate sobre los dos pies, sube recto sobre los dedos gordos y baja despacio. Los dos pies comparten la carga mientras la pantorrilla gana fuerza. Apóyate en una pared o un barandal si necesitas equilibrio.

Evidencia: Moderada. La guía de 2023 para el dolor de talón le da al entrenamiento de fuerza una B para la fascitis plantar. No se ha probado específicamente para el cansancio por estar de pie.




Pie corto, sentado

3 series de 10, mantén 5 segundos, cada pie

Días de fuerza

Siéntate con el pie apoyado en el piso. Lleva la parte delantera del pie hacia el talón para que el arco suba, y mantén. No encojas los dedos. El pie corto entrena el músculo pequeño dentro del arco que lo sostiene durante un día largo de pie.

Evidencia: Inicial. Una revisión de 2024 encontró que el entrenamiento de pie corto cambió la forma del arco, pero no el dolor. En un ensayo de 2023 fue parte de un programa que mejoró las medidas del arco.




Equilibrio a una pierna

3 series de 30 segundos, cada pierna

Días de equilibrio

Párate en un pie y mira un punto fijo. Deja que el pie se tambalee. Ese tambaleo es el pie haciendo el trabajo de equilibrio. Ponte cerca de una pared si quieres algo de seguridad.

Evidencia: Inicial. No hay un estudio específico sobre estar de pie. Es trabajo general de equilibrio para el pie y el tobillo.



Automasaje plantar

2 minutos

Días de recuperación

Siéntate y rueda la planta del pie despacio sobre una pelota de masaje, con presión firme. Si haces muecas de dolor, afloja. Rodar el pie después de un turno largo calma el tejido y da algo de alivio antes del día siguiente.

Evidencia: Inicial. No se probó en los estudios de esta página. Es una medida de comodidad entre sesiones.

Registro semanal: marca lo que hiciste	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
Estiramiento de pantorrilla							
Estiramiento de sóleo							
Estiramiento plantar							
Elevaciones de talón con dos pies							
Pie corto, sentado							
Equilibrio a una pierna							
Dolor por la mañana (0 a 10)							

Consulta primero a un profesional de la salud si

- el dolor empezó después de una lesión o una caída
- no puedes apoyar el pie, o cojeas
- viene con entumecimiento, hormigueo, ardor, hinchazón o calor
- el talón o el pie está rojo, o tienes fiebre o te sientes mal
- te despierta por la noche
- es un dolor agudo, o empeora aunque hayas bajado la carga
- el dolor está en un solo punto y empeora con la actividad, lo que puede ser señal de una fractura por estrés y no de cansancio por estar de pie
- una pierna o un pie se hinchó de repente y está adolorido, rojo o caliente
- tienes diabetes, menos sensibilidad en los pies o mala circulación
- el dolor no ha bajado después de varias semanas con menos carga, mejor calzado y los ejercicios de esta página