Упражнения при плоскостопии

Укрепление свода и мышц стопы, шаг за шагом. Лист для печати с walkito.site.

Как пользоваться листом: начните с более лёгких упражнений и меньшей дозировки. Лёгкий дискомфорт допустим. Острая боль нет. Если на следующее утро стало хуже, снизьте нагрузку на несколько дней. Это стартовые дозировки Walkito, а не назначение для вас. Полный гайд с видео и исследованиями: **walkito.site/ru/ploskostopie-uprazhneniya**



Собирание полотенца

3 подхода по 8, удержание 5 секунд, каждая стопа

Каждое занятие, пока это ваш уровень

Сядьте, расстелите полотенце на полу под стопой. Подтягивайте полотенце пальцами, пятка остаётся на полу. Это упражнение будит мелкие мышцы под сводом.



Подъём большого пальца

3 подхода по 8, удержание 5 секунд, каждая стопа

Каждое занятие, пока это ваш уровень

Сядьте, стопы стоят на полу. Поднимите только большой палец и удерживайте. Остальные четыре пальца лежат на полу. Так большой палец учится двигаться отдельно, а это первый «включатель» свода.



Короткая стопа сидя

3 подхода по 8, удержание 5 секунд, каждая стопа

Каждое занятие, пока это ваш уровень

Сядьте, стопа стоит на полу. Подтяните подушечку стопы к пятке, чтобы свод поднялся, и удерживайте.
Не поджимайте пальцы. Поджатые пальцы самая частая ошибка в этом упражнении.



Короткая стопа стоя

3 подхода по 8, удержание 5 секунд, обе стопы

Каждое занятие, пока это ваш уровень

Встаньте, вес на обеих стопах, и сделайте то же движение. Пальцы остаются ровными и длинными. Поднимается только свод. Мышца та же, что и сидя, но теперь она держит ваш вес.



Короткая стопа на одной ноге

3 подхода по 10, удержание 5 секунд, каждая стопа

Каждое занятие, пока это ваш уровень

Встаньте на одну ногу и поднимите свод. Большой палец прижат к полу. Если он поднимается, свод «жульничает». При работе одной стопой видно, какая сторона слабее.




Разведение пальцев

3 подхода по 10, каждая стопа

Силовые дни

Разведите пальцы как можно шире и удерживайте. Пальцы, которые умеют расходиться, делят нагрузку со сводом. Поднимать их не нужно.




Поворот стопы внутрь с лентой

3 подхода по 12, каждая стопа

Силовые дни

Сядьте, наденьте резиновую ленту на стопу и поворачивайте стопу внутрь против её сопротивления. Двигается стопа, а не нога. Колено неподвижно. Walkito добавляет это упражнение только после шести занятий с «короткой стопой» стоя, чтобы сначала заработали собственные мышцы свода.



Стойка на одной ноге

3 удержания по 20 секунд, каждая нога

Дни баланса

Встаньте на одну ногу и смотрите в одну точку. Пусть стопа покачивается. Так и должно быть: эти покачивания и есть работа стопы по удержанию равновесия.




Отведение бедра

3 подхода по 10, каждая нога

Силовые дни

Встаньте с резиновой лентой и отведите одну ногу в сторону против её сопротивления. Давите пяткой, а не носком. Если бедро «проседает», нагрузка ложится на свод.



Растяжка икры и камбаловидной мышцы

2 удержания по 30 секунд на каждую растяжку, каждая нога

Большинство занятий

Упритесь руками в стену. Задняя нога прямая, пятка на полу, таз подан вперёд: растяжение ощущается в икре. Затем согните колено задней ноги, пока растяжение не уйдёт ниже, к пятке. Это камбаловидная мышца, более глубокая мышца икры.

Журнал недели: отмечайте, что сделали	**Пн**	**Вт**	**Ср**	**Чт**	**Пт**	**Сб**	**Вс**
Собирание полотенца							
Подъём большого пальца							
Короткая стопа сидя							
Короткая стопа стоя							
Короткая стопа на одной ноге							
Разведение пальцев							
Утренняя боль (от 0 до 10)							

Сначала обратитесь к врачу, если

- боль появилась после травмы или падения
- на ногу нельзя наступить или вы хромаете
- боль сопровождается онемением, покалыванием, жжением, отёком или ощущением жара
- пятка покраснела, у вас температура или общее недомогание
- боль будит вас ночью
- боль острая или усиливается, хотя вы снизили нагрузку
- больно сжимать пятку с боков или боль нарастает во время пробежек после того, как вы увеличили объём бега: и то и другое может быть признаком стрессового перелома
- у вас диабет, сниженная чувствительность стоп или плохое кровообращение
- болят обе пятки, а другие суставы опухают или скованы
- за несколько недель упражнений и сниженной нагрузки лучше не стало
- свод одной стопы резко опустился уже во взрослом возрасте
- свод остаётся плоским, когда стопа на весу