
Упражнения для стоп при стоячей работе

Для долгих смен на ногах. Лист для печати с walkito.site.

Как пользоваться листом: начните с более лёгких упражнений и меньшей дозировки. Лёгкий дискомфорт допустим. Острая боль нет. Если на следующее утро стало хуже, снизьте нагрузку на несколько дней. Это стартовые дозировки Walkito, а не назначение для вас. Полный гайд с видео и исследованиями: **walkito.site/ru/bolyat-nogi-ot-stoyaniya**




Растяжка икры

2 удержания по 30 секунд, каждая нога

Большинство занятий

Упритесь руками в стену. Задняя нога прямая, пятка на полу, таз подан вперёд. Удерживайте, пока не почувствуете растяжение в верхней части икры.

Доказательства: Умеренные. Клинические рекомендации 2023 года дают растяжке икр уровень А при плантарном фасциите. Подвижность голеностопа оказалась самым сильным фактором риска в исследовании 2003 года.




Растяжка камбаловидной мышцы

2 удержания по 30 секунд, каждая нога

Большинство занятий

Встаньте в то же положение, затем согните колено задней ноги, пока растяжение не уйдёт ниже, к пятке. Камбаловидная мышца, более глубокая мышца икры, расслабляется только при согнутом колене.

Доказательства: Умеренные. Тот же механизм, что и растяжка икры: работает с подвижностью голеностопа, самым сильным фактором риска плантарного фасциита в исследовании 2003 года.




Растяжка подошвенной фасции

2 удержания по 30 секунд, каждая стопа

Большинство занятий

Сядьте и положите стопу на колено другой ноги. Потяните пальцы на себя, пока не почувствуете растяжение в своде, а не в икре. Если пятка болит сильнее всего утром, делайте это упражнение до того, как стопа коснётся пола.

Доказательства: Умеренные. Клинические рекомендации 2023 года дают растяжке подошвенной фасции уровень А при плантарном фасциите.



Подъёмы на носки на двух ногах

3 подхода по 10, обе стопы

Силовые дни

Встаньте на обе стопы, поднимитесь прямо вверх над большими пальцами и медленно опуститесь. Обе стопы делят нагрузку, пока икры набирают силу. При необходимости держитесь за стену.

Доказательства: Умеренные. Клинические рекомендации 2023 года дают силовым упражнениям уровень В при плантарном фасциите. Для стояния отдельно не тестировались.




Короткая стопа сидя

3 подхода по 10, удержание 5 секунд, каждая стопа

Силовые дни

Сядьте, стопа стоит на полу. Подтяните подушечку стопы к пятке, чтобы свод поднялся, и удерживайте. Не поджимайте пальцы. «Короткая стопа» тренирует мелкую мышцу внутри свода, которая держит его в течение долгого дня на ногах.

Доказательства: Ранние. Обзор 2024 года нашёл, что «короткая стопа» меняет форму свода, но не боль. В исследовании 2023 года она входила в программу, которая улучшила показатели свода.




Стойка на одной ноге

3 удержания по 30 секунд, каждая нога

Дни баланса

Встаньте на одну ногу и смотрите в одну точку. Пусть стопа покачивается. Покачивания и есть работа стопы по удержанию равновесия. Встаньте рядом со стеной на всякий случай.

Доказательства: Ранние. Отдельных исследований для стояния нет. Общая работа на равновесие для стопы и голеностопа.



Прокатывание стопы

2 минуты

Дни восстановления

Сядьте и медленно прокатывайте подошву по массажному мячу с плотным давлением. Если морщитесь от боли, ослабьте нажим. Прокатывание после долгой смены успокаивает ткани и приносит облегчение до следующего дня.

Доказательства: Ранние. В исследованиях на этой странице не тестировалось. Мера для комфорта между занятиями.

Журнал недели: отмечайте, что сделали	**Пн**	**Вт**	**Ср**	**Чт**	**Пт**	**Сб**	**Вс**
Растяжка икры							
Растяжка камбаловидной мышцы							
Растяжка подошвенной фасции							
Подъёмы на носки на двух ногах							
Короткая стопа сидя							
Стойка на одной ноге							
Утренняя боль (от 0 до 10)							

Сначала обратитесь к врачу, если

- боль появилась после травмы или падения
- на ногу нельзя наступить или вы хромаете
- боль сопровождается онемением, покалыванием, жжением, отёком или ощущением жара
- пятка или стопа покраснела, у вас температура или общее недомогание
- боль будит вас ночью
- боль острая или усиливается, хотя вы снизили нагрузку
- боль локализована в одной точке и усиливается при нагрузке: это может быть картина стрессового перелома, а не усталости от стояния
- одна нога или стопа внезапно отекла, болезненна, покраснела или горячая
- у вас диабет, сниженная чувствительность стоп или плохое кровообращение
- боль не прошла за несколько недель сниженной нагрузки, лучшей обуви и упражнений с этой страницы