※ 14種不是魚的魚：

① 衣魚 → 節肢動物
② 鱉魚 → 節肢動物
③ 魷魚 → 軟體動物
④ 章魚 → 軟體動物
⑤ 墨魚 → 軟體動物
⑥ 鮑魚 → 軟體動物
⑦ 山椒魚 → 兩生類
⑧ 娃娃魚 → 兩生類
⑨ 鱷魚 → 爬蟲類
⑩ 甲魚 → 爬蟲類
⑪ 鼠魚 → 棘皮動物
⑫ 鯨魚 → 哺乳類
⑬ 美人魚 → 哺乳類
⑭ 文昌魚 → 頭索動物

㊀ 學名（以二名法命名而得）
（以拉丁文命名）（以斜體字或加底線書寫）

學名 = 屬名 + 種小名（特徵 / 發現地 / 發現者）
（名詞.N）（開頭大寫）　（形容詞.adj）（開頭小寫）

Ex. Macaca cyclopis（台灣獼猴）
獼猴　圓臉的

Ex. Homo sapiens（人類）
人類　有智慧的

Ex. 試問以下三人哪個兩人可能較有關係？

甲：法宗緯
乙：楊韋德
丙：法韋德

A：甲、丙



※ 病毒的生活史：
（噬菌體）

⇒ 病毒複製完子代後便破壞宿主細胞，繼續感染其他細胞。



※ 綠藻舉例：

① 單胞藻　② 新月藻　③ 水綿　④ 團生藻

b



⑤ 綠球藻
(植物的祖先)

⑥ 石蓴
(多細胞、新北
石門中老梅綠石槽)

⑦ 波髮藻

※ 黏菌:



變形體
時期(可動)

子實體時期
(不動)

*分類七階層



※ 被子植物的比較：



※ 動物界 水蛭



A．蛭的前端腹面切去一部分，示口中鋸狀的三片齒，，排列成Y形。B．被蛭咬破的皮膚傷口呈Y形。

※ 蚯蚓



蚯蚓交尾。A．兩蚯蚓抱合，甲蚯蚓之雄性生殖孔與乙蚯蚓之受精囊孔相吻合。B．由生殖帶分泌黏液套與卵繭。C．黏液套與卵繭向前滑動。D．脫落之黏液套內含卵繭。E．卵繭。

※ 渦蟲



蝸蟲的透視圖

※ 條蟲

（b）離開寄主：以含卵的成熟節片自糞便排出。
（c）進入寄主：誤食含幼蟲的牛肉或豬肉。
（d）寄主部位：小腸。



條蟲，A.有鈎條蟲全貌，細的一端爲前端。B.無鈎條蟲的頭結放大，有四個圓形的吸盤。C.有鈎條蟲的頭結放大，除吸盤外，頂端尚有鈎。

※ 軟體動物

有利方面：
①食用：（A）很多斧足類可供食用。
（B）江珧和海扇的閉殼肌，乾製後俗稱干貝。
（C）貽貝、乾製後俗稱殼菜、淡菜。
②飾物：可形成珍珠，爲名貴飾物。如珠母、河蚌等。



（A）　（B）　（C）

數種有經濟價值的斧足綱動物。A．珠母，產生的珍珠富有經濟價值，B．貽貝，C．江珧。

※ 節肢動物

※ 節肢動物門分類：

① 甲殼綱



① 5對步足、5對泳足（第一對步足膨大成螯足）
② 呼吸器官：鰓、泳足可抱卵
③ 舉例：蝦、蟹、水蚤、劍水蚤

② 昆蟲綱



① 步足3對、翅通常2對（例外：a.蚊蠅：1對、b.蚤：0對）
② 唯一能飛行的無脊椎動物
③ 生活史有變態（完全、不完全）
④ 種類最多（陸、海、空）

③ 蛛形綱



① 毒牙位於第一對附肢，分泌毒液
第二對可支撐
② 4對步足（八腳怪）
③ 舉例：蜘蛛、蠍子、蜱

※ 海星（棘皮動物）

水管系—功用

(1) 運動

(2) 運輸（循環系退化）

(3) 排泄（排泄系統退化）

(4) 呼吸（呼吸系統退化）

(5) 感覚（神経系退化
仍具中枢神経
（但無腦）