

外科学题库+历年真题+参考试卷汇总重排版

By fallingstar10, 2021-05-29, 南医

外科学题库+历年真题+参考试卷汇总重排版

外科学习题（协和）

- 第一章 颈部疾病
- 第二章 乳房疾病
- 第三章 腹外疝
- 第四章 腹部损伤
- 第五章 急性化脓性腹膜炎
- 第六章 急腹症
- 第七章 胃十二指肠疾病
- 第八章 肠疾病
- 第九章 阑尾炎
- 第十章 直肠肛管疾病
- 第十一章 肝疾病
- 第十二章 门静脉高压症
- 第十三章 胆道疾病
- 第十四章 胰腺疾病
- 第十五章 动脉瘤
- 第十六章 骨折概论
- 第十七章 上肢、骨关节损伤
- 第十八章 下肢骨关节损伤
- 第十九章 脊柱骨折
- 第二十章 骨盆骨折
- 第二十一章 运动系慢性损伤

外科学考试卷（附一）

- 第十八章 颅内压增高
- 第十九章 颅脑损伤
- 第二十一章 颅内和椎管内肿瘤
- 第二十四章 颈部疾病
- 第二十五章 乳房疾病
- 第二十六章 胸部损伤
- 第二十九章 肺部疾病
- 第三十章 食管疾病
- 第三十一章 原发性纵隔肿瘤
- 第三十二章 心脏疾病
- 第三十三章 胸主动脉瘤
- 第三十四章 腹外疝
- 第三十五章 腹部损伤
- 第三十六章 急性化脓性腹膜炎
- 第三十七 胃十二指肠疾病
- 第三十八章 肠疾病
- 第三十九章 阑尾炎
- 第四十章 直肠肛管疾病
- 第四十一章 肝疾病
- 第四十二章 门静脉高压症
- 第四十三章 胆道疾病
- 第四十四章 上消化道大出血的鉴别诊断和处理原则
- 第四十五章 急腹症的鉴别诊断
- 第四十六章 胰腺疾病
- 第四十九章 周围血管和淋巴管疾病
- 第五十章 泌尿、男生殖系统外科检查和诊断
- 第五十五章 泌尿系统梗阻

第五十六章 尿石症
第五十七章 泌尿、男生殖系统肿瘤
第六十一章 骨折概论
第六十二章 上肢骨、关节损伤
第六十四章 下肢骨、关节损伤
第六十五章 脊柱和骨盆骨折
第六十七章 运动系统慢性损伤
第六十九章 骨与关节化脓性感染
第七十章 骨与关节结核
第七十三章 骨 肿 瘤
外科学病案分析及参考答案
试题编号：1
试题编号：2
试题编号：3
试题编号：4
试题编号：5
试题编号：6
试题编号：7
试题编号：8
试题编号：9
试题编号：10
试题编号：11
试题编号：12
试题编号：13
试题编号：14
试题编号：15
参考试卷
2013级七年制《外科学》考题（2017年5月19日）
2013级麻醉学外科学考题(考试)：
2014级七年制外科学——by 14七临考题回忆小组
2014级临床医学（五年制）外科学考题
2015级五年制临床医学《外科学》真题回顾----15级五临附一江瑛

外科学学习题（协和）

第一章 颈部疾病

- 1.判断甲亢治疗效果的主要指标是
A. 情绪变化 B. 食欲变化 C. 体重变化 D. 甲状腺大小变化 E. 脉率及脉压变化
2. 26岁女性,发现颈前一无痛肿物,生长快、质地硬、随吞咽上下活动,其最大可能性是
A. 甲状腺腺瘤 B. 甲状腺乳头状癌 C. 甲状腺滤泡状癌 D. 甲状腺髓样癌 E. 未分化癌
3. 甲状腺大部切除术后饮食上应注意
A. 高脂肪饮食 B. 高蛋白饮食 C. 高维生素饮食 D. 限制肉、蛋、乳类食品
4. 与甲状腺有关的肿块特点是
A. 位于颈前区 B. 可随吞咽上、下移动 C. 可随伸缩舌上、下移动 D. 常为囊性 E. 具有对称性
5. 对甲亢的诊断,最具敏感性的含量测定是
A. T₃ B. T₄ C. FT₃ D. FT₄ E. TSH
4. 判断甲亢病情程度和治疗效果的重要标志是
A. 食欲、体重 B. 内分泌 C. 性情、情绪 D. 脉率、脉压 E. 怕热、多汗
7. 锁骨上区的肿块应多考虑为
A. 甲状腺病变 B. 先天性病变 C. 淋巴系统病变 D. 慢性炎症 E. 转移性肿瘤
8. 15岁男孩,颈前区正中线上,舌骨下方2cm直径囊性肿块,可随吞咽及伸缩舌上、下移动,其诊断最可能是

- A. 异位甲状腺 B. 甲状腺瘤 C. 甲状腺舌管囊肿 D. 囊状淋巴管瘤 E. 舌下囊肿
9. 甲状腺癌中预后最差的是
- A. 乳头状癌 B. 未分化癌 C. 滤泡状腺癌 D. 髓样癌 E. 混合型癌

第二章 乳房疾病

- 急性乳腺炎最常见于

A. 妊娠期妇女 B. 初产哺乳妇女 C. 乳头凹陷的青年妇女 D. 哺乳半年后妇女 E. 长期哺乳的妇女
- 诊断乳房深部脓肿的主要依据是

A. 乳房红肿、热 B. 全身发热, 乳房压痛 C. 超声检查提示液平 D. 穿刺抽到脓液 E. 局部有波动感
- 乳腺癌局部皮肤呈"桔皮样改变"的原因是

A. 肿物压迫引起 B. 癌肿位置深, 侵及 Cooper 韧带 C. 肿瘤周围的炎性改变引起

C. 癌细胞侵及或堵塞乳房浅表淋巴管导致淋巴水肿 D. 肿物与乳房皮肤粘连
- 下列哪项因素与乳腺癌的预后关系最密切

A. 原发肿瘤的大小 B. 肿瘤所处的象限 C. 手术范围

D. 腋窝有无淋巴结转移及其数量 E. 肿瘤激素受体状况
- 确诊乳腺肿块良恶性病变的检查方法是

A. 钼靶照片 B. 近红外线扫描 C. B超 D. 细针穿刺细胞学检查 E. 病理切片检查
- 乳腺癌最多见于乳房的

A. 外上象限 B. 外下象限 C. 内上象限 D. 内下象限 E. 乳晕

第三章 腹外疝

- 腹外疝发病最重要的原因是

A. 腹壁强度降低 B. 慢性便秘 C. 慢性咳嗽 D. 排尿困难 E. 腹水
- 嵌顿性疝与绞窄性疝的区别是

A. 疝囊有无压痛 B. 疝内容物不能回纳 C. 疝内容物有无血运障碍 D. 是否有休克

E. 是否有机械性肠梗阻表现
- 腹外嵌顿性疝是指

A. 所有不能回纳的腹外疝 B. 疝内容物与疝囊粘连的腹外疝

C. 疝囊颈弹性收缩将内容物卡住 D. 肠管成为疝囊的一部分 E. 疝内容物有血运障碍
- 腹股沟管内环位于

A. 腹横筋膜 B. 腹横肌 C. 腹内斜肌 D. 腹外斜肌腱膜 E. 皮下浅筋膜
- 鉴别腹股沟斜疝或直疝最有意义的体征是

A. 疝块的形状 B. 疝块是否进入阴囊 D. 疝内容物的质地 E. 单侧或双侧

C. 回纳疝内容物后, 压住内环, 增加腹压时, 疝内容物是否脱出
- 内容物已进入阴囊的疝是

A. 腹股沟直疝 B. 腹股沟斜疝 C. 肠管壁疝 D. 股疝 E. 切口疝
- 在腹外疝中, 最易发生嵌顿的是

A. 腹股沟斜疝 B. 腹股沟直疝 C. 滑动疝 D. 切口疝 E. 股疝
- 腹股沟直疝的特点是疝内容物

A. 脱出后常需用手推送复位 B. 绝对不能进入阴囊, 极少嵌顿

C. 疝内容物多为小肠, 内容物不可进入阴囊 D. 疝囊颈狭小, 容易嵌顿 E. 常见于中年以上妇女

第四章 腹部损伤

- 腹部实质性脏器破裂最主要的临床表现是

A. 肠麻痹 B. 胃肠道症状 C. 全身感染症状 D. 内出血 E. 腹膜刺激征
- 腹部外伤后合并有出血性休克, 其治疗应为

A. 补充液体恢复血容量 B. 紧急剖腹探查 C. 应用抗生素控制感染

D. 抗休克的同时进行手术治疗 E. 积极抗休克治疗
- 外伤后休克病人, 经输液治疗病情好转, X线检查9、10肋骨骨折, 4d 后又发生休克, 最可能的原因是

A. 气胸 B. 肝破裂 C. 脾破裂 D. 胃破裂 E. 结肠破裂
- 外伤后, 腹腔穿刺抽出不凝固血液, 提示

- A.实质性器官破裂出血 B、空腔脏器破裂 C. 后腹膜血肿 D.肾脏损伤 E.膀胱损伤
- 5.外伤后X线片发现腰大肌影消失,常提示
 - A.腹膜后血肿B. 十二指肠损伤 C.胃破裂D.胰腺损伤 E. 肝脾破裂
- 3. 对腹部损伤的处理原则是
 - A. 优先处理穿破性损伤 B. 优先处理出血性损伤 C. 优先处理污染重的损伤
 - D. 优先处理污染轻的损伤E. 优先处理腹膜后器官的损伤
- 7.关于外伤性脾破裂,哪项是错误的
 - A.病理脾易破裂B.破裂部位多见于脾上级C. 破裂部位多见于膈面
 - D.破裂面发生在脏面则危险性更大, 尤其是脾门 E. 被膜下破裂愈后最佳, 决无危险之可能
- 4. 严重肝外伤, 手术处理的关键是
 - A.彻底清创 B.止血C.彻底清创和止血 D.单纯缝合 E. 肝叶切除
- 5. 对胰腺损伤的诊断,下列何项是错误的
 - A. 暴力直接作用于上腹中线, 常损伤胰腺颈体部 B. 暴力作用于脊柱左侧,则多伤在胰尾 C. 胰腺损伤病死率高D. 腹腔液中及血清中淀粉酶升高是胰腺损伤的特异性指标
 - E. 每例上腹部损伤者, 都应想到胰腺损伤的可能

第五章 急性化脓性腹膜炎

- 1. 有关腹膜的叙述, 哪项正确
 - A. 腹膜是由上皮细胞组成的一层薄膜 B. 网膜不是腹膜形成的 C. 腹膜的面积约 1m²
 - D. 壁腹膜主要受肋间神经和腰神经支配, 痛觉敏感, 定位准确
 - E. 盆腔腹膜较其他部位吸收力更强
 答案 :D
- 2. 继发性腹膜炎时,腹痛的特点是
 - A. 疼痛剧烈而持续B. 阵发性腹痛, 逐渐加重 C. 改变体位可使腹痛缓解
 - D. 原发病变部位疼痛不明显E. 先发热后腹痛
 答案 :A
 - 1.下列关于急性化脓性腹膜炎的体征中, 哪项是错误的?
 - A. 腹式呼吸减弱 B. 有腹肌紧张C. 腹壁肿胀及静脉曲张
 - D. 全腹压痛及反跳痛 E. 肠鸣音减弱或消失
- 3. 诊断出急性化脓性腹膜炎后, 进一步要明确的中心环节是 :
 - A. 脱水的严重程度B. 是否合并酸碱平衡紊乱 C. 引起腹膜炎的原因
 - D. 感染的程度 E. 有无贫血
- 3.下列哪项不是原发性腹膜炎的特点:
 - A. 细菌性血行感染B. 可发生于任何年龄, 多见于青年 C. 是急性腹膜炎的一种
 - D. 脓培养多见于脓血性链球菌 E. 与机体抵抗力低下有关
- 4.30岁男性,因阑尾炎穿孔并发弥漫性腹膜炎,术后形成盆腔脓肿,除应用抗生素和支持治疗外,还应:
 - A. 会阴部理疗B. 温盐水保留灌肠C. 再次经腹手术脓肿切开引流
 - D. 经麦氏切口行腹腔引流E. 经直肠前壁穿刺后切开引流
- 5.腹膜炎病人,其腹部体征最明显之处是:
 - A. 原发病灶所在部位 B. 继发性病变所在部位 C. 手术切口选择部位
 - D. 感染所在部位E. 最可忽视的部位
- 6.对各种刺激敏感痛觉定位准确的是:
 - A. 脏层腹膜 B. 壁层腹膜 C.腹膜腔D. 大网膜 E. 膈肌
- 4. 何项不是原发性腹膜炎细菌侵入腹膜的途径 :
 - A.血行扩散B.上行性感染 C.直接扩散D.透壁性感染E.腹腔内原发病灶
- 5. 在正常情况下, 腹腔内有多少毫升液体对腹腔内器官起润滑作用 :
 - A.40ml B.50ml C.60ml D. 75~100ml E.200~300ml

第六章 急腹症

- 1.腹部损伤性腹腔穿刺时,抽到不凝血,应考虑为
A.后腹膜血肿B.空腔脏器破裂 C.实质脏器破裂 D.前腹壁血肿 E.误穿血管
- 2.急腹症诊断不明时,应慎用
A. 阿托品 B. 安眠药 C.吗啡D. 镇静剂 E. 去痛片
- 3.上腹部汽车撞伤4h,患者面色苍白,四肢厥冷,血压60/40mmHg,心率 140次/min,全腹轻压痛、反跳痛与肌紧张,肠鸣音减弱,考虑为
A.胆囊破裂,胆汁性腹膜炎 B.小肠破裂,弥漫性腹膜炎 C. 严重腹壁软组织损伤
D.肝、脾破裂E.胰、十二指肠破裂,腹膜炎
- 4.鉴别急腹症,采集现病史应将 ()作为重点
A. 发热 B. 腹胀 C. 呕吐 D. 腹泻 E. 腹痛

第七章 胃十二指肠疾病

- 1.胃十二指肠溃疡穿孔最常发生于
A. 胃底B. 十二指肠前壁 C. 十二指肠后壁 D. 胃小弯 E. 胃大弯
- 2.毕I式胃切除术与毕II式胃切除术相比,优点是
A.术后不易发生胃肠道功能紊乱 B.术后溃疡不易复发 C.吻合口张力小
D.多适用于十二指肠溃疡 E.手术并发症少
- 3.胃溃疡的手术适应证不包括
A. 复合溃疡B. 经8~12周严格内科治疗无效的溃疡 C. 不能排除恶变的溃疡
D. 有穿孔的病史者E.年龄超过45岁者
- 4.患者有多年的溃疡病史,近来出现清晨大量呕吐酸臭的胃内容物,最可能的诊断是
A.十二指肠淤积症 B. 十二指肠肿瘤C. 十二指肠球部溃疡 E. 胃窦癌E. 幽门梗阻
- 5.男性,30岁,晚餐进食较多,然后突然上腹部刀割样疼痛,迅速波及 全腹,不敢直立行走,2h后入急诊。体检:疾病面容,腹式呼吸消失,腹 肌强直,有腹膜刺激征,肝浊音界消失, 肠鸣音消失,最可能的诊断是
A. 阑尾炎穿孔 B. 溃疡病穿孔 C. 胆囊穿孔D. 绞窄性肠梗阻 E. 急性胰腺炎
- 6.胃癌的好发部位依次为
A. 胃窦、胃体、贲门 B. 胃体、胃窦、贲门 C. 贲门、胃窦、胃体
D. 胃窦、贲门、胃体 E. 胃体、贲门、胃窦
- 7.因溃疡行胃部分切除术后18个月,3个月前出现上中腹痛,比术前更剧烈,并偶排黑便,最可能的诊断是
A. 残胃癌B. 碱性反流性胃炎 C.吻合口溃疡 D. 残胃溃疡E. 残留十二指肠溃疡
- 8.胃十二指肠溃疡并大出血,其溃疡部位多位于
A. 幽门或十二指肠前壁溃疡 B. 胃小弯或十二指肠后壁溃疡
C.胃大弯或十二指肠外侧壁溃疡 D.胃底部溃疡 E.贲门部溃疡

第八章 肠疾病

1. 肠梗阻的非手术治疗中,下列观察项目哪项最主要
A. 腹膜刺激征 B. 脉搏增快 C.腹胀较明显D.肠鸣音较前减弱 E. 腹痛加重
2. 最常见的肠梗阻是
A.血运性肠梗阻 B.机械性肠梗阻 C.中毒性肠梗阻 D. 动力性肠梗阻E. 肠系膜缺血性疾病
- 3.粘连导致肠梗阻的机理,不正确的是
A. 肠管因粘连牵扯成锐角 B. 粘连带压迫肠管C. 肠拌套入粘连带构成的环空
D. 肠袢以粘连处为支点发生扭转。 E. 粘连使肠管的位置不易移动
- 4.关于急性小肠扭转临床表现的描述,错误的是
A多见于老年人B多发生于饱餐剧烈活动后 C起病急,腹痛剧烈 E频繁呕吐F可出现休克
- 5.结肠癌最早出现的症状是
A. 腹部包块 B. 腹胀 C.贫血D.排便习惯和粪便性状的改变 E.消瘦
- 6.高位肠梗阻病人,除腹痛外,另一主要症状为
A.肛门停止排便排气 B. 腹胀 C.便血D. 阵发性绞痛 E. 呕吐频繁
- 7.发生肠扭转的解剖因素是

- A.肠袢固定点间距离等于系膜长度 B.肠袢两固定点间距离长于系膜长度
C.肠袢与系膜关系不重要D.肠袢两固定点间距离短于系膜长度 E. 肠袢系膜与肠扭转无关
- 8.绞窄性肠梗阻易产生酸碱失衡的类型是
A.呼吸性酸中毒 B.呼吸性碱中毒 C.代谢性酸中毒 D.代谢性碱中毒
E.呼吸性酸中毒 + 代谢性碱中毒
- 9.女,60岁。腹痛、呕吐及肛停止排气排便3d。查体:腹胀可见肠型,全腹有压痛。腹X线片:肠管扩大,可见多个液平面。应选何种治疗
A. 胃肠减压B. 抗生素治疗C.积极进行中药治疗 D.择期手术E.急诊剖腹探查

第九章 阑尾炎

- 急性阑尾炎时,最有意义的体征是
A、腹肌紧张B、阑尾固定压痛点C、结肠充气试验阳性
D、腰大肌试验阳性E、闭空内肌试验阳性
- 下列哪项不是急性化脓性阑尾炎的病理表现BE (BE为坏疽和穿孔性阑尾炎病变)
A. 浆膜充血,失去正常光泽B. 阑尾部分或全部坏死呈暗红色或黑色
C. 阑尾显著肿胀,高度充血 D. 有纤维性渗出物 E. 可出现穿孔
- 以下哪项是急性阑尾炎的最典型症状
A.恶心、呕吐 B. 乏力C.腹肌紧张D.转移性右下腹痛 E. 白细胞升高
- 下列说法不正确的是
A急性阑尾炎是最常见的外科急腹症B急性阑尾炎典型症状是上腹部痛立即转移到右下腹
C.腰大肌试验阳性说明阑尾位置较深或在盲肠后位近腰大肌处
D.急性阑尾炎确诊后应早期手术治疗E.阑尾切除术后最常见的并发症是切口感染
- 5岁男孩,体温39℃,后诉右下腹痛,腹泻3~4次/d,但无腹肌紧张及反跳痛,下列疾病中正确的是
A. 急性阑尾炎 B. 急性肠炎C. 回盲部淋巴结炎 D. 痢疾E. 阶段性肠炎
- 阑尾切除后,最常见的并发症为
A. 切口感染B. 腹膜炎、腹腔脓肿C. 粪便D. 阑尾残端炎E. 粘连性肠梗阻
- 阑尾炎时,阑尾穿孔是由于
A. 管腔梗阻合并管壁坏死 B. 阑尾系膜短易于卷曲C. 阑尾含有丰富的淋巴组织
D. 阑尾动脉为终末动脉,易发生血运障碍E 阑尾开口小

第十章 直肠肛管疾病

- 直肠肛管周围脓肿的主要病因
A. 外伤B、肛腺感染 C.药物注射D. 全身感染性疾病 E、肛裂
- 下列哪项不是肛痿的表现
A. 局部少量脓性分泌物 B. 局部皮肤瘙痒 C. 前哨痔D. 局部皮肤肿痛E. 全身发热、乏力
- 直肠癌的主要症状和体征不包括
A. 便血B. 排便习惯的改变C. 腹胀、腹痛等不全性肠梗阻症状
D. 指肠指检可发现病变 E. 腹部可触及肿块
- 最常见的直肠肛管周围脓肿是
A.肛门周围脓肿B.坐骨直肠窝脓肿 C. 骨盆直肠窝脓肿 D.直肠后间隙脓肿 E. 骨盆直肠痿
- 肛门部位胀痛,伴发热3d。查体:肛门左侧皮肤稍红,指检,距离肛缘4cm处直肠壁肿胀,压痛明显,诊断考虑为
A.肛周脓肿B.直肠壁内脓肿C.坐骨直肠间隙脓肿 D.骨盆直肠间隙脓肿 E.括约肌间隙脓肿
- 便血病人做肛门指检的目的是
A. 诊断内痔 B. 诊断外痔 C、排出炎症D.排除直肠肿瘤 E.排除肛痿
- 小儿大便时带鲜血,并于肛门外脱出一花生米大小肉块,考虑诊断为
A. 内痔脱出B. 肛裂C. 外痔栓塞 D. 直肠息肉 E. 直肠脱垂
- 对怀疑直肠癌的病人,首先应作的检查是
A. 乙状结肠镜检查 B. 直肠指检C.X线钡剂灌肠D. 答辩常规检查E. 纤维结肠镜检查
- 直肠癌根治术能否保留肛门取决于
A. 肿块大小 B. 侵犯范围C. 癌肿距离肛门范围 D. 癌肿有无转移 E. 乙状结肠长短

第十一章 肝疾病

1. 下列哪项不是阿米巴肝脓肿的征象

- A. 多有阿米巴病疾的病史 B. 起病缓慢, 病程长, 症状轻 C. 肝穿刺液常为棕褐色
D. 结肠镜检可见结肠蒙古膜有慢性溃疡 E. 脓肿常多发

2. 治疗早期原发性肝癌, 最有效的方法是

- A. 手术切除 B. 肝动脉插管治疗 C. 肝动脉栓塞治疗 D. 放射治疗 E. 局部注射无水乙醇疗法

3. 外科手术中, 常温下一次阻断肝血流的时间一般不超过

- A. 5~10min B. 10~20min C. 20~25min D. 25~30min E. 以上均不对

4. 发性肝癌的首发症状是

- A. 肝区疼痛 B. 肝肿大 C. 贫血 D. 黄疸 E. 下肢浮肿

5. 下列哪项为阳性最有助于诊断原发性肝癌

- A. γ -GT B. AFP C. MRI D. CT E. B超

5. 细菌性肝脓肿时细菌进入肝脏的途径最常见的是

- A. 肝动脉 B. 脐静脉 C. 门静脉 D. 胆道 E. 经肝创伤处直接进入

7. 肝脏的良性肿瘤较常见的是

- A. 纤维瘤 B. 海绵状血管瘤 C. 混合瘤 D. 腺瘤 E. 错构瘤

6. 诊断肝癌与肝脓肿最易混淆的是

- A. 右上腹肿块 B. 发热 C. 腹部 D. 肝癌坏死液化 E. 贫血

7. 肝包虫囊肿一旦确诊, 应特别注意哪个部位有无类似病变存在

- A. 脑部 B. 颈部 C. 腹部 D. 双肾 E. 腹膜后

8. 肝脓肿最常见的并发症是

- A. 胆道大出血 B. 急性腹膜炎 C. 急性心包积液 D. 膈下脓肿 E. 应激性溃疡

第十二章 门静脉高压症

1. 门静脉高压症是指门静脉压力达到

- A. 1.27kPa B. 2.35Kpa C. 2.45Kpa D. 2.94kPa E. 4.09kPa

解析: 注意是cmH₂O, 不是mmHg, 所以门脉高压30-50cmH₂O, 1Kpa=10.2cmH₂O, 即2.94Kpa-4.9Kpa

2. 门腔静脉分流术后发生肝性脑病的原因是

- A. 肝灌注量减少 B. 肝营养下降 C. 氨直接进入血循环 D. 白蛋白降低 E. 以上都不是

3. 门静脉高压外科手术的主要目的是

- A. 治疗脾亢 B. 减少腹水 C. 预防和治疗消化道出血 D. 预防肝功能衰竭 E. 防治癌变

3. 门静脉高压症合并食管胃底静脉曲张破裂出血的主要死亡原因是

- A. 失血性休克 B. 大量腹水 C. 感染 D. 肝功能衰竭 E. 多器官衰竭

4. 门静脉主干是由哪两条静脉汇合组成

- A. 肠系膜上静脉和肠系膜下静脉 B. 肠系膜上静脉和脾静脉 C. 肠系膜上静脉和冠状静脉
D. 肠系膜下静脉和脾静脉 E. 肠系膜下静脉和冠状静脉

解析: 答案没错, 考试出现的话就选B, 门静脉主干确实是肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成, 书上虽然说是三个包括肠系膜下静脉, 但是老师上课有说是肠系膜上静脉和脾静脉, 肠系膜下静脉汇入肠系膜上静脉或脾静脉

6. 门静脉高压症最危险的并发症是

- A. 肝性脑病 B. 脾功能亢进 C. 全血细胞减少 D. 腹水 E. 食管胃底静脉曲张破裂出血

解析: 门脉高压最危险并发症和最常见死因为肝性脑病, 最常见并发症食管胃底静脉曲张破裂出血)

7. 门静脉高压症的最主要原因是

- A. 门静脉炎 B. 肝静脉阻塞 C. 肝硬变 D. 肝血管瘤 E. 多囊肝

5. 诊断门静脉高压症最有意义的是

- A. 脾大、脾功能亢进 B. 呕血、黑便 C. 腹水 D. 肝功能障碍 E. 食管胃底静脉曲张

第十三章 胆道疾病.

1. 肝外胆道的解剖特点, 下列哪项是错误的
A. 胆管常有变异 B. 胆囊动脉常有变异 C. 胆总管下端多数与主胰管汇合
D. Oddi 括约肌由膜胆管壶腹部括约肌构成 E. 胆囊分底体颈三部
2. 静脉胆囊造影的适应证为
A. 疑有慢性胆囊炎者 B. 疑有胆囊结石症者 C. 胆管疾病可疑者
D. 急性胆囊炎者 E. 急性胰腺炎者
3. 关于胆道X线检查, 哪条不正确
A. 平片胆色素结石一般不显影 B. 平片胆固醇结石显影 C. 肝功能不佳造影时往往不显影
D. 胃肠功能紊乱, 可影响口服法造影 E. 胆囊功能不正常, 造影时可不显影
3. 急性胆囊炎最严重的并发症
A. 细菌性肝脓肿 B. 胆囊积液 C. 胆囊坏疽穿孔引起胆汁性腹膜炎 D. 并发急性胰腺炎
E. 胆囊十二指肠内瘘
4. 胆固醇结石形成的主要原因
A. 慢性胆道感染 B. 胆汁中胆固醇浓度增加 C. 胆道内蛔虫残体存留
D. 胆汁中胆盐和磷脂相对减少 E. 胆道梗阻
5. 胆管结石急性发作和急性胆管炎典型三联征
A. 疼痛、发热、胆囊肿大 B. 疼痛、白细胞增高、腹膜炎 C. 发热、淀粉酶增高、黄疸
D. 胆囊结石、胆总管及肝内胆管结石 E. 疼痛、寒战高热、黄疸
6. 胆总管结石并化脓性胆管炎时发生的并发症中, 下列哪项是错误的
A. 肝脓肿 B. 感染性休克 C. 急性胰腺炎 D. 结石压迫门静脉引起肝外型门脉高压症
E. 胆道出血
7. 先天性胆总管闭锁的婴儿手术应在
A. 出生后尽量早手术 B. 出生后2~3个月时手术 C. 出生后3~6个月时手术
D. 应在半年后考虑手术 E. 等婴儿长大后再手术
8. 有关胆道疾病的护理哪项是错误的
A. 饮食应低脂、高糖、高蛋白及大量维生素 B. 阻塞性黄疸病人, 应注意有无出血倾向
C. 对有肝脏明显受累的病人忌吗啡、巴比妥类药物 D. 对静脉胆囊造影的病人要作过敏试验
E. 如果短期内绞痛缓解, 高热黄疸逐渐消退, 即可让病人出院休养

第十四章 胰腺疾病

1. 急性胰腺炎的发病之初3~4h, 最有诊断价值的是
A. 尿淀粉酶升高 B. 血淀粉酶升高 C. 血清脂肪酶升高 D. 血白细胞计数升高
E. 血尿素氮、肌酐升高
2. 正常胰腺每天的分泌量是:
A. 500~750ml B. 750~1500ml C. 1000~2000ml D. 1500~2500ml E. <500ml
3. 急性胰腺炎者腹痛最初常见于:
A. 上腹部并向腰背部放射 B. 心窝部并向腰背部放射 C. 心窝部并向左肩部放射
D. 上腹并向右肩放射 E. 左上腹并向左侧腹放射
4. 胰腺癌的好发部位是:
A. 胰头 B. 胰体 C. 胰尾 D. 胰体、尾部 E. 全胰腺
5. 男, 58岁, 无痛性黄疸2个月, 且黄疸进行性加深, 手术探查时候见肝及胆囊增大, 直径约1.8cm, 胰头部可扪及5cm×5cm肿块, 尚能推动。应选用哪种手术方式:
A. 胰十二指肠切除术 B. 全胰切除术 C. 胰头部切除术 D. 胆囊空肠吻合术
E. 全胰十二指肠切除术
6. 诊断胰导细胞瘤最可靠的依据是:
A. Whipple 三联征 B. 葡萄糖耐量呈低平曲线 C. 血胰素值超过正常值的70%
D. B超、CT可显示肿块 E. 试验血糖明显降低且恢复缓慢
7. 急性胰腺炎时尿淀粉酶与血清淀粉酶之间的关系是
A. 两者同时增高 B. 前者增高先于后者 C. 前者增高迟于后者 D. 前者不增高, 后者增高
E. 前者持续增高, 后者先高后低

- 8.急性 肺炎病人病愈出院时,为防复发,应告诉病人
A. 戒烟B. 防止精神刺激C、戒烟、戒暴饮暴食 D. 定期驱蛔虫E. 预防上腹部创伤
- 9.胰腺疾病和胆道疾病的"同病"的解剖基础是
A. 胆总管与胰管有共同通道和出口 B. 胆总管与胰腺紧贴,并位于其后方
C. 胰腺炎胰腺肿大时常能压迫胆总管 D. 均属肝门部器官E. 均受肝内胆汁分泌的影响
10. 急性胰腺炎的基本病理改变是
A. 纤维性变B. 水肿、出血、坏死 C. 假性囊肿形成D. 形成胰腺周围脓肿 E. 胰腺萎缩

第十五章 动脉瘤

- 1.Buerger 病最重要的治疗是
A. 戒烟B.药物治疗C.高压氧疗法 D.动脉重建术E.交感神经切除术
- 2.明确下肢静脉曲张是一个独立的病变还是一个症状时,最可靠的是
A.batt试验B.Perthes试验C.Doppler超声检查D.Trendelenburg试验 E.下肢深静脉X 线造影
- 3.男,28岁,2 个月前左大腿根部被木棍击伤,近3日行走困难,发热, 体检见左腹股沟区搏动性肿物,左髋关节不能伸直,皮温升高,可触及 震颤。 应诊断
A. 髂窝脓肿B. 左腹股沟疝C. 左腹股沟脓肿 D.假性股动脉瘤E.损伤性动静脉瘘
- 4.处理下肢静脉曲张的根本办法是
A. 穿弹力袜或用弹力绷带 B. 硬化剂注射或压迫疗法
C.高位结扎和剥脱大隐静脉,并结扎功能不全的交通支 D.内科药物治疗E. 静脉瓣膜修复术
5. 动脉血栓最常见的来源是
A.心源性B.血管源性 C.医源性D.体内其他 E. 异物
- 6.诊断原发性下肢深静脉瓣膜功能不全最可靠的方法是
A.下肢静脉超声多普勒检查 B.CT C. 静脉造影 D. 深静脉通畅试验
E. 深静脉交通支瓣膜功能试验
- 7.下肢静脉曲张的主要原因是
A.长时间站立 B.静脉软弱和静脉压增高 C. 髂股静脉血栓形成D. 慢性咳嗽,习惯性便秘
E.盆腔肿瘤
- 8.单纯性大隐静脉曲张最佳的治疗方案
A.单纯高位结扎术 B. 穿弹力袜C. 结扎功能不全的交通支 D.曲张静脉分段结扎
E.高位结扎 + 主干剥脱及交通支结扎
- 9.血栓闭塞性脉管炎的主要病变部位是
A.四肢大血管B. 股动脉、腓动脉 C. 腋动脉、肱动脉
D. 四肢中小动静脉,以动脉为主 E. 四肢中小动静脉, 以静脉为主
6. 哪项不是 Buerger 病发病原因
A. 吸烟 B. 寒冷C. 动脉粥样硬化 D. 免疫功能紊乱E. 性激素和前列腺素失调

第十六章 骨折 概论

- 1.下列骨折哪一项是属稳定性骨折
A. 横形骨折 B. 斜形骨折C. 螺旋形骨折 D. 粉碎骨折E. 椎体压缩骨折超过1/2
- 2.下列哪些骨折出现骨折的专有体征
A.青枝骨折 B. 嵌插骨折 C.不全骨折 D.粉碎骨折 E. 压缩骨折
3. 哪一项是骨折的专有体征
A. 肿胀B. 功能障碍 C. 局部淤瘀 D. 畸形E. 局部痛与压痛
4. 缺血性骨坏死最易发生于
A. 股骨颈骨折B. 股骨粗隆间骨折 C. 腓骨骨折D. 胫骨下段骨折 E. 肱骨上段骨折
- 5.下列哪种新骨属外骨痂
A.骨内膜骨样组织钙化而成的新骨 B.骨外膜骨样组织钙化而成新骨
C.骨内外骨膜骨样组织钙化而成的新骨 D.软骨细胞增生钙化而成新骨
E.骨折端坏死骨爬行替代而成的新骨
- 6.影响骨折愈合的医源性因素

- A. 年龄 B. 骨折端的血供情况 C. 感染 D. 软组织嵌入骨端 E. 过度牵引
7. 下列闭合创口的方式哪项是错误的
- A. 皮肤缺损少, 无张力可直接缝合 B. II 度开放性骨折, 皮肤缺损较多, 皮缘较齐, 可行减张缝合
- C. III 度开放性骨折, 难于闭合, 可延迟闭合伤口
- D. 纵向跨过关节伤, 无皮肤损伤, 可采取直接缝合术
- E. 大块皮缺损, 无骨、肌、腱、神经等外露可采用游离植皮术
8. 开放性关节损伤按损伤程度和预后不同可分为
- A. 2 度 B. 3 度 C. 4 度 D. 5 度 E. 6 度
9. 骨折诊断的主要依据是
- A. 病史和体征 B. X 线检查结果 C. 肢体肿胀 D. 休克 E. 肢体功能障碍
5. 骨折反复多次复位造成严重的并发症有
- A. 继发性血肿 B. 皮肤坏死 C. 继发血管神经损伤 D. 骨折移位 E. 骨不愈合

第十七章 上肢、骨关节损伤

1. 闭合性锁骨骨折复位后, 多采用的固定方法是
- A. 石膏 B. 夹板 C. 牵引 D. "8" 字绷带 E. 钢板内固定
2. 锁骨骨折好发部位
- A. 胸锁关节处 B. 锁骨内 1/3 处 C. 锁骨中 1/3 处 D. 锁骨外 1/3 处 E. 肩锁关节处
3. 肱骨外科颈骨折外固定应固定
- A. 2 周 B. 2~4 周 C. 4~6 周 D. 6~8 周 E. 100d
4. 肱骨外科颈位于
- A. 肱骨头下 B. 肱骨解剖颈上 2~3 cm C. 肱骨解剖颈下 2~3 cm
- D. 肱骨内外髁上 2~3 cm E. 桡神经沟
5. 股骨干骨折下列哪项是错误的
- A. 局部有肿痛 B. 肱骨干上端骨折可出现方肩畸形 C. 可合并桡神经损伤
- D. 多有成角畸形 E. 需固定肩肘关节
6. 肱骨中下 1/3 骨折可并发
- A. 肱动脉损伤 B. 桡二头肌损伤 C. 正中神经损伤 D. 尺神经损伤 E. 桡神经损伤
6. 肱骨桡上骨折所致伏克曼挛缩是因为骨折端压迫
- A. 正中神经 B. 桡神经 C. 肱二头肌腱 D. 肱动脉 E. 前臂屈肌附着点
7. 肢骨桡上骨折多见于
- A. 男性 B. 女性 C. 老年 D. 中年 E. 儿童
8. 尺桡骨骨折后哪种说法不正确
- A. 先行手法复位 B. 复位后可用夹板固定 C. 肿胀严重压迫血管应切开减压
- D. 仅复位尺骨即可 E. 手法复位失败后可切开复位

第十八章 下肢骨关节损伤

1. 成人股骨颈的主要血液供应来源是
- A. 股圆韧带的小凹动脉 B. 股骨干的滋养动脉升支 C. 旋股内外侧动脉的分支
- D. 旋髂动脉 E. 阴部内外动脉
2. 下列哪种股骨颈骨折最容易发生股骨头坏死
- A. 股骨头下骨折 B. 经颈股骨颈骨折 C. 经基底部股骨颈骨折
- D. 不完全移位的股骨颈骨折 E. 稳定型股骨颈骨折
3. 股骨颈骨折与股骨转子间骨折在临床表现中主要的鉴别依据是
- A. 大转子上移的程度不同 B. 外旋畸形程度的不同 C. 患髋活动受限程度的不同
- D. 骨折移位程度的不同 E. 好发年龄的不同
4. 股骨颈骨折晚期最常见的并发症是
- A. 创伤性髓关节炎 B. 髋关节僵硬 C. 坠积性肺炎 D. 压疮及泌尿系感染 E. 股骨头缺血性坏死
5. 股骨转子骨折容易产生的并发症是
- A. 股骨头缺血坏死 B. 骨折不愈合 C. 髋关节外翻畸形 D. 髋关节内翻畸形 E. 髋关节僵硬
5. 股骨颈的颈干角平均角度为
- A. 117° B. 127° C. 137° D. 147° E. 小于 100°

- 7.在股骨颈治疗的过程中,下列哪项是不正确的
- 无明显移位的外展"嵌插"型骨折,可用持续皮牵引 6~8 周
 - 内收骨折或有移位的股骨颈骨折,可先牵引,7~12d 内进行内固定
 - 65岁以上病人头下型股骨颈骨折可做人工股骨头置换术
 - 儿童和青壮年的股骨颈骨折尽量不行手术治疗
 - 陈旧性股骨颈骨折不愈合者可行转子间截骨术
- 8.男,28岁,车祸后右髋部疼痛,查体见右股骨大转子上移、髋关节不能活动,呈屈曲内收内旋畸形,正位X线显示右髋关节间隙明显变窄,近似于消失。初步诊断应首先考虑为
- 髋关节后脱位
 - 髋关节前脱位
 - 股骨颈骨折
 - 股骨转子骨折
 - 髋关节中心脱位
- 9.患者女,65岁,平地绊倒后,右髋疼痛不能行走,查体右下肢呈55°外旋畸形,患髋压痛,大转子明显突出并部分上移,最可能诊断是
- 股骨上段骨折
 - 股骨颈囊内骨折
 - 垂直悬吊牵引
 - 股骨转子间骨折
 - 髌臼骨折
- 10.1岁半男孩,股骨干上1/3斜行骨折治疗最好采用
- 水平位皮牵引
 - 水平位骨牵引
 - 垂直悬吊牵引
 - 切开复位内固定
 - 石膏或夹板外固定

第十九章 脊柱骨折。

- 下面哪段脊柱骨折最多见
 - 颈椎
 - 胸椎
 - 胸腰段
 - 腰段
 - 骶尾椎
- 下面哪段脊柱骨折合并脊髓损伤较其他部位多见
 - 颈椎
 - 胸椎
 - 胸腰段
 - 腰段
 - 骶尾椎
- 齿状突骨折临床分为几型
 - 1 型
 - 2 型
 - 3型
 - 4 型
 - 5 型
- 齿状突骨折临床上哪一型并发症多常须手术治疗
 - 1 型
 - 2 型
 - 3型
 - 4 型
 - 5 型
- 颈椎半脱位患者的早期治疗应是
 - 石膏颈围固定
 - 药物治疗
 - 手术治疗
 - 不必治疗
 - 牵引治疗
- 稳定型颈椎骨折而无神经并发症患者的最佳治疗是
 - 直接石膏颈围固定
 - 手术治疗
 - 牵引复位后颈胸石膏固定
 - 无须治疗
 - 药物治疗
- 搬运脊柱骨折病人的正确方法是
 - 抬头、抬脚法
 - 搂抱搬运法
 - 半坐搬运法
 - 平托搬运法
 - 背运法
- 判断脊柱骨折脱位是否并发脊髓伤,最重要的检查是
 - CT
 - MRI
 - X 线摄片
 - 神经系统检查
 - 脊髓造影检查

第二十章 骨盆骨折

- 可发生严重并发症的骨盆骨折是
 - 髂前上棘撕脱骨折
 - 坐骨结节骨折
 - 尾骨骨折
 - 髂前下棘撕脱骨折
 - 双侧耻、坐骨骨折
- 骨盆骨折最危险的并发症是
 - 直肠损伤
 - 阴道损伤
 - 膀胱损伤
 - 神经损伤
 - 腹膜后搏动性血肿
- 骨盆骨折腹膜后血肿的来源,错误的是
 - 骨折断端出血
 - 盆腔静脉丛出血
 - 髂内动、静脉破裂出血
 - 骨盆壁肌肉出血
 - 股动、静脉分支破裂出血
- 诊治骨盆骨折的措施,错误的是
 - 密切监测血压
 - 输液途径要建立在四肢或颈部
 - 若病人不能自动排尿,应导尿
 - 多次腹腔穿刺才得到的阳性结果无诊断价值
 - 视病情及早完成 X 线和 CT 检查
- 骨盆骨折不会出现下列哪项体征
 - 骨盆分离实验阳性
 - 骨盆挤压实验阳性
 - 直腿抬高实验阳性
 - 会阴部淤瘀
 - 肢体长度不对称
- 下列哪项与骨盆骨折的诊断及并发症的防治无关
 - 导尿或嘱病人排尿
 - 诊断性腹腔穿刺
 - 摄片
 - 监测血压
 - 肠镜检查

7. 骨盆骨折病人,怀疑腹腔脏器破裂,下面哪项检查对明确诊断是最合适的
A. 腹部 B 超 B. 腹部 CT C. 导尿 D. 诊断性腹腔穿刺 E. 腹部平片
4. 耻骨骨折特有体征是
A. 股体不等长 B. 骨盆挤压实验阳性
5. 坐骨骨折特有体征是
A. 肢体不等长 B. 骨盆分离实验阳性 C. 会阴部淤癥 D. 骨盆挤压实验阳性
E. 诊断性腹腔穿刺抽出不凝血

第二十一章 运动系慢性损伤

1. 关于狭窄性腱鞘炎下列哪项是错误的:
A、病变不仅局限于屈肌腱鞘 B、肌腱和腱鞘韧带都有肉芽组织形成
C、病变部位在掌指关节前 D、早晨起床发僵发疼痛,活动后消失 E、局部压痛不明显
2. 早期狭窄性腱鞘最好的治疗方法是:
A 腱鞘切开松懈肌腱 B 石膏固定 C 局部注射醋酸强的松龙 D 针灸及理疗 E 用抗生素治疗
3. 关于腕管综合征,下列哪项是错误的:
A 本病是正中神经在腕管内受压迫 B 本病男多于女,常为单侧
C 最常见的病因是滑膜炎和肌腱炎 D 临床检查、屈腕试验诊断价值大
E 日间痛轻、晚间痛重,猛摔手痛减轻
4. 关于肱骨外上髁炎,下列哪项是错误的
A 本病是外上髁部慢性损伤性肌筋膜炎 B 常由慢性外伤引起
C 症状为肘外侧疼痛向前臂外侧放射 D 升肌腱牵拉试验阳性 E 激素注射痛点效果不肯定
5. 关于肩关节周围炎,下列哪项是错误的
A、本病是关节周围多种软组织的慢性炎症 B、特征为肩痛,活动限制和肌肉萎缩
C、外展,外受限最严重 D、病变结果为关节外软组织粘连 E、本病能自愈

参考答案

- 第一章 颈部疾病 1-5EBDBE 6-9DECB
第二章 乳房疾病 BDCDEA
第三章 腹外疝 1-5ACCAC 6-8BEB
第四章 腹部损伤 DDCAABECD
第五章 急性化脓性腹膜炎 CCBEABED
第六章 急腹症 CCDE
第七章 胃十二指肠疾病 BAEEBDCB
第八章 肠疾病 ABEADEDCE
第九章 阑尾炎 BEDBAAD
第十章 直肠肛管疾病 1-5BCEAC 6-9DDBC
第十一章 肝疾病 EABABDBDCD
第十二章 门静脉高压症 1-5DCCDB 6-8ACE
第十三章 胆道疾病 DCBCDEDBE
第十四章 胰腺疾病 BBAAAACCB
第十五章 动脉瘤 AEDCACBEDC
第十六章 骨折概论 ADDABEDBBE
第十七章 上肢、骨关节损伤 1-5DCBCB 6-10EDCED
第十八章 下肢骨关节损伤 1-5CABED 6-10BEABC
第十九章 脊柱骨折 CACBACDD
第二十章 骨盆骨折 EEECCEDCC
第二十一章 运动系慢性损伤 ECBED

外科学考试卷（附一）

一、单选题

1. 以下哪种骨折要求解剖复位()
A. 脊椎压缩性骨折 B. 肱骨干骨折 C. 掌骨骨折 D. 腓骨骨折 E. 关节内骨折
2. 骨盆骨折最严重的并发症是()
A. 腹膜后血肿引起休克 B. 膀胱尿道损伤 C. 直肠损伤 D. 腰骶神经丛损伤 E. 功能障碍
3. 脊柱损伤伤员正确搬运方法是()
A. 二人分别抱头、脚平放于硬板上后送
B. 二人用手分别托住伤员头、肩、臀和下肢,动作一致将伤员搬运起平放于门板后送
C. 一人抱起伤员放于门板担架后送
D. 二人用手分别托住伤员头、肩、臀和下肢,动作一致将伤员搬起平放于帆布担架后送
E. 无搬运工具时可背负伤员后送
4. 女性,50岁,左拇指痛3周,屈伸有弹响,第一掌侧可扪及结节,诊断可能为()
A. 第一掌骨病理性骨折 B. 弹响拇 C. 腱鞘囊肿 D. 类风湿性关节炎 E. 拇深屈肌腱断裂
5. 骨软骨瘤的临床表现()
A. 肿瘤生长迅速 B. 局部红肿、疼痛 C. 多数无症状,无意中发现骨性肿块
D. X线示骨破坏,膨胀性改变 E. 常见部位手、足等管状骨
6. 骨肉瘤的X线表现特点是()
A. 骨干中心透明影中有钙化 B. 骨膜被掀起形成 Codman 三角
C. 骨端膨胀,骨质破坏,呈肥皂泡沫样改变 D. 骨皮质呈葱皮样改变 E. 骨端突起,无明显破坏
7. 慢性化脓性骨髓炎的治疗哪项不正确()
A. 病灶冲洗 B. 切除窦道 C. 消灭死腔 D. 去除死骨 E. 植骨
8. 骨关节结核最常见于()
A. 脊柱 B. 髋关节 C. 膝关节 D. 长管骨 E. 踝
9. 泌尿系统感染的抗炎治疗,使用抗生素的标准是应持续到()
A. 病人的症状完全消失 B. 病人的症状完全消失,尿细菌培养转阴即停药
C. 病人的症状完全消失,尿细菌培养转阴后 1 周 D. 病人的症状完全消失,尿细菌培养转阴后 2 周
E. 病人的症状完全消失,尿细菌培养转阴后 3 周
10. 判断肾破裂程度,下列哪项最有价值()
A. 血尿程度 B. 尿路本片中的腰大肌阴影 C. 排泄性尿路造影及 CT 检查 D. 外伤的方式
11. 骨盆骨折最可能损伤尿道哪个部位()
A. 尿道球部 B. 尿道海绵体部 C. 尿道膜部 D. 尿道前列腺部 E. 尿道外口
12. 腹部单片上见右上腹有一不透 X 线的圆形阴影,用哪一种较简单方法来区别是胆囊结石还是肾结石()
A. 腹部正侧片 B. 腹部侧位片 C. 排泄性尿路造影 D. 逆行肾盂造影 E. 肾穿刺造影
13. 胸主动脉瘤的主要临床表现()
A. 胸痛 B. 膈肌麻痹 C. 搏动性肿块 D. 邻近器官被压迫或侵犯时才会有的临床症状 E. 呼吸困难
14. 病理性骨折最易发生于()
A. 有恶性肿瘤转移灶的肋骨 B. 老年人的肋骨 C. 小儿的肋骨 D. 绝经期后妇女的肋骨 E. 第12肋软骨
15. 食管癌最常见的细胞类型为()
A. 鳞癌 B. 腺癌 C. 恶生黑色素瘤 D. 燕麦细胞癌 E. 癌肉瘤
16. 以下哪项不属于原发性脑损伤()
A. 脑震荡 B. 弥漫性轴索损伤 C. 脑挫裂伤 D. 脑内血肿 E. 下丘脑损伤
17. 甲状腺叶切除后出现进食时呛咳,音调降低应考虑()
A. 喉上神经损伤 B. 膈神经损伤 C. 喉返神经损伤 C. 副神经损伤 E. 交感神经损伤
18. 诊断急性胰腺炎并有坏死最佳方法是()
A. 腹部增强 CT 扫描 B. 腹部 MRIC. 胰腺彩超 D. 腹部立位 X 线 E. B 超定位下胰腺穿刺
19. 乳腺癌的早期表现是()
A. 皮肤橘皮样变 B. 乳腺疼痛 C. 乳头黄色溢液 D. 乳头内陷 E. 无痛小肿块
20. 确定乳房肿块性质的最可靠方法是()
A. 钼靶检查 B. 组织学检查 C. 红外线检查 D. 彩色 B 超 E. 热像图检查

21. 下列哪项不是胆总管探查的指征 ()
 A. 典型的胆绞痛及寒战、高热史 B. 反复发生的梗阻性黄疸病史
 C. 术中见胆总管扩张，壁增厚 D. 胰腺有慢性炎症，不能除外胆管病变 E. 胆囊管闭塞
22. 肠息肉多见于 ()
 A. 十二指肠 B. 空肠 C. 回肠 D. 回盲肠 E. 乙状结肠和直肠
23. 结肠癌最重要的早期症状 ()
 A. 体重减轻 B. 贫血 C. 腹部不适 D. 排便习惯及大便性状改变 E. 胃纳差
24. 男性，40岁，经常上腹部不适10年，近2个月来呕吐频繁，体格检查：轻度脱水貌，上腹可见蠕动波，手拍有振水音，胃肠钡餐造影24小时内胃有钡剂残留。其呕吐物的主要成分应是：
 A. 含多量胆汁样液体 B. 大量酸性液体 C. 隔夜食物 D. 咖啡样液体 E. 以上都不是
25. 上消化道大出血最常见的病因是 ()
 A. 胃癌 B. 门脉高压症 C. 胃、十二指肠溃疡 D. 出血性胃炎 E. 肝内局限性感染
26. 内痔的早期症状是 ()
 A. 痔块脱出 B. 疼痛明显 C. 经常有便秘 D. 便后手纸有鲜血 E. 腹泻
27. 关于腹部损伤，以下描述哪一项不正确 ()
 A. 实质性器官或大血管损伤主要临床表现为腹腔内或腹膜后出血
 B. 空腔脏器破裂主要表现为弥漫性腹膜炎 C. 体征最明显处一般是损伤所在部位
 D. 开放性损伤有腹膜破损者为穿透伤 E. 诊断不明确，首选腹腔镜检查
28. 关于多发伤的处理，发下描述哪一项不正确 ()
 A. 心肺复苏是压倒一切的任务 B. 实质性脏器损伤比空腔脏器损伤更为紧急
 C. 诊断明确者，可给予镇痛药 D. 血压偏低或不稳定的颅脑损伤者，经一般处理后休克不能纠正，应考虑到脑干受压可能 E. 胸部有穿透伤，麻醉前都应先行患侧胸腔闭式引流
29. 关于肝脏的作用，以下哪项不正确
 A. 分泌胆汁 B. 凝血功能 C. 解毒作用 D. 吞噬或免疫作用 E. 氧合功能
30. 细菌性肝脓肿，细菌最主要的侵入途径是：
 A. 胆道 B. 肝动脉 C. 门静脉 D. 淋巴管 E. 直接经伤口或腹腔邻近感染累及
- 本科外科学考试卷 (答案)
31. E 2. A 3. B 4. B 5. C 6. B 7. E 8. A 9. D 10. C 11. C 12. A 13. D 14. A 15. A 16. D 17. A 18. A 19. E 20. B
 21. E 22. E 23. D 24. C 25. C 26. D 27. E 28. D 29. E 30. A

第十八章 颅内压增高

[A型题]

1. 小脑幕切迹疝最具诊断意义的临床表现是 D
 A. 神志不清 B. 剧烈头痛 C. 早期出现呼吸变慢和骤停
 D. 瞳孔不等大 E. 生命体征紊乱
2. 目前诊断颅内占位性病变的首选辅助检查是 B
 A. MRI B. CT C. DSA D. 头颅X线平片 E. 腰椎穿刺
3. 小脑幕切迹疝出现患侧瞳孔散大，是由于患侧哪一支颅神经受压？ B
 A. 三叉神经 B. 动眼神经 C. 滑车神经 D. 外展神经 E. 视神经

[B型题]

- A. 狭颅症 B. 阻塞性脑积水 C. 脑肿瘤
 D. 脑缺氧 E. 颅内动静脉畸形
4. 脑血流量持续增加 E
 5. 颅腔容积变小 A
 6. 颅腔内容物体积增大 D
 7. 颅内空间相对变小 C
 8. 脑脊液增多 B

[C型题]

- A. 液体积聚在细胞外间隙 B. 液体积聚在细胞膜内
 C. 两者均有 D. 两者均无
9. 血管源性脑水肿 A
 10. 细胞毒性脑水肿 B

第十九章 颅脑损伤

[A型题]

1. 血肿最好发的部位是 A
A. 颞区 B. 额顶区 C. 顶枕区 D. 额极区 E. 矢状窦上下骑跨型
2. 急性颅脑损伤在何种情况下切忌腰穿? C
A. 病情稳定之后 B. 怀疑有蛛网膜下腔出血 C. 怀疑有颅脑血肿
D. 意识障碍尚未恢复 E. 开放性颅脑损伤
3. 小脑幕上慢性硬膜下血肿的治疗多可采用 B
A. 开颅清除血肿 B. 简单的钻孔引流 C. 采用高渗脱水药物
D. 应用大剂量激素 E. 等待自行吸收
4. 慢性硬膜下血肿有以下特点, 但除 E 外。
A. 发病年龄较大
A. 仅有轻微的颅脑损伤
C. 出血源多为进入 γ 矢状窦的桥静脉
D. 血肿的包膜需3周以后才趋完备
E. 大部分病例为双侧性血肿
5. 婴幼儿硬膜下血肿的治疗方法是 C
A. 颅骨钻孔引流 B. 行开颅血肿清除术 C. 前囟外侧角穿刺抽吸血肿
D. 腰穿排放积血 E. 高渗药物保守治疗
6. 脑挫裂伤与脑震荡可靠的鉴别诊断是 C
A. 临床表现 B. X线检查 C. 脑脊液检查
D. 生化检查 E. 脑电图检查
2. 小脑幕上硬膜外血肿最主要的来源是 B
A. 颅骨骨折引起的板障出血
B. 颅骨骨折导致脑膜中动脉破裂出血
C. 脑表面的血管破裂出血
D. 帽状腱膜下的血管破裂出血
E. 颞部肌肉的血管出血
8. 颅骨骨折时出现“熊猫眼”征, 主要见于 A
A. 前颅窝骨折 B. 中颅窝骨折 C. 后颅窝骨折
D. 凹陷性骨折 E. 线形骨折

[B型题]

- A. 蛛网膜下腔出血 B. 脑内深部出血 C. 脑内浅部出血
D. 脑室内出血 E. 亚急性硬膜下血肿
9. 血肿位于白质, 而皮质无明显病灶, 多见于老年人, 少数可液化成囊肿 B
10. 可由脉络丛损伤所致, 有颅内压增高、高热及昏迷 D
A. 最轻型颅脑损伤 B. 轻型颅脑损伤 C. 中型颅脑损伤
D. 重型颅脑损伤 E. 特重型颅脑损伤
11. 格拉斯哥昏迷评分13—15分, 伤后意识障碍在20分钟以内 B
12. 格拉斯哥昏迷评分3—8分, 伤后昏迷或再次昏迷在6小时以上 D
13. 格拉斯哥昏迷评分9—12分, 伤后意识障碍20分钟至6小时 C

[C型题]

- A. 脑震荡 B. 脑挫裂伤 C. 两者均有 D. 两者均无
14. 伤后立即发生意识障碍 C
15. 伤后脑部无肉眼可见的病理变化, 不能回忆受伤当时以及前一段时间的情况 A
16. 伤后脑部可出现出血点, 可有呼吸、脉搏。血压和体温的波动 B
A. 脑的加速性损伤 B. 脑的减速性损伤
C. 两者均有 D. 两者均无
17. 头部两侧同时被硬物所挤压 D
18. 运动中的头撞到静止的物体 B
19. 硬物撞击于静止的头部 A

- A. 颅前窝骨折 B. 颅中窝骨折 C. 两者均有 D. 两者均无
20. 常累及眶顶和筛骨 A
3. 造成脑脊液耳漏 B
4. 造成脑脊液鼻漏 C
23. 伤后1—2日出现乳突部皮下瘀血斑(Battle征) D

第二十一章 颅内和椎管内肿瘤

[A型题]

1. 治疗颅内肿瘤的首选方法为 C
- A. 免疫治疗 B. 放射治疗 C. 手术切除
- D. 化学治疗 E. 脱水治疗
2. 诊断颅内动脉瘤主要的放射学检查方法有 D
- A. X线平片 B. 头部CT C. 脑核磁共振
- D. 全脑血管造影 E. 脑PET

[B型题]

- A. 星形细胞瘤 B. 少突胶质瘤 C. 髓母细胞瘤
- D. 多形性胶质母细胞瘤 E. 室管膜瘤
3. 多发生在小脑蚓部，对放射治疗极为敏感的是 C
4. 胶质瘤中最常见，生长缓慢，恶性程度较低的是 A
5. 胶质瘤中恶性程度最高的肿瘤，易发生肿瘤中心多处出血坏死的是 D
6. 肿瘤生长较慢，瘤内常有钙化斑块的是 B

[C型题]

- A. 蛛网膜下腔出血 B. 肢体抽搐
- C. 两者均有 D. 两者均无
7. 颅内动脉瘤可表现为 A
8. 颅内动静脉畸形表现为 C
9. 脑顶叶胶质瘤可表现为 B

第二十四章 颈部疾病

[A型题]

1. 年轻人的弥漫性单纯性甲状腺肿，如无症状，其治疗首先考虑 C
- A. 甲状腺次全切除术 B. 多食含碘的海带、紫菜
- C. 小量甲状腺素 D. I131治疗
- E. 无需治疗
2. 甲状腺结节手术治疗方法，正确的是 B
- A. 单个囊肿需甲状腺大部切除
- B. 实质性结节可行患侧腺体大部切除
- C. 实质性结节只需作结节完整切除
- D. 术中冰冻切片报告为良性腺瘤，肯定不是腺癌
- E. 小儿单发结节不必早日手术
3. 突然发现甲状腺单个结节、胀痛，并迅速增大，既往未注意有无结节，应首先考虑诊断为 E
- A. 甲状腺腺癌 B. 甲状腺腺瘤 C. 结节性甲状腺肿
- D. 甲状腺炎 E. 甲状腺囊性腺瘤囊内出血
4. 下列哪项是正确的？ C
- A. 早期妊娠的甲亢病人不宜作甲状腺大部切除术
- B. 甲亢病人的手术禁忌证是结节性甲状腺肿继发甲亢
- C. 青少年原发性甲亢应行非手术治疗
- D. 甲亢术前用碘准备应每日3次，首日每次6滴，逐日每次增加1滴至每次30滴时维持此剂量

- E. 嗜睡是甲亢的临床表现之一
5. 甲亢病人脉压增大的主要原因是 B
- A. 精神紧张 B. 收缩压升高 C. 舒张压降低
D. 心率增快 E. 周围血管阻力增高
5. 基础代谢率的常用公式是 B
- A. 基础代谢率: 脉率 \times 脉压-111 B. 基础代谢率=(脉率+脉压)-111
C. 基础代谢率=(脉率-脉压)-111 D. 基础代谢率=111-(脉率+脉压)
E. 基础代谢率三(脉率-脉压)-111
7. 下列哪项描述是错误的 D
- A. 甲亢术前检查包括颈部透视或摄片、心脏检查、声带功能检查、基础代谢率检查
B. 甲亢症状基本控制是指: 情绪稳定, 睡眠好转, 体重增加, 脉率稳定在每分钟90次以下, 基础代谢率+20%以下
C. 甲亢术前用药方法有复方碘、硫氧嘧啶类药物加复方碘、复方碘加心得安、心得安单用
D. 甲亢术前服碘的机理是能减少甲状腺素的合成
E. 甲状腺术最危急的并发症是呼吸困难和窒息
8. 不要给不准备手术的甲亢病人服用碘剂, 主要因为 A
- A. 一旦停药, 甲亢症状重现, 甚至更严重
B. 碘剂对减轻甲亢症状的疗效不显著
C. 碘剂不能降低甲亢病人的基础代谢率
D. 碘剂效果不如心得安
E. 病人经常不能耐受碘剂治疗
9. 甲亢病人术前碘准备, 哪项是错误的? B
- A. 抑制蛋白水解酶, 减少甲状腺球蛋白的分解
B. 孕抑制甲状腺素的合成
C. 停药碘剂后, 甲状腺滤泡内的甲状腺素释放
D. 不准备手术治疗者, 不宜服碘
E. 碘剂能减少甲状腺的血流量
10. 甲亢病人, 下述哪种情况为手术禁忌证? D
- A. 高功能腺瘤的青少年患者 B. 妊娠早期轻度原发性甲亢
C. 结节性甲状腺肿继发甲亢 D. 青少年, 基础代谢率+30%
E. 甲状腺上极可闻及血管杂音
11. 下列中哪项不宜施行甲状腺大部切除术? C
- A. 妊娠早期甲亢 B. 甲亢有气管压迫症状 C. 青少年甲亢
D. 继发性甲亢 E. 中度原发性甲亢并发心律失常
12. 关于甲状腺结节的叙述, 哪项是不正确的? E
- A. 儿童时期出现甲状腺结节, 50%是恶性的
B. 多发结节多为良性病变
C. 甲状腺癌均为冷结节
D. 热结节为高功能腺瘤
E. 结节摘除术适用于实质性结节
13. 关于原发性甲亢, 下列哪项正确? D
- A. 原发性甲亢较继发性甲亢少见 B. 发病年龄多在60岁以上
C. 原发性甲亢指在甲状腺肿大以后, 再出现甲亢症状
D. 又称突眼性甲状腺肿
E. 容易发生心肌损害
14. 中度甲亢的标准是指基础代谢率在 E
- A. +10%~+20% B. +20%~+30% C. +30%~+40%
D. +60%~+70% E. +30%~+60%
15. 在甲状腺大部切除术后的并发症中, 下列哪项是错误的? B
- A. 手足抽搐 B. 膈肌麻痹 C. 阻塞性呼吸困难
D. 声音嘶 E. 误咽

16. 结扎、切断甲状腺上动静脉时应注意 D
A. 充分显露腺体
B. 紧贴甲状腺被膜，以避免损伤喉返神经
C. 紧贴甲状腺中静脉上方，以免损伤喉上神经
D. 紧贴甲状腺上极，以免损伤喉上神经
E. 紧贴甲状腺上极，以避免损伤喉返神经
17. 下述哪项是错误的 D
A. 单个热结节常提示为高功能腺瘤 B. 甲状腺瘤可表现为温结节
C. 甲状腺癌均为冷结节 D. 凡冷结节均提示为甲状腺癌
E. 甲状腺瘤可表现为冷结节
18. 甲状腺大部切除术后，立即发生声音嘶哑，说明 D
A. 碘迟缓反应 B. 甲状腺危象先兆 C. 喉上神经内支损伤
D. 喉返神经损伤 E. 血钙突然下降
19. 甲状腺大部切除术后并发手足抽搐，预防关键在于 C
A. 术前充分准备
B. 术前服碘剂使症状控制后再手术
C. 切除甲状腺腺体时，尽量保留腺体背面部分的完整
D. 尽量保留甲状腺上下动脉与食管气道动脉的吻合支
E. 结扎甲状腺上下动脉时应尽量远离腺体
20. 关于甲状腺危象的处理，哪项是错误的？ D
A. 紧急时用10%碘化钠5~10ml静滴
B. 氢化可的松静滴
C. 应用镇静剂
D. 常规使用西地兰0.4mg静推
E. 吸氧、降温
21. 甲状腺大部切除术后发生甲状腺危象的原因有 E
A. 切除不足 B. 出血过多 C. 气管受压
D. 喉返神经损伤 E. 术前甲亢症状未完全控制
22. 临床上出现腹泻、心悸、脸面潮红和血钙降低等症状的甲状腺癌，可能是 D
A. 乳头状腺癌 B. 滤泡状腺癌 C. 未分化癌
D. 髓样癌 E. 结节性甲状腺肿恶变
23. 下述各甲状腺癌，哪一病理类型的预后最差？ C
A. 乳头状腺癌 B. 滤泡状腺癌 C. 未分化癌
D. 髓样癌 E. 甲状腺瘤恶变
24. 甲状腺癌最主要的临床表现是 C
A. 同位素扫描为冷结节
B. 结节突然增大
C. 结节质硬、固定或合并压迫症状
D. 甲状腺功能减退
E. 疼痛
25. 右侧甲状腺乳头状腺癌伴右颈淋巴结转移，治疗方案应是 C
A. 全甲状腺切除
B. 右侧腺叶加峡部切除
C. 右侧甲状腺腺体加峡部切除，左侧甲状腺大部切除，病侧淋巴结清除术
D. 放射治疗
E. 抗癌药物及甲状腺素治疗
26. 确诊甲状腺单个结节为恶性的主要依据是 E
A. 病程短 B. 单个结节、质硬 C. 同位素扫描为冷结节
D. 同侧摸到肿大淋巴结 E. 活体组织检查
27. 结节性甲状腺肿的手术适应证，下列哪项是错误的？ D
A. 有压迫症状 B. 伴有甲亢 C. 疑有癌变
D. 病史较长者 E. 胸骨后甲状腺肿

28. 巨大结节性甲状腺肿，行大部切除术，气管内插管麻醉6小时，当晚病人呼吸困难，烦躁不安，紫绀，P 130次／分，BPI70／100mmHg，伤口渗血不多，颈部不肿大，可能是 D

- A. 甲状腺危象 B. 双侧喉返神经损伤 C. 伤口内出血压迫气管
D. 喉头水肿 E. 气管塌陷

29. 女性，21岁，因原发性甲亢在颈丛麻醉下行甲状腺大部切除术，术后12小时病人颈前有压迫感，呼吸困难，紫绀，切口敷料呈红色，颈部肿胀，应立即 D

- A. 给氧 B. 松解敷料 C. 气管内插管加压给氧
D. 剪断缝线，敞开切口，清除血肿 E. 气管切开

30. 男性，65岁，颈右前扪及一肿块已8个月，逐渐增大，近2周来出现声嘶，肿块约4cm×5cm，表面欠光滑，吞咽时活动度小，无压痛，同侧颈部可摸到1.5cm×1.5cm质硬的淋巴结，首先考虑为 D

- A. 颈部淋巴结核 B. 颈部何杰金氏病 C. 结节性甲状腺肿
D. 甲状腺癌伴淋巴结转移 E. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎

[B型题]

- A. 甲基硫氧嘧啶 B. 心得安 C. 卢戈氏液
D. 甲状腺素 E. 安定及强的松

6. 使甲状腺肿大和动脉性充血的是 A

32. 减少甲状腺肿大和动脉性充血的是 C

33. 常规应用碘、抗甲状腺药物不能耐受或无作用时，术前准备可用 B

- A. 硫氧嘧啶类药物 B. ¹³¹碘 C. 甲状腺干制剂
D. 甲状腺大部切除术 E. 含碘食物

34. 青少年或症状较轻的甲亢患者可用 A

35. 20岁以前的病人，甲状腺呈弥漫性单纯性肿大可用 C

36. 双侧有3.5cm×3cm甲状腺瘤可用 D

第二十五章 乳房疾病

[A型题]

1. 急性乳腺炎最常见于 B

- A. 妊娠期妇女 B. 产后哺乳期妇女 C. 乳头凹陷妇女
D. 以上都是 E. 以上都不是

2. 乳腺癌常常发生于乳腺的哪个部位？ A

- A. 乳腺外上象限 B. 乳腺内上侧 C. 乳腺外下象限
D. 乳腺尾叶 E. 乳腺内下象限

3. 以下哪一种药物属于乳腺癌化疗常用的CMF方案？ A

- A. 氟尿嘧啶 B. 顺铂 C. 阿霉素
D. 丝裂霉素 E. 羟基喜树碱

4. ER阳性的乳腺癌患者可以选用哪种药物行针对性治疗？ C

- A. 维甲酸 B. 三尖极酯碱 C. 三苯氧胺
D. 四氢叶酸钙 E. 雌二醇

5. Pagets病是 D

- A. 导管内癌 B. 髓样癌 C. 大汗腺样癌
D. 乳头湿疹样乳腺癌 E. 炎性乳癌

6. 下列哪种乳腺疾病不会出现乳头内陷 D

- A. 乳腺浸润性导管癌 B. 乳腺结核 C. 乳腺浸润性小叶癌
D. 乳腺囊性增生 E. 髓样癌

[B型题]

- A. 轮辐状切口 B. 乳房上弧形切口 C. 乳房下弧形切口
D. 乳晕边缘弧形切口 E. 乳晕区弧形切口

2. 乳房脓肿应作 A

3. 深部脓肿或乳房后脓肿应作 C
9. 乳晕下脓肿应作 D
A. 非浸润性癌 B. 早期浸润性癌 C. 浸润性特殊癌
D. 浸润性非特殊癌
10. 鳞状细胞癌 C
11. 导管内癌 A
12. 浸润性导管癌 D
4. 硬癌 D

第二十六章 胸部损伤

[A型题]

1. 根据胸部创伤分类, 下列属于开放性损伤的是 A
A. 胸部皮肤有伤口, 肺压缩40% B. 气胸伴皮下气肿
C. 肋骨骨折并气胸 D. 肋骨骨折并血胸
E. 心包填塞
2. 下列哪些检查对诊断肋骨骨折最有意义? B
A. 受伤史 B. X线检查 C. 血气分析
D. 局部压痛 E. 合并皮下气肿
3. 肋骨骨折最重要的治疗原则是 E
A. 骨折复位 B. 骨折固定 C. 功能锻炼
D. 促进骨折愈合 E. 预防及治疗并发症
4. 胸部创伤后行X线检查, 下列哪项意义不大? D
A. 判断有无肋骨骨折 B. 判断有无气胸 C. 判断有无血胸
D. 判断有无肋软骨骨折 E. 判断有无合并症
5. 胸部创伤时, 下列哪项X线平片上不能显示? D
A. 气胸 B. 血胸 C. 纵隔及皮下气肿
D. 肋软骨骨折 E. 肺挫伤
6. 创伤性气胸, 胸腔闭式引流管的位置通常应在 B
A. 腋前线第2肋间 B. 锁骨中线第2肋间 C. 腋后线第6肋间
D. 腋前线第6肋间 E. 腋中线第6肋间
7. 胸部创伤后, 血胸不凝固的原因是 B
A. 弥散性血管内凝血
B. 心、肺和膈肌活动的去纤维蛋白的作用
C. 凝血酶原减少
D. 血小板消耗减少
E. 多种凝血因子的减少
8. 多根多处肋骨骨折导致呼吸衰竭的主要原因是 B
A. 剧痛不敢呼吸 B. 反常呼吸运动 C. 肺不张
D. 纵隔摆动 E. 继发肺部感染
9. 某患者左前胸部被刀刺伤2小时后, 感胸闷气短, 查体: 面色苍白, 四肢湿冷, 心率120次/分, 血压80/70mmHg, 颈静脉怒张。首先考虑 E
A. 胸内大出血 B. 血气胸 C. 开放性气胸
D. 肺裂伤 E. 急性心包填塞

[B型题]

- A. 连枷胸(多根多处肋骨骨折) B. 闭合性气胸
C. 开放性气胸 D. 张力性气胸 E. 创伤性气胸
10. 伤侧肺受压, 纵隔向健侧移位, 大血管扭曲提示为 D
11. 伤侧受压、钟摆呼吸、纵隔扑动、回心血量减少为 C
12. 反常呼吸运动、纵隔扑动、回心血量减少为 A
13. 健肺受压、血容量减少、休克提示为 E
A. 胸膜腔穿刺 B. 胸腔闭式引流 C. 加压包扎固定

- D. 开胸手术加内固定 E. 呼吸机辅助呼吸
14. 胸部撞伤, 呼吸困难, 胸片示右3~7肋骨多处骨折, 右胸壁可见反常呼吸运动, 则行 C
15. 胸部挤压伤, 呼吸困难, 伴休克, 胸片示左5~9肋骨多处骨折, 大量胸腔积液, 胸腔闭式引流出不凝血150ml, 则行 D
7. 右胸壁撞伤伴伤处疼痛, 轻度呼吸困难, 胸片示右第7、8后肋骨折, 肋膈角变钝, 则行 A

第二十九章 肺部疾病

[A型题]

1. 肺癌发病率已居男性各种肿瘤的 A
- A. 第一位 B. 第二位 C. 第三位
- D. 第四位 E. 第五位
2. 肺癌病人多数是男性, 男女之比是 A
- A. 3~5:1 B. 1~2:1 C. 4~5:1
- D. 4~7:1 E. 3~4:1
3. 肺癌好发部位为 E
- A. 左上肺 B. 右中肺 C. 右下肺
- D. 左下肺 E. 右上肺
4. 肺癌较早发生转移为 C
- A. 鳞癌 B. 腺癌 C. 未分化小细胞癌
- D. 大细胞癌 E. 细支气管肺泡癌
5. 在下列肺癌类型中哪一种最为常见 B
- A. 腺癌 B. 鳞癌 C. 大细胞癌
- D. 细支气管肺泡癌 E. 小细胞癌
6. 在下列肺癌类型中, 女性较男性多见的是 B
- A. 鳞癌 B. 腺癌 C. 大细胞癌
- D. 小细胞癌 E. 细支气管肺泡癌
7. 在下列肺癌类型中, 男性较女性多见的是 A
- A. 鳞癌 B. 腺癌 C. 小细胞癌
- D. 大细胞癌 E. 细支气管肺泡癌
8. 在肺癌类型中哪一种预后较好 D
- A. 腺癌 B. 小细胞癌 C. 大细胞癌
- D. 鳞癌 E. 细支气管肺泡癌
9. 在下列肺癌类型中, 哪一种类型不起源于支气管粘膜 E
- A. 鳞癌 B. 腺癌 C. 小细胞癌
- D. 大细胞癌 E. 细支气管肺泡癌
10. 下列哪一项不是肺癌的早期症状 C
- A. 刺激性干咳 B. 痰中带血 C. 胸腔积液
- D. 阵发性干咳 E. 少量咯血
11. 早期肺癌首选的治疗方法是 A
- A. 手术切除 B. 放射 C. 化学治疗
- D. 免疫 E. 中药

[B型题]

- A. 反复发作的肺部感染, 咳脓痰 B. 声带麻痹、膈肌麻痹
- C. 颈交感综合征 D. 咳嗽、痰中带血
- E. Cushing综合征
12. 肺癌晚期易出现的症状是 B
13. 支气管扩张的常见症状是 A
14. 肺癌的常见症状是 D
15. Pancoast肿瘤可有 C

第三十章 食管疾病

[A型题]

1. 典型食管癌的临床表现是 E
A. 声音嘶哑 B. 锁骨上窝淋巴结肿大 C. 恶病质
D. 持续性下咽哽噎感 E. 进行性吞咽困难
2. 下列不符合食管癌的是 E
A. 进行性吞咽困难 B. 持续性下咽哽噎感 C. 老年人多
D. 男多于女 E. 下段多于中段
3. 不符合食管癌瘢痕性狭窄的叙述是 D
A. 下咽困难 B. 钡餐X线检查示食管壁上有充盈缺损
C. 有误服腐蚀剂史 D. 男多于女 E. 营养不良
4. 食管憩室最主要的诊断依据是 E
A. 吞咽困难 B. 吞咽疼痛 C. 呼吸异味
D. 食管内压力升高 E. 钡餐X线见到膨出影袋
5. 食管癌病人有持续性胸背痛，多表示 B
A. 癌肿部有炎症 B. 癌肿已侵犯食管外组织 C. 有远处血行转移
D. 癌肿 E. 食管气管瘘
6. 晚期食管癌的一般X线表现是 B
A. 食管粘膜呈串珠样改变，食管蠕动尚好
B. 食管出现充盈缺损，管腔狭窄梗阻
C. 食管下端呈光滑的鸟嘴样狭窄
D. 食管呈不规则线样狭窄
E. 食管移位，狭窄，粘膜正常

[B型题]

- A. 发生在主动脉弓缘之上的食管恶性肿瘤
- B. 发生在颈段食管的恶性肿瘤
- C. 发生在肺下静脉之下的食管恶性肿瘤
- D. 发生在腹段食管的恶性肿瘤
- E. 发生在胃入口处的恶性肿瘤
7. 下段食管癌是 C
8. 上段食管癌是 A
9. 贲门癌是 E
- A. 腐蚀性食管灼伤 B. 早期食管癌 C. 食管良性肿瘤
D. 食管静脉曲张 E. 贲门失弛症
10. X线表现有局限性粘膜皱襞增粗和断裂 B
11. X线检查示食管下段呈光滑的鸟嘴样狭窄 E
A. benign tumor of esophagus
B. cardia achalasia
C. esophageal carcinoma
D. benign esophagostenosis
E. esophageal diverticulum
12. 男性，68岁，长期进食过硬过热，且进食过快，近3个月来，进行型吞咽困难，消瘦乏力，食管钡餐X线造影示：食管下段充盈缺损，管腔狭窄，局部粘膜断裂。该患者诊断应是 C
13. 男性，25岁，消瘦，胸骨后不适，吞咽困难时轻时重，有时呕吐，食管钡餐X线造影可见食管扩大，并有液平，下端呈鸟嘴状 B
14. 上述食管疾病中，哪一种必须是手术治疗，并可辅以放射治疗的疾病? C

第三十一章 原发性纵隔肿瘤

[A型题]

1. 发生在纵隔的畸胎瘤多位于 C
A. 后纵隔 B. 中纵隔 C. 前纵隔
D. 中后纵隔 E. 纵隔各部均可发生
2. 胸腺瘤好发于 D
A. 前下纵隔 B. 中纵隔 C. 后纵隔
D. 前上纵隔 E. 纵隔各部均可发生
3. 胸腺瘤病人合并重症肌无力占的百分比是 B
A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% E. 30%
4. 下列哪种肿瘤常位于后纵隔 A
A. 神经源性肿瘤 B. 畸胎瘤 C. 皮样囊肿
D. 胸腺瘤 E. 纵隔内甲状腺肿
5. 重症肌无力患者中有胸腺瘤或胸腺增生的占 E
A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% E. 50%
6. 关于原发性纵隔肿瘤诊疗问题, 哪项为正确 B
A. 恶性淋巴瘤, 不适用于放射
B. 绝大多数需要手术
C. 多数无症状良性肿瘤不必治疗
D. 恶性肿瘤已有远处转移, 不宜手术
E. 恶性肿瘤范围广泛, 可给予放疗

[B型题]

- A. 胸腺瘤 B. 畸胎瘤 C. 淋巴肉瘤
D. 纵隔囊肿 E. 神经源性肿瘤
7. 破入肺内和含有毛发的是 B
8. 首选放射治疗的是 C
9. 良性不恶变的是 D
10. 可并有重症肌无力的是 A
11. 压迫脊髓可引起瘫痪的是 E
A. 胸腺瘤 B. 皮样囊肿 C. 神经源性肿瘤
D. 淋巴瘤 E. 甲状腺肿
12. 前纵隔 A
13. 后纵隔 C
14. 中纵隔 D
15. 前上纵隔 E
16. 内脏器官纵隔 D

第三十二章 心脏疾病

[A型题]

1. 二尖瓣开瓣音见于 B
A. 二尖瓣关闭不全 B. 二尖瓣狭窄 C. 主动脉瓣狭窄
D. 主动脉瓣关闭不全 E. 法洛四联症
2. 关于体外循环后的生理变化, 以下哪项不对? C
A. 代谢改变 B. 电解质失衡 C. 红细胞增多
D. 肾功能减退 E. 血液稀释
3. 建立体外循环前必须注射 B
A. 鱼精蛋白 B. 肝素 C. 华法令
D. 枸橼酸钠 E. 维生素K1
4. 体外循环没有哪项作用? D
A. 泵血 B. 气体交换 C. 降低和升高血液温度
D. 酸碱平衡 E. 超滤

5. 继发孔缺损合并二尖瓣脱垂是 B
A. 左室扩大 B. 室间隔左移 D. 二尖瓣环扩大
D. 乳头肌断裂 E. 室间隔右移
6. 二尖瓣狭窄最常见的症状是 A
A. 气促 B. 咯血 C. 心绞痛 D. 晕厥 E. 乏力

[B型题]

- A. 心尖部隆隆样舒张期杂音
B. 胸骨左缘第3、4肋间连续性杂音
C. 胸骨左缘第2肋间连续性杂音
D. 胸骨左缘第2肋间收缩期杂音及固定性P2分裂
E. 主动脉瓣区双期杂音
7. 法氏窦瘤破裂的典型心脏杂音是 B
8. 房间隔缺损的听诊特点是 D
9. 典型的二尖瓣狭窄的杂音是 A
10. 典型的动脉导管未闭的杂音是 C
A. 主动脉瓣狭窄 B. 缩窄性心包炎, C. 二尖瓣狭窄
D. 左房粘液瘤 E. 冠心病
9. 颈静脉怒张、肝大、腹水、心音遥远见于 B
12. 晕厥、呼吸困难、心绞痛见于 A
13. 症状和体征随着体位变动而改变见于 D
14. 心尖区第一心音亢进, 胸骨左缘3、4肋间听到二尖瓣开瓣音, 心尖区舒张中期隆隆样杂音是——的听诊特点 C

第三十三章 胸主动脉瘤

[A型题]

1. Horner综合征是由于胸主动脉瘤压迫而产生 D
A. 膈神经 B. 脊神经 C. 喉返神经
D. 交感神经 E. 迷走神经
2. 下列检查中不常用于胸主动脉瘤诊断的是 D
A. CT B. MRI C. 主动脉造影
D. ECT E. X线检查
3. 对于升主动脉瘤合并主动脉瓣关闭不全的病人, 应行 C
A. 升主动脉瘤切除术 B. 人工血管重建术 C. Bentall手术
D. 主动脉瘤壁切除加补片修补术 E. 介入治疗带膜的金属支架
4. 下列哪一项不是胸主动脉瘤产生的压迫症状? C
A. 刺激性咳嗽 B. 声音嘶 C. 主动脉瓣关闭不全
D. 上腔静脉综合征 E. 膈肌麻痹
5. 下列哪项不是胸主动脉瘤的常见病因? E
A. 动脉硬化 B. 主动脉中层囊性坏死 C. 创伤性
D. 梅毒 E. 高血压

第三十四章 腹外疝

[A型题]

1. 腹外疝最重要的发病原因是 D
A. 慢性咳嗽 D. 长期便秘 C. 排尿困难
D. 腹壁有薄弱点或腹壁缺损 E. 经常从事导致腹内压力增高的工作
2. 腹股沟斜疝, 疝内容物最多见的是 E
A. 盲肠 B. 阑尾 C. 大网膜 D. 膀胱 E. 小肠
3. 腹外疝的疝环位置相当于疝囊的 D
A. 底部 B. 体部 C. 颈体交界部 D. 颈部 E. 以上都不对
4. 左侧腹股沟滑动性疝, 下列哪项是正确的? C

- A. 属可复性疝 B. 疝内容物没有小肠 C. 乙状结肠是疝囊的一部分
D. 最易嵌顿 E. 疝块很小
5. 疝囊内容物只能部分回纳入腹腔，肠壁无血循环障碍的腹外疝是 B
A. 易复性疝 B. 难复性疝 C. 可复性疝
D. 嵌顿性疝 E. 绞窄性疝
6. 发生嵌顿最重要的原因是 B
A. 疝内容物大，疝囊小 B. 疝环小，腹压剧增
C. 疝内容物与疝囊粘连 D. 疝囊颈部水肿
E. 疝内容物弹性差
7. 腹外疝嵌顿是指 C
A. 所有不能回纳的腹外疝
B. 内容物与疝囊粘连的腹外疝
C. 疝囊颈弹性收缩将内容物卡住的腹外疝
D. 肠管成为疝囊一部分的腹外疝
E. 以上都不是
7. 关于腹股沟疝，下列哪项是错误的？ C
A. 斜疝多见于儿童及青壮年 B. 直疝疝囊在精索后内方
C. 直疝疝囊颈在腹壁下动脉外侧 D. 腹股沟管下壁为腹股沟韧带
E. 斜疝嵌顿机会较多
9. 最常见的腹外疝是 C
A. 股疝 B. 腹壁切口疝 C. 腹股沟斜疝
D. 脐疝 E. 腹股沟直疝
10. 腹股沟斜疝的疝囊位于精索的 C
A. 内侧 B. 外侧 C. 前方 D. 后方 E. 下方
11. 腹股沟管行走的方向是 D
A. 向外、上、浅 B. 向内、上、浅 C. 向外、下、浅
D. 向内、下、浅 E. 以上都不对
8. 腹股沟管的内环位于 D
A. 陷窝韧带外侧 B. 股静脉内侧 C. 腹壁下动脉内侧
D. 腹壁下动脉外侧 E. 以上都不对
9. 形成腹股沟管外环的是 D
A. 联合肌腱 B. 腹横肌 C. 腹内斜肌
D. 腹外斜肌腱 E. 皮下浅筋膜
10. 腹股沟管解剖结构中，下列哪项是错误的？ D
A. 内口为内环，外口为皮下环
B. 上壁为腹内斜肌和腹横肌的弓状下缘
C. 下壁为腹股沟韧带和腔隙韧带
D. 前壁为腹横肌
E. 后壁为腹横筋膜和腹膜
15. 先天性腹股沟斜疝是哪种解剖因素所致？ A
A. 腹膜鞘突上端未闭
B. 腹膜鞘突中端未闭
C. 腹膜鞘突下端未闭
D. 未闭的腹膜鞘突只是一条非常细小的管道
E. 腹膜鞘突未下降到阴囊
16. 腹股沟斜疝和直疝的区别，下列哪项是正确的？ B
A. 斜疝与腹横筋膜薄弱有关，直疝与腹内斜肌薄弱有关
B. 斜疝自内环处发生，沿精索发展；直疝则由海氏三角处发生，不沿精索发展
C. 斜疝位于腹壁下动脉内侧；直疝则位于外侧
D. 斜疝疝囊在精索后方；直疝在前方
E. 斜疝的内环在陷窝韧带内侧；直疝在外侧

17. 关于直疝三角，下列哪项是错误的？ E
- A. 直疝三角在腹股沟管下端内侧后方 B. 腹股沟韧带是其底边
- C. 腹直肌外缘是其内侧边 D. 腹壁下动脉是其外侧边
- E. 腹横筋膜发育正常
11. 直疝三角的三边是 D
- A. 腹壁下动脉、联合肌腱和腹股沟韧带
- B. 联合肌腱、腹股沟韧带和腹直肌外缘
- C. 联合肌腱、腹股沟韧带
- D. 腹壁下动脉，腹直肌外缘和腹股沟韧带
- E. 腹壁下动脉、腹直肌外缘和耻骨梳韧带
12. 后天性腹股沟斜疝好发于儿童及青壮年是因为下列何组织发育不全 C
- A. 腹外斜肌腱膜 B. 腹横筋膜 C. 腹内斜肌及腹横肌
- D. 腹外斜肌和腹横筋膜 E. 腹股沟韧带
13. 关于斜疝，哪项是错误的？ C
- A. 多见于儿童和青少年 B. 后天性较先天性多
- B. 左侧较右侧多 D. 能否进入阴囊不是与直疝区别的要点
- E. 婴幼儿斜疝手术治疗时，一般不需行修补术
21. 嵌顿性疝与绞窄性疝的鉴别要点是 E
- A. 疝块不能回纳 B. 疝块是否有压痛 C. 绞窄疝出现呕吐
- D. 绞窄疝出现休克 E. 绞窄疝内容发生血循环障碍
22. 切口疝发病因素中最重要的是 C
- A. 缝合技术欠妥 B. 术后腹胀剧咳 C. 切口感染
- D. 留置引流物过久 E. 切口过长
23. 斜疝和直疝最重要的鉴别点是 D
- A. 斜疝呈椭圆形或梨形
- B. 斜疝肿块常坠入阴囊
- C. 斜疝多见于儿童和青少年
- D. 回纳疝块后压住内环，疝块不再突出者为斜疝
- E. 以手指插入皮下环，令病人咳嗽后有冲击感者为斜疝
24. 手术中诊断腹股沟斜疝的主要依据是 D
- A. 疝环在腹壁下动脉内侧 B. 疝环在直疝三角内
- C. 疝囊颈在耻骨结节下方 D. 疝囊颈在腹壁下动脉外侧
- E. 疝囊在腹股沟内
14. 最容易发生嵌顿的腹外疝是 D
- A. 切口疝 B. 难复性疝 C. 滑动性疝
- D. 股疝 E. 直疝
26. 有关绞窄性疝，下列哪项是错误的？ B
- A. 疝囊内渗液转为血性 B. 被卡住的肠管呈深红色
- C. 伴有急性机械性肠梗阻 D. 引起疝外被盖组织蜂窝组织炎
- E. 自行穿破引起粪瘘
- [B型题]
- A. 腹内斜肌、腹横肌的弓状下缘 B. 腹股沟韧带和腔隙韧带
- C. 腹外斜肌腱膜 D. 腹膜、腹横筋膜和联合肌腱
- E. 腹内斜肌和联合肌腱
27. 构成腹股沟管的前壁 C
28. 构成腹股沟管的后壁 D
29. 构成腹股沟管的上壁 A
30. 构成腹股沟管的下壁 B
- A. 腹股沟管的外环 B. 腹股沟管的后壁 C. 腹股沟管的上壁
- D. 腹股沟管的下壁 E. 腹股沟管的内环
15. 腹横筋膜的卵圆形裂隙是 E
32. 腹膜和腹横筋膜是 B

33. 腹外斜肌腱膜的三角形裂隙是 A
34. 腹内斜肌、腹横肌弓状下缘是 C
A. 腹壁浅动脉外侧，腹股沟韧带上方
B. 腹壁浅动脉内侧，腹股沟韧带上方
C. 腔隙韧带外侧，腹股沟韧带上方
D. 腹壁下动脉外侧，腹股沟韧带上方
E. 腹壁下动脉内侧，腹股沟韧带上方
35. 腹股沟斜疝的疝囊颈位于 D
36. 腹股沟直疝的疝囊颈位于 E
37. 股疝的疝囊颈位于 C
A. Ferguson法 B. Bassini法 C. Mc Vay法
D. 疝成形术 E. 保守疗法
38. 巨大斜疝，腹股沟管后壁严重缺损 D
39. 老年直疝 C
40. 青壮年疝 B
41. 复发疝 C

第三十五章 腹部损伤

[A型题]

1. 腹部损伤的关键问题首先是要明确 B
A. 有无水电解质平衡失调
B. 有无腹内脏器损伤
C. 腹壁损伤的程度
D. 后腹膜有无血肿
E. 是什么性质的脏器受到损伤和是否为多发性损伤
2. 腹部损伤时最易受损伤的脏器是 D
A. 胃 B. 肾 C. 肝 D. 脾 E. 小肠
3. 哪种脏器损伤后，其内容物对腹膜的刺激性小，因此腹膜刺激征可能较轻？ A
A. 结肠损伤 B. 小肠损伤 C. 十二指肠损伤
D. 胃损伤 E. 胆管损伤
4. 诊断外伤性脾破裂，下列哪项最主要？ D
A. 右上腹外伤史
B. 早期即出现休克
C. 左上腹压痛，反跳痛，肌紧张
D. 诊断性腹腔穿刺，抽出不凝固的血
E. 脾脏有慢性病理改变
5. 腹部损伤，X片显示腹膜后积气，可能为 C
A. 肾脏损伤 B. 十二指肠球部损伤
C. 十二指肠水平部损伤 D. 胰腺损伤
E. 结肠损伤
6. 关于脾破裂，下列哪项是不正确的？ D
A. 通常采用脾切除术
B. 小裂口可行脾缝合修补术
C. 临床上往往出现休克表现
D. 等失血性休克好转后才能手术
E. 有慢性病理改变的脾脏更易损伤

[B型题]

- A. 失血性休克 B. 腹腔出现游离气体
D. 出现腹膜炎体征 D. 腹膜后积气
E. 腹膜炎出现晚而严重
7. 脾破裂 A

8. 十二指肠水平部破裂 D
9. 结肠破裂 E

第三十六章 急性化脓性腹膜炎

[A型题]

1. 继发性腹膜炎不包括下列哪一项? B
A. 可发生于腹腔内急性炎症
B. 可发生于肝硬化腹水
C. 可发生于腹腔内脏器穿孔
D. 可发生于手术的污染
E. 可发生于腹腔开放性损伤
2. 腹膜炎最主要的症状是 A
A. 持续性剧烈腹痛 B. 恶心、呕吐 C. 发热
D. 白细胞数增多 E. 脉搏加快
3. 继发性腹膜炎最常见的病原菌是 D
A. 溶血性链球菌 B. 金黄色葡萄球菌 C. 绿脓杆菌
D. 大肠杆菌 E. 产气杆菌
4. 常用于判断急性化脓性腹膜炎病情发展的重点标志是 B
A. 腹式呼吸运动减弱 B. 腹胀加重 C. 压痛和反跳痛
D. 腹肌紧张 E. 肠鸣音消失
5. 下列腹痛性质与疾病的关系中哪项是错误的? A
A. 间歇性刺痛——胆总管结石
B. 阵发性绞痛——输尿管结石
C. 阵发性钻顶痛——胆道蛔虫病
D. 剧烈刀割样疼痛——胃十二指肠溃疡穿孔
E. 持续性胀痛——实质性脏器炎症
6. 治疗急性继发性弥漫性腹膜炎, 最关键的一条是 E
A. 补液, 纠正水、电解质及酸碱失衡 B. 输血
C. 应用大量有效的抗生素 D. 禁食、胃肠减压
E. 以上都不是
7. 继发性腹膜炎最常见的病因是 B
A. 溃疡病穿孔 B. 阑尾炎穿孔 C. 肠伤寒穿孔
D. 肠结核穿孔 E. 腹部外伤穿孔
8. 男性, 24岁, 急性剧烈腹痛8小时, 诊断为十二指肠溃疡穿孔, 行胃大部切除术, 术后第5天起体温升高, 呈弛张热, 持续4天, 下腹坠胀, 里急后重, 有粘液样稀便, 应考虑为 D
A. 倾倒综合征 B. 消化不良 C. 胃大部切除术后腹泻
D. 盆腔脓肿 E. 肠粘连, 肠功能紊乱
9. 一名50岁体质较差的患者, 十二指肠溃疡穿孔20小时, 入院施行穿孔修补术后6天体温38°C, 腹痛、腹胀, 大便次数增多, 有粘液, 里急后重, 最大可能是 C
A. 急性肠梗阻 B. 假膜性脓肿 C. 盆腔脓肿
D. 细菌性痢疾 E. 并发门静脉炎
10. 女性, 18岁, 因阑尾炎穿孔行阑尾切除术。术后第4天起持续性发热伴寒战、有时呃逆及右上腹痛, 查: 右肺底呼吸音弱, 腹部透视可见右膈活动受限, 肋膈角少量积液, 白细胞 $20 \times 10^9/L$, 最可能的诊断是 D
A. 右下肺炎 B. 右下肺不张 C. 右侧胸膜炎
D. 右膈下脓肿 E. 肝脓肿

[B型题]

- A. 直肠、膀胱刺激症状 B. 发热、呃逆, 肩颈部痛
C. 腹痛、腹胀、腹部压痛并可扪及包块 D. 消化道出血
E. 膈下出现游离气体

11. 肠间脓肿 C
12. 膈下脓肿 B
13. 盆腔脓肿 A
- A. 大肠杆菌 B. 葡萄球菌 C. 溶血性链球菌或肺炎双球菌
- D. 绿脓杆菌 E. 伤寒杆菌
14. 原发性腹膜炎 C
3. 继发性腹膜炎 A

第三十七 胃十二指肠疾病

[A型题]

1. 胃十二指肠溃疡发生形成和发展过程中, 肯定无疑的一点是 D
- A. 饮食不规律 B. 情绪激动 C. 饮入过多酒类等刺激物
- D. 胃酸过多, 激活胃蛋白酶 E. 以上均不是
2. 胃的血供来源, 哪项是错误的? C
- A. 胃腹腔动脉干分出胃左动脉
- B. 肝固有动脉分出胃右动脉
- C. 胰十二指肠上动脉分出胃网膜右动脉
- D. 脾动脉分出胃网膜左动脉
- E. 脾动脉分出胃短动脉
3. 胃穿孔的X线检查所见主要为 B
- A. 双侧横膈抬高 B. 膈下游离气体 C. 腹胀伴肠型 D. 晚间或下午呕吐大量宿食 E. 食量减少
4. 瘢痕性胃幽门梗阻的治疗中, 下列哪项是错误的? E
- A. 术前做好充分准备
- B. 纠正缺水和代谢性碱中毒
- C. 年轻、高胃酸病人应作胃大部切除术
- D. 年老、情况差, 宜作胃空肠吻合术
- E. 取可采用胃迷走神经干切断术
5. 胃溃疡首选的术式是 B
- A. 高选择性胃迷走神经切断术 B. 胃大部切除术(毕I式)
- C. 胃大部切除术(毕II式) D. 胃大部切除术(溃疡旷置)
- E. 胃空肠吻合术
6. 胃与十二指肠病人外科治疗的绝对适应证是 B
- A. 年轻的溃疡病患者 B. 并发瘢痕性幽门梗阻
- C. 并发水肿性幽门梗阻 D. 症状轻的十二指肠球部溃疡 E. 大便隐血阳性
7. 十二指肠溃疡手术适应证中, 下列哪项是错误的? E
- A. 内科治疗无效 B. X线钡餐检查证实龛影较深
- C. 有穿孔史、溃疡呈活动性 D. 反复多次大出血 E. 年龄在45岁以上, 不能排除恶变
8. 胃窦部溃疡首选的术式是 A
- A. 毕I式胃大部切除术 B. 毕II式胃迷走神经切断术
- C. 高选择性胃迷走神经切断术 D. 胃空肠吻合术 E. 全胃切除术
9. 因溃疡作胃大部切除术, 通常认为适当的胃切除容积是 C
- A. $<2/5$ B. $2/5$ C. $2/3$ D. $>3/4$ E. $4/5$
10. 毕II式胃大部切除术吻合近端空肠位置必须高于远端空肠, 是为了避免发生 B
- A. 内疝 B. 食物在胃内淤积
- C. 吻合口远端空肠段梗阻 D. 吻合口近端空肠段梗阻 E. 十二指肠残端破裂
11. 高选择性胃迷走神经切断术的要点是 A
- A. 不切断胃窦部位的迷走神经支 B. 保留迷走神经左主干
- C. 保留迷走神经右主干 D. 保留胃的壁细胞的迷走神经分支 E. 不切断迷走神经的肝胆支
12. 胃大部切除术后3~6天, 十二指肠残端破裂, 治疗除积极纠正水、电解质紊乱和供给营养外, 下列哪项治疗是正确的? E
- A. 手术修补 B. 局部加压包扎 C. 局部填塞 D. 切除破裂, 重新缝合 E. 破裂处置T管负压吸引
13. 倾倒综合征常发生于 C

- A. 迷走神经切断术后 B. 毕Ⅰ式胃大部切除术后
C. 毕Ⅱ式胃大部切除术后 D. 幽门成形术后 E. 高选择性胃迷走神经切断术后
14. 胃癌手术发现下列情况并非根治手术禁忌 E
A. 有腹水 B. 癌肿固定 C. 腹膜广泛转移 D. 癌肿侵犯胰腺 E. 癌肿侵及横结肠
15. 恶性程度较高的胃癌可以超越常规局部淋巴结转移方式；而直接侵犯远处淋巴结，其中最常见为 D
A. 胰脾淋巴结 B. 肝门淋巴结 C. 腹腔淋巴结 D. 左锁骨上淋巴结 E. 直肠上动脉旁淋巴结
16. 胃窦癌根治术中，下列哪项是错误的？ A
A. 全胃切除可以明显提高5年生存率
B. 小弯侧切除应距癌肿边缘6—8cm
C. 大弯侧切除点约在脾门下
D. 胃远侧应切至幽门远侧2~3cm
E. 将大小网膜组织整块切除
17. 女性，60岁，胃穿孔已18小时，全腹压痛，肌紧张，肠鸣音消失，处理为 C
A. 禁食、胃肠减压观察 B. 腹腔引流术
C. 穿孔修补术 D. 胃大部切除术 E. 输液，给予抗菌素，非手术治疗
18. 男性，50岁，钡餐提示胃溃疡已2年，1月来疼痛加重；，6小时前突发上腹部剧痛，扩散至全腹，病人全身情况好，诊断为胃溃疡穿孔，最理想的手术是 C
A. 穿孔修补术 B. 大网膜填塞 C. 胃大部切除术
D. 溃疡楔形切除术 E. 穿孔修补加选择性迷走神经切断术
19. 确诊胃癌的病人，没有幽门梗阻，检查发现左锁骨上淋巴结有转移（病理报告），其治疗选用 A
A. 无手术指征，给予适当的化疗
B. 作姑息性胃空肠吻合术
C. 作根治性胃癌切除加左锁骨上淋巴结清扫术
D. 放射治疗
E. 全胃切除术
20. 男性，50岁，患十二指肠溃疡在内科治疗1个月，3天来呕血、便血不止每日需输1000ml才能维持血压，应 D
A. 继续输血，给予止血剂，待血压稳定后手术
B. 继续输血，静脉滴注甲氧咪胍
C. 观察2~3日，仍有出血再手术
D. 继续输血的同时急诊手术
E. 胃肠减压，同时注入冰水、肾上腺素止血

[B型题]

- A. 胃小弯十二指肠后壁 B. 胃大弯 C. 胃小弯 D. 幽门附以胃和十二指肠前壁 E. 胃窦
21. 溃疡病急性穿孔多位于 D
22. 胃癌多位于 E
A. 根治性胃癌切除术 B. 胃大部分切除术
C. 食管下段和近端胃切除术 D. 胃空肠吻合术 E. 全胃切除术
23. 高位小弯或贲门附近胃癌应行 C
24. 胃窦部胃癌应行 A
25. 剖腹发现胃癌已广泛转移 D

第三十八章 肠 疾 病

[A型题]

1. 高位肠梗阻呕吐的特点是 B
A. 出现迟，次数多 B. 出现早，次数多 C. 出现早，次数少
D. 出现早，次数多，量多 E. 出现迟，次数少，量多
2. 高位肠梗阻的特点是 D
A. 腹胀明显 B. 可见肠型 C. 可以完全不排便、排气
D. 呕吐频繁，为胃或十二指肠内容物
E. 肠鸣音亢进，可闻及气过水声

3. 下列哪项不会引起肠扭转 C
A. 肠系膜过长 B. 肠系膜根部附着过窄 C. 肠内重量减轻
D. 肠管动力异常 E. 体位突然改变
4. 2岁以下儿童肠梗阻常见的病因是 D
A. 嵌顿性斜疝 B. 先天性肠道闭锁或无肛门
B. 先天性肠旋转不良 D. 急性肠套叠
E. 胎粪性腹膜炎
5. 绞窄性肠梗阻的腹痛特点是 C
A. 阵发性绞痛 B. 持续性钝痛 C. 持续性剧烈腹痛
D. 放射性腹痛 E. 持续性隐痛, 阵发性腰痛
6. 成人肠套叠常见原因是 D
A. 畸形 B. 饮食习惯改变 C. 剧烈运动
D. 肠肿瘤 E. 肠道炎症
7. 高位小肠梗阻时极有意义的早期临床表现是 B
A. 胃肠减压时胃液极少 B. 频繁呕吐, 腹胀不明显
C. 明显失水及酸中毒 D. 体温升高
E. 以上都不是
8. 早期肠套叠最佳的治疗方法是 D
A. 颠簸疗法 B. 口服植物油 C. 手术切除套叠部分
D. 空气灌肠 E. 胃肠减压、解痉、镇痛
9. 乙状结肠扭转的临床表现, 下列哪项不符合 E
A. 多见于男性老年人
B. 常有便秘习惯, 以往有多次腹痛发作, 经排气排便后缓解病史
C. 缓慢起病, 发作时有腹痛
D. 腹胀明显
E. 频繁呕吐
10. 绞窄性肠梗阻的临床表现, 下列哪项是错误的 E
A. 腹部出现腹膜刺激征 B. 腹痛持续加重, 无缓解
C. 呕吐血性或棕褐色液体 D. 肠鸣音消失或减弱
E. X线检查见膨胀肠袢, 位置、形状随体位和时间而变
11. 鉴别回肠—结肠型肠套叠和盲肠癌梗阻最可靠的措施是 C
A. 询问有无慢性阵发性腹痛 B. 检查右下腹有无包块
C. 进行X线钡剂灌肠检查 D. 检查有无血性粘液便
E. 检查血色素是否下降
12. 高位小肠梗阻除腹痛外, 主要症状是 C
A. 腹胀 B. 停止排气、排便 C. 呕吐频繁
D. 血便 E. 腹部包块
13. 老年人发生机械性肠梗阻时, 首先应想到 D
A. 蛔虫团所致的肠梗阻 B. 粘连所致的肠梗阻
C. 嵌顿性腹外疝 D. 肿瘤 E. 小肠扭转
14. 绞窄性肠梗阻的病理生理改变中, 下列哪项是错误的 D
A. 有效循环血量锐减 B. 大量毒素吸收
C. 水、电解质平衡失调 D. 可出现严重的代谢性碱中毒
E. 最终导致肠坏死、肠穿孔
15. 肠系膜上动脉起始部梗阻, 引起肠管血液循环障碍的范围为 C
A. 全部小肠 B. 仅屈氏韧带以下的小肠
C. 屈氏韧带以下的小肠、盲肠及升结肠
D. 升结肠和横结肠 E. 全部大小肠

[B型题]

- A. 充分准备后胃大部切除术 B. 抗生素治疗
C. 立即手术, 去除病因 D. 先采用非手术治疗

- E. 腹部热敷
- 16. 单纯性机械性肠梗阻可采用 D
- 17. 绞窄性肠梗阻应采用 C
- 18. 瘢痕性幽门梗阻应采用 A
- A. 回肠末端肠腔狭窄，管壁僵硬，呈线样征
- B. “杯口”征 C. 充盈缺损 D. “鸟嘴”征
- E. 腹中部“阶梯状”排列
- 19. 回肠—结肠型套叠，钡灌肠的典型征象是 B
- 20. 乙状结肠扭转钡灌肠的典型征象是 D
- 21. 低位小肠梗阻的典型征象是 E
- 22. 结肠息肉的X线征象是 C

第三十九章 阑尾炎

[A型题]

1. 急性阑尾炎腹痛发生的特点是 D
 - A. 左下腹痛转移到右下腹痛 B. 左上腹痛后右下腹痛
 - C. 腹痛一开始即出现在右下腹部 D. 先上腹痛，后右下腹痛
 - E. 没有明确的特点
 2. 急性化脓性阑尾炎，主要的病理改变是指 E
 - A. 炎症限于阑尾粘膜下层 B. 炎症限于阑尾粘膜层
 - C. 炎症限于浆膜层 D. 腹腔内有脓性液体
 - E. 阑尾明显肿胀，浆膜高度充血，周围炎性渗出物聚集
 3. 急性阑尾炎穿孔局限性腹膜炎的手术治疗，哪项不妥 C
 - A. 注意保护切口，防止切口感染 B. 阑尾残端妥善处理
 - C. 大量生理盐水冲洗腹腔 D. 腹腔放置引流
 - E. 缝合切口前用盐水洗手
 4. 急性阑尾炎直肠指检时，发现直肠右前方有触痛，其临床意义是 E
 - A. 急性化脓性阑尾炎 B. 急性坏疽性阑尾炎
 - C. 盲肠后位阑尾炎 D. 急性单纯性阑尾炎
 - E. 阑尾位置指向盆腔
 5. 单纯性阑尾炎腹痛的性质是 B
 - A. 阵发性剧痛或胀痛 B. 轻度隐痛 C. 钝痛或剧痛
 - D. 持续性的重度跳痛 E. 较轻的持续性胀痛
 6. 急性阑尾炎上腹部及脐周疼痛是由于 E
 - A. 胃肠道痉挛 B. 腹膜炎症刺激 C. 内脏功能紊乱
 - D. 合并急性胃肠炎 E. 内脏神经反射
 7. 急性阑尾炎的诸多症状中主要的是 C
 - A. 恶心呕吐 B. 低热 C. 转移性右下腹痛
 - D. 便秘 E. 食欲减退
 7. 诊断急性阑尾炎，下列哪项最具决定性意义 B
 - A. 体温、脉搏的变化 B. 右下腹有固定的、明确的压痛点
 - C. 白细胞计数、分类 D. 结肠充气试验及直肠指诊发现
 - E. 有无腹肌紧张
 9. 急性坏疽性阑尾炎，当阑尾壁全层坏疽后，腹痛性质为 C
 - A. 持续性刀割痛 B. 持续性隐痛 C. 持续性剧痛
 - D. 持续性跳痛 E. 持续性胀痛
- #### [B型题]
- A. 妊娠期急性单纯性阑尾炎 B. 慢性阑尾炎
 - C. 急性坏疽性阑尾炎 D. 经诊疗后阑尾脓肿症状逐渐减轻
 - E. 经诊疗后阑尾脓肿症状逐渐加重
 10. 择期阑尾切除术适用于 B

- 11. 急诊阑尾切除术适用于 C
- 12. 切开引流适用于 E
- 13. 非手术治疗适用于 D

第四十章 直肠肛管疾病

[A型题]

- 1. 关于直肠肛管的解剖, 下列哪项不对 E
 - A. 齿状线以上是粘膜, 齿状线以下是皮肤
 - B. 齿状线以上主要是由直肠上下动脉供应
 - C. 齿状线以下的静脉从属直肠下静脉丛
 - D. 齿状线以下的淋巴液主要回流到腹股沟淋巴结
 - E. 齿状线以上的直肠粘膜受阴部内神经支配
- 2. 肛管的长度为 B
 - A. 0.5cm B. 1~2cm C. 3~4cm D. 4cm E. 4~5cm
- 3. 肛门内括约肌与外括约肌的皮下部交界处称之为 D
 - A. 齿状线 B. 半月线 C. 粘膜线
 - D. 白线 E. 肛瓣
- 4. 直肠乙状结肠镜、纤维结肠镜检查最易发生的危险是 D
 - A. 直肠大出血 B. 肛门撕裂引起大便失禁
 - C. 内痔出血 D. 直肠、乙状结肠破裂穿孔
 - E. 交叉感染致癌细胞种植性转移
- 5. 肛裂常发生在肛管的 D
 - A. 前正中位 B. 左侧位 C. 右侧位 D. 后正中位 E. 左前位
- 6. 肛管直肠周围脓肿常继发于 C
 - A. 肛裂 B. 肛痿 C. 肛窦炎 D. 内痔注射 E. 直肠息肉
- 7. 肛痿多由哪种手术引起 D
 - A. 内痔注射疗法 B. 肛裂切除法 C. 血栓性外痔切开取栓子
 - D. 肛周脓肿切开或穿破 E. 内痔环切术
- 8. 肛痿的手术疗法中影响手术效果的关键步骤在于 C
 - A. 要进行广泛切除痿管周围的疤痕组织
 - B. 切除痿管后应一期缝合
 - C. 正确地找到内口, 将内口切开或切除并且不损伤括约肌
 - D. 必须用探针穿入肛痿内口再切开
 - E. 以上所述都不是
- 9. 直肠肛周脓肿手术治疗中, 下列操作哪一点不对 B
 - A. 切口应在红肿、压痛或波动最显著的部位
 - B. 坐骨肛管间隙脓肿可以作放射状切口
 - C. 脓肿切开后应注意脓肿排出量
 - D. 切口边缘的皮肤和皮下组织应适当切除
 - E. 每次排便后用1: 5000高锰酸钾溶液坐浴并更换敷料
- 10. 内痔是由于下列哪一项静脉扩大、曲张所致 C
 - A. 直肠上静脉 B. 直肠下静脉 C. 直肠上静脉丛
 - D. 直肠下静脉丛 E. 肛管静脉
- 11. 痔核一般多发生在 C
 - A. 截石位12, 6, 9点钟处 B. 胸膝位3, 7, 11点钟处
 - C. 截石位3, 7, 11点钟处 D. 胸膝位12, 6, 9点钟处
 - E. 以上所述都不是
- 12. 排便时肛门疼痛, 大便带鲜血, 最常见于哪种病 B
 - A. 肛痿 B. 肛裂 C. 内痔 D. 血栓性外痔 E. 直肠癌
- 13. 肛管直肠疾病, 下列哪一种可以发生恶变 C
 - A. 肛裂 B. 肛痿 C. 直肠息肉 D. 内痔 E. 直肠脱垂
- 14. 除幼年性息肉外, 直肠息肉多发生在 E

- A. 2~8岁 B. 12~16岁 C. 20~30岁
D. 30~40岁 E. 40岁以上
15. 直肠癌的早期症状是 C
A. 骶尾部剧痛 B. 便秘或大便变细 C. 便血
D. 排尿不畅或疼痛 E. 下腹胀痛
16. 直肠癌直接蔓延环绕肠管1周约需 C
A. 6个月 B. 6~9个月 C. 12~24个月
D. 24~30个月 E. 36个月
17. 直肠癌向远侧肠壁纵轴浸润扩散超过肿瘤边缘距离一般 D
A. 大于5cm B. 小于1.0cm C. 大于6.0cm
D. 很少超过2.0cm E. 很少大于4.0~5.0cm
18. 肛管癌一般最可能转移至 B
A. 骶前淋巴结 B. 髂内淋巴结
C. 乙状结肠系膜淋巴结 D. 腹股沟淋巴结
E. 腹主动脉周围淋巴结
19. 直肠癌的主要转移途径是 B
A. 直接蔓延 B. 淋巴转移
C. 血行转移 D. 种植转移
E. 血行加直接蔓延
20. 关于直肠癌淋巴转移, 下列错误的应是 C
A. 肿瘤侵犯肠壁越深, 蔓延周径越大, 淋巴转移率越高
B. 向肠内生长的癌肿, 淋巴转移率较低
C. 高位直肠癌不会发生向下转移的可能
D. 下段直肠癌向上方和侧方转移为主
E. C和D两者
21. 一40岁男性患者, 近几月来排便增多, 偶有便血, 肛门坠胀, 门诊按内痔注射治疗, 症状仍不能缓解, 此时应首先作 B
A. 钡灌肠检查 B. 直肠乙状结肠镜 C. 纤维结肠镜检查
D. 直肠内B超检查 E. 盆腔CT检查
22. 一8岁患儿经常大便出血, 鲜血见于大便表面, 每日大便1—2次, 无其他痛苦, 偶有像草莓样肉团脱出肛外, 直肠指检距肛门5—6cm处可触及葡萄状肿块, 质软, 指套有血迹, 应考虑 E
A. 内痔 B. 肛乳头肥大 C. 直肠脱垂 D. 直肠癌 E. 直肠息肉
23. 一30岁女性患者, 近半年来排便次数增多, 下腹部隐痛, 有里急后重, 大便检查有脓细胞及少量吞噬细胞, 经内科按慢性痢疾治疗无效, 此时应首先作 D
A. 纤维结肠镜检查 B. 直肠镜 C. 直肠指检
D. 钡灌肠检查 E. CEA检查
24. 一30岁男性患者, 肛门外经常不洁, 分泌物有恶臭, 时有肛门处肿痛, 检查发现距肛门2.5cm处, 有乳头状突起, 触诊有索状物与肛门相连, 且有压痛, 属何种疾病, 如何处理 D
A. 外痔无需处理 B. 血栓性外痔行血栓切除
C. 肛管癌行Mile's术 D. 单纯性肛瘘行挂线或瘘管切开或切除治疗
E. 肛裂行切除术
- [B型题]
- A. 排便时痔核不脱出肛门, 排便时滴血
B. 排便时痔核不脱出肛门, 痔核较小
C. 排便时痔核脱出肛门, 便后痔核可自行复位
D. 痔核反复脱出, 且不能自行还纳
E. 肛门外剧痛脱出, 且不能自行还纳
25. II期内痔会出现 C
26. Ⅲ期内痔会出现 D
27. 一期内痔会出现 A

- A. 注射疗法 B. 痔单纯切除术 C. 痔环切术
D. 一般不需特殊治疗 E. 挂线治疗
28. I、II期内痔出血应选择 A
29. 较大且孤立的内痔或混合痔应选择 B
30. 严重的环形痔应选择 C

第四十一章 肝 疾 病

[A型题]

- 原发性肝癌最常见的转移方式是 A
A. 侵犯门静脉分支，经门静脉系统形成肝内播散
B. 肝外血行转移
C. 淋巴转移
D. 腹腔种植
E. 直接向横膈蔓延
- 目前对小肝癌定位诊断最优者为 D
A. CT B. MRI C. B超 D. 肝动脉造影 E. X线检查
- 常温下一次阻断注入肝的血流不宜超过 C
A. 1h B. 30min C. 10~20min D. 5min E. 2min
- 诊断肝囊肿的首选方法是 C
A. CT B. MRI C. B超 D. 肝动脉造影 E. 诊断性穿刺
- 对根治性切除术后复发肝癌，如一般情况好，肝功能正常，病灶局限，应行 A
A. 手术切除 B. 肝动脉栓塞化疗 C. 放射治疗
D. 免疫治疗 E. 中药治疗
- 细菌性肝脓肿最常见的细菌入肝途径是 D
A. 肝动脉 B. 肝静脉 C. 门静脉 D. 胆道 E. 肠道
- 对原发性肝癌高危人群的筛查应采用 C
A. CT B. MRI C. AFP与B超 D. 肝动脉造影 E. CEA
- 小肝癌手术切除的5年生存率为 C
A. 10% B. 30% C. 60%~70% D. 90% E. 50%

[B型题]

- A. 肝动脉 B. 肝静脉 C. 门静脉 D. 肝胆管 E. 胆总管
9. 入肝血流70%~75%来自 C
10. 肝血液的流出管道是 B

第四十二章 门静脉高压症

[A型题]

- 门静脉的正常压力约在——之间 B
A. 0~1.2kPa(0~13cmH₂O)
B. 1.27~2.35kPa(13~24cmH₂O)
C. 2.35~2.94kPa(24~30cmH₂O)
D. 2.94~4.90kPa(30~50cmH₂O)
E. 4.90~5.88kPa(50~60cmH₂O)
- 正常肝脏血流量每分钟约 D
A. 500ml B. 800ml C. 1200 ml D. 1500ml E. 1800ml
- 三腔二囊管放置时间不宜持续超过 C
A. 1~2天 B. 2~3天 C. 3~5天 D. 5~7天 E. 7~10天

[B型题]

- A. 肝前型 B. 肝后型 C. 窦前阻塞 D. 窦后阻塞
4. 肝炎后肝硬化所引起的门静脉高压症属于 D
5. 门静脉主干先天性畸形所引起的门静脉高压症属于 A

6. Budd—Chiari综合征所引起的门静脉高压症属于 B
7. 血吸虫肝硬变所引起的门静脉高压症属于 C

第四十三章 胆道疾病

[A型题]

1. 胆固醇结石好发于 D
A. 左肝管 B. 胆总管 C. 右肝管 D. 胆囊 E. 肝总管
2. “白胆汁”是 E
A. 水 B. 渗出的组织间液 C. 脓液 D. 淋巴液 E. 分泌的粘液
3. 肝外胆道的解剖特点中, 下列哪项是错误的 D
A. 胆囊管常有变异 B. 胆囊动脉常有变异
C. 胆总管下端多数与主胰管会合 D. 括约肌仅由胆管括约肌构成
E. 胆囊分底、体、颈3部
4. 关于胆汁分泌下列哪项是错误的 E
A. 成人每日分泌胆汁800~1200ml B. 刺激迷走神经使分泌量增加
C. 刺激交感神经使分泌量减少 D. 促胰液素使分泌量增加
E. 蛋白质的分解产物使分泌减少
5. 上腹部绞痛、寒战、高热、黄疸最常见于 E
A. 先天性胆道闭锁 B. 胆总管囊肿 C. 胆道蛔虫病
D. 胆囊息肉 E. 胆总管结石并感染
6. 胆道感染最常见的致病菌为 A
A. 大肠杆菌 B. 产气杆菌 C. 绿脓杆菌
D. 变形杆菌 E. 副大肠杆菌
7. 肝内胆管结石 A
A. 左肝管多于右肝管 B. 右肝管多于左肝管 C. 左右肝管相等
D. 完全在左肝管 E. 完全在右肝管
8. 胆道感染致感染性休克应 E
A. 禁忌手术 B. 紧急手术 C. 需经抗休克血压回升后手术
D. 大量抗生素控制感染后手术 E. 抗休克同时进行解除胆道梗阻
9. 胆道感染的并发症中下述哪项是错误的 B
A. 严重病例可致感染性休克 B. 胆道出血少见
C. 胆管炎性狭窄 D. 胆道感染可并发肝脓肿
E. 治疗关键是解除梗阻早期进行胆道减压术
10. 胆管结石急性发作和急性胆管炎典型三联征是 C
A. 突发右上腹阵发性绞痛、畏寒、发热、胆囊肿大
B. 突发上腹部束带状剧痛、轻度黄疸、低血压
C. 突发剑突下偏右阵发性绞痛、寒战高热、黄疸
D. 寒战高热、肝区持续性胀痛、低血压
E. 以上均不是
11. 女性, 42岁, 3年来经常夜间上腹部不适, 2天前食油腻食物后突发上腹痛, 为阵发性绞痛, 畏寒、发热、呕吐、尿色逐渐加深。入院时体温38℃, 轻度黄疸, 腹稍胀, 有右上腹压痛, 肌紧张, 肠鸣音弱, 白细胞 $20 \times 10^9/L$, 中性80%, 血清淀粉酶128单位(索氏法), 最大可能是 D
A. 高位急性阑尾炎 B. 溃疡病穿孔 C. 急性胰腺炎
D. 急性胆囊炎 E. 胆道蛔虫病
12. 女性, 39岁, 2年前因胆总管结石行胆囊切除, 胆总管切开取石与T管引流术。术后有上腹闷痛, 半年后时有发热, 经抗生素治疗, 症状缓解, 查皮肤无黄染, 肝、脾未触及, 右上腹深压痛, 经皮肝穿刺胆道造影发现, 胆总管内多个充盈缺损, 可诊断为 E
A. 胆道感染 B. 胆道功能紊乱 C. 慢性胰腺炎
D. 胆道蛔虫病 E. 胆总管结石残留
13. 女性, 40岁, 3年前以胆石症行胆囊切除及胆总管探查术, 3个月前因进油腻饮食突

发绞痛,伴恶心、呕吐,有寒战、高烧,近来发作频繁。体检:巩膜黄染,剑突下压痛明显,首先应考虑 A

- A. 胆石症复发 B. 胆道蛔虫症 C. 黄疸性肝炎
D. 急性胰腺炎 E. 十二指肠溃疡

14. 女性,45岁,喝排骨汤后突然出现右上腹持续性疼痛,并向右肩及右腰放射,恶心1天,上腹有压痛,有肌紧张。血象:WBC $11 \times 10^9/L$, N80%,血清淀粉酶(索氏法)256单位,尿淀粉酶(温氏法)32单位,黄疸指数12单位。X线检查:胃肠充气扩张,未见液平面,应诊断为 A

- A. 急性胆囊炎 B. 急性胰腺炎 C. 肠梗阻
D. 急性胃溃疡穿孔 E. 胆结石,胆道感染

15. 女性,30岁,黄疸半月,自诉尿黄、皮肤瘙痒。检查:肝肋下可及二指,压痛,T—Bil $70 \mu\text{mol/L}$, D—Bil $34 \mu\text{mol/L}$, AKP50单位,其他肝功能检查正常,应考虑 C

- A. 溶血性黄疸 B. 急性黄疸性肝炎 C. 阻塞性黄疸
D. 胆道蛔虫病 E. 以上均不是

[B型题]

- A. 胆道蛔虫病 B. 化脓性梗阻性胆管炎 C. 肝脓肿
D. 急性水肿性胰腺炎 E. 急性化脓性胆囊炎

16. 胆囊结石最常见的并发症是 E

17. 最易引起休克的胆道疾病是 B

- A. 反映胆囊浓缩和收缩功能 B. 主要了解肝内毛细胆管病变
C. 明确梗阻性黄疸的原因和部位 D. 明确肝内病变的范围和性质
E. 同时了解胆道和胰管的情况

18. 口服胆囊造影术可 A

19. 经皮肝穿刺胆道造影术可 C

20. 内窥镜胰胆管造影 E

- A. 急性化脓性胆管炎 B. 急性胆囊炎 C. 急性出血、坏死性胰腺炎
D. 急性化脓性阑尾炎 E. 绞窄性小肠梗阻

21. Charcot三联征出现在 A

22. Murphy征出现在 B

第四十四章 上消化道大出血的鉴别诊断和处理原则

[A型题]

1. 引起上消化道大出血的原因不包括 B

- A. 胃十二指肠溃疡 B. 慢性胃炎 C. 门静脉高压症
D. 出血性胃炎 E. 胃癌

2. 消化道大出血的临床表现为大量呕血和便血,一般来说,呕血还是便血取决于 D

- A. 出血部位 B. 出血速度 C. 年龄 D. 出血速度和量 E. 出血时间

3. 男性,40岁,患者因上消化道大出血入院,经治疗病情稳定,出血停止,为明确出血原因,首选的检查是 C

- A. 选择性腹腔动脉造影 B. B超检查 C. 纤维胃镜检查
D. 肝功能检查 E. 钡餐检查

4. 男性,40岁,突发上消化道出血约2000ml。查体:神志模糊,皮肤巩膜黄染,腹胀,全腹浊音,无压痛及反跳痛,血压66/45mmHg,脉搏32次/分。胃镜发现食管下端曲张静脉出血。该病人的首选治疗方案为 B

- A. 手术治疗 B. 三腔二囊管压迫 C. 抚内科保守治疗,好转后再手术
D. 局部栓塞止血 E. 快速应用止血药物

5. 对于上消化道出血的病人行选择性腹腔动脉造影,这种检查仅限于 A

- A. 正在出血的病例 B. 出血已停止的病例 C. 任何病例
D. 胃癌并出血的病例 E. 出血性胃炎的病例

6. 胃十二指肠溃疡大出血的溃疡一般位于 D

- A. 胃大弯 B. 胃底后壁 C. 胃体后壁

- D. 胃小弯或十二指肠后壁 E. 十二指肠球部前壁
7. 女性, 50岁, 近3天来剑突偏右上腹剧烈疼痛, 呈阵发性。伴畏寒, 高热, 今日因黑便3次而来就诊, 无呕血。体检; 皮肤巩膜可疑黄染, 剑突下及右上腹有压痛, 肝区有叩痛, 其黑便原因最可能为 C
- A. 出血性胃炎 B. 胃癌出血 C. 胆道感染出血
- D. 十二指肠溃疡出血 E. 出血性肠炎
8. 男性, 40岁, 因上消化道出血而急诊入院。体检: 面色苍白, 烦躁, 血压10/8kPa, 心率110次/分, 在准备手术前最主要的治疗措施是 B
- A. 头低位和吸氧 B. 积极建立静脉通道, 补充血容量
- C. 去甲肾上腺素胃管点滴 D. 应用升压药物静脉点滴
- E. 冰盐水洗胃
- [B型题]
- A. 出血性胃炎 B. 肝炎 C. 胃溃疡
- D. 门静脉高压症 E. 胆道出血
9. 男性, 20岁, 呕血2小时入院, 无溃疡病史, 有肝病史, 肝肋未及, 脾肋下1指, 腹水征(+++) D
10. 上腹痛, 腹胀, 低热2个月, 突然呕血300ml, 肝肋下3指, 质硬, 呈结节状, AFP阳性 B
11. 男性, 23岁, 大量饮酒后3小时呕血约400ml入院, 无溃疡病史, 查体: 剑突下压痛, 肝脾肋下未及, 腹水征(-) A
12. 男性, 25岁, 右上腹绞痛2日, 体温39°C, 呕血约300ml, 血压尚稳定, 脉率80次/分 E
- A. 三腔管压迫 B. 胃切开止血 C. 胃、食管血管离断
- D. 胃大部切除 E. 抗感染及应用止血药
13. 男性, 65岁, 呕血800ml入院, 有肝硬化史, 钡透食管静脉曲张, 腹水征(+++) A
14. 女性, 45岁, 胃病史1年, 突然呕血600ml, 急诊胃镜检查, 胃窦有1.5cm×0.5cm大溃疡, 仍在出血 D
15. 女性, 38岁, 反复呕血1000ml, 肝炎病史十余年, 血压60/40mmHg, 用止血药, 三腔管压迫仍在出血, 脉率90~100次/分。腹水征(+), 病情尚不稳定, 大便中仍有鲜血排出 C
16. 男性, 40岁, 右上腹绞痛2天, 体温39°C, 呕血300ml, 血压尚稳定脉率92次/分 E
- A. 胃大部切除, 或加行选择性迷走神经切断术
- B. 根治性胃大部切除或全胃切除术 C. 内科治疗
- D. 剖腹探查, 寻找病因, 进行有效的止血
- E. 三腔二囊管压迫止血
17. 对于门静脉高压食管胃底曲张静脉引起的大出血的病人应采用 E
18. 由于胃癌引起的上消化道大出血, 一般采用 B
6. 由于出血性胃炎引起的上消化道大出血, 一般采用 C
20. 对于部位不明的上消化道大出血, 经过积极的初步处理后, 血压、脉率仍不稳定的病例应采用 D
- A. 上消化道出血一次量达500—1000ml, 并休克, 以呕血为主
- B. 上消化道出血一次量不超过500ml, 临床上表现为呕血和黑便, 很少并发休克
- C. 上消化道出血一次量不超过200ml, 临床上以黑便为主
- D. 上腹隐痛1年, 解柏油样稀便1周
- E. 右上腹绞痛, 畏寒, 发热, 伴黄疸, 解柏油样便1周
21. 肝内胆道出血 E
22. 食管静脉曲张破裂出血 A
23. 胃十二指肠溃疡少量出血 B
24. 胃十二指肠溃疡少量渗血 D
25. 十二指肠球部以下的出血 C
- A. 急诊手术 B. 暂时非手术治疗 C. 择期手术
- D. 限时手术 E. 内科治疗
26. 门静脉高压症首次出血1000ml, 肝功能轻度损害, 无黄疸、腹水者 A

27. 病人上消化道大出血, 部位、原因不清, 呈轻度休克者 B
28. 十二指肠溃疡活动期并少量黑便, 一般情况尚好者 E
29. 胃癌出血, 血流动力学稳定, 低蛋白血症严重者 D
30. 胃溃疡出血少量, 慢性营养不良者 C
A. 急性溃疡 B. 慢性溃疡 C. 复合性溃疡
D. 多发溃疡 E. 高位溃疡
31. 对于胃十二指肠溃疡大出血, 如果是年轻人, 多为 A
32. 对于胃十二指肠溃疡大出血, 如果病人年龄为45岁以上, 病史较长, 多为 B

第四十五章 急腹症的鉴别诊断

[A型题]

1. 男性, 42岁, 突发性中上腹持续性疼痛, 阵发性加剧3小时, 并向右肩背部放射, 频繁呕吐, 吐出胃液及少量胆汁。查体: 腹软, 肠鸣音活跃。心电图示: 房颤。白细胞: $17 \times 10^9/L$ 。最应作何检查以助于诊断 C
A. 血常规 B. 尿常规 C. B超
D. 诊断性腹腔穿刺 E. 立卧位腹部X线平片
2. 男性, 10岁, 突发性中上腹疼痛1小时, 伴呕吐。查体: 腹软, 中上腹有轻度深压痛, 无肌紧张及反跳痛, 拟诊为 D
A. 胆石症 B. 胃溃疡穿孔 C. 急性胃肠炎
D. 胆道蛔虫症 E. 急性肠梗阻
3. 男性, 66岁, 中上腹疼痛6小时, 伴畏寒、高热2小时, 以往曾行胆囊切除术。查体: $T 39.6^\circ C$, 腹软, 剑突下及右上腹均有压痛, 有轻度肌紧张及反跳痛, 肝区叩击痛阳性, 白细胞 $13.9 \times 10^9/L$, 中性粒细胞89%, 拟诊为 D
A. 急性消化道溃疡穿孔 B. 急性坏疽性阑尾炎
C. 急性绞窄性肠梗阻 D. 急性梗阻性化脓性胆管炎
E. 急性出血性坏死性胰腺炎
4. 女性, 55岁, 右上腹隐痛半年, 加重3周, 伴发热, 既往有胆道手术史。查体: $T 39.6^\circ C$, 肝肿大, 触痛明显。白细胞 $19 \times 10^9/L$, 中性粒细胞90%。核素肝扫描示肝右叶有一58mm×66mm大小占位性病变。拟诊为 E
A. 原发性肝癌 B. 慢性胆囊炎结石急性发作
C. 细菌性肝脓肿 D. 急性化脓性胆管炎
E. 急性胆管炎, 伴肝内脓肿形成
5. 男性, 55岁, 上腹部痛4天, 加重2小时, 伴恶心、呕吐、发热。曾有溃疡病病史。查体: $T 38.6^\circ C$, 腹软, 剑突下及右上腹均有压痛, 有轻度肌紧张及反跳痛, 肝区叩击痛阳性, 白细胞 $13.9 \times 10^9/L$, 中性粒细胞89%, 拟诊为 E
A. 急性腹膜炎 B. 急性消化道溃疡性穿孔
C. 急性肠系膜动脉栓塞 D. 急性胆管炎
E. 急性胆囊炎, 胆石症
6. 女性, 35岁, 腹痛5小时来诊, 经检查诊断为外科急腹症, 下列哪项决定是正确的 B
A. 粘连性肠梗阻不需要手术治疗
B. 消化道穿孔不是剖腹探查的绝对指征
C. 先有发热的急性腹痛一般是外科急腹症, 均需手术治疗
D. 疑为绞窄性肠梗阻时不可手术治疗, 必须诊断明确后才可手术
E. 急性胰腺炎是否手术治疗要根据血淀粉酶的测定结果而定
7. 女性, 54岁, 因上腹部剧痛, 休克2小时入院。查体: 巩膜轻度黄染, 重度腹胀, 肠鸣音消失, 移动性浊音(±), 血糖 $11 mmol/L$, 血钙 $1.4 mmol/L$, CO_2 结合力 $30 mmol/L$, 血淀粉酶1250温氏单位, 心电图示T波倒置, ST段下降。拟诊为 C
A. 急性水肿性胰腺炎 B. 心肌梗死, 心源性休克
C. 急性坏死性胰腺炎 D. 胃穿孔伴弥漫性腹膜炎, 感染性休克
E. 急性梗阻性化脓性胆管炎
8. 男性, 32岁, 饭后2小时出现腹痛, 并进行性加重, 向双侧腰部放射, 伴恶心、呕吐。查体: 神志清, $T 38.2^\circ C$, 血压 $10/5 kPa$, 脉搏100次/分, 律齐。患者的病程演变

还可能出现的体征哪项可除外 B

- A. 巩膜轻度黄染
- B. 出现病理性反射
- C. 季肋部皮肤出现灰紫斑，脐周皮肤青紫
- D. 上腹部明显压痛，肌紧张及反跳痛
- E. 偶可出现手足抽搐

9. 患者来院急诊时，对于腹痛必须考虑的问题中哪项除外 D

- A. 患者所指的腹痛部位有局限性压痛时，基本上是该部位的内脏疾患
- B. 虽然让患者作充分的深呼吸，但腹部却丝毫不随呼吸而起伏运动时，多是弥漫性腹膜炎
- C. 急性胰腺炎时腹肌紧张可不明显，至少不是腹肌板样强直
- D. 让患者咳嗽而感觉上腹部疼痛时，均可认为是上腹部的炎症性病变
- E. 急性阑尾炎的早期症状中可诉中上腹或剑突下疼痛

10. 急腹症的诊断中，下列哪项是错误的 D

- A. 胃、十二指肠溃疡急性穿孔，腹部透视膈下可无游离性气体
- B. 在病人所指疼痛的部位有局限性压痛时，基本上是该部位内脏的疾病
- C. 让病人咳嗽时感觉上腹疼痛不一定意味着是上腹部炎症性疼痛
- D. 血、尿淀粉酶正常不能否定急性胰腺炎的诊断
- E. 急性阑尾炎的早期症状中可诉中上腹或剑突下疼痛

11. 胃、十二指肠溃疡病穿孔引起的急腹症早期症状中，下列哪项是错误的 D

- A. 腹肌紧张 B. 呕吐 C. 早期出现休克症状
- D. 发热 E. 肠鸣音消失

12. 急腹症的治疗中，下列哪项是错误的 E

- A. 并非所有的急腹症均需手术
- B. 胆道蛔虫并发急性梗阻性化脓性胆管炎时应行手术治疗
- C. 急腹症诊断不明时，忌用吗啡类止痛剂
- D. 并非所有脾破裂均需做脾切除
- E. 一旦诊断为胃十二指肠溃疡急性穿孔时均应立即手术

13. 男性，28岁，高热，咳嗽，右上腹持续性疼痛2天，无恶心呕吐，体温39.2℃，巩膜无黄染，右下胸可闻及少量湿啰音，腹软，右上腹有轻压痛，无肌紧张，未扪及包块，肠鸣音正常，白细胞：15.9×10⁹/L，中性粒细胞：80%，其腹痛原因可能是由于 E

- A. 胆石症 B. 急性胆囊炎 C. 十二指肠溃疡穿孔
- D. 右肾结石 E. 右下肺炎

14. 女性，18岁，右下腹疼痛3天，伴恶心呕吐，体温38.2℃。右下腹可扪及固定的包块，约为45mm×40mm，压痛明显，腹软，肠鸣音正常。白细胞：3×10⁹/L，中性粒细胞：85%。诊断最大可能为 D

- A. 盲肠结核 B. 肠套叠 C. 结肠肿瘤
- D. 阑尾周围脓肿 E. 右侧卵巢囊肿

15. 女性，27岁，右下腹阵发性剧痛半天，无恶心呕吐。腹软，右下腹麦氏点轻压痛，肠鸣音正常，白细胞0.9×10⁹/L，中性粒细胞70%，尿红细胞(+)，诊断最大可能为 C

- A. 右侧输卵管炎 B. 宫外孕 C. 右侧输尿管结石
- D. 节段性回肠炎 E. 急性阑尾炎

16. 女性，22岁，妊娠3个月，中上腹阵发性疼痛8小时，间歇时症状基本消失。查体：腹平软，剑突下有深压痛，无肌紧张和反跳痛。此时应考虑做的检查是 D

- A. 诊断性腹腔穿刺 B. 血、尿常规 C. 腹部X线平片
- D. B超 E. 胸腹部透视

17. 女性，25岁，突感上腹部剧痛，不能直腰半小时。查体：血压14.7/10.5kPa，脉搏110次/分，板样腹，肠鸣音消失。血红蛋白120g/L，白细胞8.3×10⁹/L。此时最有价值的检查是 A

- A. 腹部立位X线平片 B. 血生化 C. 腹部B超
- D. 腹部CT E. 腹腔穿刺或灌洗

18. 男性, 32岁, 突发性上腹部疼痛3小时, 查体: 腹平, 全腹部压痛, 腹肌呈板样强直, 肠鸣音消失, 肝浊音界缩小。诊断应首先考虑 E

- A. 急性胰腺炎 B. 急性胆囊炎穿孔伴腹膜炎
C. 急性阑尾炎穿孔伴腹膜炎 D. 急性机械性肠梗阻
E. 溃疡病穿孔伴腹膜炎

19. 女性, 30岁, 中上腹持续性疼痛3天, 右下腹疼痛1天, 伴呕吐2次, 平时月经规则, 现已停经32天, 查体: 体温37.2℃, 脉搏88次/分, 血压16/10kPa, 腹平, 右侧腹部广泛压痛, 右下腹最显著, 伴轻度肌紧张, 无反跳痛。白细胞16.3×10⁹/L, 中性粒细胞85%, 以往曾有类似发作史, 但程度较轻。应首先考虑的诊断是 E

- A. 急性胃肠炎 B. 宫外孕破裂出血 C. 慢性胆囊炎急性发作
D. 十二指肠球部溃疡穿孔 E. 慢性阑尾炎急性发作

[B型题]

- A. 腹式呼吸基本消失 B. 腹胀, 肠鸣音消失
C. 腹部压痛最明显的部位 D. 右下腹柔软, 无压痛
E. 腹部肌肉呈板样强直

20. 在急腹症的病例中, 确诊为弥漫性腹膜炎后, 寻找导致急性弥漫性腹膜炎的病变脏器时, 最有参考价值的体征是 C

21. 在消化性溃疡急性穿孔的急腹症病例中, 最为典型的体征是 E

22. 男性, 70岁, 因消化道肿瘤穿孔而导致急性弥漫性腹膜炎时, 较为重要的体征是 B

23. 在急性弥漫性化脓性腹膜炎的病例中, 主要的腹部体征除了全腹部压痛, 伴肌紧张及反跳痛外, 还有重要的腹部体征是 A

第四十六章 胰腺疾病

[A型题]

1. 关于急性水肿性胰腺炎, 下列哪项是错误的 D
A. 部分病人可见轻度黄疸 B. 持续性腹痛, 阵发性加重
C. 常继发于胆道疾病 D. 多数病人可发生休克
E. 少数病人可发生假性囊肿
2. 急性胰腺炎炎症波及整个胰腺, 主要表现为 E
A. 腹部压痛 B. 一般情况差
C. 呕吐 D. 腹胀和肠鸣音稍减弱
E. 剧烈的全上腹痛并呈束带状向两侧腰背部放射
3. 急性胰腺炎病情严重的重要指标是 C
A. 血淀粉酶>256单位(温氏法) B. 血白细胞>15×10⁹/L
C. 血钙<1.75mmol/L(7mg/dl) D. 血糖超过200Mg/dl, 尿糖阳性
E. 血清脂肪酶>1.5单位
4. 预防急性胰腺炎发生中, 主要措施是 A
A. 防止胆道疾病的发生 B. 经常服用磺胺药和抗生素
C. 经常服用消化酶类药物 D. 注意饮食卫生
E. 积极治疗十二指肠疾病
5. 治疗急性胰腺炎, 禁用 A
A. 吗啡止痛 B. 抗胆碱能药物 C. 给予钙盐
D. 胃肠减压 E. 补充血容量
6. 急性水肿性胰腺炎的治疗措施为 E
A. 应用抗生素 B. 抗胆碱能药物 C. 静脉补液
D. 胃肠减压 E. 以上都正确
7. 大多数慢性胰腺炎来自 B
A. 胆石症 B. 急性胰腺炎 C. 胰腺外伤
D. 饮酒 E. 胰管梗阻
8. 胰头癌的主要临床特点是 C
A. 胆囊增大 B. 厌食、消瘦、乏力 C. 黄疸

- D. 上腹部隐痛 E. 肝脏肿大
9. 梗阻性黄疸伴胆囊增大最可能是 D
- A. 胆石症 B. 硬化性胆管炎 C. 胆道蛔虫症
- D. 壶腹周围癌 E. 十二指肠乳头炎
10. 男性, 61岁; 进行性黄疸, 并感上腹及腰背部疼痛, 皮肤瘙痒, 消瘦。查体: 肝肋下1.5cm, 质韧, 脾未及, Courvoisier征阳性。T—Bil 136 μ mol/L(8mg/dl), D-Bil 80 μ mol/L(4.7mg/dl), 尿胆原(一), 肝功能正常。为确诊应首选 D
- A. 肝穿刺 B. 胃肠钡餐透视 C. CT检查
- D. B超 E. 放射性核素扫描
- [D型题]
- A. 增高最早 B. 增高稍晚. E. 增高最晚
- D. 不增高 E. 持续增高
11. 急性胰腺炎时, 尿淀粉酶 B
8. 急性胰腺炎时, 血淀粉酶 A
13. 急性胰腺炎时, 血清脂肪酶 C
- A. 胰头癌 B. 急性胆囊炎 C. 胆总管结石
- D. 急性胰腺炎 E. 壶腹部癌
9. 黄疸开始有波动, 以后加深并伴大便潜血阳性 E
15. 黄疸进行性加深 A
16. 有胆绞痛伴黄疸 C

第四十九章 周围血管和淋巴管疾病

[A型题]

1. 下肢静脉曲张晚期的临床表现中, 最主要的是 A
- A. 皮肤厚硬 B. 小腿浮肿 C. 色素沉着
- D. 小腿下1/3内侧溃疡 E. 局部瘙痒
2. 间歇性跛行可发生于 D
- A. Raynaud病 B. Takayasu病 C. Raynaud综合征
- D. Buerger病 E. 大隐静脉曲张
3. 有关动脉性静息痛的描述, 下列哪项是正确的 C
- A. 伴有肢体肿胀 B. 可见静脉曲张 C. 夜间常取抱膝端坐体位
- D. 皮肤温度升高 E. 足背动脉搏动增强

[B型题]

- A. Buerger试验 B. Trendelenburg试验 C. Perthes试验
- D. Pratt试验 E. Branham征
4. 有助于动静脉瘘诊断者为 E
5. 判断大隐静脉瓣膜功能者 B
6. 深静脉通畅试验为 C
7. 判断肢体供血情况者为 A
- A. Trendelenburg试验 B. Perthes试验
- C. Pratt试验 D. Buerger试验
8. 血栓闭塞性脉管炎时, 是阳性 D
9. 检查深静脉通畅的试验是 B
10. 检查大隐静脉瓣膜功能试验是 A
11. 检查交通静脉瓣膜功能试验是 C

第五十章 泌尿、男生殖系统外科检查和诊断

1. 排尿中断的症状常见于哪种疾病 D
A.膀胱癌 B. 肾结石 C.输尿管结石 D. 膀胱结石 E. 阴茎癌
2. 泌尿外科疾病中哪一类疾病常不伴有血尿 C
A.泌尿系肿瘤 B. 泌尿系感染 C. 原发性醛固酮增多症
D. 泌尿系结石 E. 膀胱肿瘤
3. 下列哪种疾病不适宜作膀胱镜检查 C
A. 输尿管肿瘤 B. 尿道肿瘤 C. 尿道狭窄 D. 前列腺癌 E.膀胱肿瘤
4. 无痛性间歇性肉眼血尿最常见于 D
A. 急性肾盂肾炎 B. 急性前列腺炎 C. 肾结核 D. 膀胱肿瘤 E.肾肿瘤
5. 下列检查哪项对前列腺癌诊断意义不大
A. PSA检查 B. 肛门直肠指检 C. 排泄性尿路造影
D. 前列腺穿刺活检 E. 前列腺B超
6. 下列哪一项检查不能了解到肾功能 A
A. 血肌酐(Cr)和血尿素氮(BUN)测定 B. 排泄性尿路造影
C. 增强CT检查 D. 靛胭脂检查
E. 肾小球滤过率和有效肾血流量测定(通过ECT检查)
7. 尿路梗阻伴残尿量增加, 尿液不断从尿道流出, 应属哪种情况 D
A. 压力性尿失禁 B. 急迫性尿失禁 C. 真性尿失禁
D. 充溢性尿失禁 E. 混合性尿失禁
8. 下腹外伤患者, 小便不能解出, 下腹痛, 腹肌稍紧张, 需立即确定膀胱有无破裂应用哪种方法 D
A. 尿道造影 B. 膀胱造影 C. 排泄性尿路造影
D. 插入导尿管注水试验 E. 膀胱B超
9. 尿普通细菌培养有细菌生长, 菌落数大于 $1 \times 10^5 / \text{ml}$ 认为是 B
A. 尿液污染 B. 确诊尿路感染 C. 泌尿系结核
D. 盆腔炎 E. 前列腺炎
10. 有尿频、尿急症状, 尿普通培养无细菌生长, 尿常规检查、pH值为5, 镜检可发现大量脓球可能为 C
A. 急性肾盂肾炎 B. 急性膀胱炎 C. 泌尿系结核
D. 急性前列腺炎 E. 急性尿道炎
11. 新婚后的女性, 有尿频、尿急、排尿疼痛的急性泌尿系感染症状, 拟定初步治疗方案, 下列哪项检查最适宜 B
A. 尿常规 B. 尿培养 C. 尿沉淀涂片染色检查
D. 膀胱镜检查 E. 尿脱落细胞学
12. 右腰部剧烈绞痛, 向右下腹放射3小时, 大汗淋漓, 面色苍白, 尿常规RBC+++ /Hp, 哪一样检查不应该做 D
A. 腹部平片检查(KUB) B. 肾、输尿管B超检查
C. 螺旋CT检查(肾、输尿管) D. MRU检查(磁共振尿路成像)
E. 泌尿系分泌造影
13. 泌尿外科疾病中下列哪种疾病伴有血尿 C
A. 睾丸癌 B. 肾囊肿 C. 肾盂癌
D. 精索静脉曲张 E. 肾上腺皮质癌
5. 患者排出乳白色尿液, 但加入1ml乙醚后能使尿液清亮, 可能是 B
A. 脓尿 B. 乳糜尿 C. 晶体尿 D. 血尿 E. 气尿
15. 每次排尿开始有血尿, 而排尿终末尿液正常, 病变初步是位于 B
A. 肾、输尿管 B. 前尿道 C. 膀胱颈及三角区
D. 前列腺 E. 膀胱底部
16. 老年男性患者有会阴不适、排尿不畅, 血PSA $>10 \text{ ng/ml}$, 可能为 C
A. 前列腺炎 B. 前列腺增生症(BPH) C. 前列腺癌
D. 神经源性膀胱 E. 膀胱癌

17. 诊断膀胱癌的最好方法是 C
A. 膀胱造影 B. 直肠膀胱双合诊 C. 膀胱镜检查
D. 尿液脱落细胞 E. 尿常规
18. 检测肾功能严重受损,伴有重度肾积水的最佳方法是 D
A. 排泄性尿路造影 B. CT C. MRI
D. MRU E. 双肾B超

[B型题]

- A. 活动后血尿 B. 全程无痛性血尿 C. 尿频尿急伴血尿
D. 乳糜性血尿 E. 阵发性高血压
6. 泌尿系结核可有 C
20. 泌尿系结石可有 A
21. 泌尿系肿瘤可有 B
22. 乳糜尿是 D

第五十五章 泌尿系统梗阻

[A型题]

1. 老年男性患者,出现进行性排尿困难,最常见的原因是 B
A. 前列腺癌 B. 前列腺增生 C. 膀胱颈纤维性增生
D. 膀胱结石 E. 尿道结石
2. 前列腺增生症合并急性尿潴留,并有明显肾功能障碍,应如何处理 A
A. 留置导尿管,积极纠正水电解质和酸碱平衡失调
B. 膀胱穿刺抽尿 C. 膀胱造瘘
D. 雌激素治疗 E. 取前列腺切除
3. 男性,70岁,进行性排尿困难4年,多次出现过急性尿潴留,目前排尿呈点滴状,前列腺明显增大,质软,弹性,残余尿300ml,患者有冠心病已数年,时有心律不齐和心绞痛发作,最好采用哪种治疗方法 C
A. 用女性激素 B. 长期留置导尿管 C. 耻骨上膀胱造瘘
D. 前列腺切除 E. 扩双侧睾丸切除
4. 前列腺增生病人最早出现的症状是 C
A. 排尿困难 B. 尿潴留 C. 尿频
D. 无痛性血尿 E. 腹股沟疝

[B型题]

- A. 充盈性尿失禁 B. 阵发性高血压 C. 排尿中断
D. 两上腹包块 E. 无痛性血尿
5. 前列腺增生可出现 A
6. 多囊肾可出现 D
7. 嗜铬细胞瘤可出现 B
- A. 药物治疗如激素、 α 受体阻滞剂 B. 导尿
C. 前列腺切除术或经尿道前列腺电切术 D. 膀胱造瘘
E. 给予抗生素
8. 男性,70岁,近2年尿频显著,排尿费力,逐渐加重,不能排尿1天,来急诊。其治疗应该是 B
9. 该患者服药治疗无效,反复出现尿潴留,查体:前列腺II度大,肛门括约肌张力正常,正常心电图。其治疗应是 C
10. 患者行前列腺切除术后1月,仍有尿频,尿常规:白细胞3—5/HP。其治疗应是 E
11. 男性,75岁,3月前发生一次尿潴留,目前严重尿频,排尿困难,5年前发生急性心梗,目前心脏情况较稳定。其治疗应是 C
12. 男性,68岁,进行性排尿困难3年,夜尿4~5次/天;其他系统无特殊疾病,B超示前列腺增生,残余尿120ml。其治疗应是 C

第五十六章 尿石症

[A型题]

1. 甲状旁腺功能亢进并发双肾结石患者，经手术取尽结石，为预防结石复发，最重要的措施是 D
A. 进食低钙食物 B. 酸化尿液 C. 碱化尿液
D. 摘取甲状旁腺腺瘤或增生组织 E. 摘取甲状腺组织
2. 为预防结石复发，下列哪种结石需酸化尿液 B
A. 草酸盐结石 B. 尿酸铵结石和磷酸盐结石
C. 尿酸结石 D. 黄嘌呤结石 E. 混合结石
3. 某青年长跑后发生腰部绞痛，继而出现肉眼血尿，最大可能是 D
A. 肾肿瘤 B. 输尿管肿瘤 C. 膀胱肿瘤
D. 上尿路结石 E. 下尿路结石
4. 某患者左肾盂单个结石约1.2cm大小，右肾盂多发结石，IVP显示双肾积水处理应是 A
A. 左肾盂切开取石 B. 左肾造瘘 C. 右肾盂切开取石
D. 右肾造瘘 E. 双肾造瘘
5. 左肾上盏多发结石并明显扩张，最好的治疗方法是 C
A. 肾盂切开取石 B. 肾切开取石 C. 肾部分切除
D. ESWL E. 以上都不是
6. 对侧肾功能良好的肾结石患者，下列哪种情况需作肾切除 D
A. 肾盂结石功能尚可 B. 肾盏结石
C. 鹿角形结石合并肾积水 D. 肾结石合并肾功能丧失
E. 鹿角形结石无肾积水
7. 输尿管结石发生腰部绞痛的机制是 D
A. 结石合并上尿路感染
B. 结石嵌顿引起输尿管粘膜充血水肿
C. 结石在输尿管内移动或嵌顿引起输尿管平滑肌痉挛
D. 以上都不是
8. 引起尿频、尿急、排尿终末性疼痛和里急后重的结石是 E
A. 肾盂结石 B. 输尿管上段结石 C. 输尿管末端结石
D. 输尿管中段结石 E. 膀胱结石
9. 输尿管结石与腹腔淋巴结钙化阴影、肠内容物、盆腔静脉石和骨岛的鉴别最好的方法是 D
A. 腹部X线摄片 B. B超 C. IVP
D. 输尿管逆行插管造影 E. MRU
10. 输尿管结石手术，入手术室急需摄腹部KUB，其目的是 A
A. 作最后结石定位 B. 了解结石以下尿路有否狭窄
C. 了解双侧肾功能 D. 排除泌尿系结核病变
E. 以上都不是
11. 某患者左肾及右输尿管结石各一枚，均为1.2cm大小，IVP示双肾积水，处理应是 D
A. 左肾切开取石 B. 左肾造瘘 C. 右肾切除
D. 右输尿管切开取石 E. 右肾造瘘
12. 左肾结核患者，IVP示左肾无功能，右输尿管结石一枚1.3cm大小，右肾轻度积水，全身无尿毒症表现，宜先作何处理 D
A. 切除无功能左肾 B. 立即输尿管切开取石 C. 抗痨治疗
D. 抗痨治疗下行ESWL治疗 E. ESWL治疗
13. 膀胱憩室内结石应如何治疗 C
A. 药物排石 B. 经尿道液电碎石 C. 耻骨上膀胱切开取石+憩室切除
D. 无需治疗 E. 以上都不是
14. 后尿道有一1.2cm×1.8cm×0.8cm结石，患者排尿困难，最后治疗方案是 E
A. 经尿道外口钩取或钳碎结石 B. 尿道切开取石
C. 膀胱切开取石 D. 尿道碎石

E. 将结石推回膀胱，再切开膀胱取石或者经膀胱镜碎石取石

15. 经皮肾镜取石的适应证应除外 D

A. 肾盂结石 B. 肾盏结石 C. 手术后复发结石

D. 手术后试拿结石 E. 鹿角形肾结石

[B型题]

A. 肾窦肾盂切开取石术 B. 肾部分切除术

C. 肾实质切开取石术 D. 肾切除术

16. 左肾巨大结石并重度积水，IVP示左肾不显影，右肾功能正常，应行 D

17. 一侧巨大鹿角形结石，功能尚可，应行 C

18. 肾内型肾盂结石，直径2cm大小，应行 A

19. 肾下盏多个0.5cm大小结石，应行 B

第五十七章 泌尿、男生殖系统肿瘤

[A型题]

1. 出现下列哪种情况时应最先考虑泌尿系肿瘤 B

A. 膀胱刺激症状 B. 无痛性肉眼血尿 C. 排尿困难

D. 尿失禁 E. 尿潴留

2. 肾盂癌最常见的病理类型是 C

A. 鳞癌 B. 腺癌 C. 移行上皮癌

D. 移行上皮乳头状瘤 E. 膀胱肉瘤

3. 对Ta、T1期膀胱肿瘤，膀胱内灌注治疗目前效果最好的是 A

A. BCG B. 丝裂霉素 C. 阿霉素 D. 羟喜树碱 E. 噻替派

4. 下列对阴茎癌的描述错误的是 C

A. 绝大多数发生于包茎的病人

B. HPV是致癌物

C. 常浸润尿道海绵体，影响排尿

D. 最常见的病理类型是乳头状瘤

E. 以手术治疗为主，辅以放疗和化疗

5. 关于肾母细胞瘤的描述正确的是 C

A. 发生于胚胎性肾组织，是上皮源性恶性肿瘤

B. 与正常的肾组织有明显界限

C. 是婴幼儿最常见的腹部肿瘤

D. 常侵入肾盂肾盏内

E. 多在5岁以后发病

[B型题]

A. 鳞癌 B. 腺癌 C. 移行细胞癌

D. 上皮和间质来源的恶性混合瘤 E. 肉瘤

6. 膀胱癌最常见的病理类型是 C

7. 肾盂癌最常见的病理类型是 C

8. 前列腺癌最常见的病理类型是 B

9. 阴茎癌最常见的病理类型是 A

10. 肾母细胞癌最常见的病理类型是 D

A. 经尿道膀胱肿瘤切除术 B. 膀胱部分切除术

C. 膀胱全切术 D. 膀胱内化疗药物灌注

E. 全身化疗和放疗

11. 膀胱原位癌细胞分化不良、癌旁原位癌或已有浸润者，最合适的治疗方案为 C

12. 分化良好的膀胱原位癌最合适的治疗方案为 D

13. 多发、侵犯三角区的T2、T3期膀胱癌最合适的治疗方案为 C

14. T4期膀胱癌最合适的治疗方案为 E

15. 多发的T1期膀胱癌，治疗后复发且恶性程度增高者，最合适的治疗方案为 C

第六十一章 骨折概论

1. 以下哪种骨折要求解剖复位 E
A. 股骨干骨折 B. 肱骨干骨折 C. 掌骨骨折
D. 腓骨骨折 E. 踝关节骨折
 2. 下列哪种情况骨折愈合快 B
A. 胫骨干中、下1/3骨折 B. 儿童骨折 C. 牵引过度
D. 软组织嵌入 E. 反复手法复位
 3. 男性, 16岁, 左小腿挫伤24小时, 疼痛加重, 左小腿肿胀, 胫前伤口与骨折处相通, 有出血, 组织皮肤有花纹, 足背动脉搏动稍弱, 足部感觉迟钝, 足趾被动屈伸剧痛, X线片示腓骨中段横行骨折, 应如何处理? C
A. 清创缝合伤口, 石膏固定 B. 加压包扎止血, 密切观察
C. 充分切开皮肤、深筋膜 D. 伤口放引流条, 小夹板固定
 4. 某人被重物砸伤, 双股骨干骨折, 住院2天, 突然意识丧失, 呼吸困难, 皮肤可见点状出血, 肢体末端紫红发凉, 可能是 E
A. 硬脑膜外血肿 B. 颅内血肿 C. 脑损伤
D. 坠积性肺炎 E. 脂肪栓塞
 5. 直立足跟中心着地, 在长管状骨干骺端坚质骨与松质骨交界处的骨折, 最容易发生哪类移位 C
A. 成角移位 B. 侧方移位 C. 缩短移位
D. 分离移位 E. 旋转移位
 6. 一耻骨骨折患者, 合并膀胱破裂, 检查所见: 耻骨骨折轻度移位, 骨折分类应属 E
A. 闭合骨折 B. 裂缝骨折 C. 压缩骨折
D. 骨骺分离 E. 开放骨折
 7. 骨折急救的主要方法是 A
A. 骨折固定 B. 骨折复位 C. 恢复功能
D. 解除疼痛 E. 消除肿胀
 8. 骨折后, 反复整复的最严重的并发症是 B
A. 骨折移位 B. 骨折不愈合 C. 骨折端刺破皮肤, 骨外露
D. 骨折延迟愈合 E. 皮肤坏死
 9. 骨折临床愈合后骨痂的改造塑形决定于 B
A. 外固定的牢固性
B. 肢体活动和体重所形成的应力
C. 局部血液供应的情况
D. 骨痂的多少
E. 是否很好地配合理疗、按摩及药物治疗
- [B型题]
- A. 胫神经损伤 B. 骨筋膜室综合征 C. 腓总神经损伤
D. 动脉损伤 E. 股神经损伤
 10. 男性, 18岁, 左小腿上段外侧撞伤, 膝和膝下肿胀, 软组织裂伤, 膝轻度外翻畸形, 右足下垂。最可能的诊断为 C
11. 女性, 30岁, 墙倒砸伤右小腿6小时, 患肢严重肿胀, 发亮, 趾甲苍白, 足背动脉摸不到, 足趾半屈曲位, 牵引时剧痛。最可能的诊断为 B
A. 压缩性骨折 B. 撕脱性骨折 C. 病理性骨折
D. 疲劳骨折 E. 开放性骨折
 12. 肌肉拉力可发生 B
13. 骨组织疾患有时可发生 C
14. 积累性劳损可引起 D

第六十二章 上肢骨、关节损伤

[A型题]

1. 锁骨中断中段骨折后，由于——牵拉，使骨折近端可向上、后移位，远折端则由于重力作用，向前、下移位。 B
A. 斜方肌 B. 胸锁乳突肌 C. 胸大肌
D. 以上都是 E. 以上都不是
2. 以下哪一项不属于肩关节后脱位? C
A. 肩峰下脱位 B. 冈下脱位 C. 喙突下脱位
D. 孟下脱位 E. 以上都不是

[B型题]

- A. 被动活动正常，主动活动不能 B. 主动和被动活动都不能
C. 主动和被动活动均部分障碍 D. 主动活动不能，被动活动部分障碍
E. 主动活动部分障碍，被动活动不能
3. 神经麻痹或肌肉肌腱断裂可出现 A
4. 关节强直可出现 B
5. 关节僵硬可出现 C

第六十四章 下肢骨、关节损伤

[A型题]

1. 股骨头的血供主要来自 B
A. 干骺端上侧动脉 B. 髂外侧动脉 C. 干骺端下侧动脉
D. 圆韧带小凹动脉 E. 滋养动脉
2. 膝关节外侧副韧带损伤会出现 A
A. 侧方应力试验(+) B. 抽屉试验(+) C. 轴移试验(+)
D. 研磨试验(+) E. 麦氏试验(十)

[B型题]

- A. 患肢轴向叩击痛、外旋畸形 $45^{\circ}\sim 60^{\circ}$
B. 患肢轴向叩击痛，外旋畸形 90°
C. 患肢呈屈曲、内收、内旋畸形
D. 患肢呈外展、外旋、屈曲畸形
E. 患肢轴向叩击痛，内旋畸形 $45^{\circ}\sim 60^{\circ}$
3. 股骨颈骨折，会出现 A
4. 股骨粗隆间骨折，会出现 B
5. 髋关节后脱位，会出现 C
6. 髋关节前脱位，会出现 D
A. 侧方应力试验(+) B. 抽屉试验(+) C. Frment征(十)
D. 过伸试验(+) E. Mills征(+)
7. 膝关节侧副韧带损伤会出现 A
8. 前交叉韧带损伤会出现 B
9. 半月板损伤会出现 D

第六十五章 脊柱和骨盆骨折

[A型题]

1. 脊椎骨折病人在搬运过程中最正确的体位是 C
A. 侧卧位 B. 仰卧屈曲位 C. 仰卧过伸位
D. 俯卧过伸位 E. 半坐卧位
2. 关于脊柱外伤与脊髓外伤的关系，哪项是错误的? B
A. 脊髓损伤节段与椎体受伤平面不一致
B. 胸椎较固定，所以胸椎骨折脱位多有脊髓伤
C. 有的病例表现为亚脊髓损伤，但X线却无骨折脱位

- D. 屈曲型骨折脱位造成脊髓损伤最多见
- E. 椎管狭窄者，脊柱创伤更易发生脊髓损伤
- 3. 对于骨盆骨折合并尿道损伤及失血性休克的处理顺序是 B
- A. 骨盆骨折—尿道损伤—休克
- B. 休克—尿道损伤—骨盆骨折
- C. 休克—骨盆骨折—尿道损伤
- D. 尿道损伤—休克—骨盆骨折
- E. 同时处理尿道损伤和休克—骨盆骨折

[B型题]

- A. y轴轴向牵拉伴x轴旋转 B. x轴上旋转力量
- C. y轴的轴向压缩 D. y轴轴向压缩伴顺或逆时针旋转
- E. y轴上旋转力量
- 4. 单纯楔形压缩性骨折暴力来自 B
- 5. 稳定性爆破型骨折暴力来自 C
- 6. 不稳定性爆破型骨折暴力来自 D
- 7. Chance骨折暴力来自 A
- A. 弛缓性瘫痪，数分钟或数小时内完全恢复
- B. 四肢瘫痪，下肢瘫痪重于上肢瘫痪
- C. 四肢瘫痪，上肢瘫痪重于下肢瘫痪
- D. 同侧肢体运动及深感觉消失，对侧肢体痛温觉丧失
- E. 同侧肢体痛觉消失，对侧肢体运动及深感觉消失
- 8. 脊髓半切征表现为 D
- 9. 脊髓前综合征表现为 B
- 10. 脊髓中央管周围综合征表现为 C
- 11. 脊髓震荡表现为 A

第六十七章 运动系统慢性损伤

[A型题]

- 1. 下列运动系统慢性损伤的病因中，哪一项是错误的 A
- A. 有明显的外伤史
- B. 局部有畸形时，增加了局部应力
- C. 工作姿势不正确
- D. 慢性病或退行性变，降低了对应力的适应能力
- E. 长期伏案工作
- 2. 腰肌劳损的临床表现中，哪一项是错误的? D
- A. 无明显诱因的慢性疼痛
- B. 单侧或双侧的骶棘肌痉挛征
- C. 对固定的压痛点进行叩击，疼痛反可减轻
- D. 坐骨神经行径区域压痛
- E. 疼痛经休息后可缓解，但卧床过久又感不适
- 3. 关于肩周炎，哪一项是错误的? A
- A. 男性多于女性，多为中老年患者
- B. 病程长者X线片可见肩部骨质疏松
- C. 肩关节以外展、外旋、后伸受限最明显
- D. 肩部某一部分疼痛，与动作、姿势有明显关系
- E. 体检可有三角肌轻度萎缩，斜方肌痉挛
- 4. 肩周炎的自愈时间，一般是 B
- A. 两年 B. 一年 C. 六个月
- D. 三个月 E. 八至九个月
- 5. 狭窄性腱鞘炎的病因，下列哪一项是错误的 E
- A. 手指长期快速活动 B. 手指长期用力活动
- C. 先天性肌腱异常 D. 类风湿性关节炎

- E. 好发于网球运动员
6. 在各个手指中，弹响指的发病频度最多的是 A
- A. 中、环指 B. 拇、食指 C. 环、小指
- D. 拇指 E. 食指

[B型题]

- A. Finkelstein试验阳性 B. Mills征 C. Phalen征
- D. Spurling征 E. Tinel征
7. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎可有 A
8. 肱骨外上髁炎可有 B
9. 梨状肌综合征可有 E

第六十九章 骨与关节化脓性感染

[A型题]

1. 急性血源性骨髓炎自然病程可以维持 D
- A. 2周 B. 6周 C. 8周 D. 3~4周 E. 2~3周
2. 急性血源性骨髓炎最常见的发病群体为 A
- A. 儿童 B. 青少年 C. 中老年 D. 老年 E. 中青年
3. 急性血源性骨髓炎在出现x线片改变后，若全身及局部症状消失，抗生素应继续应用至少多长时间 B
- A. 4周 B. 3周 C. 2周 D. 1周 E. 5周
4. 以下哪一种情况可诊断为慢性骨髓炎 E
- A. 急性骨髓炎消退后1周 B. 急性骨髓炎消退后2周
- C. 急性骨髓炎消退后3周 D. 急性骨髓炎消退后4周
- E. 急性骨髓炎消退后，有死骨、窦道或死腔形成
5. 急性血源性骨髓炎的病理特点为 E
- A. 死骨形成为主 B. 骨质增生为主 C. 大量脓液形成
- D. 骨质增生与骨质破坏同时存在 E. 骨质破坏与坏死为主
6. 慢性骨髓炎的手术指征是 A
- A. 有死骨形成，有死腔及窦道流脓者
- B. 有大量骨膜反应
- C. 反复发热
- D. 局部骨质硬化
- E. 局部肿胀明显
7. 小儿急性化脓性骨髓炎，脓液进入关节腔继发化脓性关节炎，可能发生在 E
- A. 肩关节 B. 肘关节 C. 腕关节
- D. 膝关节 E. 髋关节

[B型题]

- A. 破坏与坏死为主 B. 反应性新骨形成 C. 骨膜反应
- D. 骨膜下脓肿 E. 死骨、窦道、死腔形成
8. 急性血源性骨髓炎早期会出现 A
9. 急性血源性骨髓炎后期会出现 B
10. 慢性骨髓炎会出现 E
- A. 金黄色葡萄球菌 B. 白色葡萄球菌 C. 溶血性链球菌
- D. 大肠杆菌 E. 绿脓杆菌
11. 急性血源性骨髓炎的主要致病菌是 A
12. 慢性血源性骨髓炎的主要致病菌是 A

第七十章 骨与关节结核

[A型题]

1. 脊柱结核易发生于 C
A. 颈椎 B. 胸椎 C. 腰椎 D. 骶尾骨 E. 胸腰椎
2. 全关节结核是 A
A. 关节软骨、骨端及滑膜均受累
B. 骨组织破坏严重
C. 关节的全部滑膜组织有结核病变
D. 关节腔内积液增多并混浊
E. 关节软骨受累
3. 患腰椎结核时，寒性脓肿流注的部位，下列哪项是错误的 D
A. 腰大肌 B. 髂窝 C. 腰三角
D. 季肋部 E. 腹股沟
4. 确诊膝关节结核，下列哪项最可靠 A
A. 滑膜活检
B. X线示膝关节有骨质疏松
C. 低热、盗汗、纳差
D. 血沉加快
E. MRI

[B型题]

- A. 胸椎结核 B. 腰椎结核 C. 颈椎结核
D. 髋关节结核 E. 膝关节结核
5. 腰大肌脓肿，髋关节伸直受限见于 B
6. 跛行，髋关节活动受限，膝部疼痛见于 D

第七十三章 骨肿瘤

[A型题]

1. 单纯使用根治手术切除治疗骨肉瘤，5年存活率不变，其主要原因是 C
A. 早期髓腔内广泛蔓延 B. 早期淋巴管内瘤核形成
B. 早期血液中发现瘤细胞 D. 早期广泛侵犯软组织
E. 多见于年轻人
2. 在骨转移肿瘤中，下列原发病灶哪种最常见 A
A. 乳腺癌 B. 前列腺癌 C. 肾癌
D. 膀胱癌 E. 甲状腺癌
3. 脊柱肿瘤可出现 A
A. 椎体破坏和压缩畸形 B. 椎间隙狭窄
C. 两者均有 D. 两者均无
4. 有关肿瘤的临床表现，下列哪项是正确的 B
A. 骨肿瘤的发现统统在损伤之后
B. 疼痛剧烈而持久时，需考虑肿瘤是恶性
C. 局部肿胀是另一个症状
D. 肿瘤近关节活动功能将受限制
E. 脊柱肿瘤可压迫脊髓而瘫痪
5. 原发性恶性骨肿瘤的主要转移方式是 B
A. 通过小动脉 B. 通过小静脉 C. 通过淋巴管
D. 沿神经干传播 E. 直接局部蔓延
6. 恶性肿瘤诊断最主要的依据是 E
A. 病程发展快 B. 明显体征 C. 有关化验检查
D. X线、同位素检查 E. 病理组织学检查
7. 判断骨髓瘤下列哪项是错误的 E
A. 尿中本周蛋白阳性，血沉高达100mm/h

- B. 骨髓穿刺可确诊
 - C. 常呈多发性，偶见单发，多出现病理性骨折
 - D. X线摄片示圆形穿凿型溶骨性缺损，周围无反应性新骨
 - E. 多见于年轻人
8. 最常见的良性骨肿瘤有 B
- A. 骨髓瘤 B. 骨软骨瘤 C. 骨巨细胞瘤
 - D. 骨囊肿 E. 骨肿瘤
9. 良性肿瘤X线片的特点是 A
- A. 边缘清楚，无骨膜反应 B. 骨质破坏
 - C. 边缘不清楚，骨质破坏，骨膜反应明显
 - D. 可见Codman三角 E. 呈多处虫蚀状
10. 恶性肿瘤X线片的特点是 A
- A. 边缘不清楚，骨质破坏，骨膜反应明显
 - B. 边缘清楚，骨质破坏，骨膜反应明显
 - C. 边缘不清楚，骨质破坏，无骨膜反应
 - D. 边缘不清楚
 - E. 边缘清楚，骨质增生，无骨膜反应
10. 尤文肉瘤主要来源于 D
- A. 成骨细胞 B. 成纤维细胞 C. 成软骨细胞
 - D. 间充质细胞 E. 破骨细胞
- [B型题]
- A. X线片示：骨端膨胀性溶骨性破坏
 - B. X线片示：短骨膨胀，有蜂窝状骨吸收区夹杂钙化斑块
 - C. X线片示：干骺端骨破坏和日光射线现象，有Codman三角
 - D. X线片示：骨膜板层状或“葱皮状”反应性骨形成和骨破坏
 - E. X线片示：长骨干骺端突出的病损
12. 骨软骨瘤 E
13. 骨肉瘤 C
- A. 上颌骨和下颌骨 B. 手和足的管状骨
 - C. 骶尾椎和颅底蝶枕骨 D. 股骨下端和胫骨上端
 - E. 好发于下肢长骨骨干
14. 骨瘤好发于 A
15. 软骨肉瘤好发于 E
- A. 骨干 B. 骨干骺端 C. 骨髓
 - D. 骨端 E. 骨髓
16. 骨巨细胞瘤好发于 D
11. 骨软骨瘤好发于 B
- A. 临床表现 B. K线摄片 C. 血管造影
 - D. 组织活检 E. 血碱性磷酸酶的测定
18. 确诊骨肉瘤的根据是 D
- A. 放疗 B. 化疗 C. 手术治疗
 - D. 放疗加手术治疗 E. 化疗加手术治疗
19. 骨髓瘤可采用 B
20. 骨肉瘤可采用 E
21. 骨转移瘤可采用 D
- A. 骨组织肿瘤 B. 软骨组织肿瘤 C. 纤维组织肿瘤
 - D. 骨髓瘤 E. 滑膜肉瘤
22. 滑膜骨软骨瘤属于 E
23. Gardner综合征属于 A
24. Oldker综合征属于 B
25. 骨组织细胞肉瘤属于 D
26. Mafflucci综合征属于 B

外科学病案分析及参考答案

病案分析

试题编号：1

病例摘要：

男性，40岁，上腹部隐痛2月，黑便1周。2月前开始出现上腹部隐痛不适，进食后明显，伴饱胀感，食欲逐渐下降，无明显恶心，呕吐及呕血，自服胃药斯达舒胶囊，稍好转。近半月自觉乏力，消瘦，体重较2月前下降3公斤。近日大便色黑。来我院就诊，大便潜血(+)，血Hb90g/L，为进一步诊治收入院。

既往：无消化道疾病史。

查体：一般状况尚可，浅表淋巴结未及肿大，皮肤无黄染，结膜、口唇苍白，心肺未见异常，腹平坦，未见胃肠型及蠕动波，腹软，肝脾未及，腹部未及包块，剑突下深压痛，移动性浊音(-)，肠鸣音正常。辅助检查：上消化道造影示：胃窦小弯侧可见约2.5cm大小龛影，位于胃轮廓内，周围粘膜僵硬粗糙，腹部B超检查肝脾未见肝异常。

要求：根据以上病史摘要，请将：诊断及诊断依据；鉴别诊断；进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：12分钟

评分要点：一、诊断及诊断依据：8分

(一)诊断 1. 胃癌。 2. 失血性贫血。

(二)诊断依据 1. 腹痛、黑便、食欲下降、乏力、消瘦。 2. 结膜苍白，剑突下深压痛。

3. 上消化道造影所见。 4. 大便潜血(+)，血Hb90g/L。

二、鉴别诊断：1. 消化性溃疡。 2. 胃炎。

三、进一步检查：1. 胃镜检查，组织病理检查。 2. 放射线检查：CT、胸部X片。

四、治疗原则：3分 1. 胃癌根治术加化疗。 2. 支持疗法、对症治疗。

试题编号：2

女性，64岁，间歇腹胀、停止排便、排气伴腹痛2个月，加重5天急诊入院。

患者2个多月来，无明显诱因间歇发作腹胀腹痛，停止排便，每次发作持续一周左右，经服药和对症治疗或输液后尚可缓解。5天前起，再次发作，上述症状加重，服药无效，且较前加重，近日不排便，不排气，呕吐一次，呕吐为胃内容物，不能进食。发病以来，乏力，消瘦，无明显发热。既往无结核及手术史。

查体：T 37.4℃，P 70次/分，R 20次/分，BP 140/90mmHg慢性病容，神清，皮肤稍松弛，弹性尚可，浅表淋巴结未触及，巩膜无黄染。心肺检查未见异常。全腹明显膨隆，未见胃肠型，叩鼓，肝脾未触及，全腹部轻度压痛，无肌紧张。左下腹深部隐约可及包块，约5cm直径大小，实性感，包块轻度压痛。移动性浊音(-)，肠鸣音活跃。

辅助检查：Hb 130g/L，WBC 5.3×10⁹/L

x线腹平片：右上腹可见液气平面。

要求：根据以上病史摘要，请将：诊断及诊断依据；鉴别诊断；进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：12分钟

评分要点：一、诊断及诊断依据：

(一)诊断 1. 肠梗阻(不全性)。 2. 左半结肠癌可能性大。

(二)诊断依据 1. 腹痛腹胀，停止排便排气，呕吐。 2. 全腹膨隆，左下腹包块，肠鸣音活跃。 3. 腹平片可见液气平面，提示肠梗阻。

二、鉴别诊断： 1. 肠扭转。 2. 乙状结肠扭转。 3. 肠结核。

三、进一步检查 1. 腹部B超。 2. 钡剂灌肠造影。 3. 纤维结肠镜检查。

四、治疗原则： 1. 胃肠减压，输液，低张灌肠。 2. 开腹探查：肿瘤切除，肠道重建。

试题编号：3

病例摘要：

男性，10岁，外伤后右肘肿痛，活动受限一小时。患儿一小时前奔跑中向前跌倒，手掌着地后，诉右肘部痛，不敢活动右上肢。遂来急诊就医。

急诊室检查：尚能合作。右肘向后突出处于半屈曲位。肘部肿胀，有皮下瘀斑。局部压痛明显，有轴心挤压痛。肘前方可及骨折近端，肘后三角关系正常。右挠动脉搏动稍弱，右手感觉运动正常。

要求：根据以上病史摘要，请将：诊断及诊断依据；鉴别诊断；进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：12分钟

评分要点：一、诊断及诊断依据

(一)诊断 右肱骨髁上骨折(伸直型)。

(二)诊断依据 1. 典型受伤机制。2. 局部压痛及轴向挤压痛，并触及骨折近端。

3. 肘后三角关系正常。

二、鉴别诊断：肘关节后脱位。

三、进一步检查：右肘侧位x线片，明确诊断。

四、治疗原则：手法复位

试题编号：4

男性，24岁，工人，高处坠地后呼吸困难20分钟。患者20分钟前工作时从3米高处坠地，左侧胸先着落于地面的砖上，出现呼吸困难，被急送入院。

既往体健，无特殊可载查体：T36.5℃，P148次/分，R40次/分，Bp80/50mmHg。神清合作，痛苦状，呼吸急促，伴口唇青紫，颈静脉怒张不明显。气管移向右侧，左胸廓饱满，呼吸运动较右胸弱。左胸壁有骨擦音(第4、5肋)局部压痛明显。上自颈部、胸部直至上腹部均可触及皮下气肿。左胸叩鼓，呼吸音消失，右肺呼吸音较粗，未闻及啰音。左心界叩诊不清，心律整，心率130次/分，心音较弱，未闻及杂音。腹部平软，无压痛肌紧张，肝脾未及，肠鸣音正常，下肢无浮肿，四肢活动正常，未引出病理反射。

要求：根据以上病史摘要，请将：诊断及诊断依据；鉴别诊断；进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：12分钟

评分要点：一、诊断及诊断依据：

(一)诊断 1. 张力性气胸(左侧)。2. 外伤性休克。3. 多根肋骨骨折。

(二)诊断依据 1. 外伤性休克(胸外伤史，BP80/50mmHg)。

2. 多根肋骨骨折(左胸肋有骨擦音，局限性压痛明显)。

3. 张力性气胸(外伤性肋骨骨折，休克，进行性呼吸困难，青紫，广泛性皮下气肿，气管右移，左胸叩鼓，呼吸音消失)。

二、鉴别诊断：1. 闭合性气胸(多半无紫绀，休克等)。

2. 心包压塞(无颈静脉怒张，无舒张压上升，脉压差缩小等)。

3. 血胸(无胸腔积液体征，如伤侧胸部叩浊等)。

4. 多根多处肋骨骨折(无浮动胸壁，无反常呼吸等)。

三、进一步检查：1. 胸穿。(2分) 2. 胸片正侧位。(1分)

3. EKG,持续监测血压及其它生命体征，血气分析等。(1分)

四、治疗原则：3分

1. 纠正休克，输血输液，保证呼吸道通畅，吸氧。(1分)

2. 胸腔穿刺、闭式引流，必要时开胸探查。(1分)

3. 抗生素防治感染，对症治疗：镇痛、固定胸廓。(1分)

试题编号：5

男性，57岁。左季肋部被汽车撞伤5小时，口渴、心悸、头晕1小时。患者5小时前被汽车撞中左季肋部，当时疼痛剧烈，即至医院就诊。诊断为左胸肋骨骨折，卧床休息和局部固定后感觉好转，1小时前觉全腹疼痛腹胀，伴头晕、心悸，口渴、烦躁。

查体：T37.0℃，P110次/分，Bp92/60mmHg。神清，面色苍白，心肺(-)左季肋部皮下瘀斑，压痛。腹稍胀，全腹有明显压痛，以左上腹为著，肌紧张不明显，但有明显反跳痛，移动性浊音(±)，肠鸣

音可闻，弱。

化验：Hb 80g/L，WBC 90×10⁹/L。

要求：根据以上病史摘要，请将：诊断及诊断依据；鉴别诊断；进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：12分钟

评分要点：一、诊断及诊断依据：

(一)诊断 1. 脾破裂，腹腔内出血。2. 左胸肋骨骨折。

(二)诊断依据 1. 左季肋部外伤史，胸片证实肋骨骨折。

2. 腹痛遍及全腹，伴有失血症状，腹腔内出血体征。

二、鉴别诊断：1. 单纯肋骨骨折及软组织挫伤。

2. 其他腹腔脏器损伤：肝、小肠。3. 血胸。

三、进一步检查 1. 腹部B超，腹部平片。2. 胸片。3. 腹腔穿刺。

四、治疗原则：1. 严密观察病情，防止休克，必要时输血。

2. 开腹探查：脾切除。3. 条件许可对缝合裂口或脾部分切除术。

试题编号：6

男性，26岁，腹痛、腹泻、发热10小时。患者于10小时前，出现下腹部不适，呈阵发性并伴有恶心，呕吐，呕吐物为胃内容物，自服黄连素和吗叮啉，未见好转，腹痛由胃部移至右下腹部并出现发热（自测体温38.5℃）及腹泻数次，为稀便，无脓血便，来我院急诊，查便常规阴性，查血象WBC18×10⁹/L，急收入院。

既往体健，无肝肾病史，无结核及疫水接触史，无药物过敏史。

查体：T 38.7℃，P 120次/分，BP 110/70mmHg。发育营养正常，全身皮肤无黄染，无出血点及皮疹，浅表淋巴结不大，眼睑无浮肿，结膜无苍白，巩膜无黄染，颈软，医学全在线网站提供甲状腺不大，心界大小正常，心率120次/分，律齐，未闻及杂音。双肺呼吸音清，未闻干湿啰音，腹平，肝脾未及，无包块。全腹压痛以右下腹麦氏点周围为著，无明显肌紧张及反跳痛，肠鸣音亢进：10—15次/分。

辅助检查：Hb 162g/L，WBC 25×10⁹/L，中性分叶85%，杆状9%，尿常规(—)。粪便常规：稀水样便，WBC3~5/高倍，RBC0~2/高倍，肝功能正常。

要求：根据以上病史摘要，请将：诊断及诊断依据；鉴别诊断；进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：12分钟

评分要点：一、诊断及诊断依据：

(一)诊断 1. 急性阑尾炎。2. 局限性腹膜炎。

(二)诊断依据 1. 转移性右下腹痛。2. 右下腹固定压痛。3. 发热，白细胞增高。

二、鉴别诊断：1. 急性胃肠炎、菌痢。2. 尿路结石感染。

三、进一步检查：1. 腹部B超。2. 腹部X光片 3. 复查粪便常规，血常规。

四、治疗原则：1. 阑尾切除术。2. 抗感染治疗。

试题编号：7

女性，55岁，右上腹持续疼痛一周，加重伴发热一天。患者一周前进食油腻食物后出现右上腹隐痛，未予治疗，昨天中午吃煎鸡蛋后上述症状开始加剧，疼痛向右侧腰背部放射，伴恶心，未吐。发热38度左右，无畏寒，寒战。大便稀，无脓血。小便正常。既往无心肺疾患，无肝胆病史。

查体：T 38.5℃，P 90次/分，R 18次/分，BP 120/90mmHg。急性病容，表情痛苦，皮肤巩膜无黄染，锁骨上淋巴结未及肿大。心肺检查未见异常。腹部未见胃肠型，右上腹局限性肌紧张，右肋下可及约5cm直径大小之包块边缘，触痛，Murphy征(+)。肝脾未及，腹部叩呈鼓音，移动性浊音(-)，肠鸣音较弱。

辅助检查：Hb 120g/L，WBC 16.2×10⁹/L，N 89%。

要求：根据以上病史摘要，请将：诊断及诊断依据；鉴别诊断；进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

时间：12分钟

评分要点：一、诊断及诊断依据：

(一)诊断 急性胆囊炎。

(二)诊断依据 1. 发作性右上腹痛，向同侧腰背部放射，伴发热。

2. 右肋下可及压痛之包块，局限性肌紧张，Murphy征(+)。

3. WBC上升，中性粒细胞增高。

二、鉴别诊断：1. 胃扩张，胃炎或穿孔。2. 肝脓肿。3. 急性胰腺炎。
三、进一步检查1. 腹告知B超、CT。2. 血尿淀粉酶，肝功能。3. 腹部立位x线片。
四、治疗原则：1. 抗感染，利胆治疗。2. 开腹探查：胆囊切除术。3. 对症治疗。

试题编号：8

女性，40岁，反复右上腹疼痛10年，再发伴有寒热黄疸、神志不清5天入院。查体：T：39.8℃，P：120bpm，
R：30bpm、BP：10.6/6.6kPa（80/50mmHg），皮肤巩膜黄染明显，浅表淋巴结不肿大，腹部稍胀，右上腹及剑突下有明显压痛，Murphys（+），肠鸣音3—4次/分。

问：1、诊断考虑什么？2、该做哪些进一步检查？3、治疗方案及原则。

答：1、诊断：急性化脓性胆管炎（AOSC）

2、基本检查：血、尿常规，血、尿淀粉酶，电解质，胆道胰腺B超，心电图。

3、治疗方案：（1）积极抗休克抗感染治疗；（2）紧急手术去除病因。

原则：手术的目的是抢救生命，因此应力求简单有效，通常采用的是胆总管切开减压，T管引流。

试题编号：9

女性，48岁，间歇性右上腹痛3月，疼痛向右肩部放射，伴恶心、嗝气，无畏寒、发热，无皮肤巩膜黄染。曾行胃镜，示“浅表性胃炎”。近2日再次出现右上腹痛，向右肩放射，伴有畏寒、发热。体检：T：38℃，P：90bpm，BP：14/9kPa。皮肤巩膜黄染，上腹肌紧张，剑突下压痛，肝区叩痛。WBC：
15×10⁹/L，N：83%。

问：1、初步诊断如何？2、需做哪些进一步检查？3、应如何治疗？

答：1、初步诊断：（1）胆总管结石、急性胆管炎；（2）胆囊结石

2、B超，了解肝、胆情况，尤其是胆囊有无结石及结石大小，注意检查胆总管结石。

3、治疗原则：（1）非手术治疗，包括解痉、纠正水电解质及酸碱平衡紊乱，使用有效抗生素控制感染，使用维生素K、维生素C以及护肝治疗；（2）如局部炎症和全身感染加重，非手术治疗无效，则可行胆囊切除、胆总管探查取石、T管引流。

试题编号：10

患者男，45岁，呕血2日入院。患者近1年来有腹胀、厌油。3天来，饮酒、食硬后出现呕血，前后共2次，量约800ml。血压15/12kPa，贫血貌，前胸有5枚蜘蛛痣，肝未触及，脾大。腹水（±）。HB：94g/L，RBC：3.5×10⁹/L，PLT：4.8×10⁹/L，ALT：68U/L，AST：66U/L，γ-GT：35mmol/L，ALB：30g/L，GLB：35g/L，HbsAg（+）。B超：肝缩小，门静脉内径16mm，脾肿大。食道吞钡检查：钡剂充盈时食道呈虫蛀样改变；排空时，呈串珠样改变。

问：1、请作出初步诊断并提出诊断依据。2、简述该疾病常见的临床表现。

3、简述该疾病的治疗原则。

答：1、初步诊断：门静脉高压症并食道、胃底静脉曲张破裂出血。

诊断依据：（1）中年男性患者；（2）症状主要为呕血；（3）腹胀、厌油及HbsAg（+）肝功能损害提示患有乙肝肝硬化；（4）B超示：肝缩小、脾肿大、门静脉扩张；（5）食道吞钡检查提示食道静脉曲张。以上均提示“门静脉高压症并食道、胃底静脉曲张破裂出血”。

2、门脉高压症的主要表现：脾肿大、脾功能亢进、呕血和腹水。

3、治疗原则：（1）非手术治疗：包括输液、输血，使用垂体加压素，三腔管压迫止血，护肝治疗；（2）病情稳定后行积极手术治疗，该患者Childs分级属B级，可行断流术。

试题编号：11

患者，男，68岁，因“反复上腹疼痛半年，身目黄染，皮肤瘙痒及尿黄2周”入院。体检：全身皮肤、巩膜重度黄染，腹肌软，上腹正中偏右有深压痛，无反跳痛，肝胆肋下均可触及肿大，腹水征（-）。辅助检查：尿胆红素（++），尿胆原（-），Hb：106g/L，TB：276μmol/L，DB：140μmol/L，ALB：30g/L，AKP：750U/L，GGT：1230U/L，血糖4.5mmol/L，CEA（+），CA199：2530U/L。B超及CT提示胆囊明显增大，肝内外胆管扩张，胰头见2.0×2.0cm肿块，PTC检查示：肝内外胆管明显扩张，胆总管下段中断，管壁僵硬。

问：1、请作出诊断并提出诊断依据。2、治疗措施如何。

答：1、初步诊断：（1）阻塞性黄疸：胰头癌；（2）轻度贫血；（3）低白蛋白血症。

诊断依据：（1）老年男性；（2）不明原因上腹痛伴消瘦、进行性黄疸；（3）体检发现皮肤巩膜重度黄染，肝脏、胆囊增大；（4）辅助检查提示梗阻性黄疸、血红蛋白、白蛋白下降；（5）B超、CT发现胰头肿块，PTC发现胆总管下段梗阻。

2、治疗措施：（1）先行PTCD减黄；（2）改善患者全身一般情况，纠正贫血和低蛋白血症；（3）限期行手术治疗，可行Whipple术，术后行放疗、化疗、免疫治疗等。

试题编号：12

女，49岁，右上腹疼痛伴发热黄疸2天入院。查体：T：39℃，脉搏138次/分，BP：9/6kPa。巩膜黄染，右上腹肌紧张，有压痛。B超显示胆总管有一枚直径约1.5cm的结石。

问：1、请作出初步诊断。2、何为“Charcot三联症”。3、该患者应如何进行治疗。

答：1、诊断：急性梗阻性化脓性胆管炎。

2、Charcot三联症：腹痛、发热、黄疸。

3、治疗：（1）行积极抗休克治疗：补液、纠正水电解质酸碱平衡紊乱；（2）行积极抗感染治疗；（3）全身情况转好后及时手术；（4）如抗休克治疗病情未见好转，则在予以组两有效抗生素、肾上腺皮质激素的同时进行手术。

试题编号：13

女性，30岁，6天前脐周隐痛，伴恶心，1天后右下腹持续性疼痛。近3天发热，38-39℃，腹胀，3天未排大便。检查：右下腹压痛、反跳痛和腹肌紧张，并可扪及一个约鸡蛋大小，边界不清，伴压痛的包块。血WBC：20.5×10⁹/L。

问：1、请作出最可能的诊断和依据。2、进一步需要哪些检查？

3、请简述该患者的治疗方案

答：1、诊断：急性阑尾炎合并阑尾周围脓肿，

诊断依据：（1）转移性右下腹痛；（2）近3天发热，38-39℃；（3）右下腹压痛、反跳痛和腹肌紧张；（4）右下腹扪及一个约鸡蛋大小，边界不清，伴压痛的包块；（5）血WBC：20.5×10⁹/L。

2、可通过B超进一步明确。

3、治疗要点：暂时保守治疗，加强抗感染，全身支持及对证治疗，促进脓肿消退吸收。如脓肿无局限趋势，则行脓肿切开引流。

试题编号：14

男，34岁，急性化脓性阑尾炎伴局限性腹膜炎，行阑尾切除术后5天仍右腹痛腹胀发热，大便次数4—5次/天，有下坠感。WBC：18×10⁹/L。

问：1、该患者最可能的诊断是什么？

2、请简述诊断该患者疾病最快速直接的检查和进一步的检查。

3、该患者应如何治疗？

答：1、该患者诊断为术后盆腔脓肿。

2、最直接快速的检查是直肠指检，可进一步行B超明确诊断。

3、治疗：加强抗感染和全身支持治疗，并行经直肠脓肿切开引流术。

试题编号：15

男性，30岁，腹痛4小时急诊入院。5小时前进食过量，饮酒后感上腹部不适，4小时前剑突下突发剧痛，伴恶心、呕吐胃内容物数次，3小时前腹痛蔓延至右侧中、下腹部。患者因疼痛腹部拒按，烦躁不安，出冷汗。急诊查体：腹平坦，广泛肌紧张，剑突下及右中、下腹部压痛明显，剑突下最著，肠鸣音偶闻，为进一步诊治经急诊入院。既往间断上腹痛8年，饥饿时明显，未经系统诊治。

查体：T37.6℃，P104次/分，R24次/分，BP90/60mmHg。急性痛苦面容，烦躁，心肺检查未见明显病变，腹平坦，未见胃肠型及蠕动波，广泛腹肌紧张，剑突下区域及右侧中、下腹部压痛，反跳痛明显，剑突下最著，肝、脾未及，Murphy征(-)，移动性浊音(-)。肠鸣音偶闻，直肠指检未及异常

辅助检查：急查血WBC11×10⁹/L，Hb 140g/L；血淀粉酶96u(对照32u)。

一、诊断及诊断依据

(一)诊断 胃十二指肠溃疡穿孔(弥漫性腹膜炎)

- (二)诊断依据 1.突然上腹部剧痛,伴腹膜刺激征 2.十二指肠溃疡病史
- 二、鉴别诊断 1.胆囊炎,胆囊结石急性发作 2.急性胰腺炎 3.急性胃肠炎
- 4.急性阑尾炎
- 三、进一步检查 1.立位腹部平片 2.B 超检查 3.重复血尿淀粉酶测定
- 四、治疗原则 1.禁食,胃肠减压,作好术前准备 2.开腹手术:穿孔修补术

参考试卷

一、单选题20% (共20题, 每题1分)

- 1、采用非手术的方法治疗上尿路结石时,一般要求结石应B
- A、<0.4cm B、<0.6cm D、<1.0cm C、<0.8cm E、<2.0cm
- 2、上尿路结石的临床表现主要是:A
- A、与活动有关的疼痛和血尿 B、与活动无关的疼痛和血尿
- C、与活动有关的尿频、尿急、尿痛 D、腰痛和无尿
- E、腰痛、发热
- 3、开放性气胸是指:B
- A、胸壁上有未清创缝合的伤口B、胸膜腔持续与外界相通
- C、胸膜腔暂时与外界相通 D、胸部损伤后胸膜腔内气体存留
- E、肺组织和胸壁同时损伤
- 4、肾盂癌的手术切除范围是:C
- A、肾盂病变部分 B、全肾切除 C、全肾和输尿管上段
- D、全肾和输尿管中段 E、全肾和输尿管全长
- 5、体外循环过程中需要进行血液稀释,一般要求HCT达到的值为:C
- A、10%以下 B、10%~15% C、20%~25% D、30%~35% E、35%以上
- 6、关于肺动脉瓣膜狭窄患者的心脏杂音特点,不正确的是?E
- A、位于胸骨左缘第二肋间 B、杂音性质响亮而粗糙伴有收缩期震颤。
- C、为中早期喷射性杂音 D、肺动脉第二音减弱或消失
- E、肺动脉瓣第二心音亢进
- 7、颅腔内容物容积最大可代偿:A
- A、5% B、8% D、15% C、10% E、20%
- 8、颅内血肿按症状出现时间分为3型,亚急性型为:C
- A、24h以内 B、72h以内 C、三周内 D、超过三周 E、两个月内
- 9、男,16岁。低热2个月,胸椎后突畸形,X线片示T₁₂椎体破坏,椎体压缩成楔型,椎弓根阴影仍清晰可见;红细胞沉降率增快,最可能的诊断是:
- A、压缩性骨折 B、脊椎结核 C、脊椎肿瘤 D、化脓性脊椎炎 E、先天性脊柱畸形
- 10、腹外疝致死的主要原因是:A
- A、绞窄疝未及时治疗,引起肠梗阻、腹膜炎 B、腹内脏器构成疝囊壁的一部分,难还纳
- C、腹股沟疝的临床症状常不典型,易误诊 D、疝囊单纯高位结扎术造成
- E、巨大疝的疝内容物过多
- 11、乳癌局部皮肤呈橘皮样改变的原因是:B
- A、侵入Cooper韧带 B、皮内皮下淋巴管被癌细胞填塞 C、腋窝淋巴管被癌细胞填塞
- D、粘连 E、癌细胞侵犯皮肤
- 12、原发性肝癌极易转移的脏器是:A
- A、肝内 B、肺 C、骨 D、脑 E、胰腺周围、腹膜后
- 13、在我国急性胰腺炎的病因主要是:A
- A、胆结石 B、过量饮酒 C、暴饮暴食 D、高脂血症 E、高钙血症
- 14、急性阑尾炎,当腹痛尚未转移至右下腹前,在诊断上具有重要意的是:
- A、已出现发热 B、有恶心呕吐 C、压痛已固定于右下腹
- D、脐区压痛反跳痛 E、腹腔穿刺抽出脓液
- 15、不完全性肠梗阻主要是没有下列哪项症状:E
- A、恶心 B、呕吐 C、腹痛 D、腹胀 E、肛门停止排气排便
- 16、经直肠指诊可触及的直肠癌占:D

A、40% B、50% C、60% D、70% E、80%

17、胃十二指肠溃疡穿孔最常发生于:B

A、胃底 B、十二指肠前壁 C、十二指肠后壁
D、胃小弯 E、胃大弯

18、因溃疡行胃部分切除术后18个月,3个月前出现上中腹痛,比术前更剧烈,并偶排黑便,最可能的诊断是:C

A、残胃癌 B、碱性反流性胃炎 C、吻合口溃疡 D、残胃溃疡 E、残留十二指肠溃疡

19、肾损伤非手术治疗,下列哪一项是错误的:E

A、抗休克补充血容量 B、应用止血剂 C、早期使用抗生素预防感染
D、卧床休息观察血尿与腰部肿块的变化 E、病情稳定、血尿转清后,要早期离床活动

20、下肢静脉曲张症能否进行手术治疗的关键性检查是:B

A、深浅静脉交流支瓣膜功能是否健全 B、深静脉是否通畅
C、浅静脉瓣膜是否闭锁不全 D、小隐静脉功能是否健全
E、曲张静脉是否出现并发症

二、填空题15% (每空1分)

1、肾结核晚期常见的并发症是 和 。

2、肾母细胞瘤又称: 或

3、腹外疝经腹壁的突出途径不同:斜疝经 突出;
直疝经 突出。

4、原发性肝癌可分为__型、__型和__型

5、腹膜炎手术的原则是 和

6、腰肌劳损压痛点在_

7、周围血管疾病所致的肢体肿胀分为_ _和

三、名词解释15% (共5题,每题3分)

1、脑疝:

2、5P征:

3、腹外疝:

4、急性胰腺炎:

5、肾绞痛

四、问答题40% (共4题,每题10分)

1、简述纵隔肿瘤的诊断和治疗?

2、右半结肠癌与左半结肠癌的临床表现的区别。

3、甲状腺功能亢进的手术指征和禁忌证。

4、简述骨盆骨折常见并发症。

五、病例分析10% (共1题,每题10分)

患者,男,52岁,一年半前开始出现大便习惯改变,排便次数增加,大便时伴有出血及黏液。当地医院以"结肠炎"收治,疗效不明显,病情时好时坏,严重时出现黏液脓血便。最近3个月便前有肛门下坠感,粪便变细且经常出现大便困难、腹胀。请做出初步诊断,并指出依据;应作何检查?

参考答案

一、单选题

1-5BABCC 6-10EACBA 11-15BAACE 16-20DBCEB

二、填空题

1.膀胱挛缩 对侧肾积水 2.肾胚胎瘤 Wilms瘤 3. 腹股沟管、直疝三角

4.巨块型 结节型 弥漫型 5.处理原发病 彻底清除腹腔 充分引流

6.腰段骶棘肌中外侧缘 7.静脉性肿胀 淋巴性肿胀

三、名词解释

11. 脑疝:当颅内某分腔有占位性病变时,该分腔的压力大于邻近分腔的压力,脑组织从高压区向低压区移位,导致脑组织,血管及颅神经等重要结构受压和移位,有时被挤,硬脑膜的间隙或孔道中,从而出现一系列严重临床症状和体征称为脑疝。

2. 5P征:骨筋膜室综合征的晚期,出现无痛,脉搏消失,皮肤苍白,感觉异常,肌肉麻痹称为5P征。

3.腹外疝:腹腔内脏器或组织连同腹膜壁层,经腹壁薄弱点或孔隙,向体表突出所形成的肿物。

4.急性胰腺炎:是一种常见病, 激活的胰酶对胰实质的自身消化, 病变轻微者为胰腺间质水肿, 重者胰腺发生部分或全腺坏死, 以及胰

腺及胰周感染。

5.肾绞痛:结石引起的肾盂输尿管连接部或输尿管完全梗阻致肾盂或输尿管平滑肌痉挛所产生的剧烈疼痛称为肾绞痛。

三、问答题

1.答:①胸部影像学检查是诊断纵隔肿瘤的重要手段, X线透视检查可观察肿块是否随吞咽上下移动、是否随呼吸有形态改变以及有无搏动等。X线正侧位胸片可显示肿瘤的部位、密度、外形、边缘清晰光滑度、有无钙化或骨影等。断层摄片、CT或磁共振更能进一步显示肿瘤与邻近组织器官的关系, 必要时作心血管造影或支气管造影, 能进一步鉴别肿瘤的相通部位以及与心大血管或支气管、肺等的关系, 提高确诊率。

②超声扫描有助于鉴别实质性、血管性或囊性肿瘤。

③放射性核素¹³¹I扫描可协助诊断胸骨后甲状腺肿。

④颈部肿大淋巴结活检有助于鉴别淋巴源性肿瘤或其它恶性肿瘤。

⑤气管镜、食管镜、纵隔镜等检查有助于鉴别诊断, 但应用较少。

⑥诊断性放射治疗, 在短期内能否缩小, 有助于鉴别放射性敏感的肿瘤。治疗除恶性淋巴源性肿瘤适用放射治疗外, 绝大多数原发性纵隔肿瘤只要无其他禁忌症, 均应外科治疗。即使良性肿瘤或囊肿毫无症状, 由于会逐渐长大, 压迫邻近器官, 甚至出现恶变或继发感染, 因而均以采取手术为宜。恶性纵隔肿瘤若已侵入邻近器官无法切除或已有远处转移, 则禁忌手术, 可根据病理性质给予放射或化学药物治疗

2.答:右半结肠肠腔较宽大, 血运及淋巴丰富, 吸收能力强, 癌肿易溃烂、坏死致出血感染, 故临床表现为全身贫血、腹部肿块症状为主。左半结肠肠腔相对狭小, 该部多为浸润型癌, 临床表现以局部的肠梗阻、便秘、腹泻、便血等和腹部肿块症状为主。

3.答:手术指征有:

①结节性甲状腺肿且有功能亢进者;

②甲状腺显著肿大压迫邻近器官者;

③甲状腺较大, 长期抗甲状腺药物治疗无效或停药后3个月复发者;

④异位(胸骨后)甲状腺;⑤病人坚持长期服药有困难者。

禁忌证有:①青少年患者;②病情较轻者;③高度突眼症而甲亢程度较微者;④病人伴有其他严重疾病者;⑤病情较重、症状明显而尚未为抗甲状腺药物满意控制时, 暂不手术

4.分析:引起骨盆骨折的外力较大, 因此, 骨盆骨折可合并盆腔器官以及临近组织的损伤, 常见的并发症有:

①腹膜后水肿:骨盆血液循环丰富。有许多血管丛。骨盆骨本身为松质骨, 因此, 骨盆骨折可引起广泛、大量出血, 血肿在腹膜后疏松组织中形成。大量出血可发生休克。

②腹腔脏器损伤:骨盆与腹腔临近, 暴力可引起骨盆骨折, 也可引起腹腔中器官和组织损伤。包括以出血为主的实质性器官损伤和以腹膜炎主的空腔脏器损伤。

③膀胱、后尿道、直肠损伤, 会阴部撕裂:骨盆骨折的移位可引起以上器官和组织的损伤, 出现相应的临床表现。

④神经损伤:骶髂关节和骶骨的损伤可引起腰骶神经丛的损伤。

四、病例分析

1. 初步诊断为结肠癌, 因①男性, 52岁, 属于高危人群;②病程长, 逐渐加重;③有排便不适, 黏液血便及慢性肠梗阻的临床表现。

应马上行直肠指检, 这是诊断直肠癌最重要、快捷的方法之后需行:①乙状结肠镜检查, 取病理活检明确诊断;②钡剂灌肠检查, 以排除结肠中多发性原发癌;③B超检查;CT检查等, 以排除肝脏等远处器官的转移。

2013级七年制《外科学》考题(2017年5月19日)

一、选择题(30×1)

1. ARDS的共同病理生理(肺顺应性下降)
2. 肠外营养最严重的并发症(空气栓塞)
3. 术前准备最根本的目的是(提高病人对手术的耐受力)

4. 我国结直肠癌最好发的部位（直肠—低位）
5. 腰椎间盘突出和腰椎管狭窄最主要的鉴别是依据（CT/MRI）
6. 齿状突骨折分型
7. 转移性骨肿瘤最常见的原发癌灶是（乳腺癌）
8. 反复手法复位的严重并发症是（骨折不愈合）
9. 不是肾盂肾炎的临床表现是（可出现发热、腰痛、膀胱刺激症状）
10. 腹外疝腹壁加强修补术式（前壁加强术式、后壁加强术式、适应症）
11. 桥本甲状腺炎的临床表现
12. 胸部损伤都有的症状（胸痛？）
13. 鳞状细胞癌的说法
14. 胸腺瘤好发于（前上纵隔）
15. 绞窄性肠梗阻
16. 腹部闭合性损伤容易损伤的脏器（脾＞肾＞小肠＞肝＞肠系膜）
注：开放性损伤为：肝＞小肠＞胃＞结肠＞大血管
17. 怀疑有腹腔内脏器损伤最有用的：腹穿+腹腔灌洗
注：实质性器官为腹穿+腹腔灌洗术（最简单、最可靠）
空腔脏器为立位X片（最简单、最有意义）
18. 继发性化脓性腹膜炎最常见的致病菌（大肠埃希菌）
19. 高位复杂性肛瘘手术最关键的是（挂线疗法？）
20. 结直肠癌转移错误
21. 原发性肝癌首发症状（肝区疼痛）

二、名词解释（5×4）

22. Colles骨折
23. Reynolds五联征
24. Glisson鞘
25. 甲状腺危象
26. 混合痔

三、简答题（4×5）

27. 试述头颅血肿的分类。
28. 试述颅内压增高的主要病因。
29. 试述溃疡病穿孔的典型症状和体征。
30. 试述阑尾炎切除术的并发症。

四、问答题（3×6）

31. 肝硬化产生腹水的机制有哪些？
32. 腹股沟斜疝和直疝的鉴别。
33. 腹部闭合性损伤的手术探查指征有哪些？

五、案例分析题（1×12）

肠梗阻

34. 诊断（2分）及诊断依据（3分）
35. 鉴别诊断（2分）
36. 进一步检查？（3分）
37. 治疗原则（2分）

哇这份卷子出得太随意啦，严重怀疑是胃肠外科老师出卷，比例严重失衡呀！

2013级麻醉学外科学考题(考试)：

注:15级麻醉和13级麻醉考卷一样

一、选择30×1=30分

- 1.硬膜外血肿最好发部位（脑膜中动脉）
- 2.门脉压多少为高压（30-50cmH₂O）

注:正常为13-24cmH₂O、平均18cmH₂O

- 3.老年人肠梗阻最常见原因:（乙状结肠扭转～老年男性）

注:青壮年为急性小肠扭转、2岁以下为肠套叠、肠蛔虫堵塞好发于儿童

4.胃癌最好发于什么部位:(胃窦)

注:胃十二指肠溃疡穿孔好发于胃小弯、十二指肠球部前壁、最常发生于十二指肠球部前壁;胃十二指肠溃疡大出血好发于胃小弯、十二指肠球部后壁

5.肺癌最常见病理类型:(外科书写腺癌、病理学写鳞癌、趋势最多的是腺癌)

6.抽屉试验阳性提示什么损伤:(前、后交叉韧带)

注:前交叉韧带~抽屉试验+Lachman试验+抽移试验;

内、外侧副韧带~侧方应力试验

7.化脓性关节炎最常见部位:(髋关节和膝关节)

8.脊椎结核最严重并发症:(截瘫)

9.胃大部分切除治疗胃十二指肠溃疡的原因(切除了含大量壁细胞和主细胞的远端胃体、降低了胃酸和胃蛋白酶的分泌;切除了胃窦从而减少G细胞分泌促胃液素~降低了胃酸分泌;好发溃疡部位也一并切除)

10.外科治疗门脉高压的主要目标

(这题出现了好多[呲牙]防止再出血、预防肝性脑病)

11.腹股沟直斜疝比较中不必要的是(?)

注:最有意义/最重要的是回纳后是否再次脱出

12.哪一项不会引起周围血管性损伤产生间歇性疼痛(骨筋膜室综合征是无痛~重点急性动脉栓塞和骨筋膜室综合征5P的鉴别)

注:会引起的有动脉硬化性闭塞症(ASO)、血栓闭塞性脉管炎(TAO/Buerger病)等

13.L5S1损伤提示什么(踝反射消失、足趾曲/屈拇无力)

14.二尖瓣狭窄听诊特点(心尖区第一心音亢进和舒张中期隆隆样杂音、胸骨左缘3.4肋间二尖瓣开瓣音)

15.颅内压增高没有哪一种表现

16.向外穿过外括约肌到达坐骨直肠间隙引起什么脓肿(坐骨肛管间隙脓肿)

注:肛腺脓肿或坐骨直肠间隙脓肿向上穿破肛提肌进入骨盆直肠间隙引起~骨盆直肠间隙脓肿

17.胃穿孔,十二指肠穿孔好发于哪里(上面有注)

18.泌尿系统感染途径(上行~多为大肠杆菌;血行~多为金葡菌、肾皮质感染;淋巴~由肠道严重感染/腹膜后脓肿形成;直接)

19.女性低血糖,补液后恢复是什么瘤(胰岛素瘤)

20.男性4cm肝癌,最好治疗手段(部分肝切除~肝癌首选和最有效方法)

21.老年男性排尿困难原因(前列腺增生)

二、填空20x1.5=30分

三、简答6x5

1.胃十二指肠溃疡穿孔非手术治疗措施

2.泌尿系统结核临表

3.甲状腺癌分型

4.肺结核手术切除指征

5.急性结石性胆囊炎急诊手术指征

6.影响骨折愈合的局部及全身因素

四、问答1x10=10分

腹部损伤剖腹探查指征

2014级七年制外科学——by 14七临考题回忆小组

一、选择题(50x1)

1、Thomas实验阳性说明病变位于:股骨头骨软骨病、髋关节有无屈曲畸形(髋关节结核)

2、股骨颈内收型骨折的临床表现:pauwels>50度

3、肱骨干中下1/3骨折最容易发生:桡神经损伤

4、乳腺囊性增生不会出现什么症状:可出现乳房胀痛和肿块,月经前明显,月经后减轻,重者整个周期都有疼痛,查体:肿块质韧、触痛、界不清、少数有乳头溢液

5、乳腺纤维瘤最佳的治疗方法是:手术切除

- 6、以下哪个是骨折的早期并发症（脂肪栓塞）
- 7、脊柱骨折并发脊髓损伤，首要的治疗措施是（解除脊髓受压）
- 8、I131摄取，比周围正常组织高，是什么结节（热结节）
- 9、以下哪个不是剖腹探查的指征（腹膜刺激征）
- 10、以下关于胰腺癌说法正确的是（病理学上导管腺癌最多见）
- 11、门静脉高压合并食管静脉曲张的治疗目的是（预防上消化道大出血）
- 12、以下最容易发生坏死的的是（肠扭转）
- 13、成年男性发生骑跨伤后，会出现的体征是（前尿道损伤:尿道出血、压痛、尿外渗、局部血肿）
- 14、在我国最常见的泌尿系肿瘤是（膀胱癌，其次是肾肿瘤）
- 15、急性尿潴留最常见的病因是（机械性梗阻）
- 16、尿路结石最常见的结石类型是（草酸钙结石最多见；磷酸盐、尿酸盐、碳酸盐次之；胱氨酸结石罕见）
- 17、胆囊结石多为（胆固醇）石
- 18、透光实验阴性一定不会见于以下哪种疾病（睾丸肿瘤）
- 19、腹腔穿刺抽出不凝血，病人出现休克的表现，首要的治疗措施是（抗休克同时剖腹探查）
- 20、以下关于青枝骨折说法正确的是（好发于儿童）
- 21、肾胚胎瘤的好发年龄是（80%在5岁前发病，平均3.5岁）
- 22、恶性淋巴瘤首选什么治疗方法？（化疗）
- 23、以下关于化脓性骨髓炎说法错误的是（）
- 24、直肠腺癌应先进行什么治疗（术前放化疗）
- 25、判断哪个椎间盘突出的案例题（L3~4）
- 26、以下哪个是开胸探查的指征（P262:穿透性胸伤中度休克；穿透性胸伤濒且高度怀疑心包压塞；）
- 27、胆道出血三联症是（胆绞痛、黄疸、上消化道出血）
- 28、褥疮形成的病因（即压疮～老年医学呀:垂直压力即长期卧床/长期坐轮椅；剪切力；摩擦力；尿便失禁、大汗、伤口大量渗出液；营养不良～外科学:脊髓损伤并发症，最常发生部位为骶部、股骨大转子、髂脊、足跟）
- 29、急性梗阻性化脓性胆管炎不会出现以下哪种症状？
- 30、关于胃泌素瘤不正确的说法是（是难治性、反复发作/不典型部位的消化性溃疡，高胃酸分泌，部分患者可并发其他内分泌肿瘤。累及内分泌腺的分布依次为甲状旁腺、胰腺、垂体、肾上腺、甲状腺等部位。出现相应的与内分泌腺功能亢进有关的临床表现。）
- 31、颅前窝骨折不会出现的症状是（耳漏）
- 32、甲状腺孤立结节，无触痛，不规则固定，考虑是（甲状腺癌）
- 33、诊断胆囊结石的依据是（超声还是腹部x线平片？～首选超声）
- 34、滑动疝的疝壁可能包含（乙状结肠）
- 35、以下哪个不是溃疡性疾病的手术指征？

二、名词解释（5x3）五年制不考全英文名解

- 1、real urine incontinence ～真性尿失禁
- 2、Gilsson鞘 ～肝疾病那
- 3、osteofascial compartment syndrome～骨筋膜室综合征
- 4、brain herniation～脑疝
- 5、Horner征

三、问答题（5x5）

- 1、闭式胸腔引流术的指征
- 2、影响骨折愈合的因素
- 3、双侧上尿路结石的手术原则
- 4、产生颅内高压的病理因素
- 5、胆囊结石的手术指征

四、案例分析（1x10）

男，34岁，上腹部隐痛伴反酸4年，3小时前突起上腹部疼痛继而转为右下腹疼痛。体检：腹平坦，未见胃肠型、蠕动波，上腹部及右下腹部压痛明显，腹肌紧张，肠鸣音减弱

问：最可能的诊断是？需与什么鉴别？首选什么检查确诊？治疗原则？

诊断:十二指肠溃疡穿孔

鉴别:急性阑尾炎、右侧输尿管结石

首选检查:立位X线检查

原则:

1.先进行非手术治疗（去除病因、禁饮食、胃肠减压、纠正水电解质紊乱和酸碱失衡、抗生素、静脉注射大剂量质子泵抑制剂奥美拉唑）

2.非手术治疗无效时采用手术治疗:

>8h:单纯穿孔缝合术，术后正规抗溃疡药物治疗

<8彻底性手术（胃大部切除术）

2014级临床医学（五年制）外科学考题

一、单选题(501)

普外(15)和骨科(12)的题最多，其次是泌尿(7)和乳腺外科(6)。

有个别超纲题(麻醉、精索静脉曲张等等)，选择题考得比较细，整张卷了最难的就是这里。

二、名词解释(53)

1.Cushing 反应

2.张力性气胸

3.Calot三角

4.充盈性尿失禁

5.骨筋膜室综合征

三、问答题(55)

1.甲亢手术并发症

2.十二指肠溃疡手术后晚期并发症

3.腹股沟斜疝和直疝的鉴别

4.尿三杯试验定义及其意义

注：尿三杯试验在P530、Mears-Stemey“四杯法”在P557

5.骨折切开复位的指征

四、病例分析(110)

胃癌，轻度贫血

诊断，诊断依据，鉴别，检查，治疗原则

2015级五年制临床医学《外科学》真题回顾----15级五临附一江瑛

一、单选（50题50分）

1.腹部损伤腹穿抽出不凝血，且休克，治疗原则是:抗休克同时手术

2.腹部闭合性损伤，休克，治疗原则:抗休克同时手术

3.腹部空腔脏器损伤，休克，治疗原则:先抗休克后手术或者抗休克无好转立即手术

4.脑外伤后综合征不常用的治疗方法:中医中药吧

5.开放性骨折治疗首要措施:闭合伤口

6.肺癌早期诊断最有意义的是:支气管镜检查及活检

7.食管原位癌是

A无远处转移

B只累及至基底细胞

C早期浸润癌

8.下列正确的是

A门脉压越高，腹水越重

B肝硬化变越重，门脉压越高

其他选项都错

- 9.急性化脓性骨髓炎的早期表现正确的是（A吧）
A局部红肿压痛
B干骺端持续性剧痛、压痛
- 10.主动脉瘤最常见原因
A梅毒
B先天性
C动脉硬化
D损伤性
- 11.哪种大肠癌最常见:直肠癌
- 12.以下哪种骨折常用手法复位
A桡骨远端骨折
B胫骨平台骨折
- 13.关于下肢静脉功能不全的说法错误的是:是一种独立疾病
- 14.单纯下肢静脉曲张的理想治疗是:高位结扎加抽脱
- 15.前壁缺血性挛缩最常见的是
A肱骨髁上骨折
B桡骨骨折
C尺骨骨折
D桡尺双骨折
E.colles骨折
- 16.下列是切除肾、输尿管、输尿管口部分膀胱的是:肾盂癌
- 17.下列关于肾癌正确的是:B
A主要是乳头状癌
B主要经淋巴道转移
- 18.关于脑瘤的可定位是:
A一侧视乳头萎缩，对侧水肿
B双目失明
C双侧动眼神经麻痹
- 19.纵隔肿瘤除恶性淋巴瘤的主要措施是:化疗
- 20.T2N1M0的肺癌首选措施是:
A化疗
B化疗后手术再化疗
C姑息性手术
- 21.关于骨巨细胞瘤X线表现正确的是:密度不均、溶骨性破坏
- 22.肛瘘的治疗首要是:找出内瘘
- 23.甲亢手术前的药物治疗
- 24.动脉导管未闭选哪个检查:X线
- 25.F4心脏形状:靴形心
- 26.前列腺增生最早出现的症状:夜尿频
- 27.尿道球部损伤完全断裂时尿外渗进入
A皮下浅筋膜
B皮下深筋膜
C皮下组织
D辜丸鞘膜
E精索鞘膜
- 30.胰岛素瘤正确的是:A
A可合并甲状腺瘤
B糖尿病
C高血压
D糖耐量曲线升高
E都不是
- 31.关于门静脉侧支循环正确的是:以上都正确

32. 肱骨中下段骨折合并什么神经损伤: 桡神经
33. 胆囊结石最常见的是: 胆固醇结石
34. 尿酸盐结石除了与尿液酸度有关, 下列最密切的是: 感染
35. 输血引起发热的原因不正确的是: D (D 导致低温, 唯一出现的外总题)
- A 致热原
- B 免疫反应
- C 溶血反应
- D 输入大量库存血
- E 细菌污染
36. 早期胃癌指
37. 乳腺癌外上象限 II 期的标准术式是:
- A 典型根治术
- B 改良根治术
- C 扩大根治术
- D 乳房切除
- E 肿瘤切除
38. 胃癌, 肺部两个病灶, 腹主动脉淋巴结转移, 手术: 胃癌根治术加肺叶切除
- 二、名解 (3x5)

1. 脑疝
2. 纵隔扑动
3. 胆囊三角(题目是英文)
4. 假性尿失禁
5. 孟氏骨折

三、简答 (5x5)

1. 甲亢术后主要并发症
2. 门脉高压的临床表现
3. 绞窄性肠梗阻临表
4. 双侧上尿路结石的治疗原则
5. 关节脱位的特征和复位指标

四、病例 (10)

转移性右下腹痛, 9 小时前进食后上腹部痛, 6 小时前下腹部痛, 下腹压痛反跳痛肌紧张

1. 初步诊断及诊断依据
2. 鉴别诊断
3. 进一步检查
4. 治疗原则