

Glaucoma agudo

- **Glaucoma** trata-se do termo utilizado para se referir á doenças que tem como características o aumento da pressão intraocular;

Glaucoma agudo/ Glaucoma de Ângulo Fechado

Estreitamento ou fechamento do ângulo da câmara anterior, levando á drenagem inadequada de líquido, aumentando a pressão intraocular e lesão do nervo óptico

Fatores de Risco

- Fatores demográficos, temos:
 - Idade avançada
 - Sexo feminino
 - História familiar positiva de GPAF
 - Ascendência asiática (chinesa).
- Fatores oculares:
 - Hipermetropia
 - Ângulo oclusível
 - Câmara anterior rasa
 - Pequeno diâmetro corneano
 - Cristalino espesso
 - Pequeno comprimento axial do olho.

Quadro Clínico

- Dor periocular e ocular;
- Cefaleia;
- Visão turva com halos coloridos;
- Náuseas/vômitos;
- Olho duro á palpação;
- Pupila em midríase leve (pouco reativa);

Tratamento

- Nada de midriático!! (atropina)
- USAR:
 - Timolol 0,5% (colírio)
 - 1 gota no olho afetado (pode repetir após 5-10 min)

- **Mecanismo:** bloqueia receptores β no corpo ciliar
 - 👉 ↓ produção de humor aquoso
- Acetozolamida (VO ou EV)
 - 500 MG VO ou EV (ataque)
 - 250 MG VO 6/6H (manutenção)
 - inibe anidrase carbônica
 - 👉 ↓ formação de bicarbonato
 - 👉 ↓ produção de humor aquoso
- Analgesia/antiemético
- Pilocarpina (30-60 min//PIC der uma baixada)
 - Pilocarpina 1–2%
 - 1 gota a cada 15 min por 1 hora
 -
 - agonista muscarínico
 - 👉 contrai músculo esfíncter da íris (miose)
 - 👉 contrai músculo ciliar

Efeito:

- abre a malha trabecular
- facilita drenagem do humor aquoso



Se grave ou sem resposta

Considerar manitol EV

- 20%
- 1–2 g/kg em 30–60 min
 - 👉 reduz rapidamente a PIO