Ciência da Computação

Prof. Tiago J. Arruda

Exercícios Propostos¹

↑ Máximos e mínimos locais e globais

1. Encontre os pontos críticos das funções abaixo.

(a)
$$f(x) = 5x^2 + 4x$$

(d)
$$f(x) = x^{1/3} - x^{-2/3}$$

(b)
$$f(x) = 4x^3 - 9x^2 - 12x + 3$$

(e)
$$f(x) = x^2 - 32\sqrt{x}$$

(c)
$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

(f)
$$f(x) = \sqrt{3 + 2x - x^2}$$

2. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos de f no intervalo dado.

(a)
$$f(x) = 3x^2 - 12x + 5$$
, $[0,3]$

(c)
$$f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$$
, $[-3, 2]$

(b)
$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 4$$
, $[-2, 1]$

(b)
$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 4$$
, $[-2, 1]$ (d) $f(x) = x^2 + \frac{2}{x}$, $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$

3. Para cada uma das funções abaixo, encontre: (i) os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente; (ii) os valores de máximo e mínimo local de f; (iii) os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão.

(a)
$$f(x) = x^3 - 12x + 1$$

(a)
$$f(x) = x^3 - 12x + 1$$
 (c) $f(x) = x^6 + 192x + 17$ (e) $f(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$ (b) $f(x) = 5 - 3x^2 + x^3$ (d) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$

(e)
$$f(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$$

(b)
$$f(x) = 5 - 3x^2 + x^3$$

(d)
$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x^3$$

4. Determine os valores das constantes a e b de forma que $f(x) = ax^2 + bx$ tenha um máximo absoluto no ponto (1,2).

∧ Aplicações do teste da segunda derivada

- 5. (a) Um objeto com peso W é arrastado ao longo de um plano horizontal por uma força agindo ao longo de uma corda presa ao objeto. Se a corda fizer um ângulo θ com o plano, então a magnitude da força é $F=\frac{\mu W}{\mu\sin\theta+\cos\theta}$, onde μ é uma constante positiva chamada coeficiente de atrito e $0 \le \theta \le \pi/2$. Mostre que F é minimizada quando $\tan \theta = \mu$.
 - (b) Um canhão, situado no solo, é posto sob um ângulo de inclinação α . Seja A o alcance do canhão, dado por $A = \frac{2v^2}{g} \sin \alpha \cos \alpha$, onde $v \in g$ são constantes. Para que ângulo o alcance é máximo?
- 6. Uma fábrica produz x milhares de unidades mensais de um determinado artigo. Se o custo de produção é dado por $C = 2x^3 + 6x^2 + 18x + 60$ e o valor obtido na venda é dado por $R=60x-12x^2$, determine o número ótimo de unidades que maximiza o lucro L = R - C.
- 7. Encontre dois números positivos cuja soma seja 66 e cujo produto seja o maior possível.
- 8. Determine as dimensões de uma lata cilíndrica, com tampa e volume V, de forma que a sua área total seja mínima.

¹Resolva os exercícios sem omitir nenhuma passagem em seus cálculos. Respostas sem resolução e/ou justificativa não serão consideradas. Data máxima de entrega: 10/12/2024 até 16:00 horas