
ASD | human simultaneous RT | 4,770 trials from 8 participants pooled
Reactive-only, joint RT + choice | 20 independent Gamma–Omega–delay triples + shared bias (61 parameters) | delay prior 0–500 ms
Data: 20 ms bins / choice dots
Analytic model at arithmetic posterior means
|ΔdB| = 0.1 · n=474
|ΔdB| = 0.3 · n=472
|ΔdB| = 0.65 · n=478
|ΔdB| = 1.3 · n=480
|ΔdB| = 2 · n=480
|ΔdB| = 0.1 · n=473
|ΔdB| = 0.3 · n=475
|ΔdB| = 0.65 · n=479
|ΔdB| = 1.3 · n=479
|ΔdB| = 2 · n=480
ASL 20 cd/m² Density (s⁻¹)
ASL 40 cd/m² Density (s⁻¹)
RT (s)
Psychometric
P(right)
Signed ΔdB (right − left)
ASL 20 cd/m²
ASL 40 cd/m²
Condition = RT; 0–1.8 s retained, both choices; raw-trial pooling across participants and sessions; no further exclusion
RTDs pool ±Δ within each ASL using retained-trial frequencies; each signed prediction is normalized on 0–1.8 s
Convergence checks passed | psychometric model points are connected only as guides; no extra sigmoid fit