

Nazorg na de besnijdenis van een jongen

Locatie Amsterdam ☎ Telefoon 020-6909712

✉ amsterdam@besnijdeniscentrum.nl

Andere locaties



Telefoon 085-4871506



✉ info@besnijdeniscentrum.nl

Nazorg Arabisch

نشرة معلومات الرعاية اللاحقة لختان صَبِي

1-الفازلين

الجرح والحشفة (رأس القضيب) تكون مغطاه بعد الجراحة بمرهم الفازلين (فازلين أبيض). وهذا له نفس تأثير ضمادة ربط الجروح: حيث أنه يغطي الجرح ويمنع التصاق الحشفة بالحفاضات أو بالسروال الداخلي القصير. إذا ما كان ابنكم يرتدي حفاضات فمن المهم مع تغيير كل حفاضة الدهان بالفازلين مرة أخرى. بعد مرور أسبوع علي العملية الجراحية يمكنكم التوقف عن فعل ذلك .

2- النزيف

القليل من النزيف يعتبر أمر طبيعي (يقع دم صغيرة في الحفاضات أو الملابس الداخلية). ولكن إذا كان الجرح ينزف حقا) يتساقط الدم على هيئة قطرات (يجب عليك أن تتصل بالطبيب المناوب ل "مركز ختان هولندا" عن طريق الهاتف رقم 035-9213 692) ملاحظة: رمز الهاتف 035). يمكنكم الاتصال بهذا الرقم لمدة يومين بعد الختان ليلا ونهارا. إذا لزم الأمر يمكنكم العودة مرة أخرى مع ابنكم للمركز الذي تم فيه الختان من أجل علاج النزيف.

3- التبول

في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد عملية الختان ينبغي أن يكون ابنكم قد قام بالتبول. إذا لم يحدث ذلك, يجب عليكم الاتصال بنا علي الهاتف رقم 035-9213 692 .

4- تخفيف الألم

بعد مرور ساعة علي عملية الختان قوموا بإعطاء ابنكم تحميلة شرجية واحدة (لئوس) من الباراسيتامول, ثم بعد كل أربع ساعات تحميلة باراسيتامول أخرى طبقا لجدول الجرعات التالي:

جرعة الباراسيتامول (أسييتامينوفين)	وزن المريض
1 تحميلة شرجية من الباراسيتامول 60 ملغ	> 5 كيلو
1 تحميلة شرجية من الباراسيتامول 120 ملغ	5 – 7 كيلو
1 تحميلة شرجية من الباراسيتامول 240 ملغ	7 – 15 كيلو
1 تحميلة شرجية (أو قرص) من الباراسيتامول 500 ملغ	15 – 30 كيلو
1 قرص من الباراسيتامول 1000 ملغ	< 30 كيلو

5- في الحمام

منذ اليوم التالي لعملية الختان يجب وضع ابنكم لمدة 15 دقيقة في حمام من الماء الفاتر لتنظيف القضيب والجرح. ويفضل عدم استخدام الصابون أو الشامبو. بعد الحمام يجب دهن الحشفة والجرح مرة أخرى بالفازلين.

6- الغرز

الغرز قابلة للذوبان وتتساقط من تلقاء نفسها بعد مرور 2 إلي 3 أسابيع. عندما تبدأ الغرز في التفكك بعد يوم أو عشرة , يمكن أن تنزف من جديد. هذا ليس خطيرا وسيتوقف نزول الدم من تلقاء نفسه .

7- التورم, وازرقاق الجلد

في الأيام الأولى بعد الختان قد يتورم القضيب نوعا ما مع تلون القضيب وكيس الصفن باللون الأزرق. ويأتي ذلك من وخز وحقن المخدر. وهذا سيختفي من تلقاء نفسه.

8- طبقة (افرازات) صفراء علي الحشفة

قد تنشأ علي الحشفة طبقة صفراء وقد تبدوا أحيانا مُق زرة. وقد تبدو كغشاء. سبب تكون هذه الطبقة هو أن الطبيب قام بفصل القلفة عن الحشفة. تخنفي هذه الطبقة (الافرازات) الصفراء في غضون أسبوع من تلقاء نفسها بالاستحمام .

9- العدوي

بعد أيام قليلة إذا أصبح القضيب غليظا ومحمرا ومسببا للألم بشدة , إذن تلك اشارة لوجود عدوي الجرح. بالإضافة إلي ذلك قد يصاب ابنكم بالحمي. الأطفال الرضع عادة ما يشربون بطريقة سيئة بسبب الألم. في حالة حدوث عدوي الجرح, يرجى الاتصال بالطبيب الممارس العام, ولكن يمكنكم أيضا في أيام العمل الأسبوعية من 8 صباحا إلي 5 مساءا الاتصال بالطبيب المنوب ل "مركز ختان هولندا" علي الهاتف رقم 035-9213 692

10- المتابعة

إذا كانت النتيجة جيدة والجرح يشفي بشكل طبيعي, إذن فلا يوجد ضرورة للمتابعة. أما إذا كان لا يزال هناك سبب يستدعي المراجعة, يرجى الاتصال هاتفيا للحصول علي موعد صباح يوم الثلاثاء أو الجمعة علي هاتف رقم أو يمكنكم ارسال رسالة إلي البريد الالكتروني

11- إذا تم استخدام مادة الميدازولام المهدنة: انظر إلي المعلومات في الجزء الخلفي من هذا النموذج !

الجزء الخلفي من نموذج الرعاية اللاحقة

لقد خضع ابنكم لعملية الختان عندنا تحت تأثير مادة مهدنة مضادة للقلق والأرق (الميدازولام).

إنه من الحكمة طوال الأربع ساعات القادمة أن يبقى بجواره أشخاص بالغين, بحيث إذا ما اقتضت الضرورة يمكن طلب المساعدة إذا نشأت مشاكل.

طوال الساعات القادمة يجب عدم تركه يقف أو يسير منفردا. حيث أنه لا يمتلك بعد السيطرة الكاملة علي عضلاته (ساقه) وهو ما يتواجد معه خطر السقوط.

برجاء الحذر مع الحلوى الصغيرة وما إلي ذلك؛ فربما يرغب في ابتلاعها.