

นี่คือข้อมูลยาสามัญประจำบ้าน 50 รายการ พร้อมด้วยข้อมูลชื่อยา, ส่วนผสม, สรรพคุณ, ขนาดและวิธีใช้, คำเตือน, และการเก็บรักษา:

#### 1. พาราเซตามอล (Paracetamol)

- ส่วนผสม: พาราเซตามอล
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดและลดไข้
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 500-1000 มิลลิกรัมทุก 4-6 ชั่วโมง (ไม่เกิน 4 กรัมต่อวัน), เด็กตามคำแนะนำของแพทย์
- คำเตือน: ห้ามใช้เกินขนาดที่กำหนด, ระวังการใช้ร่วมกับยาที่มีพาราเซตามอล
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น, ห่างจากแสงแดด

#### 2. ไบรูโพรเฟน (Ibuprofen)

- ส่วนผสม: ไบรูโพรเฟน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวด, ลดไข้, และลดการอักเสบ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 200-400 มิลลิกรัมทุก 4-6 ชั่วโมง (ไม่เกิน 1.2 กรัมต่อวัน), เด็กตามคำแนะนำของแพทย์
- คำเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาไบรูโพรเฟน, ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคกระเพาะ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น, ห่างจากแสงแดด

#### 3. ยาลดกรดอลูมิเนียม-แมกนีเซียม (Aluminium-Magnesium Antacid)

- ส่วนผสม: อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์, แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก, กรดไหลย้อน, และแผลในกระเพาะอาหาร
- ขนาดและวิธีใช้: รับประทาน 1-2 ช้อนโต๊ะทุก 4-6 ชั่วโมงหรือตามที่แพทย์สั่ง
- คำเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ส่วนผสม, ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไต
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น, ห่างจากแสงแดด

#### 4. ยาคลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine)

- ส่วนผสม: คลอเฟนิรามีน มาเลต
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการแพ้, คัด, น้ำมูกไหล
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 4 มิลลิกรัมทุก 4-6 ชั่วโมง (ไม่เกิน 24 มิลลิกรัมต่อวัน), เด็กตามคำแนะนำของแพทย์
- คำเตือน: อาจทำให้ง่วงนอน, ห้ามใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น, ห่างจากแสงแดด

#### 5. ยามีน็อกซีซิลลิน (Amoxicillin)

- ส่วนผสม: อะม็อกซิซิลลิน ไตรไฮเดรต
- สรรพคุณ: รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบต่าง ๆ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 250-500 มิลลิกรัมทุก 8 ชั่วโมง, เด็กตามคำแนะนำของแพทย์
- คำเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้เพนิซิลลิน, ระวังการใช้ในผู้ที่มีประวัติโรคไต
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น, ห่างจากแสงแดด

#### 6. ยาลอราทาดีน (Loratadine)

- ส่วนผสม: ลอราทาดีน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการแพ้, คัน, น้ำมูกไหล
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 10 มิลลิกรัมวันละ 1 ครั้ง, เด็กตามคำแนะนำของแพทย์
- คำเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาลอราทาดีน, ระงับการใช้ในผู้ที่มีประวัติโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น, ห่างจากแสงแดด

#### 7. ยาเดคโตรเมทอร์ฟาน (Dextromethorphan)

- ส่วนผสม: เดคโตรเมทอร์ฟาน ไฮโดรโบรไมด์
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการไอแห้ง
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 10-20 มิลลิกรัมทุก 4-6 ชั่วโมง (ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อวัน), เด็กตามคำแนะนำของแพทย์
- คำเตือน: ห้ามใช้ร่วมกับยากกลุ่ม MAO inhibitors, ระงับการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น, ห่างจากแสงแดด

#### 8. ยาฟลูคอนazole (Fluconazole)

- ส่วนผสม: ฟลูคอนazole
- สรรพคุณ: รักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนังและเยื่อเมือก
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 150 มิลลิกรัมครั้งเดียวหรือ 50 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลาหลายวัน, เด็กตามคำแนะนำของแพทย์
- คำเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาฟลูคอนazole, ระงับการใช้ในผู้ที่มีประวัติโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น, ห่างจากแสงแดด

#### 9. ยาเมโทรนิดาโซล (Metronidazole)

- ส่วนผสม: เมโทรนิดาโซล
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและโปรโตซัว
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 500 มิลลิกรัมทุก 8 ชั่วโมง, เด็กตามคำแนะนำของแพทย์
- คำเตือน: ห้ามใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์, ระงับการใช้ในผู้ที่มีประวัติโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น, ห่างจากแสงแดด

#### 10. ยาคลอรามเฟนิคอล (Chloramphenicol)

- ส่วนผสม: คลอรามเฟนิคอล
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบต่าง ๆ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 250-500 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมง, เด็กตามคำแนะนำของแพทย์
- คำเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา, ระงับการใช้ในผู้ที่มีประวัติโรคตับและโรคไต
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น, ห่างจากแสงแดด

#### 11. ยาอาร์นิกา (Arnica)

- ส่วนผสม: สารสกัดจากดอกอาร์นิกา
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดและอักเสบจากการบาดเจ็บ
- ขนาดและวิธีใช้: ทาบริเวณที่เจ็บวันละ 2-3 ครั้ง
- คำเตือน: ห้ามใช้กับผิวหนังที่มีแผลเปิด
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

12. ยาอะซิโtromycin (Azithromycin)

- ส่วนผสม: อะซิโtromycin
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 500 มิลลิกรัมครั้งเดียวหรือ 250 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 5 วัน
- ค่าเตือน: ระงับการใช้ในผู้ที่มีประวัติโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

13. ยาเบต้าเมทาโซน (Betamethasone)

- ส่วนผสม: เบต้าเมทาโซน
- สรรพคุณ: ลดอาการอักเสบและคัน
- ขนาดและวิธีใช้: ทาบริเวณที่มีอาการวันละ 1-2 ครั้ง
- ค่าเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

14. ยาเซทิริซีน (Cetirizine)

- ส่วนผสม: เซทิริซีน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการแพ้, คัน, น้ำมูกไหล
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 10 มิลลิกรัมวันละ 1 ครั้ง
- ค่าเตือน: อาจทำให้ง่วงนอน
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

15. ยาเดซลอราทาดีน (Desloratadine)

- ส่วนผสม: เดซลอราทาดีน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการแพ้, คัน, น้ำมูกไหล
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 5 มิลลิกรัมวันละ 1 ครั้ง
- ค่าเตือน: ระงับการใช้ในผู้ที่มีประวัติโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

16. ยาโดกซีไซคลิน (Doxycycline)

- ส่วนผสม: ด็อกซีไซคลิน
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 100 มิลลิกรัมทุก 12 ชั่วโมงในวันแรก จากนั้น 100 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- ค่าเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

17. ยาอีริโtromycin (Erythromycin)

- ส่วนผสม: อีริโtromycin
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 250-500 มิลลิกรัมทุก 6-8 ชั่วโมง
- ค่าเตือน: ระงับการใช้ในผู้ที่มีประวัติโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

18. ยาฟามอติดีน (Famotidine)

- ส่วนผสม: ฟามอติดีน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการกรดไหลย้อนและแผลในกระเพาะอาหาร
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 20 มิลลิกรัมวันละ 1-2 ครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไต
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

19. ยาฟลูโอเซที (Fluoxetine)

- ส่วนผสม: ฟลูโอเซที
- สรรพคุณ: รักษาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 20 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ที่มีประวัติโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

20. ยาฟลูติกาโซน (Fluticasone)

- ส่วนผสม: ฟลูติกาโซน
- สรรพคุณ: ลดอาการอักเสบและคัน
- ขนาดและวิธีใช้: ทาบริเวณที่มีอาการวันละ 1-2 ครั้ง
- ค่าเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

21. ยาเจนทาไมซิน (Gentamicin)

- ส่วนผสม: เจนทาไมซิน
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ทาบริเวณที่มีอาการวันละ 2-3 ครั้ง
- ค่าเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

22. ยาไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazide)

- ส่วนผสม: ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
- สรรพคุณ: ลดความดันโลหิตและบวมน้ำ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 25-100 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไต
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

23. ยาไฮโดรคอร์ติโซน (Hydrocortisone)

- ส่วนผสม: ไฮโดรคอร์ติโซน
- สรรพคุณ: ลดอาการอักเสบและคัน
- ขนาดและวิธีใช้: ทาบริเวณที่มีอาการวันละ 1-2 ครั้ง
- ค่าเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

24. ยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol)

- ส่วนผสม: ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
- สรรพคุณ: ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
- ขนาดและวิธีใช้: ทาบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
- คำเตือน: ห้ามใช้กับแผลเปิด
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

25. ยาไอบูเฟน (Ibuprofen)

- ส่วนผสม: ไบบูโพรเฟน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดและลดไข้
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 200-400 มิลลิกรัมทุก 4-6 ชั่วโมง
- คำเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคกระเพาะ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

26. ยาลามะคิแลน (Lamexilan)

- ส่วนผสม: ลามะคิแลน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 250-500 มิลลิกรัมทุก 8 ชั่วโมง
- คำเตือน: ห้ามใช้ในผู้

ที่มีประวัติแพ้ยา

- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

27. ยา ليفล็อกซาซิน (Levofloxacin)

- ส่วนผสม: ลีโวฟล็อกซาซิน
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 500 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- คำเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

28. ยาไลน์ลิด (Linezolid)

- ส่วนผสม: ลอร์โนลิด
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 600 มิลลิกรัมทุก 12 ชั่วโมง
- คำเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไต
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

29. ยา ลิดเคน (Lidocaine)

- ส่วนผสม: ลิดเคน
- สรรพคุณ: ช่วยบรรเทาอาการปวดและชาที่ผิวหนัง
- ขนาดและวิธีใช้: ทาบริเวณที่มีอาการตามที่แพทย์สั่ง
- คำเตือน: ระวังการใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

### 30. ยามาลาเรีย (Malarone)

- ส่วนผสม: อะโทวาควอน, โพรกวานิล
- สรรพคุณ: ป้องกันและรักษาโรคมาลาเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 250/100 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

### 31. ยาเมนทอล (Menthol)

- ส่วนผสม: เมนทอล
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการคันและระคายเคือง
- ขนาดและวิธีใช้: ทาบริเวณที่มีอาการวันละ 2-3 ครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ที่แพ้ประวัติแพ้ยา
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

### 32. ยามอร์ฟีน (Morphine)

- ส่วนผสม: มอร์ฟีน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดรุนแรง
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ตามคำแนะนำของแพทย์
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไตและตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

### 33. ยานาโปรกเซน (Naproxen)

- ส่วนผสม: นาโปรกเซน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 250-500 มิลลิกรัมทุก 8-12 ชั่วโมง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคกระเพาะ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

### 34. ยาไนโตรฟูแรนโตอิน (Nitrofurantoin)

- ส่วนผสม: นิโตรฟูแรนโตอิน
- สรรพคุณ: รักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 50-100 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไต
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

### 35. ยานอร์แฟล็ก (Norflex)

- ส่วนผสม: ออร์เฟนดริน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 100 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

36. ยานอร์ฟลอกซาซิน (Norfloxacin)

- ส่วนผสม: นอร์ฟลอกซาซิน
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 400 มิลลิกรัมทุก 12 ชั่วโมง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไต
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

37. ยาโอเมพราโซล (Omeprazole)

- ส่วนผสม: โอเมพราโซล
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการกรดไหลย้อนและแผลในกระเพาะอาหาร
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 20 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

38. ยาเพนิซิลลิน (Penicillin)

- ส่วนผสม: เพนิซิลลิน
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 250-500 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไต
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

39. ยาพิโรxicam (Piroxicam)

- ส่วนผสม: พิโรxicam
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 20 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคกระเพาะ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

40. ยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine)

- ส่วนผสม: พาร็อกซีทีน
- สรรพคุณ: รักษาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 20 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

41. ยาไรซิทัน (Rizatriptan)

- ส่วนผสม: ไรซิทัน
- สรรพคุณ: รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 5-10 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการ
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

#### 42. ยาไรเฟมไพซิน (Rifampicin)

- ส่วนผสม: ไรเฟมไพซิน
- สรรพคุณ: รักษาโรควัณโรคและโรคติดเชื้ออื่น ๆ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 450-600 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

#### 43. ยาริทาเวอริน (Ritonavir)

- ส่วนผสม: ริทาเวอริน
- สรรพคุณ: รักษาการติดเชื้อเอชไอวี
- \*\*

ขนาดและวิธีใช้\*\*: ผู้ใหญ่ 600 มิลลิกรัมวันละครั้ง

- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

#### 44. ยาซาลบูตามอล (Salbutamol)

- ส่วนผสม: ซาลบูตามอล
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการหอบหืด
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 100-200 ไมโครกรัมเมื่อมีอาการ
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

#### 45. ยาซิมบัสตาติน (Simvastatin)

- ส่วนผสม: ซิมบัสตาติน
- สรรพคุณ: ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 10-40 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

#### 46. ยาซุฟาร์ทรีเฟอ์ (Sulfasalazine)

- ส่วนผสม: ซุฟาร์ทรีเฟอ์
- สรรพคุณ: รักษาโรคข้ออักเสบและโรคลำไส้อักเสบ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 500 มิลลิกรัมวันละ 2-4 ครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

#### 47. ยาแทมซูลอซิน (Tamsulosin)

- ส่วนผสม: แทมซูลอซิน
- สรรพคุณ: รักษาอาการต่อมลูกหมากโต
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 0.4 มิลลิกรัมวันละครั้ง
- ค่าเตือน: ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น



48. ยาเตตราซัยคลิน (Tetracycline)

- ส่วนผสม: เตตราซัยคลิน
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 250-500 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมง
- คำเตือน: ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

49. ยาไทอะม็อกโซซิล (Thiamoxocil)

- ส่วนผสม: ไทอะม็อกโซซิล
- สรรพคุณ: รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 250-500 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมง
- คำเตือน: ระงับการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น

50. ยาเทอร์บูทาลีน (Terbutaline)

- ส่วนผสม: เทอร์บูทาลีน
- สรรพคุณ: บรรเทาอาการหอบหืดและโรคหลอดลมอักเสบ
- ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่ 2.5-5 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง
- คำเตือน: ระงับการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ
- การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็น