PLANT BASED CLINIC
www.plantbasedclinic.com
info@plantbasedclinic.com

Dr.ssa Barbara Ciccantelli
Specialista in Gastroenterologia e Scienza dell'alimentazione
bciccantelli@plantbasedclinic.com

Sig.ra Testa Federica, 26 anni **17/09/2025**

Da 4 anni gonfiore e distensione addominale diffuso, flatulenza e bruciore e dolore epigastrico. Alvo 6 ev/die (fino a 12). BS 5-6. Dolore pre-evacuativo che si risolve con le evacuazioni. Cistiti ricorrenti per cui assume buscopan.
Già seguita in presenza con diagnosi di SIBO: impostata ieri terapia con Rifaximina e fermenti per SIBO e con gastroprotettore.
Peso abituale 65 Kg. 60KG a 18 anni. Altezza 166 cm. Oscillazioni di 3-4 kg a periodi.
Nega familiarità per patologie evolutive del digerente. Dislipidemia (padre).
Nega altre patologie. Nega allergie note. Nega consumo di FANS.
In visione esami ematochimici (luglio 25); emocromo nei limiti; biochimica epatica completa di colestasi, coagulazione, urea e glicemia (88) nei limiti. Creatinina 0,61. Assetto lipidico: **col tot 237** (vs 180 gen 25); **non LDL 186 (vs 135 gen 25); HDL 51 (vs 48); TG 284 (vs 335). Ferritina 33; Vit B12 337;** Sierologia per celiachia negativa. CF e ricerca HPylori feci negativa. TSH 2,07.
Lab dic 24: **Homa index calcolato 3,2 (<2,5)**. Iperferritnemia (472) con lieve rialzo di transaminasi e GGT.

Terapie: Vedi sopra. Solgar B12 2000 mcg cianocobalamina in modo discontinuo.
ANAMNESI FISIOLOGICA: ciclo regolare (interrotta EP due mesi fa); nega gravidanze; Fumo:no. Alcolici: occasionali. Liquidi: 1,5 L/die di acqua. Caffè: 1-2/die con zucchero (un cucc). Abitudini voluttuarie: no. Sonno: 8 ore/die, mai ristoratore. Attività fisica: cammina molto 5 k al giorno. Attività sportiva strutturata: no.
ANAMNESI ALIMENTARE: periodi di iperfagia per motlo appetito alternati a periodi di inappetenza con stanchezza. Frutta a guscio/semi oleaginosi: semi di chia un cucchiaio/die e due cucchiaini di mix di semi. Fonti omega tre vegetali: non regolarmente. Prodotti industriali: max una volta. Frutta fresca: una-due porzioni al giorno. Verdure: ha tolto verdura foglia verde e crucifere; per il resto alterna. Due porzioni al giorno circa 200 g. A volte cereali integrali. Dolci: circa 15-20 /die di cioccolato. Nega bevande zuccherine o con dolcificanti. Codimenti grassi: Olio EVO non lo misura ma tendenzialmente poco. Avocado uno intero 2 volte a settimana. Non sa se sale iodato.

GIORNATA ALIMENTARE TIPO :

- Colazione: un caffe, pane e pomodoro o una banana o uno yogurt di soia (1 sett) con semi di chia o frutta. A volte porridge con latte di avena.
- Spuntino: fa colazione tardi
- Pranzo: Tofu 150 g con verdure (porzioni abbondanti) Porzione di cereale che varia tra frumento-pasta o cous cous, quinoa o riso porzioni abbondanti. Anche 500 g di gnocchi. Un caffè con zucchero.

PLANT BASED CLINIC
www.plantbasedclinic.com
info@plantbasedclinic.com

- Spuntino: a volte frutta secca (2-3 vv a settimana). Circa 10-15 g (pistacchi, noci mandorle anacardi) o frutta fresca.
- Cena: come il pranzo ma meno abbondante.

Dieta vegana frazionata in 4-5 pasti giornalieri. Nel complesso buone scelte qualitative ma riferite porzioni di cereali ai pasti principali eccessive rispetto alla stima dei fabbisogni. Si esegue counseling nutrizionale rispetto alle abitudini da migliorare: consumo più regolare di aliementi ricchi in calcio e omega tre. Ridurre le porzioni di cereali a quelle standard. Provare a ridurre lo zucchero aggiunto.
Si allegano indicazioni per sana e corretta alimentazione su base vegana e lista di alimenti ricchi in FODMAPS da usare come guida per pianificare pasti in modo da evitare carico eccessivo di FODMAPS (regime FODMAPS *light*).
Dalle analisi emerge quadro di dislipidemia da ricontrollare dopo almeno 6 mesi di nuove abitudini alimentari e aumento dell'attività fisica.

Si consiglia:

- esami ematochimici :vitamina D; emocromo; anticopri anti HCV; HbsAg; anti HBc IgM e IgG.
- Ripetere tra 6 mesi dosaggio glicemia e insulina basali; col totale, LDL; HDL e trigliceridi.
- Aumentare assunzione di Vitamina B12 a 1000 mcg una cp/die per un mese poi passare a mantenimento con una cp/die due volte a settimana. Dosare i valori tra 8 mesi.
- Vitamina D Piùlife 1000 UI due cp/die (da rimodulare in base all'esisto delle analisi);
- Compatibilmente con il livello attuale di allenamento ed eventuali controindicazioni mediche aumentare gradualemnte l'attività fisica strutturata fino a 3 allenamenti a settimana (alternando cardio e resistenza con i pesi).

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e visita di controllo dopo 4-6 settimane.
Distinti saluti

BARBARA CICCANTELLI
MEDICO CHIRURGO
GASTROENTEROLOGA
Iscr. Ordine M56782

Dott.ssa Barbara Ciccantelli

Aggiornamento del 17/02/2026: dopo ciclo di terapia con Rifaximina 14 gg miglioramento dei sintomi (gonfiore meno frequente e meno intenso). Alvo 1 ev/die; possono capitare giorni in cui ha feci non formate talvolta con dolori pre evacuativi che si risolvono con l'evacuazione (al max una volta al mese). Aveva già iniziato regime a contenuto di FODMAPS controllato con beneficio.
Ha eseguito BT al fruttosio risultato positivo (non in visione).
Deve iniziare attività fisica (yoga).
Non assume terapie.

PLANT BASED CLINIC
www.plantbasedclinic.com
info@plantbasedclinic.com

Mantiene irregolarità nel consumo dei pasti: concentra soprattutto alla sera. Tende a mantenere iperfagia a cena.
Peso 70 Kg altezza 166 cm. Aumento di circa 5 kg negli ultimi mesi. IMC 25,6 (lieve sovrappeso).
Riferisce di muoversi di più e di aver migliorato comunque le scelte alimentari. Si è pesata dopo periodo di vacanza. A volte reflusso notturno che migliora se mangia presto.

Recall 24 ore dieta tipo giornaliera: Vegana.
Colazione (1130): due fette biscottate con olio e sale. Un caffè con poco zucchero.
Pranzo alle 14 e 30: Riso o pasta non li misura 70-80 g circa. 120 g di legumi cotti o tofu 100 g. Verdura in piccole quantità. Condisce poco. Un quadratino di cioccolato.
Spuntino: nulla.
Cena: pane con guacamole (non sempre) o poi primo piatto con secondo veg e verdura.

Si concorda per dieta ipocalorica su base vegana. Preferisce distribuire le calorie su tutto il giorno.
Si allegano inoltre le indicazioni per dieta a basso contenuto di fruttosio.

Ripetere le analisi dopo 6 mesi di nuove abitudini alimentari e allenamenti costanti includendo dosaggio del colesterolo totale e frazionato , glicemia e insulina basali, creatinina, ALT, AST.

Stime dei fabbisogni secon Harris Benedict BMR 1505Kcal/die; TDEE 1806-1957 Kcal.
1500-1600 Kcal PRO 60-70 g

N.B. La dieta ipocalorica viene formulata sulla base di stime e che come tali possono discostarsi in modo anche notevole dai reali fabbisogni. L'unico modo per verificare l'efficacia di un piano alimentare è seguire l'andamento del peso e dei parametri di laboratorio nel tempo in modo da apportare eventuali modifiche.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e visita di controllo dopo 4-6 settimane.
Distinti saluti

BARBARA CICCANTELLI
MEDICO CHIRURGO
GASTROENTEROLOGA
Iscr. Ordine M56782

Dott.ssa Barbara Ciccantelli

PLANT BASED CLINIC
www.plantbasedclinic.com
info@plantbasedclinic.com

Regole generali per sana e corretta alimentazione.

- **Ho mangiato cibi proteici in almeno due-tre occasioni (Latte, yogurt di soia; legumi; derivati della soia;) oggi tra la colazione, il pranzo e la cena?** I legumi andrebbero idealmente consumati almeno una volta al giorno. Non superare le due volte al giorno per i derivati della soia. I preparati industriali ultraprocessati non andrebbero consumati più di una volta a settimana. Latte e yogurt vegetali si possono consumare su base quotidiana possibilmente addizionati di calcio (porzioni 125 g 2-3 porioni al giorno). Tofu 125 g a porzione. Tempeh 80 g a porzione.
  ** La porzione media di legumi corrisponde a circa 120 g cotti (circa 50 g secchi).*Per i legumi assumerli nel formato che dia menon fastidio (decorticati, passati al passaverdure frullati o sotto forma di farine o pasta di legumi. La porzione può essere aumentata gradualmente fino a uella suggerita.*

- **Cereali e derivati (o patate, o una loro combinazione) erano sempre presenti a ogni pasto principale?** Sarebbe meglio variare il tipo di cereale utilizzato nella giornata o nell'arco della settimana. Cereali in chicco alternativi al frumento (pasta e pane comune): riso (tutte le varietà), miglio, amaranto, grano saraceno, teff, avena, mais, quinoa, farro, orzo, segale. I cereali integrali sono vantaggiosi in termini metabolici e per la salute in generale ma possono peggiorare i sintomi intestinali. **Se si hanno disturbi intestinali preferire la versione non integrale.** Non ci sono motivi per non consumare i cereali a cena, di qualunque tipologia essi siano (pasta inclusa). **I cereali in chicco hanno un peso di riferimento equivalente a quello della pasta.**
  Cereali equivalenze: pasta 100 g patate 350 g 220 g gnocchi; cereale secco -->patate moltiplicare per 3 volte e mezzo il peso del cereale; ---> gnocchi 2,2 volte il peso del cereale secco; cereale secco---> panemoltiplicare per 1,5.
  Fuori casa: cereale cotto circa un pungo e mezzo. Pane unità da mangiare fuori casa: fetta il palmo della mano; panino pugno ***50 g pane 150 g patate 40 polenta 30 g grissini o crackers o gallette (circa tre).***

- **Le verdure erano presenti ai pasti principali?** Alternare verdure crude e cotte (cucinate in modi diversi es una vellutata di antipasto e verdure al forno di contorno), verdi in foglia e crucifere (broccoli ecc); considerare come razione standard **200 g** per le verdure che vanno cotte e **100 g** per le verdure da consumare crude (il peso da considerare a crudo al netto dello scarto). In ogni caso adeguare progressivamente la quantità in base alla propria tolleranza individuale che è diversa per ogni verdura.
  Verdure porzione fuori casa: due pugni quelle cotte; 2-3 pugni insalata.

- **Ho mangiato 2-3 porzioni di frutta oggi?** Variare i colori preferendo frutta di stagione. La frutta può essere consumata, in base alle proprie preferenze e alla tolleranza, in qualunque momento della giornata: alla fine di uno dei pasti pricipali e come spuntino ,da sola o abbinata a yogurt o a frutta secca**.** Una porzione di frutta corrisponde a circa 150 g (un frutto medio) da considerarsi sempre a crudo al netto dello scarto. Se si fa attenzione a variare la tipologia non c'è bisogno di adeguare la quantità delle singole porzioni.

- **Il gruppo alimentare di frutta a guscio/semi oleosi era presente oggi?** Considerare 20 grammi durante l'intera giornata da poter suddividere nei vari pasti, spuntini inclusi o in unica porzione. Le creme di frutta secca sono sostanzialmente equivalenti ai semi. Per una questione di varietà si consiglia di assumerle in diversi modi. Se si soffre di gonfiore meglio frazionare la porzione.

- **Ho introdotto fonti di omega-3 fonti vegetali (assunzione giornaliera)?** Per le fonti vegetali: olio di lino spremuto a freddo da banco frigo due porzioni da 5 ml (1 cucchiaio/die). Semi di lino o di chia macinati e consumati subito (2 cucchiai circa 15 g ciascuno). N.B.: Se si opta per i semi macinati utilizzare un macinacaffè. Si può conservarli in congelatore già macinati preparando in anticipo più dosi. Tali alimenti vanno consumati da soli o accompagnati a pietanze fredde o tiepide. Le dosi complessive possono essere la combinazione di due singole porzioni.

- **Cibi ricchi di calcio sono comparsi più volte nella giornata?** Latte o yogurt vegetali addizionati di calcio, verdure (verdi in foglia e famiglia crucifere, carciofagretti), sesamo, mandorle, tofu, tempeh, fichi secchi.
  _ **Condimenti grassi** si consiglia olio di oliva possibilemnte extravergine nelle quantità di 20-30 g al giorno (da 2 a 3 cucchiai da tavola in base a quanto si voglia condire). L'olio può essere usato anche in cottura ad es per il soffritto (evitare di bruciarlo) . In ogni caso è consigliato consumarlo anche a crudo alternando.

ORIENTAMENTI DIETETICI PER IL PAZIENTE CON GONFIORE ADDOMINALE

Consigli generali

- Mangiare ad orari regolari, masticando lentamente per evitare d'ingurgitare aria
- Abituare l'intestino all'evacuazione sempre alla stessa ora possibilmente al mattino dopo colazione quando interviene un riflesso fisiologico.
- Praticare una moderata ma costante attività fisica (una camminata a passo svelto aiuta a mantenere una buona motilità intestinale e a combattere lo stress)
- Evitare alcolici e cibi troppo speziati.
- Evitare alimenti ricchi di grassi e in generale cibi troppo elaborati (alimenti ultraprocessati)
- La formazione di gas intestinale è favorita anche da alimenti insufflati d'aria (gelati, creme, mousse, frappè, ecc.) e dall'uso di gomme da masticare.
- In caso di dieta vegetariana/onnivora che includa anche latte e latticini: l'ingestione di latte e formaggi freschi può determinare in alcuni soggetti problemi di velocizzazione del transito intestinale con diarrea e/o fermentazione con gonfiore.
- In alcuni soggetti l'assunzione di frutta lontano dai pasti aiuta ad evitare problemi di gonfiore/distensione intestinale.
- Limitare l'assunzione cibi ricchi di amido (pasta ecc) che non siano freschi o che siano stati cotti due volte, o cotti e fatti raffreddare.
- Evitare il consumo di bevande gassate, inclusa l'acqua, e di bevande alcoliche.
- Evitare sorbitolo e dolcificanti il cui nome finisce in –olo se affetti da gonfiore e/o diarrea.
- Non bere più di tre tazzine di caffè o tazze di tè.

PLANT BASED CLINIC
www.plantbasedclinic.com
info@plantbasedclinic.com

Per la dieta FODMAPS *light* gli alimenti ricchi in sostanze fermentabili non vanno del tutto eliminati ma occorre fare attenzione affinché nello stesso pasto non coincidano più alimenti che ne contengono molti. Tutti gli alimenti tollerati meno vanno periodicamente testati di nuovo introducendo una piccola quantità (es metà o un terzo di dose) o provando ad aumentare la dose se ridotta (es legumi).

Regole generali per la dieta LowFODMAPS vegana/vegetariana.

Tutti i cibi in scatola o fermentati hanno una quantità di FODMAPS ridotta rispetto alla versione non lavorata. La marinatura può ridurre fino a oltre il 90% il contenuto in FODMAPS degli alimenti (es aglio, cipolla, rapa rossa).

Frutta secca e semi oleaginosi: mandorle (fino a 10 unità), macadamia, arachidi, noci pecan, noci brasiliane, noci, semi di girasole, semi di zucca, semi di sesamo e tahina (10 g max).

Frutta fresca: banane, mirtilli, lamponi, fragole, uva, meloni, kiwi, limoni, arance, mandarini, frutti della passione, papaya, rabarbaro, pompelmi.

Verdura e ortaggi: zucchine, carote, melanzane, fagiolini, peperoni verdi, cavolo riccio, sedano, indivia belga, pomodori (65 g), lattuga romana, rucola, zucca, patate, spinaci, rapa, fagioli verdi, germogli di bamboo e di fagioli.

Fonti proteiche alterantive ai legumi al naturale: I derivati della soia come tofu, tempeh sono LowFodmaps per via della lavorazione/fermentazione dutante i processi di trasformazione. Latte e yogurt di soia andrebbero consumati solo se derivati dalle sole proteine e non dal fagiolo intero, ma nel nostro paese è più difficile trovarli.

Bevande vegetali di solito sono ben tollerate: mandorla, canapa, riso, macadamia, cocco purché puri e non contenenti zuccheri aggiunti.

Legumi (dose LowFodmaps): solo quelli in scatola a metà della dose standard (circa 50-60 g cotti). Se si sa di essere particolarmente intolleranti partire anche da un solo cucchiaio.

Cereali naturalmente privi di glutine: riso, avena, mais, miglio, quinoa, sorgo, tapioca, teff.

Attenzione ai cibi che contengono i seguenti dolcificanti artificiali perché possono dare fastidio addominale: sorbitolo E420, mannitolo E421, isomalto E953, maltitolo E965, xilitolo E967

PLANT BASED CLINIC
www.plantbasedclinic.com
info@plantbasedclinic.com

Cibi generalmente tollerati meglio

Frutta secca e semi oleaginosi: mandorle (fino a 10 unità), macadamia, arachidi, noci pecan, noci brasiliane, noci, semi di girasole, semi di zucca, semi di sesamo e tahina (10 g max).

Frutta fresca: banane, mirtilli, lamponi, fragole, uva, meloni, kiwi, limoni, arance, mandarini, frutti della passione, papaya, rabarbaro, pompelmi.

Verdura e ortaggi: zucchine, carote, melanzane, fagiolini, peperoni verdi, cavolo riccio, sedano, indivia belga, pomodori (65 g), lattuga romana, rucola, zucca, patate, spinaci, rapa, fagioli verdi, germogli di bamboo e di fagioli.

Fonti proteiche alterantive ai legumi al naturale: I derivati della soia come tofu, tempeh sono LowFodmaps per via della lavorazione/fermentazione dutante i processi di trasformazione. Il latte di soia andrebbe consumato solo se derivato dalle sole proteine e non dal fagiolo intero, ma nel nostro paese è più difficile trovarli. Le fonti proteiche animali con la sola eccezione dei derivati del latte vaccino non contengono FODMPAS se consumati al naturale. Attenzione a possibili additivi nel caso si prendano lavorati.

Bevande vegetali di solito sono ben tollerate: mandorla, canapa, riso, macadamia, cocco purché puri e non contenenti zuccheri aggiunti.

Legumi (dose LowFodmaps): solo quelli in scatola a metà della dose standard (circa 50-60 g cotti). Se si sa di essere particolarmente intolleranti partire anche da un solo cucchiaio.

Cereali naturalmente privi di glutine: riso, avena, mais, miglio, quinoa, sorgo, tapioca, teff. Alcune persone tollerano meglio cereali a base di frumento ma sottoposti a lunga fermentazione (es pane con lievito madre).

PLANT BASED CLINIC
www.plantbasedclinic.com
info@plantbasedclinic.com

Colazione	
Sulla colonna di dx trova le possibili sostituzioni	
Latte vegetale di soia o avena (addizionato di calcio) 200 ml caffè o orzo *o thè (se graditi)*	*- Yogurt vegetale di soia 200 g (sojasun naturale senza zuccheri)*
Frutta a guscio (non tostata) 10 g -vedi istruzioni	burro di frutta a guscio g
Avena in fiocchi 30 g o fiocchi di mais non zuccherati 30 g	Pane bianco 50 g; biscotti 30 g; Fette biscottate 30 g;
Un frutto fresco	
Spuntino	
Un frutto fresco e/o frutta secca 10	(scegliere anche in base a ciò che ha mangiato nel resto della giornata)
Pranzo	
*Riso bianco basmati o altra tipologia di semola 60 g**	Patate* 200-210 g (massimo due volte a settimana) Pane * 90 g cereali in chicco a scelta, cous cous ecc* 50 g
Una fonte proteica a scelta tra -Tofu 150 g	--Legumi secchi; farina o pasta di legumi 50 g (circa 120 g cotti- tre cucchiai da tavola cotti) 5-7/settimana (raccomandati) – tempeh 80 g -seitan 150 g. - Prodotti Veg industriali se graditi e tollerati (max una-due volte a settimana).
Verdure in base a tolleranza (vedi istruzioni)	
Olio di oliva (possibilmente extravergine) o di lino	1 cucchiaio da tavola circa 10 g
Spuntino	
un frutto fresco (una porzione) e /o frutta secca bifidus sojasun o alpro bianco 125 g cioccolato fondente 10 g (può essere consumato anche in altri momenti)	(scegliere anche in base a ciò che ha mangiato nel resto della giornata)
Cena	
Pasta o cereali in chicco 70 g*	Pane 100 g cous cous, boulgur, cereali in chicco (proviamo a mangiarli almeno 1/giorno) 70 g*. Patate 250 g idealmente non più di due volte a settimana.
Legumi 120 g cotti	O alternativa come sopra
Verdure in base a tolleranza (vedi istruzioni)	
Olio di oliva (possibilmente extravergine) o di lino	1 cucchiaio da tavola circa 10 g

PLANT BASED CLINIC
www.plantbasedclinic.com
info@plantbasedclinic.com

Indicazioni per dieta a basso contenuto di fruttosio:

E' un regime alimentare che riduce il contenuto di fruttosio consumato limitando o evitando cibi con un eccesso di fruttosio (cibi con oltre la metà dei loro zuccheri naturali in fruttosio, cibi con alto contenuto di fruttosio (oltre 3 g) o cibi che sono una fonte significativa di Fruttani (catene di fruttosio).
Questa dieta va seguita per il periodo necessario al miglioramento dei sintomi, mediamente dalle due alle sei settimane. I tempi di risposta sono soggettivi. Successivamente i cibi ad alto contenuto di fruttosio e di fruttani possono essere reintrodotti gradualmente in piccole quantità fino a trovare la quantità tollerata. E' utile attendere da uno a tre giorni tra una prova e l'altra. L'obiettivo è tornare ad una dieta il più varia e libera possibile mantenendo il consumo di fruttosio a livelli che non diano fastidio.
Considerando che tutta la frutta contiene fruttosio, seppur in contenuto minimo, il consumo di frutta fresca va limitato a massimo due porzioni al giorno. Le porzioni sono circa 125 g ciascuna.
Per gli alimenti industriali processati controllare sempre il contenuto eventuale di dolcificanti a base di sciroppo di fruttosio.

Fruttosio

Cibi a basso contenuto di fruttosio.

Frutta: banane dure; mirtilli rossi, mandarini; ananas; fragole, lime, arance; avocado, lamponi, cocco, kiwi, papaya, mapo.

Ortaggi: germogli di bamboo e alfa alfa, carote; rucola; alga nori; bok choi; sedano; barbabietole; erba cipollina; cavolo riccio; peperoni verdi; pomodori datterini; pastinaca; ravanelli; rabarbaro; spinaci; patate dolci; cime di rapa; patate; zucca; patata bianca; cavolo rosso,; zucchine; melanzane; finocchio; zenzero; bietole; fagiolini; Ci sono vegetali permessi che potrebbero però dare gonfiore per altre sostanze: cavolini di bruxelles; cavolfiori, cavoli; lattuga.

Grani e cereali: farine e cereali non da frumento inclusi pane e pasta e cereali da colazione-non dolcificati con sciroppo di fruttosio: riso in tute le sue forme, grano saraceno, fecola di maranta; farina di mais, miglio, avena, sorgo, tapioca e teff;

Derivati del latte e sostituti: tutti i derivati del latte, con o senza lattosio, e sostituti vegetali purché non dolcificati con fruttosio.

Bevande: caffè e thè; soda con zucchero di canna; acqua anche frizzante; soda o bevande integratori ecc senza dolcificanti a base di fruttosio. Vino e birra. NB: gli alcolici sono sconsigliati per motivi di salute generale.

Frutta secca e semi: tutti quelli non presenti nella lista da evitare.

Dolcificanti: qualunque non presente nella lista ad alto contenuto di fruttosio. Tra quelli artificiali la stevia è consentita.

Secondi proteici: tutti i tipi di carne o pesce non lavorati (senza panature o salse dolcificate); uova; tofu.

Cibi ad alto contenuto di fruttosio:

Frutta: tutta la frutta non presente nei cibi permessi e in modo particolare succhi di frutta, frutta essiccata (prugne, uvetta e datteri, frutta sciroppata. Cachi, mango; fichi; pere; mele; banana matura; anguria; pompelmo; melograno, ciliegie; prugne; pesche (bianche).

Ortaggi: Carciofi; asparagi; broccoli, porri; funghi; okra, cipolle, aglio, pisellini; peperoni rossi; scalogni; concentrato di pomodoro; prodotti industriali a base di pomodoro (es pomodori pelati, ketchup). Taccole.

Grani e cereali: grano, segale, orzo, farro e tutti i possibili derivati e preparazioni.

Derivati del latte e sostituti: tutti i derivati (inclusi yogurt, gelati e creme) ed eventuali sostituti vegetali dolcificati con sciroppo di fruttosio.

Frutta secca e semi: anacardi e pistacchi.

Bevande: succhi di frutta (tutti); soda di qualunque tipo dolcificata con sciroppo di agave, fruttosio, miele o sorbitolo. Integratori per sport con i suddetti dolcificanti. Vini dolci e rum. Orzo, bevanda di cicoria.

Dolcificanti: sciroppo d'agave, miele, fruttosio, sciroppo di mais alto in fruttosio.

Secondi proteici: preparazioni con panature o marinature con algio cipolla o dlcificanti o altri ingredienti sconsigliati.

PLANT BASED CLINIC
www.plantbasedclinic.com
info@plantbasedclinic.com

Colazione porridge di avena con bevanda di soia addizionata di calcio, un cucchiaino di crema di mandorle e mirtilli rossio lamponi o banana o combinazione di entrambi. Oppure yogurt di soia addizionato di calcio con granola di grano saraceno o miglio soffiato o fiocchi di mais (senza zuccheri aggiunti) il peso dei cereali è da considerarsi equivalente a quello dell'avena. Aggiungere kiwi o a parte un arancio medio.

Spuntini: un frutto a scelta (scegliere tra quelli a basso contenuto di fruttosio) da abbinare a 10 g di mandorle (10 unità) oppure ad altra frutta s guscio evitando anacardi e pistacchi. Nel pomeriggio può unire la frutta fresca e i semi allo yogurt di soia bianco senza zuccheri aggiunti. Nello yogurt può sminuzzare il cioccolato fondente oppure mangiarlo nel dopo cena.

Idee per preparazioni con basso contenuto di fruttosio che potranno essere alternate via via sostituendo la verdura e gli altri componenti (es pasta di semola o pane di frumento al posto dei derivati con poco fruttosio dopo le prime settimane).

Pasta con pesto di edamame (surgelati circa 120 g) e zucchine saltate in padella. Il pesto di edamame può farlo frullando gli edamame con mezzo cucchiaio di olio di oliva extravergine.

Fagiolini al vapore, tofu saltato in padella e pane.

Crema di zucca (150-200 g) con lenticchie decorticate (cuocere anche tutto insieme e frullare). Aggiungere miglio o grano saraceno o quinoa cotti.

Piadina di mais con hummus di ceci (frullare ceci con limone e tahina circa 10 g ed erbe aromatiche a piacere se gradite) rucola 30g e pomodorini 60 g oppure zucchine cotte con la modalità che preferisce.

Pasta di mais e di legumi (porzione equivalente a quelli secchi) con zucchine e rucola.

Vellutata di carote e zenzero. Far rosolare l'olio con lo zenzero grattugiato e aggiungere 200 g di carote e 150 g di patate (crude al netto dello scarto) fatti a pezzi coprire con acqua o brodo vegetale e far cuocere finché non sono tenere poi frullare con frullatore a immersione. Aggiungere ceci cotti e se non usato tutto la restante parte di olio di oliva a crudo.

Minestra di miglio e bietole (parte tenera) e ceci (già cotti e ben sciacquati 120g oppure 45 g secchi poi cotti). Fare soffritto con 5 ml di olio e carote (eventualmente parte verde di un cipollotto) aggiungere la parte verde delle biete e i legumi già cotti coprire con acqua o brodo a filo. Quando le verdure saranno tenere aggiungere il miglio già cotto. Condire con la restante porzione di olio se non usato tutto in cottura.

Piadina di mais con hummus di ceci (preparato con la quantità di legumi consigliata) finocchi 75 g (crudi al netto dello scarto) e carote crude 100 g. Un cucchiaio di olio EVO.

Insalata tiepida di grano saraceno (cuocere una parte di cereale e due di acqua senza toccarlo finché non assorbe tutto il liquido, quindi lasciare riposare 10-15 minuti poi sgranare con una forchetta) con zucchine grigliate ceci cotti 120 g e condire con olio EVO anche sotto forma di citronette, ed eventuali erbe aromatiche. Il grano sraceno può essere sostituito con miglio o quinoa.

PLANT BASED CLINIC
www.plantbasedclinic.com
info@plantbasedclinic.com

Bowl calda di tofu riso e verdura. Marinare il tofu (zenzero tritato, miso un cucchiaio, salsa di soia un cucchiaio, acqua un goccio, pepe un pizzico e curcuma un cucchiaino). In una casseruola fare rosolare con olio la parte verde del cipollotto o del porro e la carota a cubetti piccoli e la bieta (parte verde circa 100 g) aggiungere il riso e farli rosolare leggermente. Poi aggiungere acqua (non salata) due volte il volume del riso e far cuocere 10 minuti, aggiungere gli ultimi due minuti il tofu marinato.