Ortiva Top®

Fungicida **Top** para agricultores **Top**



Ortiva Top®

syngenta®

Mantén el control, elige Tecnología ORTIVA® Probada.

Tecnología ORTIVA® Probada es el sello que garantiza a los agricultores que el fungicida que tienen en sus manos ha sido testado durante 20 años y se ha convertido en récord de ventas gracias a su rendimiento y calidad superior.
Este sello es la garantía de calidad e innovación que solo pueden ofrecer los productos Syngenta.

® 2018 Syngenta. Todos los derechos reservados. ™ y ® son marcas comerciales del Grupo Syngenta.
Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Ortiva Top®

Fungicida de amplio espectro, robusto y eficaz


Fungicida de aplicación foliar a base de Azoxistrobin y Difenoconazol para el control de enfermedades fúngicas en: brócoli, lechuga, apio, tomate, pimiento, alcachofa, cebolla, ajo, judías, guisantes, cucurbitáceas y otras hortícolas.

Robusto contra resistencias

Cada día son menos las soluciones que tenemos para controlar las enfermedades de los cultios hortícolas por lo que necesitamos hacer un uso óptimo de las que tenemos. **Ortiva Top** con su dos grupos químicos y dos modos de acción es ideal para luchar contra las resistencias.

Difenoconazol

Es un triazol que inhibe la síntesis del ergosterol, altera la fluidez y permeabilidad de la membrana y produce inhibición del crecimiento del hongo.




Azoxistrobin

Es una estrobilurina que inhibe la respiración de los hongos impidiendo la trasferencia de electrones entre citocromo b y c1. Teniendo como consecuencia falta de energía.

Espectro de acción y eficacia

Ortiva Top tiene un amplio espectro de acción y una alta eficacia contra la mayoría de enfermedades que afectan a los cultivos hortícolas para los que tiene registro. Si se hace una buena estrategia de aplicación puede controlar varias enfermedades al mismo tiempo, sin necesidad de utilizar otros ingredientes activos.



Registros de **Ortiva Top**

Cultivo	Enfermedades	Dosis[2]	Días de intervalo	Aplicaciones máximas por año	Plazo de seguridad	LMRs autorizados UE (mg/kg)	
						Difenoconazol	Azoxistrobin
Ajo	Alternaria, Mildiu, Roya	1 l/ha	-	1 (Aire libre)	14	0,5	10
Alcachofa	Oídio	1 l/ha	10	3 (Aire libre)	7 días	1	5
Apio	Septoria	1 l/ha	14	3 (Invernadero y Aire libre)	14 días	0,3	0,3
Berenjena	Oídio, Alternaria, Mildiu, Cladosporiosis	1 l/ha	7	3 (Invernadero y Aire libre)	3 Invernadero 7 Aire libre	0,6	3
Brécol	Alternaria, Mildiu	1 l/ha	14	2 (Aire libre)	14 días	1	5
Cebolla	Alternaria, Mildiu, Roya	1 l/ha	-	1 (Aire libre)	14 días	0,5	10
Coles	Alternaria, Mildiu	1 l/ha	14	2 (Aire libre)	21	0,3	5
Coliflor	Alternaria, Mildiu	1 l/ha	14	2 (Aire libre)	14 días	0,2	5
Cucurbitáceas de piel comestible	Mildiu, Cladosporiosis	1 l/ha	10	2 (Invernadero y Aire libre)	3 días	0,3	1
Cucurbitáceas de piel no comestible	Mildiu, Cladosporiosis	1 l/ha	10	3 (Invernadero y Aire libre)	3 días	0,2	10
Espárragos	Stemphylium, Roya	1 l/ha	14	2 (Aire libre)	NA	0,05*	0,01*
Fresa	Oídio	1 l/ha	7	2 (Invernadero y Aire libre)	3 días	0,5	10
Guisantes con vaina	Oídio	1 l/ha	14	2 (Aire libre)	14	1	3
Judías con vaina	Oídio	1 l/ha	14	2 (Aire libre)	7	1	3
Lechuga y similares[1]	Alternaria, Mildiu, Esclerotinia	1l/ha	7	2 (Invernadero y Aire libre)	14 días	Lechuga: 15	3-7 (dependiendo de cultivo)
Pimiento	Alternaria, Oídio, Mildiu, Cladosporiosis	1 l/ha	10	2 (Invernadero y Aire libre)	3 días	0,8	3
Tomate	Alternaria, Oídio, Mildiu, Cladosporiosis	1 l/ha	7	3 (Invernadero y Aire libre)	3 Invernadero 7 Aire libre	2	3
Zanahoria	Alternaria, Oídio	1 l/ha	14	3 (Aire libre)	14	0,4	1

* Puedes consultar el resto de cultivos para los que tiene registro en: https://www.mapa.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/productos/pdf/25588.pdf

[1] **Similares incluye**: canónigo, berro o mastuerzo, barbarea, mostaza china y brotes tiernos. Incluye rúcula solo al aire libre.

[2] **En invernadero** utilizar en todos los cultivos la dosis de 100 ml/hl y un máximo de 1 l/ha, en lechuga un máximo de 0,8 l/ha.



Excelente compatibilidad con abejorros y abejas

Ortiva Top es compatible con los principales insectos auxiliares y polinizadores empleados en cultivos hortícolas.

Recomendaciones de uso

- Aplicar en pulverización foliar procurando realizar una buena mojabilidad del cultivo.
- Aplicar preventivamente al inicio de las condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades.
- Utilizarlo en programas alternando con otros fungicidas con diferentes modos de acción.
- Seguir las recomendaciones FRAC para prevenir el desarrollo de resistencias.





Ortiva Top es bien tolerado por los cultivos en los que está registrado y utilizado según las recomendaciones de etiqueta. Así lo demuestran todos los ensayos llevados a cabo en España, Portugal e Italia.

Ortiva Top como precaución, no debe mezclarse con productos que contengan aceites en su composición. Con los demás productos ensayados, presenta una buena compatibilidad, en caso de duda consultar Servicio Técnico de Syngenta o hacer un test previo observando la reacción del cultivo los días posteriores a la aplicación.

Excelente eficacia demostrada en los ensayos de campo


Ortiva Top ha demostrado, a través de numerosos ensayos en una amplia variedad de cultivos hortícolas que es un excelente y versátil fungicida gracias a su alta eficacia frente a la mayoría de enfermedades de cultivos hortícolas. Los siguientes gráficos muestran la eficacia de **Ortiva Top** frente a sus principales competidores.






***El valor del testigo expresa el % de ataque de la enfermedad.**


Tomate: % de eficacia contra oídio (*Leveillula taurica*). Severidad en hojas




Alcachofa: % de eficacia contra oídio (*Erysiphe sp*)




Cebolla: % de eficacia contra mildiu (*Peronospora destructor*)




Apio: % de eficacia contra septoria (*Septoria apii*)



Ajo: % de eficacia contra roya (*Puccinia allii*)



Fresa: % de eficacia contra oídio (*Podosphaera macularis*)



***El valor del testigo expresa el % de ataque de la enfermedad.**

Ortiva Top®

syngenta®

Formulación y envasado

Nº de registro	Composición	Formulación	Presentación
25.588	Azoxistrobin 200 g/l + Difenoconazol 125 g/l.	Suspensión concentrada (SC).	Envases de 1 y 5 litros.

Los beneficios de **Ortiva Top**



- **Hace selectiva** la unión de azoxistrobin y difenoconazol
- **Alta eficacia** sobre la mayoría de hongos que afectan a los cultivos hortícolas
- **Excelente protección** superficial, difusión homogénea y movilidad sistémica
- **Pilar estratégico** de los programas de fungicidas de una amplia variedad de cultivos hortícolas
- **Protección anti resistencias** intrínseca con 2 modos de acción
- **Compatible** con artrópodos auxiliares

Syngenta España S.A.U.
C/ Ribera del Loira 8-10
28042 Madrid
www.syngenta.es

www.syngenta.es/good-growth-plan

HUEPU07100-Nov18