

Source	SMD (95% CI)
Claiborn (1969)	-0.32 [-0.75; 0.11]
Fine (1972)	-0.18 [-0.49; 0.13]
Jose & Cody (1971)	-0.14 [-0.47; 0.19]
Ginsburg (1970)	-0.07 [-0.41; 0.27]
Evans & Rosenthal (1969)	-0.06 [-0.26; 0.14]
Grieger (1970)	-0.06 [-0.39; 0.27]
Fielder et al. (1971)	-0.02 [-0.22; 0.18]
Keshock (1970)	-0.02 [-0.59; 0.55]
Rosenthal et al. (1974)	0.03 [-0.21; 0.27]
Fleming & Anttonen (1971)	0.07 [-0.11; 0.25]
Conn et al. (1968)	0.12 [-0.17; 0.41]
Flowers (1966)	0.18 [-0.26; 0.62]
Henrikson (1970)	0.23 [-0.34; 0.80]
Pellegrini & Hicks (1972)	0.26 [-0.46; 0.98]
Kester (1969)	0.27 [-0.05; 0.59]
Rosenthal & Jacobson (1968)	0.30 [ 0.03; 0.57]
Carter (1970)	0.54 [-0.05; 1.13]
Maxwell (1970)	0.80 [ 0.31; 1.29]
Pellegrini & Hicks (1972)	1.18 [ 0.45; 1.91]
Total	0.08 [-0.02; 0.18]
Prediction interval	[-0.23; 0.39]
Heterogeneity: $\chi^2_{18} = 35.83$ ( $P < .01$ ), $I^2 = 50\%$	

