
ANTEC INTERNATIONAL

VIRKON Desinfectante



O mais recente desinfectante de largo

Responsável pela Introdução no Mercado:

Iberal

VIRKON DESINFECTANTE

O mais recente desinfectante de largo espectro.
Comprovado em 20 países com testes independentes como sendo o mais eficaz contra:
58 tipos de VÍRUS, **350** tipos de BATÉRIAS, **45** tipos de FUNGOS, **6** tipos de ESPOROS.

Propriedades Gerais de Virkon Desinfectante

❖ Não mancha, não causa problemas ambientais de resíduos e apresenta uma toxicidade excepcionalmente baixa.
❖ Um pó rosa-cinza para diluição fácil e precisa - rapidamente solúvel em água morna originando uma solução cor-de-rosa.
❖ Pode ser aplicado em superfícies e equipamentos que se deseja limpar e desinfectar numa única operação - passa o teste da AOAC de detergente na diluição de 1:200.
❖ Um desinfectante de água excelente e seguro.
❖ Pode ser usado como spray ou nebulização aérea.
❖ Apropriado para aplicação manual ou por máquina.
❖ Único produto patenteado em 20 países.
❖ Adequado ao uso em todos os tipos de exploração, centros de incubação e fábricas de processamento.
❖ Seguro e adequado para utilização com todo o tipo de animais mamíferos e aves.
❖ Aprovado pelo MAFF DO Reino Unido para ser utilizado em diluições excepcionalmente altas: Febre aftosa → 1:1300, e Indicações Gerais → 1:120

Propriedades Químicas e Físicas

Composição: Uma mistura de compostos geradores de oxigénio, surfactante, ácidos orgânicos e um sistema tampão inorgânico, equilibrada e estabilizada.
Aparência: Pó rosa acinzentado.
Actividade: Sistema fortemente oxidante.
Odor: Leve cheiro a limão.
Estabilidade: Pó: 2,1% de perda de actividade depois de 26 semanas a 20°C.
1,4% de perda de actividade depois de 26 semanas a 37°C.
Solução a 1%: 1,4% de perda de actividade depois de 14 dias em 350ppm de água dura
Solubilidade: Totalmente solúvel em água morna, fornecendo uma solução cor-de-rosa transparente.
Biodegradabilidade: Virkon é constituido principalmente por sais inorgânicos. O surfactante da formulaçõa é im sal de cadeia recta de sulfonato de alquibenzeno o qual está de acordo com a directiva EEC 82/243, fornecendo mais de 90% de biodegradabilidade nas condições de teste OECD.
PH da solução: Solução a 1% - pH 2,4.

Impacto Ambiental

a) Efeito ambiental - "Nas diluições recomendadas, todos os ingredientes de Virkon são decompostos e/ou biodegradados e são comparativamente inofensivos... O sal triplo de 'monopersulfato' de potássio vai decompor-se para formar subprodutos inofensivos. Em meio aquoso, o produto degrada-se e não apresenta nenhum problema para os processos de tratamento dos efluentes." Anglian Water, Agosto de 1994.
b) Demanda Bioquímica de oxigénio
Durante o teste de Demanda Bioquímica de Oxigénio de 5 dias, realizado por Anglian Water, uma solução a 15 DE Virkon Desinfectante não inibiu o teste DBO. Daqui pode-se concluir que Virkon Desinfectante foi degradado sob as condições de teste e não afectou o funcionamento das estações de tratamento de efluentes.
c) Biodegradabilidade: Virkon Desinfectante é constituido principalmente por sais inorgânicos que se decompõem para formar subprodutos inofensivos. O surfactante é um sal de uma cadeia de sulfonato de alquibenzeno e de acordo com a directiva EEC 82/243, proporciona mais de 90% de biodegradabilidade nas condições de teste OECD.

Segurança

a) Saúde & Segurança
Para Virkon não há necessariamente limites de exposição ocupacional de acordo com as exigências estabelecidas no Guia Executivo de Saúde e Segurança, Nota EH 40/89. (Controle de Substâncias Perigosas à Saúde, COSHH, Regulamentos, 1989).
b) Irritabilidade

ESPECTRO DE ACTIVIDADE

Actividade Virucida

	AVES			PORCOS			GADO E CARNEIROS		
VÍRUS	DOENÇAS	FONTE	DILUIÇÕES	DOENÇAS	FONTE	DILUIÇÕES	DOENÇAS	FONTE	DILUIÇÕES
ADENOVIRUS	Símdrome de perder ovos (EDS 127)	MAFF	1:200	Adenovírus do porco	CVL	1:100			
	Enterite hemorrágica	MAFF	1:100						
BIRNAVIRUS	Doença Bursal infecciosa	MAFF / AOAC	1:250						
CIRCOVIRUS	Anemia infecciosa	MAFF	1:250						
CORONAVIRUS	Bronquite infecciosa	CVL / Weybridge	1:280	TGE	CVL	1:280			
	Crina azul de perú	MAFF / AOAC	1:200	Encefalomielite hemoaglutinante	CVL	1:280			
HEPADNAVIRUS	Hepatite viral do pato	LSHTM	1:200						
HERPETOVIRUS	Herpes vírus perú de	MAFF	1:200	Doença Aujeszky	AVRI Pirbright	1:200	Rinotraqueite bovina infecciosa	CVL Weybridge	1:600
	laringotraqueite Infecciosa de Marecks	MAFF / AOAC IAH Compton	1:100 1:200	Cilumega vírus de porco	CVL	1:60			
IRIDOVIRUS				Febre africana de porco	AVRI Pirbright	1:200			
ORTHOMYXOVIRUS	Influenza Asiática	MAFF / AOAC	1:320	Influenza	CVL	1:320			
PAPOVAVIRUS							Papilomatose bovina	CVL Weybridge	1:100
PARAMIXOVIRUS	Doença de Newcastle	MAFF / AOAC	1:280						
	Rinotraqueite infecciosa	MAFF / AOAC	1:200						
PARVOVIRUS	Doença de Derszy	MAFF / AOAC	1:100	Parvo vírus de porco	MAFF	1:50			
PICORNAVIRUS	Encefalo mielite de Aves	MAFF	1:200	Doença vesicular de porco	MAFF AFNOR / Fougères	1:200	Febre aftosa	AFNOR / Fougères	1:100
	Hepatite de vírus de pato	MAFF	1:200	Febre aftosa		1:200			
POXVIRUS	Varíola de Aves	MAFF	1:300	Varíola de porco	CVL	1:300	Varíola de vaca bovina	CVL Weybridge	
REOVIRUS	Tenosynonvitis	Univ Liverpool	1:200	Rota vírus de leitão (scours)	CVL	1:250			
RETROVIRUS	Sarcoma Rous	MAFF	1:200				Maedi & Visna	MAFF	1:400
	Leucose	MAFF	1:200						
	Reticulcendothelioses	MAFF	1:200						
RHABDOVIRUS				Estomatite vesicular	MAFF	1:200	Rábia	MAFF	1:280
TOGAVIRUS				Colera suina	CVL	1:350			
				Febre clássica suina	CVL	1:350			
				Orelha Azul (PRRS)	CVL	1:700			

Actividade Virucida

	AVES	PORCOS	REFERÊNCIAS	
Agente testado	Doenças	Doenças	Fontes	Diluições
BACTÉRIAS				
BACILLUS ANTHRACIS		Antraz	MAFF	1:200
BORDETELLA BRONCHISEPTICA	Infecções Bordetella	Atrophie Rhinitus	MAFF / CVL	1:150
CAMPYLOBACTER	Intoxicação Alimentar	Enterite	Ag. Univ. Uppsala / AOAC	1:100
CLOSTRIDIUM	Enterite Necrótica	Enterite necrótica	Lab. J. Simon, Belgium, EDIN / 555	1:100
ENTEROBACTER CLOACAE	Enterobactéria Infecciosa			
ERISIPILOTHRIX RHUSIOPATHIAE			AOAC	1:100
ESCHERICHIA COLI	Septicemia	Haenidytic colibacterílosis (Scours)	AOAC / AFNOR / Glasgow University	1:100
EUBACTERRIUM	Cistite		Glasgow University	1:200
HAEMOPHILUS	Corisa infecciosa	Pleuropneumonia	MAFF / AOAC / CVL	1:200
KLEBISIELLA PNEUMONIAE		Rinite	Athens University	1:200
LEPTOSFIRA	Leptospirose		Glasgow University	1:200
LISTERIA MONOCYTOGENES	Listeriose			
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM	CRD		MAFF	1:50
PASTEURELLA MULTOVCIDA	Colera de Aves	Rinite Atrofica, pasteurellosis	MAFF / AOAC	1:150
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS	Pseudomona infecciosa		AOAC / AFNOR / TNO / CIVO Holland	1:100
SALMONELLA	Salmonellosis	Salmonellosis	TNO / CIVO Holland	1:100
SALMONELLA ENTERITIDIS &	Salmonellosis	Salmonellosis	MAFF / AOAC / 555	1:100
SALMONELLA PULLORUM & GALLINARUM	Salmonellosis	Salmonellosis		1:500
STAPHYLOCOCUS	Staphylococcal infeccioso	Arterite, meningite	MAFF / AOAC / 555 / TNO / CIVO / CVL	1:100
STREPTOCOCUS	Streptococcal infeccioso	Meningite, Arterite	MAFF / CVL	1:100
TREPONEMA HYODYSENTERIAE		Disenteria Suina	Glasgow University	1:200

Actividade Fungicida

	AVES	PORCOS	REFERÊNCIAS	
Agente testado	Doenças	Doenças	Fontes	Diluições
FUNGI				
ASPERGILLUS	Aspergillosis	Aspergillosis	AFNOR / AOAC	1:100
CANDIDA	Candidiosis	Scours	AFNOR / AOAC	1:100
MICROSPORUM CANIS		Tinha	Hatano Int Japan	1:300
TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES		Tinha	Hatano Int Japan	1:300

Actividade Esporicida

Agente testado	Doenças	Fontes	Diluições
SPORES			
BACILLUS CEREUS	Aborto Bovino	Laboratoire Simone Belgium	
BACILLUS SUBTILIS		PHLS, UK	1 - 3%
ASPERGILLUS NIGER	Aspergillosis	Milan University	1:100
CLOSTRIDIUM SPOROGENES	Infecções Clostriodiais	Laboratoire Simone Belgium	1:100

USO DE VIRKON

Produção Animal.
Suinicultura, Bovinos, Ovinos, Caprinos, Coelhos.

Produção Láctea.
Indústria de Lacticínios, Salas de Ordenha.

Produção de Aves.
Centros de Incubação; Avicultura: frangos, galinhas poedeiras, patos, perus.

Pisciculturas
Apiários
Matadouros
Mercados de Animais de Criação
Clínicas Veterinárias
Processamento de Alimentos

Instruções de Uso

Devido ao seu alto nível de segurança e ao seu espectro de actividade biocida, excepcionalmente largo, Virkon pode ser usado para uma grande variedade de finalidades.

Uso	Diluição	Aplicação
DESINFECTANTE TERMINAL Onde existe um vírus específico, aplique Virkon de acordo com a rotina de limpeza usando um lavador a pressão ou outro equipamento apropriado de spray.	1:100 ou veja aprovação MAFF e tabela de actividade virucida.	200 - 300 ml/m²
LIMPAR E DESINFECTAR EQUIPAMENTOS Para limpar e desinfectar equipamentos em exploração, no processamento de alimentos, chocadeiras, etc...	1:200 - 1:100 (0,5% - 1%) dependendo do nível de sujidade.	300 - 400 ml/m²
CONTROLAR E DESINFECTAR EQUIPAMENTOS 1- Para desinfectar água de beber e sistemas de água na limpeza final. 2- Esterilização contínua de água.	1:400 (0,25%) 1:1000 (0,1%)	Doseie tanque principal e sistema de drenagem. Deixe pelo menos 30 minutos. Doseie tanque principal de acordo com necessidade.
NEBULIZAÇÃO Para substituir a fumigação perigosa e ineficaz com formalina, use uma máquina de nebulização como parte de uma rotina de desinfecção final.	1:100 (0,1%)	Aplique 1 litro de solução por 100 m³
DESINFECÇÃO AÉREA Para ajudar a reduzir infecção cruzada durante surtos de doenças, especialmente doenças respiratórias - use um lavador a pressão em baixa pressão, um nebulizador de carregar às costas ou nebulizador ULV.	1:200 (0,5%)	Aplique suficiente para encher a atmosfera com uma fina névoa 1 litro de solução por 100 m³ de espaço aéreo.

Antec International
Windham Road, Sudbury, Suffolk CO10 6XD, England
Tel: (01787) 377305 Telex: 987495 Fax: (01787) 310848

FM 23836
BS 5750/ISO 9002

De acordo com a directiva EEC 67/548/EEC, o Virkon Desinfectante na diluição de 1% para utilização está classificado como: - Não irritante para a pele - Não irritante para os olhos.