

part 1:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -4 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = 1 \times (-2 - 4) - (-4) \times (8 + 4) + 2 \times (8 - 2) \\ = -6 + 48 + 12 = 54 \neq 0 \Rightarrow \text{inverse exist}$$

$$M^T = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -4 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$M^{-1} \cdot M = I \Rightarrow M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{-1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{5}{18} \end{pmatrix}$$

part 2: $M \cdot X = \lambda X$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & -4 & 2 \\ -4 & 1-\lambda & -2 \\ 2 & -2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (1-\lambda)((\lambda-1)(2+\lambda)-4) + 4(8+4\lambda+4) + 2(8-2+\lambda) = 0 \\ \Rightarrow \lambda = -3, 6$$

$$\Rightarrow X_1 = \begin{pmatrix} -0.75 \\ -0.67 \\ 0.60 \end{pmatrix} \quad X_2 = \begin{pmatrix} -0.60 \\ 0.67 \\ 0.52 \end{pmatrix} \quad X_3 = \begin{pmatrix} 0.30 \\ -0.33 \\ 0.85 \end{pmatrix}$$

Part 3:

$$\nabla_A f(A) = \left[\begin{array}{ccc} 2X_{11}X_{22}X_{23} + X_{12}X_{13}X_{31} & X_{11}X_{13}X_{31} & X_{11}X_{12}X_{31} \\ -X_{11}^2X_{12} & X_{11}^2X_{22} & \sqrt{2}X_{11} \end{array} \right]$$

$$\nabla_A f(A) = \begin{pmatrix} -x_{33}^2 x_{32} & x_{11}^2 x_{23} & x_{11}^2 x_{22} \\ x_{11} x_{12} x_{13} & -x_{33}^2 x_{21} & -2x_{11} x_{32} x_{21} \end{pmatrix}$$

Part 4:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 3x^2 y + yz \cos(x) + y^2 z^5 \quad \frac{\partial g}{\partial y} = x^3 + z \sinh(x) + 2x y z^5$$

$$\frac{\partial g}{\partial z} = y \sinh(x) + 5x y^2 z^4$$

$$H(g) = \begin{pmatrix} 6xy - yz \sinh(x) & 3x^2 + z \cos(x) + 2yz^5 & y \cos(x) + 5y^2 z^4 \\ 3x^2 + z \cos(x) + 2yz^5 & 2x z^5 & \sinh(x) + 10xy z^4 \\ y \cos(x) + 5y^2 z^4 & \sinh(x) + 10xy z^4 & 20xy^2 z^3 \end{pmatrix}$$