HOMOCLAVE	Peso al nacimiento	porcentaje de natalidad	ganancia de peso	edad de destete	peso a los 12 meses	edad de inicio de consumo de alimento solido	porcentaje de mortalidad en lactantes	edad de descorne	metodo de suministro de calostro	protocolo de identificacion animal	estado de salud	diseño y seguridad de las areas de manejo	partos	disponibilidad de sombra natural o artificial	disponibilidad de limpieza	manejo de bajo estrés
RL_B_161	32	87	2	8	200	14	4	19	natural	sano	deficiente	eutocicos	distocico	suficiente	libre acceso	parcial

Enfermedad	Septicemia por Colibacilosis(Escherichia coli)
descripcion	Infección bacteriana sistémica que ocurre comúnmente en becerros neonatos (primeros 5 dias de vida) debido a una falla en la transferencia de inmunidad pasiva (falla de encalostramiento).
Diagnostico	Aislamiento bacteriológico a partir de sangre o bazo; determinación de inmunoglobulinas séricas (refractometría) para confirmar falta de calostro.
Tratamiendo	Antimicrobianos sistémicos de acción rápida, fluidoterapia intravenosa con glucosa y electrolitos.
Medicamento	Enrofloxacina (5 mg/kg I.M.) o Ceftiofur (1-2 mg/kg I.M.) + Dexametasona o Flunixin Meglumine.

