	Disponibilidad y limpieza de fuentes de agua	Condiccion de los comederos	Drenaje y estado del suelo en los corrales	Eficacia del monitoreo de enfermedades	Estado de la salud podal	Métodos de identificación visibles y seguros	Facilidad de manejo en las mangas y básculas	Peso al destete	Ganancia diaria de peso	crecimiento temprano	consumo de materia seca	carga animal	porcentaje de mortalidad en	ganancia compesatoria	edad al primer servicio
HOMOCLAVE	limpias	bueno	activo	sanos	sanos	sin arete	seguro	29	2	145	2	57	1	2,3	17

RL_C_012

Enfermedad	Dermatofilosis (Estreptotricosis)
descripcion	Actinomiceto exudativo que causa una dermatitis epidérmica con formación de costras gruesas en pincel, asociada a épocas de alta humedad, lluvia y ectoparásitos.
Diagnostico	Examen microscópico de frotis de exudado bajo las costras teñido con Giemsa (cadenas bacterianas en "vías de tren").
Tratamiendo	Antibióticos sistémicos de amplio espectro, baños antisépticos y secado del ganado.
Medicamento	Penicilina-Estreptomicina (20,000 UI/kg I.M. cada 24 h por 3-5 días) o Oxitetraciclina L.A.

